

Précautions en cas d'usage du poppers ... : en cas d'usage, utiliser avec modération / ENIPSE, Équipe nationale d'intervention en prévention et santé pour les entreprises.

Contributors

Équipe nationale d'intervention en prévention et santé pour les entreprises

Publication/Creation

[between 2004 and 2014?]

Persistent URL


<https://wellcomecollection.org/works/szxusweb>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



**PRÉCAUTIONS EN CAS D'USAGE
DU POPPERS**

PRÉCAUTIONS EN CAS D'USAGE DE POPPERS



- Ne pas utiliser en cas de problèmes cardio-vasculaires.



- Ne pas associer avec un vasodilateur masculin de type *Viagra[®], Cialis[®], Levitra[®]...*



- Provoque des brûlures au contact des muqueuses.



- Ne pas avaler, ni injecter.



- Ne pas fumer.

EN CAS D'USAGE, UTILISER AVEC MODÉRATION

ENiPSE

EQUIPE NATIONALE
D'INTERVENTION EN PREVENTION
ET SANTE POUR LES ENTREPRISES