

TPE stop le risque : comment ou quand : rapport non protégé ...rupture de préservatif ...éjaculation dans la bouche : traitement post exposition : 48h pour agir / SNEG, santé et prévention ... ENIPSE.

Contributors

Syndicat national des entreprises gaies
Équipe nationale d'intervention en prévention et santé pour les entreprises

Publication/Creation

[between 2012 and 2014?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/prgjyp9h>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Rapport non protégé
... Rupture de préservatif
... Ejaculation
dans la bouche ...

TPE



QUAND


COMMENT

OU

TRAITEMENT POST EXPOSITION

48^H
pour
Agir ►

T.P.E. (TRAITEMENT



C'est quoi ? Le T.P.E. est un traitement anti-rétroviral temporaire de 4 semaines. Le but est de diminuer le risque d'infection par le VIH immédiatement après un risque d'exposition.


Pour qui ? Il concerne les personnes séronégatives ou qui ne connaissent pas leur statut sérologique.



Où ? Rendez-vous le plus vite possible aux urgences de tout hôpital (au mieux dans les 4 heures et au plus tard dans les 48 heures) de préférence avec votre partenaire. Le médecin évaluera avec vous le risque pris et l'intérêt de vous prescrire un traitement post exposition. Ce traitement réduit le risque de contamination par le VIH mais il ne l'élimine pas complètement.

POST EXPOSITION)

Test : Si la prise de risque date de plus de 48 heures, faites-vous dépister. L'infection peut être détectée dès le 15^e jour. Si le résultat du test est négatif, ce n'est que 6 semaines après la prise de risque qu'un autre test permettra de savoir avec certitude que vous n'êtes pas atteint par le VIH.



Protection : il est important d'utiliser systématiquement le préservatif, avec tous vos partenaires, jusqu'au prochain résultat des tests de dépistage.

Dialogue : Si vous aviez arrêté le préservatif avec votre partenaire régulier, il est important de discuter de votre prise de risque et de la nécessité de vous protéger à nouveau dans l'attente de votre test de dépistage.



OÙ TROUVER D'AUTRES INFORMATIONS ?

- ▶ SIDA INFO SERVICE - Tél. : 0 800 840 800
www.sida-info-service.org
- ▶ Les Centres de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) ou les Centre d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles (CIDDIST)
- ▶ Votre médecin traitant
- ▶ Nos chargés de Prévention en scannant le QR Code ci-contre ou sur www.sneg.org



L'axe Prévention du SNEG change d'identité et devient :

ENiPS3

EQUIPE NATIONALE
D'INTERVENTION EN PREVENTION
ET SANTE POUR LES ENTREPRISES