

**Chemipharm präsentiert: Praecimal : Chemipharm präsentiert:
Stufentherapie Prednirheumin-kombi.**

Contributors

Chemipharm

Publication/Creation

[1972?]

Persistent URL


<https://wellcomecollection.org/works/dazdf7r8>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>




Migräne und vasomotorische Kopfschmerzen



Vasomotorische Kopfschmerzen und Migräne



Migräne und vasomotorische Kopfschmerzen



Vasomotorische Kopfschmerzen und Migräne



Migräne und vasomotorische Kopfschmerzen



Vasomotorische Kopfschmerzen und Migräne



Migräne und vasomotorische Kopfschmerzen



Vasomotorische Kopfschmerzen und Migräne



Migräne und vasomotorische Kopfschmerzen

Praecimal.

Zusammensetzung:

	Gel-Kapseln	Gel-Supp.
Ergotamintartrat	0,75 mg	1 mg
Mepyraminmaleat	20 mg	30 mg
Nicotinsäureamid	50 mg	75 mg
Coffein	50 mg	100 mg


Indikationen: Migräne, vasomotorische und posttrau-

matische Kopfschmerzen, Wetterfühligkeit.
Kontraindikationen: Hypertonie, periphere arterielle Durchblutungsstörungen, Leber- und Nierenschäden, Gravidität.
Nebenwirkungen: Aufgrund des Antihistaminikums Mepyraminmaleat kann bei einzelnen Patienten Müdigkeit auftreten.

Dosierung: Bei Beginn des Migräneanfalls 2 Gel-Kapseln oder Gel-Suppositorien, in schweren Fällen bis zu 6 Gel-Kapseln.
Bei einfachen vasomotorischen Kopfschmerzen 1-2 Gel-Kapseln.
Handelsformen: Packung mit 30 Kapseln 9,30 DM. Schachtel mit 10 Supp. 9,80 DM.



Chemipharm präsentiert:



Stufentherapie Prednirheumin-kombi

Zusammensetzung:

	Prednison	Phenylbutazon
3 Drg. dkl-rot	20 mg	200 mg
3 Drg. rot	15 mg	200 mg
3 Drg. orange	10 mg	200 mg
3 Drg. gelb	5 mg	200 mg
3 Drg. hellgelb	2,5 mg	200 mg
15 Drg. weiß	0 mg	200 mg

Indikationen: Polyarthritis, Spondylitis ankylopoetica, Arthrosen mit entzündlichen Begleiterscheinungen, akut schmerzhaftes Weichteilrheuma.
Kontraindikationen: Haemorrhagische Diathese, Leukopenie, Hypertonie, Herz- und Niereninsuffizienz, Ulcusanamnese, Diabetes mellitus, Gravidität.
Nebenwirkungen: Übliche Nebenwirkungen der Kor-

tisonoidtherapie werden durch die kurzfristige Verabreichung weitgehend vermieden.

Dosierung: Täglich 1 Dragée in der angegebenen Reihenfolge. Anschließend Übergang auf 1-2 weiße Dragées.

Handelsform:

Packung mit 30 Dragées 11,90 DM.