

**Resyl Name geschützt CIBA (Glyzerinäther des Guajakols) : gut resorbierbares Guajakol-Präparat.**

**Contributors**

CIBA Limited

**Publication/Creation**

[between 1940 and 1949?]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/y6frfdn9>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

# RESYL

Name geschützt

»CIBA«

(Glyzerinäther des Guajakols)

## Gut resorbierbares Guajakol-Präparat

Expektorans und Antiseptikum bei  
akuten und chronischen Erkrankungen der  
Atmungsorgane, Husten, Bronchialkatarrh,  
Pertussis, Grippe, Pharyngitis, Laryngitis

Sirup

mit und ohne  
Kodein

Tropfen



CIBA-  
AKTIENGESELLSCHAFT  
BERLIN-WILMERSDORF



# Resyl

enthält als wirksamen Bestandteil den Glyzerinäther des Guajakols, der sich durch besonders günstige Resorbierbarkeit auszeichnet ohne die Reizwirkung des Guajakols auf die Magenschleimhaut zu besitzen.

## Handelsformen:

**Resyl-Sirup**  
mit und ohne Kodein  
Kodein phosph. 0,05 ad 200 g  
Flaschen zu ca. 200 g

**Resyl-Tropfen**  
mit und ohne Kodein  
Kodein phosph. 0,1 ad 20 g  
Flaschen zu ca. 20 g

## Dosierung:

**Resyl-Sirup**  
Erwachsene 2—4 Eßlöffel täglich  
Kinder 2—4 Teelöffel täglich

**Resyl-Tropfen**  
Erwachsene 3—4 mal täglich 20 Tropfen in Wasser, Tee oder anderen Flüssigkeiten  
Kinder je nach Alter 5—15 Tropfen 3—4 mal täglich.



**CIBA AKTIENGESELLSCHAFT**  
**BERLIN-WILMERSDORF**