

Éphépirine : composition: acide acetylsalicylique 500 mgr. : chlorhydrate d'éphédrine 15 mgr.

Contributors

Albert Couvreur Pharmacien

Publication/Creation

[between 1925 and 1935?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/rfdqvgp5>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

ÉPHÉPIRINE

COMPOSITION :

Acide acetylsalicylique 500 mgr.

Chlorhydrate d'éphédrine 15 mgr.



SAMENSTELLING :

Acetylsalicylicumzuur 500 mg.

Ephedrine hydrochloride 15 mg.

ÉPHÉPIRINE

COMPOSITION :

Acide acétylsalicylique 500 mg.
Chlorhydrate d'éphédrine 15 mg.

PROPRIÉTÉS PHARMACODYNAMIQUES :

Réunit à l'action analgésique, antipyrrétique et anti-rhumatismale de l'acide acétylsalicylique, les propriétés toniques et stimulantes de l'éphédrine naturelle sur les fonctions circulatoires et respiratoires.

INDICATIONS :

Maladies infectieuses aiguës, grippe, rougeole, etc.
Douleurs rhumatismales, névralgies, céphalées.

POSOLOGIE :

Enfants en dessous de 5 ans, deux fois $\frac{1}{2}$ comprimé pendant la journée.

Adultes, 1 à 4 comprimés par jour.

L'EPHEPIRINE comme les autres produits éphédrinés doit se prendre à une certaine distance des repas.

PRESENTATION :

Tube de 20 comprimés divisibles.

EPHEPIRINE

SAMENSTELLING :

Acetylsalicylicumzuur 500 mg.
Ephedrine hydrochloride 15 mg.

PHARMACODYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN :

Ephepirine voegt bij de analgetische antipyretische en antirhumatische werkingen van het acetylsalicylicumzuur de tonische en stimulerende eigenschappen der natuurlijke ephedrine op den bloedsomloop en de ademhalingswegen.

AANWIJZINGEN :

Acute infectieuze ziekten, griep, mazelen, enz., rhumatische pijnen, nevralgiën, hoofdpijn.

DOSEERING :

Kinderen beneden 5 jaar, tweemaal $\frac{1}{2}$ tablet per dag.
Volwassenen, 1 à 4 tabletten per dag.
EPHEPIRINE wordt zooals alle ephedrine produkten buiten de eetmalen genomen.

ORIGINEELE VERPAKKING :

Buisje met 20 verdeelbare tabletten.



**ETABLISSEMENTS FIRMA
ALBERT COUVREUR**

78-80, rue Gallait BRUXELLES III

78-80, Gallaitstraat BRUSSEL III