

Hepacupryl.

Contributors

Albert Couvreur Pharmaciens

Publication/Creation

[between 1925 and 1935?]

Persistent URL


<https://wellcomecollection.org/works/g9mjdbdm>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



HEPACUPRYL

HEPACUPRYL

COMPOSITION :

Extrait de foie de veau correspondant à 100 grammes d'organe frais	{ pour une Citrate de fer 5 mg. ampoule Acétabate de cuivre 1 mg. 10 cc.
---	--

PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES :

L'HEPACUPRYL apporte à l'organisme le principe anti-anémique et hématopoïétique. En associant l'extrait de foie au fer et au cuivre, l'HEPACUPRYL s'oppose et combat toutes anémies hypochromes secondaires, le cuivre jouant le rôle très important de catalyseur. De plus, l'apport de fer et de cuivre stimule les défenses en cas de maladies infectieuses et reconstitue les réserves en ces métaux.

INDICATIONS :

Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromes, anémies secondaires hypochromes, d'origine infectieuse ou hémorragique, convalescence, grossesse.

POSOLOGIE :

Une à deux ampoules par jour.

PRESENTATION :

Ampoules buvables de 10 cc.
Boîte de six ampoules.

ETABLISSEMENTS ALBERT COUVREUR

Pharmacien

78-80, RUE GALLAIT, BRUXELLES

HEPACUPRYL

SAMENSTELLING :

Kalfleverextract overeenkomend met 100 gram versch orgaan	} voor één IJzercitraat 5 mg. Koperacetaat 1 mg. ampul 10 cc.

PHARMACODYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN :

Het HEPACUPRYL brengt het organisme het anti-anemisch en hæmatopoëtisch princiep aan. Door aan het leverextract het ijzer en het koper te voegen, bestrijdt het HEPACUPRYL al de hypochrome secundaire bloedarmoeden, het koper spelt hier de rol eener katalysator.

Wat nog meer is, de aanbrenqst van ijzer en van koper verscherpt de verdediging in geval van infectieuze ziekten en herstelt de reserven van deze metalen.

AANWIJZINGEN :

Pernicieuze anæmie en andere hyperchrome anæmiën, secundaire hypochrome anæmiën van infectieusen of hæmorragischen oorsprong, herstelperiode, zwangerschap.

DOSEERING :

Een tot twee ampullen dagelijksch.

VOORSTELLING :

Drinkbare ampullen van 10 cc.

Doos van zes ampullen.

FIRMA ALBERT COUVREUR

Apotheker

78-80. GALLAITSTRAAT, BRUSSEL

