

**Streptococyl : comprimés dosés à 0 gr. 40 de paraaminobenzènesulfamide.**

**Contributors**

Albert Couvreur Pharmaciens

**Publication/Creation**

[between 1925 and 1935?]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/uddzjkqr>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome  
collection**

Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

# STREPTOCOCCYL

Comprimés dosés à 0 gr. 40 de paraaminobenzènesulfamide



### INDICATIONS :

STREPTOCOCCIES, infections pures et mixtes, affections à gonocoques et à colibacilles.

### INCOMPATIBILITÉS :

Sulfates et aliments soufrés : œufs, moutarde, etc. Rayons U. V. — Novocaïne. — Papavérine. — Barbituriques.

### POSOLOGIE :

#### Adultes :

Celle-ci est évidemment variable suivant la gravité de l'affection et l'état général du sujet.

Dose quotidienne : 0 gr. 05 à 0 gr. 15 par kilo du poids du corps, soit 8 à 24 comprimés pour un adulte de 60 kilos, dose à répartir de 4 heures en 4 heures.

Les doses fortes permettant plus rapidement la cessation du médicament, sont préférables aux doses faibles répétées, celles-ci risquant de créer un état de sulfamido-résistance.

#### Enfants :

En raison de l'intégrité des fonctions hépatiques, le STREPTOCOCCYL peut être administré aux mêmes doses que chez l'adulte, soit 0 gr. 05 à 0 gr. 15 par kilo du poids du corps et par 24 heures.

### PRÉSENTATION :

Tube de 20 comprimés divisibles dosés à 0 gr. 40.

---

Établissements Albert COUVREUR

PHARMACIENS

78-80, rue Gallait

B R U X E L L E S