

Ulcigel.

Contributors

Albert Couvreur Pharmaciens

Publication/Creation

[between 1925 and 1935?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/a83zd8cy>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

ULCIGEL



ULCIGEL

COMPOSITION :

Silicate d'alumine 1,66 gr.
Silicate double d'alumine et de soude 1,66 gr.
Kaolin colloïdal 1,66 gr.
par sachet.

PROPRIÉTÉS :

Sous l'influence de l'acide chlorhydrique, l'ULCIGEL libère l'acide silicique et l'hydroxyde d'alumine qui forment un gel protecteur recouvrant la muqueuse.

Le pH du suc gastrique s'élève par formation de chlorures facilement solubles non irritants.

En outre, le kaolin colloïdal joue un rôle absorbant important.

INDICATIONS :

Ulcères gastro-duodénaux, hyperacidité, gastrites, dyspepsies douloureuses.

MODE D'EMPLOI :

1 à 2 paquets délayés dans un verre d'eau.
A prendre avant les principaux repas.

ÉTABLISSEMENTS ALBERT COUVREUR
78-80, rue Gallait BRUXELLES

ULCIGEL

SAMENSTELLING :

Aluminium silicic. 1,66 gr.
Aluminium natrium silicic. 1,66 gr.
Bolus alba colloïd. 1,66 gr.
per pakje.

EIGENSCHAPPEN :

Onder den invloed van het zoutzuur maakt ULCIGEL het silicicumzuur en het aluminium hydroxyde vrij en deze vormen een beschermende laag die het slijmvlies bedekken. Het pH van het maagzuur wordt verhoogd door de vorming van gemakkelijk oplosbare, niet prikkelende, chloriden. Het colloïdaal bolus alba heeft een absorbeerende werking.

AANDUIDINGEN :

Maag- en duodenumzweren, hyperaciditeit, gastritis, pijnlijke spijsverteringsstoornissen.

GEBRUIKAANWIJZINGEN :

1 à 2 pakjes in een glas water oplossen. In te nemen vóór de voornaamste maaltijden.

FIRMA ALBERT COUVREUR
78-80 Gallaitstraat BRUSSEL

