

Nadisan.

Contributors

Boehringer Mannheim GmbH

Publication/Creation

[1959?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/u9a4nqmf>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Nadisan

นาดิซาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก จำ
นวนมหาศาลมีชีวิตอยู่อย่างผา
สุข เพราะรับประทาน นาดิซาน
เพียง วันละเม็ด แทนการฉีด
อินซูลิน

1 tablet daily instead of
insulin. Nadisan has been
used successfully for the
last 3 years in the
treatment of about 500000
diabetics in more than
80 countries.



Nadisan

Oral antidiabetic agent
for the treatment of stable diabetes.

Special indications:

Treatment of diabetes mellitus in older patients
(above 40 years)
of sthenic-adipose constitution,
who have not hitherto
been treated with insulin.

Change-over from insulin
to Nadisan therapy in elderly sthenic-adipose patients
who have not been treated with insulin
for more than 5 years.

Routine control of blood and urine sugar
is particularly important in these cases.

Available
in packs containing 20 and 40 tablets
and hospital packs containing 200 tablets.



Sole Agents in Siam:
Messrs. B. Grimm & Co.
P.O. B. 66
Bangkok

นาดิซาน:

ยานี้เกิดขึ้นกับโรคเบาหวาน ของ เบอริงเกอร์
เป็นยาตัวแรก ๔ ปี ที่แพทย์ทั่วโลกใช้ "นาดิซาน"
ยังไม่ปรากฏว่า เกิดผลร้ายที่พิสูจน์ได้เนื่องจากยา
ชนิดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดปกติทาง
ไต ยานี้เป็นยา ๒ ชนิด "นาดิซาน" จึงเป็นที่ยอมรับ
ใช้กันอยู่ทั่วไป และความจริงนั้นคนนิยมใช้ส่วน
รวม ของ "นาดิซาน" ยังเห็นอกว่า ยานี้ประเภท
คล้ายคลึงกันที่ออกใหม่ๆ ด้วย


- ๑) นาดิซาน มี Depot Effect จึงมีระยะเวลาที่ยาวนานในเลือด
ไว้ได้นานและสม่ำเสมอ ตัดกังวลในการรับประทาน
- ๒) นาดิซาน ออกฤทธิ์ช้าลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เหมาะสำหรับผู้
ป่วยโรคเบาหวานที่หนักแน่น หรือโรคเรื้อรังติดต่อ
- ๓) นาดิซาน ลดน้ำตาลในเลือดได้เด็ดขาด รับประทาน
วันละครั้งเดียวก็พอ ปลอดภัยในการใช้

หิ้ง บี. กริม แอนด์ โกลด์ ถนนนครสวรรค์ พระนคร
ทั้งนี้ในส่วนสถานีวิทยุสมัครเล่น สำหรับงานประชาสัมพันธ์

How do I treat elderly diabetics?


a) without previous insulin therapy:

In general practice, the elderly ambulant patient can be treated with Nadisan, if insulin therapy has not been given previously. Particularly in sthenic-adipose patients whose metabolism cannot be stabilised by even a strict dietary regime, Nadisan restores the blood sugar to normal values without wide fluctuations.



b) after previous insulin therapy:

The change-over from insulin to Nadisan therapy should only be undertaken if blood and urine sugar can be checked routinely. The lower the previous insulin requirements, the greater the chances of therapeutic success. The maintenance dose is adjusted to individual requirements.



Dosage:

A single dose of Nadisan daily restores the blood sugar to normal levels.

The following doses can be regarded as a guide:

4—6 tablets on the first day

3—4 tablets on the second day

$\frac{1}{2}$ —2 tablets on all subsequent days.

The tablets should be taken after breakfast in some liquid.

Nadisan