

**Entomologia Parisiensis; sive catalogus insectorum quae in agro Parisiensi
reperiuntur / [Antoine-François de Fourcroy].**

Contributors

Fourcroy, Antoine-François de, comte, 1755-1809.

Publication/Creation

Parisiis : [Cuchet], 1785.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/qga6qqrx>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.


You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>







23,091/A

ENTOMOLOGIA

PARISIENSIS;

SIVE

CATALOGUS Insectorum quæ in Agro
Parisiensi reperiantur ;

SECUNDUM methodum Geoffræanam in
sectiones , genera & species distributus :

CUI addita sunt nomina trivalia & fere trecentæ novæ
Species.

Edente A. F. DE FOURCROY , Doct.
Med. Paris. ; è Reg. Scientiar. Academ. ;
è Reg. Soc. Medic. &c.

PARS PRIMA.



PARISIIS,

VIA ET ÆDIBUS SERPENTINEIS.

M. DCC. LXXXV.

SUB PRIVILEGIO ACADEMIÆ.

PARIS 1812

212

Catalogue de la Bibliothèque

de la Ville de Paris

pour l'année 1812

Par M. le Directeur de la Bibliothèque

de la Ville de Paris




et de la Bibliothèque

de la Ville de Paris

de la Ville de Paris

PARIS 1812



PARIS 1812

PARIS 1812

PARIS 1812

PARIS 1812



LECTORI ENTOMOPHYLO

MONITUM EDITORIS.

*J*AM à viginti annis prodiit celeb. Geoffroy de insectis opus eximium, quod multo favore prosecuti sunt historię naturalis cultores. Dudum à plurimis expectabatur manuale Compendium quod nomenclaturam & methodum complectens, omissâ scilicet historicâ parte, rus deferri posset. Non ergo ingratum entomophylis fore arbitratus est illustr. autor, si catalogus insectorum quæ circa Parisios reperiuntur typis parvâ formâ mandaretur, Botanicon Parisiensis ad instar. Felicissimæ apud cives suos praxeos medicæ curis distractus, hoc quod susceperat opus omnino absolvere non potuit. Entomologiæ olim deditus & auctoris auxilio fretus, hunc catalogum

publici juris facere non timui. Methodum ill. Geoffroy, genera, species, descriptivas sententias, religiosè servavi. Trivialia, sæpius Linneana, ipse autor addidit, quæ in magno opere (I) neglexerat. Hæc simul datâ occasione quædam in methodo suâ emendavit, adjecit plurima. Sic genus Eulophi post Tenthredines omnino omissum est, cum sedulâ attentione factâ, Eulophus nihil aliud sit quàm verus Cynips antennis ramosis. Hinc insectum illud inter cynipes nunc incedit. Præterea multæ à viginti annis novæ in agro Parisiensi detectæ sunt insectorum species, quæ ad sua quæque genera revocatæ sunt; sed ut novæ illæ species quæ ducentum & quinquaginta superant à cæteris in historiâ Insectorum in-4^o. descriptis

(I) Hist. abreg. des Insectes, par M. Geoffroy, 2 vol. in-4^o. Paris, 1764.

distinguantur, singulas asterico notandas curavi. Specierum dimensiones, & habitationum loca adjeci; sic ergo quoad numerum specierum & nomenclaturam hic catalogus multo auctior & emendatior magno opere in-4^o. prodit, & hanc illustrationem celeb. Geoffroy. omnino deberi fateor. Levia quædam vel addidi, vel mutavi tantum, quæ hic commemorare supervacuum duco; simplicis igitur editoris munus suscepi, utilitatis potius quam gloriæ spe ductus.

Dabam Lutetiæ, mense apr. 1785.



INSECTORUM DIVISIO GENERALIS.

Insecta dividuntur in sex sectiones.

SECTIO I. *Coleoptera*, quorum alæ coleoptris seu elytris teguntur & quibus est os maxillosum.

SECTIO II. *Hemiptera*, quorum alæ superiores elytris accedunt, & quorum os sub thorace est inflexum.

SECTIO III. *Tetraptera alis farinaceis*, quibus sunt quatuor alæ squamulis tectæ.

SECTIO IV. *Tetraptera alis nudis*, quibus alæ quatuor sunt membranaceæ.

SECTIO V. *Diptera*, quibus sunt alæ duæ & halteres sub alarum origine.

SECTIO VI. *Aptera*, quæ carent alis.

Prima autem sectio, coleopterorum scilicet, cum maxime numerosa sit, in articulos & ordines dispertitur.

Articulus primus insecta coleoptera comprehendit quæ coleoptra gerunt integra & dura.

Articulus secundus ex iis componitur quorum coleoptra dura sunt, sed dimidiata, seu semisecta ita ut abdomen non omnino tegant.

Articulus tertius ea exhibet insecta, quorum coleoptra mollia sunt & membranacea.

Ex iis articulis quisque in varios ordines dividitur, prout tarsi insectorum varium referunt articulorum numerum, duos nempe, tres, quatuor aut quinque articulos, vel quinque in primo & secundo pedum pari, quatuor verò in posteriore.

ERRATUM.

Pag. 82, lin. 8, tribus lege tibiis.

*EXTRAIT des registres de l'Académie
des Sciences.*

Du 13 Juillet 1785.

LES Commissaires nommés par l'Académie, lui ayant rendu compte d'un Ouvrage de M. DE FOURCROY, intitulé : *Entomologia Parisiensis*, elle a jugé cet Ouvrage digne de son approbation, & de paroître sous son Privilège.

Je certifie le présent extrait conforme à l'original & aux registres de l'Académie. Le 13 Juillet 1785.

Signé, le Marquis DE CONDORCET.

*EXTRAIT des registres de la Société
Royale de Médecine.*

LA Société Royale de Médecine ayant entendu, dans la séance tenue au Louvre le 23 Juin présent mois, la lecture d'un rapport très-avantageux fait par MM. GEOFFROY & MAUDUYT, sur un Ouvrage de M. DE FOURCROY, intitulé : *Entomologia Parisiensis, sive Catalogus Insectorum quæ circa Lutetiam reperiuntur*, &c. a pensé que cet Ouvrage étoit très-digne de son approbation. En foi de quoi j'ai signé le présent. A Paris, ce 28 Juin 1785.

Signé, VICQ D'AZIR, Secrétaire perpétuel.

ENTOMOLOGIA

Notée

Sur L'Entomologie Parisienne

Contenant

- 1^o. un Résumé de la méthode de Geoffroi
- 2^o. un Résumé de celle d'Olivier.

Paris au Sept.

Résumé

de la méthode de Geoffroi.

Classification.

- 1^o Coléoptères ayant des ailes recouvertes par des étuis ou Elytres; bouche armée de mâchoires dures page 1^{ere}.
- 2^o Hémiptères ailes super. presque semblables à des étuis; bouche armée d'une trompe aigue, repliée en dessous le long du corps. page 184.
- 3^o Tétraptères à ailes farineuses: 4 ailes chargées de poussière écailleuse. page 1^{re} 233.
- 4^o Tétraptères à ailes nues: 4 ailes membraneuses, nues & sans poussière. page 343.
- 5^o Diptères. 2 ailes, un petit balancier au dessous de leur origine. page 454.
- 6^o Aptères Corps sans ailes. page 517.

Subdivisions des Classes.

Classe 1^{re} Coleoptères.

art. 1^{er} Étais durs qui couvrent tout le Ventre p. 1.

ordre 1^{er} 1 articles à tous les Tarses (page 1.)

ordre 2^e 4 articles à tous les Tarses (page 71)

ordre 3^e 3 articles à tous les Tarses (page 143)

ordre 4^e 1 arti. aux 4 piés de devant, 4 à coup de d^{re} (p. 152)

article 2^e Étais durs qui ne couvrent qu'une partie du Ventre (p. 163)

ordre 1^{er} 1 articles à tous les Tarses (p. 163.)

ordre 2^e 4 articles à tous les tarses (p. 173)

ordre 3^e 3 articles à tous les Tarses (p. 175)

ordre 4^e 1 art. aux 4 piés de devant, 4 à coup de d^{re} (p. 176)

article 3^e Étais mous & co^e membraneux (p. 177)

ordre 1^{er} 1 art. aux 4 piés de devant, 4 à coup de d^{re} (p. 177)

ordre 2^e 2 articles à tous les tarses (p. 178)

ordre 3^e 3 articles à tous les Tarses (p. 179)

ordre 4^e 4 articles à tous les Tarses (p. 182)

ordre 5^e 5 articles à tous les Tarses (p. 183)

Classe 4^e Tétraptères ailes mées

ordre 1^{er} 3 articles à tous les Tarses (p. 343)

ordre 2^e 4 articles à tous les Tarses (p. 350)

ordre 3^e 5 articles à tous les Tarses (p. 350)

Toutes les autres classes sous sous divisions

Genres.

1°. Coleoptères. Etuis durs & luisants.

Doit tous à 6 articles

- Platycerus* antennes en peigne d'un côté, à l'extrémité (2)
Ptilinck antennes en peigne d'un côté, dans toute la longueur (4)
Scarabæus ant. en masse lamellée; 1 cousson entre les Elytres à leur origine (4)
Copris antennes en masse lamellée; point d'écusson entre l'origine des Elytres. (13)
Atelabus ant. en masse entière, brisée au milieu. tête renfoncée dans le corselet (16)
Dermestes ant. en masse perforée; 1^{er} article solide gibbeux: Elytres point bordées (17)
Nirrhud ant. demi-massives, 2^{es} & 3^{es} art. m. longs (25)
Anthrenus ant. en masse solide un peu aplatie, droites (27)
Cistele ant. perforées de trous insensibles^m p. p. prolegs thorax conique non bordé (28)
Peltis ant. id. Thorax & Elytres bordés (29)
Cucupida ant. courtes, cunées. thorax nud en dessous. tête à moitié enfoncée dans le corselet. (33)
Elaeter antennes en file ou filif. insérées entre la cavité de la tête en dessous. corselet terminé en dessous par une pointe recue dans la cavité de la poitrine (35)
Buprestis ant. filif. une q. trochantère, ou appendice à la base des cuisses de derrière (40)
Meloe ant. filif. corselet arrondi en bosse. corps sph. dos couvré (57)
Lampyrus ant. filif. corselet grand, aplati, cachant la tête par un large rebord (58). cotés du ventre plies en papilles.

Cicindela aut. filif. corselet plane, bordé. tête découverte
élytres flexibles (59)

Onaliscus aut. filif. corselet plane, long; terminer
postérieure^m en 2 angles aigus (64)

Hydrophilus aut. en masses, perforées; p: courtes que les
palpes. pies propres à la nage (65)

Dytiscus aut. filif. p: longues que la tête. pies id. (66)

Cyzinus aut. rudes p: courtes que la tête; pies id.
4 yeux (71)

20. doit tous à 4 articles

Melolontha aut. en saie, placées devant les yeux (71)

Prionus aut. en saie, placées dans l'œil. (73)

Leucambus aut. placées dans l'œil, diminuant de grosseur
de la base au sommet. corselet armé de pointes (73)

Leptura aut. id. corselet sans pointes (77)

Stenocorus aut. placées devant les yeux, diminuant de
grosieur de la base au sommet; élytres p:
étroites par le bout (88)

Eupreus aut. filif. à longs articles: corselet plane,
bordé (89)

Cryptocephalus aut. id. thorax bossu, hémisphér. (90)

Crioceris aut. cylindr. à articul. globuleux. corselet
cylindr. (94)

Altica aut. égales partout: cuisses ^{postér. g.} recourbées, &
presque globuleuses (97)

Galera aut. égales partout; artic. un peu recourbés.
corselet, inégal, scabre, bordé (102)

Chrysomela aut. grossissant de la base au sommet; art. globul.
corselet égal, bordé (104)

Mylabris aut. croissant sensible^m à articul. hémisphér.
insérées par un bec; court & plane. hyalères fon

Albinouacer aut. toutes droites, en massue: insérées sur un long bec (115).

Circulio aut. en massues, brisées, placées sur un long bec de subst. cornée (116)

Ostrichus aut. en massue comp. de 3 articles, placées sur la tête: point de bec. corselet cubique, retirant la tête: tarseres nas épineux. (133)

Clerus aut. id. point de bec: corselet un peu cylind. point bordé: tarseres spongieux (134)

Antribus aut. id. point de bec. corselet large, bordé: tarseres spongieux (136)

Scolytus aut. à massue solide. point de bec (139)

Cassida aut. nouvelles, p^{tes} épaisses à l'extrémité. corselet & Elytres bordés. tête couverte par le corselet (140)

Anaspide aut. filif. Croissans sensible^{ment}. écusson à peine visible: corselet plane, lisse, point bordé (141)

3^e 3 articles aux doigts

Loccinella aut. nouvelles, p^{tes} épaisses à l'extrém. p^{tes} courtes que les palpes: corps hémisphér. (143)

Tritoma aut. p^{tes} épaisses sensible^{ment} à l'extrém. Corps oblong (152) aut. p^{tes} longues que les palpes.

4^e 5 art. aux p^{tes} de devant, 4 aux p^{tes} de d^{re}

Diaperis aut. Taxiformes, articul. lentif. perforées. corselet couvrez, bordé (152)

Lyzochroa aut. en peigne d'un côté: corselet inégal, scabre, non bordé (153)

Cantharis aut. filif. corselet id. (154)

Tenebrio aut. filif. corselet uni & bordé (156)

Moidella aut. un peu en fûte, articul. 3 angul. corselet couvrez, p^{te} étroite en devant (151)

Orthotermes aut. filif. corselet à capuchon, ad eut unique (162)
Crococoma aut. à 2^e article en massue (celles des o⁷
soul plier & en peigne au milieu) (163)

2^e Coléoptères; Etuis durs, point entiers.

1^o 5 articles aux tarses

Staphyleus aut. filif. ailes couvertes; abdomen sans
arme (163)

2^o 4 articles aux tarses

Necydalis aut. filif. ailes nues, (173)

3^o 3 articles aux tarses

Forficula aut. filif. ailes recourbées; abdomen armé
de crochets. (175) Supérieur.

4^o 5 articles en avant, 4 en arrière.

Meloe aut. de croissant du milieu vers la base de
le premier (176) point d'ailes.

3^e Coléoptères, à Etuis mous.

1^o 5 articles en avant, 4 en arrière

Blatta aut. filif. des ^{longs} appendices Vesiculux, situés
aux côtés de l'anus, & sillonnés en travers (177)

2^o 2 articles à tous les tarses

Tripe aut. filif. bouche ^{dent} comme une fente longitudinale
tarses Vesiculux (178)

3^o 3 articles aux tarses

Gryllus aut. sétif. queue à 2 soies. 3 oceller (179)

Acridium aut. filif. p^s courtes que la moitié du corps
3 oceller (180)

4^o 4 articles aux tarses

Locusta aut. filif. p^s longues que le corps. 3
occeller. (182)

5^o 5 articles aux tarses

Martha aut. sétif. filif. (183)

6^o une appendice qui revient en dent au bout de coque lachon

Classe 2^e hémiptères.

- Cicada* 3 art. aux tarses : antennes p^{tes} courtes que la tête, 2 ocell. bec réfléchi. 4 ailes, les inf. en croix. (184)
- Cimex* 3 articles aux tarses : ant. p^{tes} longues que la tête, à 4-5 articles. bec réfl. 4 ailes, les sup. à une 1/2 membrane. (194)
- Naucoris* 2 art. aux tarses : ant. très courtes, posées sous les yeux : 4 ailes en croix : 6 piérs, ceux de devant au f. de pincer. 1 écusson. (219) bec refl.
- Notonecta* 2 art. aux tarses : antennes très courtes, posées sous les yeux : bec réfl. 4 ailes en croix : 6 piérs propres à nager : 1 écusson (220)
- Loricæ* 1 seul article aux tarses : ant. béc. 4 ailes id. 6 piérs, ceux de devant au pincer : ceux de derrière propres à nager. Écusson. o (221)
- Helopæ* 1 seul article aux tarses : antennes en pincers. bec réfl. 4 ailes en croix : 4 piérs. (221)
- Psylla* 2 articles aux tarses : bec recourbé naissant entre la 1^{re} & la 2^e paires de cuisses. 4 ailes ant. & latér. piérs propres à sauter. abdomen acuminé 3 ocell. (222)
- Aphidæ* 1 seul article aux tarses : bec réfl. ailes nulles ou toutes 4 droites. piérs propres à marcher abdomen à 2 cornes. (225) ou 2 tubercules.
- Chermès* bec cor. la psylle : (le o⁷ a 2 ailes élevées :) abdomen à 2 appendices sétacés : q^z ressemblent à 1 follicule (227)
- Coccidæ* béc id. ailes id. abdomen id. la q^z ressemble la forme d'un insecte (231)

Classe 3^e. Tetrapt. farinens

- Papilio* antennes en massue: nymphe nue (233)
Sphinx antennes grises unguées; nymphe dans une coque (234)
Pterophore ant. filif. langue en spirale; ailes roussees, roussees velus; nymphe nue horis^{le} (236)
Phalene ant. de croissant de la base au sommet; nymphe dans une coque; larve nue (237)
Tinea ant. filif. id. front un peu proéminent. larve couverte d'une habitation formée par des feu. réunies d'auquelles elle devient nymphe (238)

Classe 4^e. Tetraptera nud.

1^o. 3 articles aux tarses.

- Libellula* ant. très courtes; bouche à mâchoire; 3^e à queue comp. de 2 petits rochers; 3 Ocellen en devant où dans les yeux (243).
Perla ant. filif. ailes égales; couchées sur le dos dans le repos & croisées. bouche à 4 tentacules; queue à 2 soies; 3 Ocellen (248)

2^o. 4 articles aux tarses

- Raphidia* ant. filif. ailes couchées sur le dos dans le repos. bouche à 4 tentacules. Nulle appendice à la queue à la queue: 3 Ocellen (250)

3^o. 5 articles aux tarses

- Ephemerella* ant. très courtes; ailes inf. beaucoup plus courtes que à 2-3 soies: 3 grands Ocellen devant les yeux (250)
Phryganea ant. filif. ailes latérales, en toit, presque s'élev. au milieu: 4 tentacules à la bouche; queue nue 3 Ocellen (253)
Heurostus ant. filif. ailes four. égales: bouche à 4 palpes

formicales

proéminente, queue avec point d'Ocelles (358)
ant. courtes, en masses; épaisses. ailes égales
bouche & 4 palpes proéminentes; queue avec
point d'Ocelles (359)

Panorpa

antennes longues filif. ailes égales; trompe
dure & cylind. terminée en pointe de crabe &
Ocelles (360)

Crabro

ant. en masse; ailes inf. p. courtes. bouche
armée de mâchoires; aiguillon du dernier dentel
Ventre entièrement joint au corselet & par tout
d'égale grosseur. 3 Ocelles (361)

Uroare

ant. filif. ailes & bouche id. aiguillon
dentelé proéminent, couvert d'une gouttière
Ventre id. 3 Ocelles (362)

Tenthredo

ant. ailes, bouche & ventre id. aiguillon
dentelé caché dans le corps. 3 Ocelles (363)

Cinips

ant. brisées, ailes inf. p. courtes, bouche
armée de mâchoires; aiguillon conique entre
2 lames du ventre; ventre presque ovale,
aplati des côtés, attaché au corselet par 1
pied. court. 3 ocelles (364)

Diplolepis

ant. filif. longues. Comp. de 14 art. la 1^{re}
id. Ventre aigu en dessous. (365)

Eulophus

(c'est un cynips) ant. branchues; ailes inf. p. courtes. bouche
armée de mâchoires; aiguillon conique; ventre
presque ovale, attaché au corselet par 1 pied. court
3 ocelles (366)

Ichneumon

ant. filif. longues vibratiles; ailes & bouche
id. aiguillon div. en 3 pièces; ventre attaché au
corselet par 1 pied. long & mince. 3 ocelles (367)

Vespa

ant. brisées dont le 1^{er} anneau est très long

- ailes inf. p. courtes: bouche armée de mâchoires
avec une trompe membraneuse en dedans:
aiguillon simple en pointe. Ventre attaché
au corselet par un ped. court: 3 oceller
corps glabre (429)
- Abelle fourmille* tout id. corps velu, trompe dentée en dedans (442)
aut. & ailes id. (point d'ailes dans les mâles)
bouche armée de mâchoires; ventre attaché
au corselet par 1 ped. court avec une Ecaille
entre deux. 3 oceller. (451)

Classe 5.^e Diptères.

- Astre* Antennes sétacées qui naissent d'un bouton
3 pointes au lieu de bouche. 3 oceller (454).
- Taban* Antennes sétacées coriaces, div. en 4 part.
bouche compr. d'une trompe & de dents qui
se joignent. 3 Oceller. (455)
- Asyle* aut. id. bouche formée par une trompe
simple & aigue. 3 oceller (459)
- Stratymide* aut. sétacées & bridées: bouche avec une
trompe sans dents; l'extrémité du corselet
armée de pointes; 3 Oceller (466)
- Musca* aut. formées par une palette plate &
solide, avec une ^{soie} ou 1 poil latéral. bouche
avec 1 trompe sans dents. 3 oceller (469)
- Tomoxide* aut. formées par une palette, avec un
poil latéral velu: bouche formée par une
trompe simple & aigue. 3 oceller (500)
- Volucelle* aut. formées par une palette, avec un poil
latéral velu, & plaies sur la tête: bouche
formée par une trompe renfermée d'un

- une gaine où bec aigu; 3 ocelles (500)
Stenotela aut. grèves, terminées par une pointe
 & placées sur la gaine de la trompe: bouche
 fournée par une trompe renfermée dans
 une gaine où bec aigu: 3 ocelles (502)
Scutopse aut. filif. bouche avec une trompe, sans
 dents: 3 ocelles (503)
Hypobosca aut. sétacées, très courtes, comp. d'un
 seul poil. bouche fournée par une espèce
 de bec cylindr. & obtus. 3 ocelles (504)
Eipulea aut. filif. un peu pectinées (surtout en
 panache dans les o7). beaucoup p. longues
 que la tête: bouche accompagnée des
 barbillons recourbés & articulés. 3
 ocelles (504)
Ribio aut. en fil. persiliées, presque aussi courtes
 que la tête. bouche id. 3 ocelles (514)
Culex aut. pectinées (en panache dans les o7)
 bouche fournée par un tuyau mince &
 filif. 3 ocelles (515)

Classe 6.^e Aptères.

- Pediulus* 6 pattes, 2 yeux, aut. filif. Ventre juncq (5)
Lodura 6 pattes, 2 yeux; queue fourchue, repliée
 à l'extrémité du ventre, et servant le support
 pour aider l'insecte à sauter. corps
 couvert de petites écailles (522)
Forbicina 6 pattes, dont l'origine est large &
 écailleuse. 2 yeux. bouche avec deux
 barbillons mobiles. aut. filif. 3 filets
 au bout de la queue. corps id. (525)

Pulex 6 pattes propres à sauter. 2 yeux. bouche
recourbée en Dessous. ant. filif. queue
simple & arrondi (§26)

Chelifer 8 pattes. 8 yeux. ant. en pince de crabe
p. longues que la trompe (§26)

Acaride 8 pattes. 2 yeux. ant. simples p. courtes
que la trompe (§27)

Phalangium 8 pattes: 2 yeux: ant. formant un angle
aigu. 2 longs barbillons semblables à
des ant. (§30)

Aranea 8 pattes, 8 yeux (§31)

Monoculus 6 pattes, 1 seul œil. ant. branchues
avec plusieurs poils latéraux. Corps
crustacé (§37)

Binoculus 6 pattes, 2 yeux: ant. simples & séparées
queue fourchée, corps crustacé (§39)

Cancer 10 pattes, les 2 premières en forme de
pinces: 2 yeux: ant. filif. queue comp.
de plusieurs lames. corps crustacé (§40).

Miscus 14 pattes: 2 ant. coarçues (§40)

Asellus 14 pattes, 4 ant. brisées dont 2 sont p.
longues (§41)

Scolopendra 24 au m. souvent plus. corps aplati. ant.
filif. comp. de plusieurs articles courts (§42)

Tilulæ p. de 100 pattes: corps arrondi & cylind.
ant. comp. de 5 articles (§44)

Résumé

du Système D'Olivier.

Classification

1. 4 Ailes découvertes

1° Lépidoptères 4 Ailes membranées, recouvertes
d'une poussière d'écaillure. Trompe en spirale

2° Névroptères 4 Ailes nues, membranées, réticulées;
bouche munie de mandibules & de mâchoires;

3° Hyménoptères 4 Ailes nues, membranées, veinées
inégales; bouche munie de mandibules & d'une
trompe souvent très courte, & imperceptible.

2° 2 Ailes cachées sous des étuis.

4 Héméptères 2 Ailes croisées sous des étuis mous, à demi
membraneux. Trompe aigue, recourbée sous la
poitrine.

5 Orthoptères 2 Ailes pliées longitudinalement sous des
étuis mous, presque membraneux; bouche
munie de mandibules & de mâchoires.

6 Coleoptères 2 Ailes pliées transvers. sous des étuis durs & coriaces
bouche munie de mandibules & de mâchoires.

3° 2 Ailes Découvertes

7 Diptères 2 Ailes, nues membraneuses, veinées, 2 balanciers, trompe & tentilles.

4° Point d'ailes dans les 2 sexes

8 Aptères point d'ailes, bouche variable.

Genre

I Lepidoptères

- Papillon* aut. filif. terminées par un bouton au f. de Massieu.
(255) 2 aut^{es} courtes, égales, compr. velues & recourbées.
trompe longue div. en 2, cachée entre les aut^{es}.
- Sphinx* aut. filif. prismatiques, terminées en pointe mousse
(256) 2 aut^{es} égales, compr. velues & recourbées. trompe très
longue, div. en 2, roulée & cachée entre les aut^{es}.
- Messia* aut. cylindr. un peu renflées vers le bout, terminées
 Sphinx (256) en pointe mousse. 2 aut^{es} égales, aiguës, compr. &
velues. trompe longue, filif. div. en 2, roulée &
cachée entre les aut^{es}.
- Agona* aut. filif. à leur base, renflées vers le bout &
 Sphinx (256) terminées en pointe. 2 aut^{es} égales, compr. & velues.
trompe de longueur moyenne sétacée, div. en 2, &
cachée entre les aut^{es}.
- Bombyx* aut. filif. pectinées : art. courts & grenus. 2
 Chalœna (257) aut^{es} égales, compr. & velues. trompe courte, filif.
membran. div. en 2, cachée entre les aut^{es}.
- Epialte* aut. courtes, filif. articles distincts, égaux &
 Chalœna (257) arrondis. 2 aut^{es} égales, membran. compr. & velues.
trompe très courte, large, membran. div. en 2.
& cachée entre les aut^{es}.
- Cœtus* aut. sétacées, articles égaux, cylindr. à peine
 Chalœna (257) distincts. 2 aut^{es} égales, compr. velues, cylindr.
à leur extrémité. trompe sétacée, aiguë, div. en 2,
roulée entre les aut^{es}.
- Chalœna* aut. filif. (souvent pectinées dans les o^{es}), articles très
(257) courts égaux à peine distincts. 2 aut^{es} égales &
compr. membran. cylindr. presque nues. trompe

- membraneuse, div. en 2, cachée entre les aut.^{les}
- Pyralis* aut. filif. simples, articles courts & égaux. 2 aut.^{les}
Phalaena (317) égales, nues, cylindr. à leur base, dilatées au milieu,
 sétacées à leur pointe. trompe membraneuse, div. en 2, cachée entre les aut.^{les}
- Linea* (320) aut. sétacées, simples; articles égaux, très courts.
 4 aut.^{les} inégales; les 2 antér. p^{tes} longues, droites & avancées
 en avant. Trompe membraneuse, div. en 2, cachée entre les aut.^{les} inf.
- Alucita* aut. sétacées, simples art. très courts, très nombreux
Linea (320) à peine distincts. 2 aut.^{les} allongées, nues, égales,
 membraneuses, pointues, 2 fides. Trompe sétacée,
 membraneuse, div. en 2, cachée sous les aut.^{les}
- Pterophorus* aut. sétacées, simples; articles, très courts,
 (336) égaux très peu distincts. 2 aut.^{les} amincies
 cylindr. filif. subulées à leur extrémité, nues &
 membran. Trompe allongée, sétacée, membran.
 div. en 2, cachée entre les aut.^{les}

Classe 2. *Exopteroidea*

1°. 3 articles aux tarses

- Libellula* aut. très courtes, sétacées, 5 art. dont le 1^{er} art.
 (343) beaucoup p^{tes} gros que les autres. 2 aut.^{les} insérées
 à la base ext. des mâchoires, 2 articles, dont le
 1^{er} très court, le 2^e. beaucoup p^{tes} long, presq. cylindr.
 (abdomen des 5^{es} terminé par 2 petites crochets)
- Perla* aut. longues, sétacées; articles nombreux, très courts,
 (348) les 1^{ers} un peu p^{tes} gros. 4 aut.^{les} filif. assez longues
 les antér. comp. de 4 articles, les post. de 3.
 (abdomen communément terminé par 2 soies
 distantes & sétacées)

Asidia

ant. filif. de longueur moyenne; articles égaux,
 peu distincts, le 1^{er} un peu p^r gros que les autres.
 4 aut^{es} courtes, presque égales, filif. les aut^{es} comp.
 de 4 articles, les post^{es} de 3. (4 à abdomen
 terminé par une appendice sétacée, assez longue)

3^e. 5 articles aux tarses.

Microbia

(353)

ant. sétacées, assez longues; articles très nombreux
 & peu distincts: 4 aut^{es} inégales, filif. les aut^{es}.
 comp. de 4 articles les post^{es} de 3.

Myrmelion

unicaleo (359)

ant. courtes, recflées vers l'extrémité, articles très
 courts. 6 aut^{es} inégales, filif. les post^{es} très
 longues (abdomen des 7 terminé par 2 crochets.)

Panozpa

(360)

ant. longues, filif. articles très courts & très
 nombreux. 4 aut^{es} filif. égales, les aut. comp.
 de 4 articles, les post^{es} de 2 (abdomen des 7
 terminée par une queue articulée, armée de piquets)

Phryganea

(355)

ant. longues & sétacées; articles très nombreux
 très courts, le 1^{er} un peu p^r gros. 4 aut^{es} inégales,
 filif. les aut^{es} p^r longues & comp. de 4 articles
 les post^{es} courts & comp. de 4 (abdomen simple)

Phemeria

(360)

ant. très courtes & subulées; articles nombreux
 à peine distincts. 4 aut^{es} très courtes, peu appa-
 reutes, égales, filif. les aut^{es} comp. de 4
 articles, les post^{es} de 3 (abdomen terminé
 par 2 ou 3 filets longs & sétacés)

Phemid

mediculus (357)

ant. monilif. de la longueur du corselet. 14
 articles arrondis & distincts. 4 aut^{es} égales,
 filif. les aut^{es} comp. de 4 articles, les post^{es}.
 de 3 (abdomen simple, nucléus sous ailes)

Classe III. Hymenoptères

1^{re} Bouche. Sans Trompe

Formica (451) aut. filif. brisées. 1^{er} article très long & cylindr.
4 aut.^{es} courtes, filif. les aut^{es}. un peu p^{re} longues
comp. de 6 articles égaux, les post^{es} de 4. Ventre
attaché au corselet par un pied, petite écaille
saillante entre deux (point d'ailes dans les mâles)
Crabro
Yespa (429) aut. courtes filif. 1^{er} article long & cylindr. le 2^e
autres très courts. 4 aut.^{es} inégales, les aut^{es}. comp.
de 6 articles, dont le 2^e, 3^e, & 4^e gros & coniques; les
post^{es}. comp. de 4 articles, dont le 1^{er} très mince
à la base (aiguillon simple, pointu, caché dans
l'abdomen)

Yespa
(429) aut. filif. brisées, 1^{er} article long & cylindr. le 2^e
long & presque conique. 4 aut.^{es} filif. inégales
les aut^{es}. un peu p^{re} longues, comp. de 6 articles.
les post^{es}. de 4, dont le dernier très court & très
petit (aiguillon simple & très pointu, caché dans l'abd.)

Chrysid
Yespa (429) aut. courtes filif. 1^{er} article un peu p^{re} long;
les autres courts & égaux. 4 aut.^{es} filif. inégales
les aut^{es}. une fois p^{re} longues, comp. de 6 articles
les post^{es}. de 4 dont le 1^{er} à peine distinct. (Ventre
attaché au corselet par un pied. court. aiguillon)

Ichneumon
(393) aut. sétacées, longues, & bristées; articles très
courts, nombreux, peu distincts. 4 aut.^{es} inégales
filif. les aut^{es}. un peu p^{re} longues, comp. de 6 articles
les post^{es}. de 4 (Ventre attaché au corselet par
un pied. long & mince; aiguillon flexible, long &
div. en 3 pièces dans la ♀)

Urocerus (362) aut. filif. articles courts, égaux, cylindr. & distincts

4 aut^{es} très courtes, inégales. les aut^{es} comp. de
2 articles égaux: les post^{es}. de 4 dont le dernier
p^r: gros (Ventre joint au corselet, & terminé par
une pointe forte, aigue. aiguillon dentelé, caché
sous une gaine creusée en gouttière, dans long)

Capellaria
nabro (361)

aut. en masse, un peu p^r: courtes que le corselet
4 aut^{es} filif. les 2 aut^{es}. un peu p^r: longues, comp.
de 5 articles les 2 post^{es}. de 4 (Ventre joint au
corselet. aiguillon denté, caché dans l'abdomen des 5)

Anthredo
(363)

aut. filif. p^r: longues que le corselet. articles
égaux distincts, cylindr. 4 aut^{es} inégales, filif.
les aut^{es}. p^r: longues, comp. de 6 articles, les post^{es}.
de 4 (Ventre joint au corselet, aiguillon denté
caché dans l'abdomen)

Triptolepita
(391)

aut. filif. longues. 14 articles, cylindr. égaux très
distincts. 4 aut^{es} courtes, les aut^{es}. filif. de 5 arti.
égaux les post^{es} de 3, dont le dernier en masse
(Ventre un peu comp^r. aiguillon caché entre 2
lames du ventre)

Gynipte
(379)

aut. filif. brisées, 1^{er} art. très long & cylindr.
le 2^e petit, les autres courts, égaux, peu distincts.
4 aut^{es} courtes, inégales, presque en masse: les
aut^{es}. un peu p^r: longues, de 6 articles. les post^{es}.
de 5 (Ventre id. aiguillon courbé & d)
2^e. bouche avec une trompe.

Chalcid
888 p^r (429)

aut. courtes, filif. un peu p^r: grosses par le bout
1^{er} article p^r: long & cylindr. 4 aut^{es} filif. les aut^{es}.
un peu p^r: longues, comp. de 6 articles presque égaux
les post^{es}. de 4 (Ventre presque globuleux, attaché au
corselet par un long pied. aiguillon caché dans
l'abdomen. autres post^{es}. renflées)

Phore aut. un peu p^r longues que le corselet filif. en spirale
Johnuncuow 11 articles égaux, cylindr. distincts. 4 aut^{es} filif.
 (393) presque égales: les aut^{es} un peu p^r longues, de 6 articles
 les post^{es} de 4 (ventre attaché au corselet, par un
 p^r p^r ou un l^g aiguillon pointu, simple, caché dans l'a

Andrena aut. courtes filif. 1^{er} article long, mince à la base.
 (412) 2^e très petit les autres égaux & cylindr. trompe
 dir. en 3 pièces, sup^{es} en fermées dans une gaine. 4
 aut^{es} filif. inégales: les aut^{es} à 6 art. les post^{es} de 2
 (aiguillon simple caché dans l'abdomen)

Apidea (412) aut. filif. courtes, brisées. 1^{er} article très long: les autres
 courts égaux. Trompe dir. en 3 pièces; sup^{es} libres,
 en fermées dans une gaine à leur base. 4 aut^{es} sétacées
 très courtes. les aut^{es} de 6 art. les post^{es} de 5 (aiguillon
 simple, très pointu, caché dans l'abdomen)

Encera aut. longues filif. articles égaux, presque cylindr.
 (413) Trompe dir. en 3 pièces, sup^{es} libres. 4 aut^{es} courtes
 filif. les aut^{es} un peu p^r longues, de 6 art. les post^{es}
 de 2 (aig. simple & pointu caché dans l'abdomen)

Classe V. Hémiptères

1^{re} Elytres d'égale Consistance

Membracis aut. très courtes subulées, posées devant les yeux. 1^{er}
 (184) article p^r gros que les autres, presque arrondi. trompe
 recourbée, longue obtuse, comp. de 3 articles, au fer^{me}
 3 soies. 3 articles aux tarses (corselet dilaté)

Cicada aut. courtes, sétacées, posées entre les 2 yeux. 5 articles
 (184) dont le 1^{er} p^r gros que les autres. trompe recourbée, filif.
 longue, à 2 articles, au fer^{me} 3 soies. 3 articles aux
 tarses, dont les 2 premières très courts.

Tettigonia aut. très courtes, minces, subulées, posées devant les yeux
 (184) 1^{er} article globuleux, les autres à peine distincts

Billa
(212)

trompe courte, recourbée, comp. de 3 articles,
renfermant 3 soies. 3 articles aux tarsi.
ant. cylindr. 11 art. égaux. trompe recourbée, naissant
entre la 1^{re} & la 2^e paire de pattes. 2 articles aux
tarsi (pattes propres à sauter)

Aphide (215)

ant. filif. p^{es} longues que le corselet, posées devant
les yeux. 1^{er} article un peu p^{es} gros que les autres.
Trompe allongée, recourbée, comp. de 5 articles
renfer. une seule soie. 1 seul art. aux tarsi.
(abd. terminée par 2 fil. droits & distants)

Thripis
(178)

ant. filif. de la longueur du corselet. 7 art. dont le
1^{er} p^{es} grand & le 2^{es} p^{es} petit. trompe cachée dans
une fente longitudinale. 2 art. aux tarsi, dont le
2^{es} forme une espèce de vésicule.

Chermès
(227)

ant. filif. terminées par un fil. 3^e article. trompe
allongée, recourbée, à 3 art. posée entre la 1^{re} &
la 2^e paire de pattes. 3 art. aux tarsi (q aptère)

Locusta
(221)

ant. courtes filif. presque cylindr. trompe courte
recourbée, à 3 art. posée id. pattes très courtes, &
souvent imperceptibles (q aptère)
2^e Olytes, moitié coriaces & moitié membraneux

Notonecta
(220)

ant. courtes, posées au dessous des yeux, 3 art. dont
le 1^{er} p^{es} gros, & le 2^{es} p^{es} petit. trompe courte, recour-
bée, à 3 art. renfermant 3 soies. 2 art. aux tarsi,
les post. larges, aplatis & ciliés.

Corixa
(221)

ant. très courtes posées sous les yeux, 3 art. presq.
égaux. trompe courte, recourbée, à 1 seul article, renfer.
3 soies. tarsi à 1 seul art. les post. aplatis, larges, ciliés

Hepa (221)

ant. très courtes, peu apparentes, posées sous les yeux,
cachées dans la fossette, à 3 art. trompe id. 1-2 art.
aux tarsi. pattes ant. portées en avant l'abd. des q

terminée par 2 fil. sétacés.

Orducoris aut. très courtes, posées au dessous d'un ruy. trompe
(219) id. 2 art. aux tarses, les postér. aplatis, larges, à liés.
pattes antér. courtes, armées d'un ongle très fort.

Cimex aut. filif. à 4 art. très distincts; trompe recourbée
(194) sous la poitrine, creusée en gouttière, & contenant 3
soies. 3 art. aux tarses. (corps allongé, rare^{ment} ovale,
souvent déprimé.

Pentatomia aut. filif. comp. de 5 art. cylind. 2. trompe id. 3 art.
(194) aux tarses. Corps souvent ovale.

Reduvius aut. sétacés, p^{res} longues que la corse, à 4 art.
(194) trompe id. courte, & courbée en arc. 3 art. aux tarses.
Corps allongé, tête étroite avancée.

Classe V Orthoptères

Blatta aut. longues, sétacés, posées sous les yeux; art. nombreux
(177) très courts & peu distincts. 4 aut^{es} filif. les antér. un
peu p^{res} longues, comp. de 5 art. doubles d'un 1^{er} très court; les
postér. de 3, presque égaux. 5 art. aux tarses des 4 pattes
antér. 4 à ceux des postér. (pattes propres à la course)
abd. terminée par 2 appendices très courts)

Gryllus aut. longues, sétacés, posées entre les yeux. art. id.
(179) 4 aut^{es} filif. les antér. une fois p^{res} longues & 5 art.
double de dernier très court: les post. de 3: tarses à 3 art.
le 2^e très court (abd. terminée par 2 appendices longues
sétacés & distinctes)

Locusta aut. très longues & sétacés. art. id. 4 aut^{es} les antér.
(182) un peu p^{res} longues, à 5 art. presq. cylind. 2. les 2 1^{ers} très
courts, les post. de 3. 4 art. aux tarses (abd. terminée
par une pte de queue tranchante & pointue, dans
les ♀. pattes propres à sauter)

Mantis (183) aut. sétacés, de longueur moyenne posées entre les yeux

art. id. 4 aut^{es} filif. presque égales. les aut^{es}. à part
les post. de 3 (pattes aut^{es}. armées de piquant et d'un
ongle, très fort & très aigu. abd. simple)

Crydium aut. filif. p^{res} courtes que la 1^{re} du corps: 11 art. cylindr.
(180) égaux, distincts. 4 aut^{es} presque égales, filif. les aut^{es}.
à part. les post. de 3 (pattes post. propres au saut. abd. id.)

Classe VI Coléoptères

1^{re}. 5 art. à tourner l'arête

Melolontha aut. en masse, 10 art. dont le 1^{er} très long; les
(2) autres courts, égaux: les 4 derniers en masse feuilletée
d'un seul côté: 4 aut^{es} filif. inégales: les aut. comp. de
le art. dont le 2^e. & le 3^e beaucoup p^{res} longs. les
post^{es}. de 3, dont le 1^{er} très court, & le 2^e long & robuste
mandibules allongées & dentées (jambes aut^{es}. dentées)

Carabus aut. courtes, en masse. 10 art. dont le 1^{er} p^{res} long &
(4) p^{res} gros que les autres. les 3 d^{er} en masse obtuse, feuilletée
(13) 4 aut^{es} filif. courtes: les aut^{es}. à 4 art. dont le 1^{er}.
très court, les post^{es}. de 3 presque égaux (jambes id.)

Trox aut. courtes, en masse. 10 articles, le 1^{er} gros & velu, les 3
(4) derniers en masse ovale, feuilletée. 4 aut^{es} courtes
un peu en masse, les aut^{es}. à 4 art. les post^{es}. à 3.
(jambes id. tête presque entièrement cachée dans le corselet)

Melolontha aut. en masse allongée, feuilletée. 10 art. le 1^{er} gros &
(4) presque sphérique, 4 aut^{es} inégales, filif. les aut^{es}. un
peu p^{res} longues, à 4 art. le 1^{er} très court, les post. de 3.
(jambes aut^{es}. à 2 petites dentelures)

Leptonia aut. courtes, en masse, 10 art. le 1^{er} p^{res} gros, les 3
(4) d^{er} en masse ovale, feuilletée. 4 aut^{es} filif. presque
(1) égales. les aut^{es}. à 3 art. le 1^{er} allongé: les post^{es}. de
3, le 1^{er} très court. mandib. presque membraneuses,
peu apparentes (jambes aut^{es}. dentées: 1 le cresson)

Altera bas aut. condées, en masse: 11 art. 1^{er}: très long; les autres
hister courts & globuleux: les 3 der^{es} en masse foliée ovale
(16) 4 aut^{es} presque filif. les aut^{es} à 4 art. le 1^{er}: obtus, les
post^{es} de 3. (Jambes aut^{es}. dectées, tête petite
un peu cachée dans le corselet)

Dermostes aut. courts, en masse. 1^{er} art. p^{er} gros, beaucoup
(17) égaux, presque globuleux: les 3 der^{es} en masse persfoliée
4 aut^{es} inégales filif. les aut^{es} à 4 art. égaux; les
post^{es} de 3 (Jambes simples, sans dectolures)

Microphorus aut. en masse, 1^{er} art. gros & assez long; les autres courts
Dermostes (17) & presque globuleux: les 4 der^{es} très gros, aplatis, en masse
persfoliée. 4 aut^{es} égales, filif. les aut^{es} à 4 articles
le 1^{er} très court; les post^{es} de 4, le 1^{er} p^{er} long que les autres
(Corselet bordé, aplatti)

Silpha aut. en masse: 1^{er} art. assez long, les autres courts &
Peltia (19) égaux: les 4 der^{es} un peu p^{er} gros, en masse persfoliée
le 1^{er}: ovale. 4 aut^{es} inégales, filif. les aut^{es} un peu p^{er}
longues, à 4 art. le 1^{er} très court & très petit, le 2^{es} gros
& conique: les post^{es} de 3, le 1^{er} p^{er} long que les autres (Jambes
& corselet bordés)

Nitidula aut. en masse. art. courts presque égaux, les 3 der^{es}
Dermostes (17) très gros aplatis, en masse persfoliée. 4 aut^{es} filif.
égales. les aut^{es} à 4 art. presque égaux. les post^{es} de 3
(Corselet & Elytres un peu bordés)

Syrphus aut. Courts, en masse; art. courts & grêles. les
Cistela (18) 6 der^{es} en masse persfoliée, aplatis, & grossissant
insensiblement. 4 aut^{es} égales, presque en masse le 1^{er}
art. ovale & p^{er} gros: les aut^{es} à 4; les post^{es} de 3
(Jambes compr.)

Anthrenus aut. courts, en masse. art. presque égaux, les 3 der^{es}
(27) en masse foliée, un peu compr. 4 aut^{es} cylindr. inégales

les auter. un peu plus longues, à 4 art. les postér. de
3 (corps ovale, presque arrondi)

Sphæroidium aut. courtes, en masse. articles égaux, presque arrondis
Derivantes (17) les 4 1^{er} p^{er} gros, en masse perforée; le 2^{er} p^{er} petit
ovale. 4 aut^{es} filif. inégales. les auter. à 4 art. les
postér. de 3, 4^{es} courtes (jaunes épineuses, corps
ovale, presque hémisphère.)

Onobium aut. filif. légères en masse, les 3 1^{er} articles un
Pyrrhus (25) peu p^{er} gros & p^{er} longs, presque ovales, amincis à leur
base. 4 aut^{es} égales, terminées en masse: les
auter. de 4 art. les postér. de 3. (tête en sautoir
dans le corselet; corselet court, un peu bordé)

Stenocera aut. longues, filif. art. presque égaux, un peu coniques.
Stenocera (57) 4 aut^{es} égales, filif. les auter. à 4 art. les postér. de 3.
(corselet relevé en bosse)

Ipse aut. droites, en masse. art. presque sphér. &
Derivantes (17) égaux; les 3 1^{er} p^{er} gros aplatis, & perforés; le 2^{er}
arrondi à sa pointe. 4 aut^{es} très courtes, égales
filif. à 3 art. presque égaux; le 2^{er} ovale, un peu renflé
(corps allongé, presque parallélépipède; 1^{er} art. des
tarses très court, & p^{er} petit que les autres)

Lagria aut. filif. art. courts distincts, presque égaux:
Lagria (59) le 1^{er} un peu p^{er} gros & renflé; le 2^{er} un peu p^{er}
petit & arrondi. 4 aut^{es} inégales, filif. les auter.
un peu plus longues; à 4 art. le 1^{er} p^{er} petit & p^{er}
mince, les autres égaux; les postér. de 3; le 1^{er}
très petit & à peine distinct.

Ptilinus aut. pectinées d'un seul côté, dans toute leur
(4) longueur; les 2 1^{er} articles simples & arrondis. 4 aut^{es}
courtes filif. les auter. un peu plus longues, à 4 art.
égaux: les postér. de 3 dont les 2 1^{er} globuleux.

Omalyse ant. filif. art. presque cylindr. le 2^e. Me 3^e presque
(64) globuleux. 4 aut^{es} inégales, filif. les aut^{es}. un peu
p^{tes} longues, comp. de 3 art. presque globuleux, le 1^{er}.
arrivé à sa base: les post. de 2 art. égaux (corselet
un peu applati, terminé post^{er}. en 2 angles aigus)

Elephorus ant. filif. art. cylindr. égaux, le 2^e. beaucoup p^{tes} court.
Cicindela (59) 4 aut^{es} inégales, sécuroïdes: les aut^{es}. un peu p^{tes},
longues, à 4 art. les post^{es} de 3, le 2^e art. dilaté,
compr. 3 angul. en forme de hache. (côtés du ventre
plissés & 3 papilles: corselet plat, légèr^{ment} bordé)

Malachius ant. filif. presque en saie le 1^{er} art. gros & arrondi. 4
Cicindela (59) aut^{es} filif. les aut^{es}. un peu p^{tes} longues, à 4 art.
égaux, presque cylindr. les post^{es}. de 3 (Vesicules
cachées de chaque côté de la poitrine & du ventre)

Lampyrus ant. filif. art. égaux, presque cylindr. le 1^{er}. un peu
(58) p^{tes} gros. 4 aut^{es} inégales, filif. les aut^{es}. un peu p^{tes},
longues, à 4 art. les post^{es}. de 3 (Corselet grand
applati, inclinant la tête par un large rebord)

Elymus ant. filif. compr. souvent en saie. 1^{er} art. p^{tes} petit &
Lampyrus (59) arrondi. 4 aut^{es} un peu p^{tes} grosses à l'extrémité, inégales
le 2^e art. large, compr. presque 3 angul. les aut^{es}. à 4
art. les post^{es}. à 3 (tête étroite, p^{tes} où on allonge
corselet applati, un peu bordé.)

Elaeter (55) ant. filif. en saie, souvent pectinées. 1^{er} art. p^{tes}
gros, arrondi; le 2^e. très petit. 4 aut^{es} courtes, inégales,
sécuroïdes. les aut^{es}. à 4 art. les post^{es}. de 3. le 2^e art.
p^{tes} gros dilaté, arrondi, presque 3 angul. (Corselet terminé
en dessous par une pointe reçue dans une cavité de
la poitrine)

Buprestis ant. courtes, filif. en saie. art. égaux, le 1^{er} gros &
(*Cucujus*) (55) arrondi. 4 aut^{es} inégales, filif. les aut^{es}. à 4 art. les

postér. de 3, le 2^e obtus, presque tronqué (tête à moitié enfoncée dans le corselet)

cincléla aut. filif. presque détachées, art. cylindr. égaux, le 2^e
apertus (40) très court. 6 aut. filif. les autér. à 2 art. allongés
égaux; les moyennes p^r longues, à 4, dont le 1^{er} très
court & le 2^e très long. les postér. de 4 dont les 2
1^{er} très courts (Yemp saillants, tasses filif. appendice
à la base des ailes postér.)

capitatus aut. détachées; art. courts & égaux, le 1^{er} p^r gros. 6 aut.
apertus (40) presque égales filif. les autér. de 2 art. égaux; les
moyennes de 4, cylindr. les postér. de 3, dont le 1^{er}
p^r court (Yemp saillants, appendice id.)

crabul aut. filif. art. allongés, égaux, presque cylindr. le 1^{er}
apertus (40) p^r gros, & arrondi; le 2^e très petit. 6 aut. inégales
filif. le 1^{er} art. un peu p^r gros, & tronqué; les autér. très
courtes de 2 art. égaux; les moyennes p^r longues
de 4, & les postér. de 3 (corselet avec un rebord. app. id.)

ophorus aut. courtes, en masse. art. arrondis, les 2^e & 3^e beaucoup
minutus (17) p^r gros, en masse ovale, solide, persfoliée. 4 aut. inégales
presque en masse, le 2^e art. ovale & replié; les autér.
un peu p^r longues, à 4 art. dont le 2^e long & cylindr. les
postér. de 3 dont le 1^{er} très court. Tasses filif. 1^{er}
art. très court & le 2^e assez long.

drophyus aut. en masse, p^r courtes que les aut. 1^{er} art.
(65) gros & assez long, les autres courts & globuleux; les
4 2^e très gros, en masse persfoliée. 4 aut. inégales
filif. les autér. longues, à 4 art. cylindr. le 1^{er} très court.
les postér. de 3 (Tasses de 4 p^r les postér. larges &
ciliés des 2 côtés)

triscut aut. filif. presque détachées, de la longueur du
(66) corselet, art. presque égaux, coniques; le 1^{er} assez long

le 2^d. très courts, les 2^{es} amincies. 6 aut^{es} filif.
les aut^{es}. très courtes, à 2 art. égaux; les moyennes
longues & à 4. les post^{es}. de 3 (toutes post^{es}.
larges aplaties & ciliés)

Gyrinus
(71)

aut. très courtes, pédonculées: 1^{re} art. grand, en forme
de Cuiller, les autres très courts, peu des ténets. 4
aut^{es} égales filif. les aut^{es}. à 4 art. arrondis,
presqu'égaux: les post^{es}. de 3 (4 pattes post^{es}. id.

Staphylinus
(163)

aut. filif. 1^{re} art. allongé, les autres globuleux; les 6
2^{es} p^{es} courts, un peu compr. le 2^d. ovale, souvent
coupé oblique. 4 aut^{es} courtes, égales, filif. les aut^{es}.
à 4 art. le 1^{er} court & petit, le 2^d. p^{re} long & courbé
les post^{es}. de 3 égaux (Elytres très courtes)

Oxyporus
staphylinus
(163)

aut. courtes, mobili^{es}. presque en masse: 1^{re} art.
minuscule, les autres renflées, lenticulaires, perforées
le 2^d. arrondi à sa pointe. 4 aut^{es} courtes, égales
les aut^{es}, à 4 art. égaux, filif. les post^{es}. de 4 dont
le 2^d. en masse, large, aplatis, 3 angul. presq.
en croix aut (Elytres ~~très~~ courtes)

Pederus
staphylinus
(163)

aut. mobili^{es}: 1^{re} art. un peu allongé, les autres
égaux, presque sphér. 4 aut^{es} inégales. les aut^{es}.
beaucoup p^{re} longues, à 4 art. le 2^d. ovale, un peu
p^{re} gros, presque en masse: les post^{es}. de 3 art. égaux
filif. (Elytres très courtes)

2^d. 5 art. ^{sauf des} 4 pattes de devant; 4
seule^{me} à l'emp des pattes de derrière

Meloe (176)

aut. mobili^{es}. 1^{re} art. assez long; le 2^d. court & petit.
le 2^d. sétacé. 4 aut^{es} inégales: les aut^{es}. un peu p^{re}
longues, à 4 art. dont le 1^{er} très court & très petit
les post^{es}. de 3, dont le 2^d. ovale et un peu p^{re} gros.
(tarses terminés par le crochet; Elytres courtes, presq. ovale)

antharis aut. filif. p^s longues que le corselet; art. égaux, presq.
(153) cylind. le 1^{er} assez gros & le 2^d. très court. 4 autres filif.
inégales; les antér. à 4 art. le 1^{er} très court, les postér. de 3.
(tarses terminées par le crochet. Elytres molles & flexibles.
tête inclinée.)

proconus aut. monilif. en masse. art. égaux; inég. aplatis, dilatés
(163) dans les 7 ar. & dans les 9. le 1^{er} gros, en masse, compr. par les
côtés. 4 aut^{es} égales, filif. les antér. à 4 art. le 1^{er} très petit
le 2^d. très allongé, le 2^e & le 3^e. très raclés, presque vericaux
dans les 7. les postér. de 3 art. égaux (Tarses & Elytres id.)

demera aut. filif. presque de la longueur du corps. art. égaux, cylind.
antharis (153) le 1^{er} à peine p^s gros, le 2^d. un peu p^s court. 4 aut^{es} filif.
les antér. un peu p^s longues, à 4 art. le 1^{er} très court & très
petit. les postér. de 3; le 1^{er} un peu p^s petit (Tarses &
terminant par 2 crochets, art. pénultième, large, 2^e fide garni
de poils.)

totarus (162) aut. filif. art. presque coniques, les 3^{es} ar. ar. monilif.
antharis (153) 4 aut^{es} monilif. les antér. à 3 art. ar. ar. le 1^{er} à peine
p^s gros & presque ovale; les postér. de 3, le 1^{er} très petit
(art. pénultième des Tarses id.)

pyrochroa aut. en saie ou pectinées: 1^{er} art. gros & un peu allongé
(153) le 2^d. petit & presque rond. 4 autres inégales, filif. les
antér. beaucoup p^s longues, à 4 art. le 1^{er} très court
& très petit; le 2^d oval, allongé. les postér. de 3. (Tarses
à 4 art. pénultième, court, 2^e fide, & garni de poils.)

sistela aut. filif. un peu p^s longues que le corselet. art.
enebris (156) presque coniques, le 2^e. un peu p^s petit que les autres &
arrondi. 4 aut^{es} filif. les antér. un peu p^s longues
à 4 art. le 1^{er} très court & les autres presque égaux &
coniques; les postér. à 4, très courts; le 2^d. un peu p^s long
& conique (Tarses filif.)

Diapores aut. courtes, renflées: 1^{re} & 2^e art. petits; les autres courtes
(152) applatis, perfoliés. 4 aut^{es} courtes, filif. les aut^{es}. à 4 art.
le 1^{er} très petit, le 2^e ovale: les post^{es}. très courtes, de 3, le 1^{er}
à peine distinct (ant. des tarses très courts, le 2^e très long)

Opatrum aut. filif. un peu p^o grosses par le bout, p^o courtes que la
Cerebrio (156) corselet: 2^e art. petit & arrondi. 4 aut^{es} en masse.
les aut^{es}. un peu p^o longues, à 4 art. le 2^e gros, ovale,
trouqué. les post^{es}. de 3 art. p^o gros à leur extrémité
(corselet avec un rebord)

Tenebrio aut. mouilif. art. presque égaux: le 3^e à peine p^o long
(156) que les autres; le 2^e globuleux, un peu renflé. 4 aut^{es}
filif. les aut^{es}. un peu p^o longues, à 4 art, le 1^{er} un
peu p^o petit, le 2^e un peu p^o gros & trouqué (corps allongé)

Linellia aut. filif. à leur base, mouilif. à leur extrémité: le 1^{er}
Cerebrio (156) & le 2^e art. très courts: le 3^e très long, presq. cylindre
les 2^{es} globuleux. 4 aut^{es} les aut^{es}. beaucoup p^o long
à 4 art. presque coniques, un peu renflés; le 2^e & 3^e
presque trouqué (corps souvent renflé)

Blaps aut. filif., mouilif. à leur extrémité: 1^{er} art. court, très
Tenebrio (156) peu p^o gros, le 2^e très petit; le 3^e très long: les 2^{es} courts
& arrondis. 4 aut^{es} inégales, en masse; les aut^{es}. à 4 art. le
1^{er} très petit. le 2^e gros, conique, un peu compr. & trouqué
les post^{es}. de 3 art. presque égaux, le 2^e trouqué.

Helopis aut. filif. souvent presq. mouilif. 2^e art. un peu p^o court
Tenebrio (156) le 3^e à peine p^o long que les autres. 4 aut^{es} inégales, les aut^{es}
à 4 art. le 1^{er} très mince à sa base; les autres coniques; le
2^e en masse, large, compr. presq. d'angle. en forme de hache
les post^{es}. de 3 art. dont le 2^e p^o gros & obtus.

Mordella aut. filif. souvent un peu en saie, quelque fois pectinées,
(151) de la longueur du corselet. 4 aut^{es} les aut^{es}. un peu p^o
longues, à 4 art. le 2^e un peu p^o gros, allongé: les post^{es}. filif.

à 3 art. égaux (corselet courbe, abd. terminée en pointe
dans les 2°) 3°. à tous les Tarses

ionnue (73) aut. longues, jetées, quelque fois au 1^{er} art. renflé
2^o. très court & arrondi, posées devant les yeux. 4 aut.
presqu'égaux, filif. les antér. à 4 art. de 2^o. très long, &
le 2^o renflé à sa pointe, & comme boucle: les post. de 3
dont le 2^o. très long. pénultième art. des Tarses, large
& fidé, garni de houpes (corselet applati, tranchant sur
les côtés, dentelé, ou épineux)

ambis (75) aut. jetées, longues, posées dans les yeux. 1^{er} art. gros &
à 1^{er} long. 2^o. très court & très petit: les 3^{es} & 4^{es} un
peu renflés à leur pointe: les 5^{es} égaux & courtes. 4 aut.
presqu'égaux, filif. les antér. à 4 art. le 1^{er} très court &
très petit: les post. de 3 dont le 1^{er} court & petit.
Tarses id. (corselet arrondi tuberculé ou épineux
sur les côtés. yeux encroissant entourant la base des ant.)

perda aut. id. art. presq. cylindr. le 1^{er} un peu p^o. gros & le 2^o.
ptura (77) très court. 4 aut. égales, filif. les antér. à 4 art. le 1^{er}
court, & le 2^o. assez long: les post. de 3 à 3 art. presqu'égaux
Tarses id. (Corselet cylindr. yeux id.)

tenocorus aut. filif. posées devant les yeux: le 1^{er} art. un peu p^o.
(89) gros, 2^o. court & arrondi. 4 aut. inégales, presque
filif. 3^o art. un peu p^o. gros, presque ovale, à peine
trouqué: les antér. de 4 art. les post. de 3. Tarses id.
(Corselet épineux ou tuberculé, yeux ovales)

alli d'uno aut. filif. à peu près de la longueur du corps, posées
septura (77) dans une échancrure & devant les yeux. 4 aut.
égales: les antér. à 4 art. dont le 2^o presque en u^o &
& le 1^{er} petit: les post. de 3 dont le 2^o assez gros &
Tarses id. (Corselet globuleux, ou rond & léger & applati)

Donacia aut. filif. un peu p^r courtes que le corps, posées devant
Stenocorus (85) les yeux. 1^{er} art. assez gros; le 2^d. à peine p^r court que
les aut^{res}. 4 aut^{res} égales, filif. les aut^{res}. à 4 art. égaux
les post. de 3. Tarses id. (yeux ronds & saillants)

Leptura aut. filif. à peine de la longueur du corps, posées
Stenocorus (86) devant les yeux: 2^d. art. très petit. 4 aut^{res} inégales
filif. les aut^{res}. à 4 art. presque égaux. les post. de 3.
Tarses id. (Corselet un peu p^r étroit aut^{re} m^e)

Necydalis aut. filif. un peu p^r courtes que le corps, posées dans
Leptura (77) une échancrure au devant des yeux. 1^{er} art. renflé
à son extrémité; le 2^d. très petit. 4 aut^{res} presque égales
filif. les aut^{res}. à 4 art. le 1^{er} petit & le 2^d allongé
les post^{érieurs}. de 3; le 2^d un peu p^r long, & à peine p^r gros
que les autres. Tarses id. (Élytres souvent très courtes &
rétrécies à leur pointe)

Euperus aut. filif. de la longueur du corps, art. égaux, cylindr.
(89) allongés. 4 aut^{res} filif. les aut^{res}. à 4 art. dont les 3
1^{ers} courts & presque égaux; le 2^d allongé & pointu; les
post^{érieurs}. de 3, dont le 2^d pointu. Tarses id.

Clerus (134) aut. presque unifi. p^r grosses à leur extrémité. le
1^{er} art. long & en masse le 2^d. court, assez gros, & globuleux
4 aut^{res} presque égales, les aut^{res}. à peine p^r courtes, à
4 art. le 2^d un peu p^r gros, courbe & convexe; les
post^{érieurs}. de 3: le 2^d saugré. presque en f. de hache
Tarses id. (Corselet arrondi, un peu aminci post^{érieur} m^e)

Prostichus aut. courtes, en masse le 1^{er} art. assez gros & un peu
(135) allongé: le 2^d gros & globuleux; les 3^{es} très gros, en
masse perforées. 4 aut^{res} égales, filif. les aut^{res}. à 4
art. presque cylindr. & les post^{érieurs}. à 3, dont le 2^d ovale
un peu p^r gros. Tarses simples (Corselet gros & globuleux)

Scolytus (136) aut. id. 1^{er} art. assez gros: le 1^{er} globul. le 2^d gros, en masse

Solide. 4 aut.^{es} courtes filif. presque égales; les ant. à 4 art.
dont le d.^{er} terminé en pointe; les post. de 3. première
art. des Tarses, large, 2^e fi de, garni de houpes (corselet gros
presque cylind. un peu renflé: tête enfouie dans le
corselet, arrondie & terminée en pointe)

Bruchus aut. filif. presque égales; 1^{er} art. assez gros, les 3^{es} suivantes
(112) simples, arrondies; les 7 d.^{es} presque égales. 4 aut.^{es} filif. les
ant. p.^{tes} longues, à 5 art. presque égales; les post. de 3, le
d.^{er} oval. Tarses id. (tête avancée & penchée)

Antibus aut. courtes, en masse. 1^{er} art. gros & allongé, les autres
(136) un peu renflés, les 4 d.^{es} en masse perforées. 4 aut.^{es} les
ant. un peu p.^{tes} longues, à 4 art. le d.^{er} en masse, 3^e angl.
les post. de 3. Tarses id. (corselet large un peu bordé)

Atelabus aut. mobilif. un peu p.^{tes} courtes que le corselet; 1^{er} & 2^e
(113) art. un peu p.^{tes} gros; les 3 d.^{es} en masse perforées. 4 aut.^{es}
filif. les ant. un peu p.^{tes} longues, à 4 art. égaux arrondis.
les post. de 3. bouche placée au bout d'une espèce de trompe
dure & cornée. Tarses id.

Brachio aut. brisées, presque en masse le 1^{er} art. long & rectil à son
(106) extrémité; les 4 d.^{es} formant une masse ovale; presque
solide. 4 aut.^{es} courtes filif. presque égales, les ant. à 4
art. dont le d.^{er} terminé en pointe: les post. de 3.
Bouche id. Tarses id. Mandibules simples.

Pyssomela aut. mobilif. p.^{tes} longues que le cors. élév. art. presque
(104) égaux, le 1^{er} un peu p.^{tes} gros. 4 aut.^{es} inégales, les ant. un
peu p.^{tes} longues, à 4 art. dont le d.^{er} p.^{tes} gros et en masse
les post. de 3, dont le 1^{er} très petit & le 2^e conique. Tarses id.
machoires div. en 2 pièces (corselet large, un peu bordé)

Atisca aut. filif. presque de la longueur du corps. 4 aut.^{es} filif. les
(97) ant. un peu p.^{tes} longues, à 4 art; le 1^{er} très court le 3^e
assez gros & arrondi, le 4^e en pointe: les post. de 3.

machoires, & Tarses id. (cuisses postér. renflées)
Crioceris aut. presque mouilif. à peine de la longueur du
(94) corps: le 1^{er} art. un peu p^o gros; le 2^e un peu p^o petit.
4 aut^{es} courtés égales; les antér. à 4 art. dont le d^{er}
un peu p^o gros, se pointe: les postér. de 3 art. presque
égaux: pénultième art. des Tarses, 2 fide & garni
de houppes (corselet arrondi, presque cylindr.)

Hispia aut. filif. de la longueur du corselet, très rapprochées
Crioceris (95) à leur base; art. égaux, le 1^{er} seul un peu p^o gros.
4 aut^{es} courtés égales, filif. les antér. à 4 art. presque
égaux les postér. de 3 Tarses id. (tête petite avancée
corselet arrondi)

Cryptocephalus aut. filif. presque en scie, 1^{er} art. assez gros, les 2^e
(96) ou 3 suivants p^o petits & lobulés; les d^{er} presque
melobolus (97) cylindr. ou en scie. 4 aut^{es} filif. égales; les antér. à
4 art. presque égaux, le d^{er} terminé en pointe moufle
les postér. à 3 art. égaux. machoires div. en 2 pièces
Tarses id. (tête à moitié enfouie dans le corselet.
Corselet convexe, relevé en bords)

Cassida aut. courtés, presque filif. grossissant insensiblement vers
(100) la pointe, très rapprochées à leur base. 4 aut^{es} presq^{ue}
filif. inégales: les antér. à 4 art. dont le d^{er} est ovale
allongé, se pointe: les postér. de 3, le d^{er} un peu p^o gros
& ovate. Tarses id. (corselet & élytres de bordant
courti & décalé de corps)

Anaspis aut. presque mouilif. grossissant insensiblement. 1^{er} art. un
(101) peu p^o petits & un peu p^o allongés; les autres égaux
entiers & mouilif. 4 aut^{es} les antér. un peu p^o longues
à 4 art. le d^{er} p^o gros, troué, oblique. presque en f.
de hache; les postér. de 3. pénultième art. des Tarses
des 4 pattes antér. court & garni de houppes. Tarses

postér. presque détachés. art. assez longs & très distincts.
(corps allongé, tête penchée).

Helruca aut. filif. presque de la longueur du corps: 1^{er} art. gros
(102) & allongé. 4 aut^{es} filif. inégales. les autér. à 1^{er}
art. presque égaux, arrondis. le 2^o en pointe, les postér.
très courtes, de 3, dont le 1^{er} à peine distinct, & les 2
autres arrondis (Machoirs, div. en 2 pièces (guilles
simples; corselet inégal) (cet art. en double)

4^{es} 3 art. à tous les tarses

Bocinello aut. courtes, presque en masse. 1^{er} art. un peu allongé
(143) les autres presque globuleux; les 3 d^{es} p^{res} gros & en masse
4 aut^{es} inégales; les autér. un peu p^{res} longues, à 3
art. dont le 2^o p^{res} gros, en forme de hache; les postér. à 2
art. égaux. (corps hémisphér. plat en dessous. corselet
& élytres bordés)

Elomac aut. très courtes en masse. les 3 d^{es} art. gros &
porfoliés. 4 aut^{es} les autér. un peu p^{res} longues, à 3
art. le 2^o dilaté, applati, aigu de chaque côté. les
postér. de 2. le 2^o presque en masse. (corselet & élytres
très peu bordés)

Erpicula aut. filif. presque détachés. 1^{er} art. gros & allongé, les
autres égaux, cylindr. 4 aut^{es} filif. les autér.
beaucoup p^{res} longues, à 3 art. dont les 2 1^{ers} assez
courtes. les postér. de 3, dont le 1^{er} très court.
élytres très courtes; abdomen terminé par des
pinces longues, cornées, très fortes)

Classe 7^e. Diptères

Astruc aut. courtes, séparées. 1^{re} art. gros & globuleux. Trompe
(454) très courte rétractile, s'étale; cachée entre 2 les peurs de
les res. vésiculées. Supoir à 3 soies membraneuses, filiformes
courtes, presque égales, appliquées sur la trompe.

Tabanus aut. courtes, rapprochées: 7 art. dont le 3^e grand dilaté
(455) ayant une espèce de dent latérale: les 3 dern. courtes,
peu apparentes, terminés en pointe. Trompe courte
bilabiale, cannelée. Supoir, div. en 7 pièces; la sup. large
applatie, contenant 3 soies dans la cannelure à
la trompe. 2 aut^{es} grandes, courbées, & appuyées
sur la Trompe.

Nemotelus aut. courtes, rapprochées, 3 art. grêles, unifi. le
musca (469) 3^e terminée en pointe aigue, allongée. Trompe id.
Supoir div. en 4 pièces. 1 sup^{er}. large, membraneuse,
applatie; contenant 3 soies courtes, dans la
cannelure de la trompe. 2 aut^{es} filif. insérées à la
base lat^{er}. du supoir, & appuyées sur la Trompe.

Stratiomys aut. cylindr. brisées, un peu p^{res} longues que la tête
(466) 3 art. le 1^{er} & le 3^e très longs. le 2^e très court. Trompe
id. Supoir libre, formé d'une seule pièce, recue dans la
cannelure de la Trompe. 2 aut^{es} courtes, en masse, à
3 art. le 3^e gros & ovale, insérées à la partie latérale
de la Trompe (écusson, souvent armé de piquants).

Syrphus aut. courtes, 2 art. le 1^{er} ovale, compr. Et le 2^e formant
musca (469) une foie très mince. Trompe courte, rétractile, bilabiale
cannelée. Supoir div. en 4 pièces, la sup^{er}. p^{res} longue &
p^{res} large, à 3 soies dans la cannelure de la Trompe. 2
aut^{es} minces, articulées, de la longueur des soies, insérées à
côté du supoir & appliquées sur la Trompe.

Musca (469) aut. id. Trompe id. Supoir libre, à 1 seule soie, recue dans la

cannelure de la trompe. 2 aut^{es} filif. un peu p^{res} grosses
vers la pointe, insérées à la partie lat^{er}ale un peu
sup^{er}. de la trompe.

Tomoxia aut. courtes, rapprochées, courbées: 2 art. le 1^{er} ovale
(500) allongé, un peu compr. le 2^e formant une foie très
mince & velue. Trompe rétractile, allongée, filif.
cylindr. 2 foies, coude à la base. Sucoir formé de 2 foies
renfermés dans la trompe. 2 aut^{es} courtes filif.
insérées à la base sup^{er}. de la trompe.

Conopsea aut. p^{res} longues que la tête, presque en masse,
insilus (459) réunies à la base. 2^e art. renflé, terminé en pointe
Trompe rétractile, cannelée, 2 labiées. Sucoir de
2 pièces, la sup^{er}. un peu p^{res} large & aplatie, conten.
une doie dans la cannelure de la trompe. 2 aut^{es}
courtes, filif. insérées à la base du sucoir & appliquées
sur la trompe.

Myopa aut. courtes, courbées. 3 art. le 2^e presque conique
insilus (459) le 3^e ovale, aplati, à 1 poil latéral assez court.
Trompe rétractile, longue, filif. brisée, & repliée au
milieu. Sucoir formé d'une seule foie renfermée
dans la trompe. 2 aut^{es} minces, très courtes, à 3 art.
presque égales, insérées à la base lat^{er}. un peu sup^{er}
de la trompe (partie ant^{er}. de la tête presq. verticale)

Chagion aut. courtes, 3 art. grenus, mouilif. terminés par
insilus (459) un poil allongé. Trompe très courte, 2 labiées, cannelée
Sucoir de 3 soies, reçues dans la cannelure de la
trompe. 2 aut^{es} avancées, de la longueur de la trompe
filif., assez grosses & velues.

Silus (459) aut. de la longueur de la tête, rapprochées, presque
filif. le 2^e art. allongé, terminé en pointe. Trompe
filif. cannelée. Sucoir de 4 pièces: la sup^{er}. très courte

assez large, contenant 3 soies dans la cavure de la
trompe. 2 aut^{es} courtes très velues; insérées à la base
latérale de la trompe.

Empis aut. presque de la longueur de la tête, rapprochées: 1^{re} &
asilus (459) 2^e art. gramin, arrondie: la 3^e terminée en pointe très
allongée. Trompe filif. longue, 2 fides, cannelée. Sucoir
de la pièce la supérieure. assez grosse, de la longueur de la
trompe, contenant 3 soies reçues dans la cavure, 2
aut^{es} courtes, filif. un peu velues, id.

Bombylius aut. courtes, rapprochées, filif. 3 art. dont le 1^{er} long; le 2^e
asilus (459) court; le 3^e allongé terminée en pointe. Trompe droite
allongée, sétacée, cannelée, 2 fides. Sucoir, de la pièce la
supérieure. un peu plus large, contenant 3 soies dans la cavure
de la trompe. 2 aut^{es} courtes filif. insérées id.

Culex aut. sétacées, velues, pectinées ou plumées, de la longueur
(459) de la corbelle. Trompe longue, sétacée, cannelée, 2 fides.
Sucoir à 4 pièces égales, très minces & très délicates, reçues
dans la cavure de la trompe. 2 aut^{es} velues, courtes, id.

Zipula aut. sétacées, simples ou velues, ou plumées, ou pectinées
(504) beaucoup plus longues que la tête. Trompe courte,
bilabée, cannelée. Sucoir libre, formé d'une seule pièce
reçue dans la cavure. 2 aut^{es} filif. beaucoup plus
longues que la trompe, à plusieurs art. dont le 3^e, 1^{er}
plus gros & plus distincte

Bibio (514) aut. monilif. un peu plus courtes que la tête; art. courts, applat
perfoliés. Trompe id. Sucoir id. 2 aut^{es} id. à 3 art. distincts
(tête grosse, arrondie dans le 1^{er}, petite & applatie dans la 2^e)

Hippobosc aut. très courtes, sétacées; 2 art. dont le 1^{er} très court, & le
(504) 2^e plus long. Trompe très courte, div. en 2. Sucoir formé de 1
seule pièce, forte, presque coracée, contenant 2 rebords pièces
de la trompe (point d'aut^{re} corps un peu applati)

Classe 8. Aptères

1°. 6 pattes, 2 antennes

Pulex (526) aut. courtes, filif. à peine p^{re} grosses vers le bout; 1 art. presque coniques. 2 yeux. Trompe allongée aigue, recourbée sous la poitrine, articulée, sans aut^{re} pattes postér. plus longues, propres à sauter (abdomen simple)

Pedicular (517) aut. filif. 2 de la longueur du corps; art. presque égaux distincts. 2 yeux. Trompe courte, droite, inarticulée, sans aut^{re} (abd. simple un peu proéminent)

Phlebotomus (513) aut. filif. p^{re} courtes que les corselets; art. id. 2 yeux. bouche munie de mandibules, & d'une trompe courte droite, inarticulée, sans aut^{re} (abd. id.)

Forficula (525) aut. sétacées, longues, à beaucoup d'art. égaux, à peine distincts. 2 yeux. bouche munie de mâchoires & de 4 aut^{re} inégales, filif. les antér. à 7 art. les postér. à 3 (abd. terminé par 3 fil. sétacés)

Podura (522) aut. filif. à 7 art. le 2^e très court, le 3^e sétacé. 16 yeux à peine distincts. bouche à mâchoires, & à 4 aut^{re} presque en masse: les antér. à 7 art. les postér. à 3, queue fourchue, repliée sous le ventre, propre à sauter.

2°. 8 pattes: point d'antennes

Carula (527) 2 aut^{re} droites, courtes, filif. à 3 art. distincts, insérées à la partie latérale de la bouche. Trompe courte, droite, dure, presque cylindr. 2 yeux (abdomen confondu avec le corselet)

Trichodina (521) 2 aut^{re} filif. p^{re} longues que la tête, courbées, à 4 art. le 2^e terminé en pointe aigue, insérées à la partie latérale de la trompe. Trompe avancée, allongée, droite, presque conique obtuse. 2 yeux (abd. id.)

Mallophaga (520) 2 aut^{re} allongées, filif. courbées, à 4 art. le 2^e 3/4 le 3^e p^{re} longs que les autres, insérées à la base ext. des mâchoires.

bouche munie de mandibules & de mâchoires. mandib.
avancées, dures, comp. de 2 pièces, dont la 2^{de} est armée
d'une dent mobile, en forme de pince. 2 yeux (abdomen
confondu avec le corselet, où très peu distinct)

Aranea 2 aut^{es} filif. allongées, à 4 art. double d^{er} en masse,
(531) continuant les sexes dans les 4^{es} insérées à la base
latérale des mâchoires. bouche munie de mandibules
& de Mâchoires. Mandib. épaisses, fortes dures, de 2
pièces, dont la d^{re} mince, très forte & très aigüe. 8
yeux (abdomen séparé du corselet par un étrangl^é.)

Chelifer 2 aut^{es} très longues, assez grosses, articulées, terminées
en pinces, insérées à la base latérale de la bouche.
Bouche munie de mandibules & de mâchoires. mandib.
courtes, presque cylindr. simples. 2 yeux (abdomen
simple joint au corselet; point de lames pour le corps)

3^o Crustacée

3, 10, ou 14 pattes, ou plus. 2 ou 4 aut.

monoculus aut. simples, séparés ou branchues, art. très nombreux
(537) à peine distincts. bouche à mandib. & mâchoires. 4 aut^{es}
binoculus (538) inégales. les aut^{es} à 4 art. le 1^{er} petit, le d^{er} assez gros.
les post^{es}. de 3, dont le d^{er} creux, en forme d'oreille.
8 ou 10 pattes (corps terminé par une queue pointue,
simple ou fourchée)

Cancer 4 aut. très courtes, presque égales: les 2 aut^{es} séparés
(540) les 2 post^{es}. filif. 2 yeux pétiolés, mobiles. bouche à
mandibules & à 6 aut^{es} 2 fides. corps ovale, quadr.
angul. terminé par une queue articulée, ressembl.
foliacée, appliquée sur le corps. 10 pattes, dont les 2
aut^{es}. en forme de pinces.

astacud 4 aut. les 2 sup^{es}. très longues, & séparés: les 2 inf^{es}.
Cancer (540) courtes, à 4 art. le d^{er} double & séparé. 2 yeux arrondis,

pédouculés, mobiles: bouche à mandib. & à 6 aut. les
2 fides. corps allongé, terminé par une queue articulée
garnie de 3 feuillets: 10 pattes, les 2 postér. souvent
en forme de pinces


Limnæus 4 aut. simples, pédouculés: les ant. courtes & bulbées
(540) les postér. p. longues & sétacées. 2 yeux id. bouche id.
corps allongé, souvent courbé. terminé id. 10 à 16
pattes, terminées par des ongles simples


Sellæa 4 aut. sétacées: les 2 ant. p. rapprochées & p. longues
(541) que les postér. art. nombreux. bouche sans mandibales
ou mâchoires apparentes. 2 aut. courtes filif. le d.
art. court & étroit: corps à plusieurs anneaux, &
terminé par une queue large; p. à un? longue, &
munie de 2 fil. 2 fides. 14 pattes, terminées par un
onglet simple, fort & crochu.


Microgaster 2 aut. sétacées, brisées. 3 art. dont le d. sétacé, &
(540) à art. p. à un? nombreux, très peu distincts. bouche
à mandib. à mâchoires & à 4 aut. courtes, filif.
corps à plusieurs anneaux, & terminé par 2 appen-
dices simples, sétacées, souvent très courtes & à peine
visibles. 14 pattes, terminées par un ongle simple.


Exochus 2 aut. courtes filif. presque en masse, 7 art. le pénul-
(544) tième, un peu p. gros. le d. petit & arrondi à son extrémité
bouche à mandibules & mâchoires très petites, & 2 aut.
courtes, filif. insérées entre les mandib. & les mâchoires.
corps à plusieurs anneaux sans appendices: 2 paires de
pattes à chaque anneau; nombre de pattes indéterminé.


Colopendra 2 aut. sétacées, art. nombreux. bouche à mandib. & à 2
(542) aut. assez longues: 2 crochets longs, recourbés, très aigus
insérés au dessous de la bouche. corps id. 1 paire de pattes
à chaque anneau, terminées par un ongle simple.












postér. presque sétacés. art.





ENTOMOLOGIA PARISIENSIS.

PRIMA SECTIO INSECTORUM.

INSECTA COLEOPTERA.

Caracteres sectionis.

Abdomen elytris duris tectum.

Maxillæ corneæ laterales.

ARTICULUS PRIMUS.

Caract. articuli I.

Elytra integra dura.

ORDO PRIMUS.

Caract. Ordin. I.

Articulorum articuli quinque.

A

I. PLATYCERUS. LE CERF-
Lucanus; Fabr. Walk.
 VOLANT.

Antennæ in extremo uno versu pectinatae.

FAMILIA I. *Antennis fractis.*

1. P. Cervus. *Lucanus cornubus mobilis*
Le grand Cerf-volant.

Longueur 21 lignes. Largeur 7 lignes.

P. fuscus, cornubus duobus mobilibus,
 aspice bifurco, intus ramo denticu-
 lisque instructis.

Locus. Habitat silvas & præcipue ilices.

2. P. foemina cervi. *L. cervi foemina*
La grande Biche.

Long. 16 lig. Larg. 6 lig.

P. fuscus, elytris lævibus, capite lævi.
Loc. Larva carie exesos fraxinorum truncos
 habitat.

3. P. parallelipipedus. *bo. latr. +*
L. paral. Fabr. +
La petite Biche.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

P. niger, elytris lævibus, capitis puncto
 duplici prominente.

Los. Habitat arbores cariosas.

4. P. caraboides. ^{bon lat. +} *Lu. carab. Fabr. +*
La Chevrette bleue.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

P. violaceo-cœruleus, elytris lævibus.

Varietas A. Platycerus caraboides la-
tior, superne viridis, inferne
fuscus. La Chevrette verte.

Loc. Habitat easdem arbores.

FAMIL. II. *Antennis integris.*

5. P. striatus. *Tropidita caraboides* ^{*Cyberidicinus*}
La Chevrette brune. ^{*Hallé: rouge.*}

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

P. fuscus, capite & thorace punctatis,
 elytris punctato-striatis.

Loc. Habitat vetustas arbores.

6. P. pygmæus.

Le Cerf-volant mignonette.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

P. nigro fuscus, elytris striatis, pedibus
 fuscis, capite brevi, antennis vix
 apparentibus.

Loc.

II. PTILINUS. *LA PANACHE.*

Antennæ secundum totam longitudinem
uno versu pectinatæ.

1. P. fuscus. *p. pectinicornis oliv. latz. +*
La Panache brune. fabr.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

P. atro-fuscus, thorace convexo, pedi-
bus antennisque pallidis.

Loc. Habitat vetustas salices quas rotundis foras
minibus larva reerebrat.

2. P. flavescens. *fabr. +*
Drilus flav. oliv. +
La Panache jaune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

P. niger, subvillosus, thorace plano
marginato, elytris flavis mollioribus.

Loc. Habitat flores apertos.

III. SCARABÆUS. *LE SCARABÉ.*

Antennæ clavatæ, clavâ lamellatâ; sou-
tellum inter elytrorum origines.

Geotrupes, Scarabæus, Copris, Cetonia,
melolontha trichia,

FAMIL. I. *Antennarum lamellis septem.*

1. *S. nasicornis.* *gestupes nasic. fabr. +*
Le Moine. *oryctes uasic. latr. +*

Long. 15 lig. Larg. 9 lig.

S. capite unicorni recurvo, thorace gibbo, abdomine hirsuto.

Loc. Habitat humum recentem (*les couches*) & arborum cariem.

2. *S. fullo.* *melolontha fullo oliv.*
Le Foulon.

Long. 17 lig. Larg. 7 lig.

S. antennarum lamellis maximis, corpore nigro, squammis albis, varie maculato.

Loc. Habitat meridionales Galliae provincias; in musæis frequens.

3. *S. melolontha.* *mel. vulgaris oliv. Walk*
Le Hanneton.

Long. 1 pouce. Larg. 6 lig.

S. testaceus, thorace villosa, abdominis incisuris lateralibus albis, caudâ inflexâ.

Loc. Habitat arbores.

FAMIL. II. *Antennarum lamellis
tribus.*

4. *S. typhæus.* *(p. 6 liv. (bou) geotrupes typhæus Latr. +*
Le Phalangiste.

Long. 8 lig. Larg. $4 \frac{1}{2}$ lig.

S. niger, elytris striatis, thorace antro-
sum tricorni.

Loc. Habit. bovinas fæces, gallicè *Bouzes de vaches.*

5. *S. auratus.* *(Stonia aur. Oliv. Walk. +*
L'Émeraude.

Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

S. viridi-ænæus, thoracis parte pronâ,
antice prominente.

Loc. Habitat flores præcipue rosæ & pæoniæ.

6. *S. nobilis.* *(Stonia nob. Oliv. +*
Le Verdet. Nichia nob. Walk. +

Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

S. viridis nitens, thorace infra æquali,
non prominente.

Loc. Habitat flores umbellatos.

7. *S. autumnalis.* *(Melolontha solstitialis Oliv. Hal +*
Le petit Hanneton d'automne.

Long. 7 lig. Larg. $3 \frac{1}{2}$ lig.

S. testaceus, thorace villoso, elytris luteo-

pallidis, lineis tribus elevatis pallidioribus.

Varietas A. Scarabæus autumnalis omnino viridis.

Loc. Habitat circa arbores.

8. *S. horticola.* *Melolontha hort. oliv. Walk +*

Le petit Hanneton à corcelet vert.

Long. 4 lig. Larg. $2 \frac{2}{3}$ lig.

S. capite thoraceque cœruleo piloso; elytris rufis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

9. *S. stercorarius.* *fabi (bon) Geotr. per ster. latz +*

Le grand Pilulaire, le fouille-merde.

Long. 10 lig. Larg. 5 lig.

S. ater, dorso glabro, elytris sulcatis; capitis clypeo rhomboïde, centro prominulo.

Loc. Habitat bovinas fæces.

10. *S. vernalis.* *fabi (bon) Geotr. ver. latz +*

Le petit Pilulaire.

Long. 7 lig. Larg. 5 lig.

S. cœrulescens, dorso elytrisque glabris lævissimisque, capitis clypeo rhomboïde, centro prominulo.

Loc. Habitat bovinas fæces.

11. *S. subterraneus.* *Trox sabulosus +*
Copris sub. oliv. ?

Le Scarabé perlé. *aprosius sub. stat.*

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

S. ater, punctis elevatis, per strias digestis.

Loc. Habitat arenam sterilem; in urbe Fontainebleau frequens.

12. *S. hæmipterus.* *Cetonia hæmipt. +*
Trichia hæmipt. Halk. +

Le Scarabé à tarrière.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. ater depressus & squamosus, maculis albis variegatus, elytris abdomine brevioribus, fæmina aculeo ani.

Loc. Habitat arbores exesas & cortices.

13. *S. argenteus.* *Melolontha squamosa oliv. +*
mel. fæmiosa Halk. febr. +

L'Ecailleux violet.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig. $\frac{3}{4}$.

S. violaceus & squamosus, squamis subtus argenteis.

Loc. Habitat exesos arborum truncos.

14. *S. funerarius.* *Cetonia stictica oliv. Halk. +*

Le Drap mortuaire.

Long. 5 lig. Larg. 3 lig.

S. nigro-cœrulescens, maculis albis sparsis, ordine macularum abdominalium longitudinali.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

6. S. marginatus. *Melolontha varicosa* Oliv. *Walt.* +
Le Scarabé à bordure.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

S. niger, elytris croceis margine nigro.

Loc.

7. S. fasciatus. *Cetonia fasc.* Oliv. *Trichia fasc.* *Walt.* +
La Livrée d'ancre,

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

S. niger hirsutie-flavus, elytris luteis, fasciis tribus nigris interruptis.

Loc. Habitat flores umbellatos.

8. S. villosus. *Cetonia hirta* +
L'Arquelin velu.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. villosus albo, nigro flavoque irregulariter variegatus.

Loc.

9. S. bicolor. *Copris funetarius* Oliv. +
Le Scarabé bedeau. *Iphodius fim.* *Walt.* +

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

S. capite thoraceque nigro , antennis
elytrisque rubris.

Loc. Larva & Scarabæus fæces bovinas habitat.

19. *S. fimetarius.* *Copris conspurcator* Oliv. +
Le Scarabé gris des bouzes. *aphodius conspurcator* Galt. +

Long. 1, 2, 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. capite thoraceque nigro glabro , elytris
griseis , pedibus pallidis.

Loc. Abundat in bovinis fæcibus.

20. *S. fossor.* *Copris fossor* Oliv. +
La Tête armée. *aphodius fossor* Galt. +

Long. 2, 3, 4, 5 lig. Larg. 1, 2, 2 $\frac{1}{2}$ lig.

S. totus niger , spinulis tribus capitis trans-
versim positis.

Loc. Abundat in bovinis fæcibus.

21. *S. gagatinus.* *aphodius rufipes* Fabr. +
Le Scarabé jayet. *Copris gagates* Oliv. ?

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. totus niger , capite inermi.

Loc. Habitat bovinas fæces.

22. *S. fulvescens.* *melolontha brevicornis* Oliv. Hal. +
Le Scarabé fauve aux yeux noirs.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. fulvus, oculis nigris, thorace glabro.

Loc. Habitat arbusa sepium.

23. *S. atratus*. *var. du mel. ruficollis juv. latr. +*
Melolontha humeralis fabr. oliv. +
Le Velours noir.

Long. 2 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

S. niger hirsutus.

Loc. In horro regio Parisiensi frequens.

24. *S. fumosus*. *Melolontha Variabilis oliv. Hal. +*
Le Scarabé couleur de suie.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{3}{4}$ lig.

S. ater, thorace subvillosa, elytris fuscis
 striatis.

Loc.

25. *S. lamellatus.*

Le Scarabé brun chagriné.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. atro-fuscus, supra veluti cinerascens,
 antennis pedibusque fuscis, lamellis
 antennarum longis, elytris striatis.

Loc.

26. *S. aquaticus.*

Le Scarabé noir des marais.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. piceus.

Loc. Habitat putridas paludum aquas.

27. *S. natator.* *hydrophilus griseus fabr. ? +*
hydrophilus? latr. +
Le Scarabe nageur.

Long. 2 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

S. totus rufo-niger, maculis nigrioribus.

Loc. Habitat rivulos & aquas.

28. *S. perla.* *hydr. bipunctatus fabr. ? +*
hydr. unimaculatus? latr. +
La Perle aquatique.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

S. subrotundus lucidus, capite thoraceque nigro, elytris pallidis pellucidis.

Loc. Habitat rivulos.

29. *S. putridus.* *aphodius arenarius +*
Le petit Scarabé noir strié.

Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, pedibus rufis, elytris profunde striatis.

Loc. Habitat putridas plantas.

30. *S. florilegus.* *utridula aenea +*
Le petit Scarabé des fleurs.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

S. nigro-coerulescens.

Loc. Habitat flores.

31. *S. fulcatus*. *hister fulcatus oliv. Walk*
Le Scarabé à côtes.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

S. ater, supra costis elevatis striatis.

Loc.

IV. COPRIS. *LE BOUSIER.*

Antennæ clavatæ, clavâ lamellatâ.

Scutellum inter elytrorum origines
 nullum.

1. *C. lunaris*. (*bon*)

Le Bousier capucin.

Long. 8 lig. Larg. $4 \frac{2}{3}$ lig.

C. capitis clypeo lunulato, margine elevato, corniculo denticulato.

Loc. Habitat fimetaria & bovinas fæces rar.

2. *C. ferratus*. *stachys lat. collis (Walk.)* ^{*lati. Fabr. ♀*}
Le Hottentot. *C. lat. collis (oliv.)* ^{*♀*}

^{*et auct. at. Jauer latr. +*}
 Long. 7 lig. Larg. 5 lig.

C. niger; capite clypeato, margine serrato, thorace lato lævi; elytris striatis.

Loc. Habitat bovinas fæces; rar. in agris lutetianis.

3. *C. nuchicornis.* ^{outophagus nuchicornis latr. + (bin)}

Le petit Bousier noir cornu.

Long. $3 \frac{1}{2}$, $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 2, $1 \frac{1}{3}$ lig.

C. fusco-niger, capite clypeato angulato, pone cornuto, elytris ferrugineo-nebulosis, brevibus, striatis.

Loc. Habitat bovinas faeces.

4. *C. acornis.* ^{est la q du précédent}

Le petit Bousier noir sans cornes.

Long. 2, $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, $1 \frac{1}{3}$ lig.

C. fusco-niger, capite clypeato angulato, non cornuto, elytris brevibus, striatis.

Loc. Habitat bovinas faeces.

5. *C. conspurcatus.* <sup>C. vacca obs. Hala
outop. vac. latr. +</sup>

Le Bousier à deux cornes.

Long. 4 lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

C. obscuræ ænæus, capite pone bicorni, thorace antice prominente, elytris rufis nigro maculatis.

Loc. Habitat bovinas faeces.

6. *C. fulvus.* <sup>C. flavipes obs. + outophagus flav. +
ouitt flav. Hala. + latr.</sup>

Le Bousier fauve.

Long. 2, $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$, 2 lig.

C. fulvus, capite ænæo, thoracis utrinque cavitate laterali fuscâ.

Loc. Habitat bovinas fæces.

7. C. hæmorrhoidalis. *C. Schreberi* Oliv. *Walm.*

Le Bouflier à points rouges.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{3}{4}$ lig.

C. niger nitidus, thorace antice gibbo duplici, elytro singulo maculâ duplici rubrâ.

Loc. Habitat bovinas fæces.

8. C. sinuatus. *C. pillularius* Oliv. +
Atteuchus pill. Hal. +

Le Bouflier à couture.

Long. 5 lig. Larg. 4 lig.

C. niger, capite clypeato, elytris marginæ exteriori sinuatis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

9. C. arachnoides. *Atteuchus schæfferi* Hal. +
Scaphœus Sch. *fabric.* +
Le Bouflier araignée. *Corpi* Oliv. +

Long. 4 lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

C. niger, pedibus longis, femorum posteriorum basi denticulatâ, elytris postice gibbis.

Loc. Idem.

10. *C. corniger.* *C. Taurus* Fabr. +
Le Bousier à ^{outo phagus Taurus latr. +} *cornes retroussées.*

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

C. niger, capite pone bicorni, corniculis tenuibus arcuatis, longitudine thoracis, thorace utrinque sinuato.

Loc. Habitat bovinas fæces.

V. ATTELABUS. L'ESCARBOT.

hister Antennæ clavatæ, clavâ integrâ, in medio fractæ.

Caput intra thoracem.

1. *A. unicolor.* *hister unicolor* Oliv. Walk. +
L'Escarbot noir.

Long. 1, 3, 4 lig. Larg. 1, 2, 3 lig.

A. totus niger, elytris lævibus nonnihil striatis.

Loc. Habitat identidem fæces bovinas, sæpius glaream sterilem.

2. *A. bimaculatus.* *hister bimaculatus* Oliv. Walk. +
L'Escarbot à taches rouges.

Long. 1, $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, $1 \frac{1}{4}$ lig.

A. niger, elytro singulo macula rubra.

Loc. Cum præcedent.

3. *A. cupreus.* *hister aeneus oliv. Walt. +*
L'Escarbot bronzé. Speculiter latr.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A. nigro-cupreus, capite nonnihil prominulo.

Loc. Cum præcedent.

VI. DERMESTES. *LE DERMESTE.*

Antennæ clavatæ perfoliatæ, ultimo articulo solido gibboso.

Elytra non marginata.

1. *D. vespillo.* *microphorus Vespillo +*
Le Dermeste à point d'Hongrie.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

D. thorace marginato, elytris abscissis, nigris, fasciis duabus transversis undulatis luteis.

Loc. Habitat cadavera putrida.

2. *D. listerianus.* *microphorus germanicus +*
Le grand Dermeste noir.

Long. 14 lig. Larg. 6 lig.

D. thorace marginato, elytris abscissis, totus niger.

Loc. Cum præcedente, rarior.

3. *D. bipunctatus*. ~~nitidula~~ *bipunctulata* +

Le Dermeste à 2 points rouges.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. niger, coleoptris punctis rubris binis.

Loc. Putrida cadavera habitat.

4. *D. pellio*. (*bou*) +

Le Dermeste à 2 points blancs.

Long. 2, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger, coleoptris punctis albis binis.

Loc. Habitat hortos & domos.

5. *D. lardarius*. (*bœu*) +

Le Dermeste du lard.

Long. 3 lig.

D. niger, elytris antice cinereis.

Loc. Habitat partes animalium putridas, musæis ubi pelles conservantur infestus.

6. *D. pallidus*.

Le Dermeste effacé.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. nigro-fuscus, elytris antice pallidioribus nebulosis.

Loc. Habitat partes animalium putridas, musæis ubi pelles conservantur infestus.

7. D. murinus. (bois) +

Le Dermeste à écusson jaune.

Long. 2, 3 lig. Larg. 1 lig.

D. lævis niger, cinereo-nebulosus, scutello luteo.

Loc. Cadavera & exesas arbores habitat.

8. D. flavescens. (bois) *D. tomentosus oliv. +*

Le Velours jaune. Hyturus tom. latr. +

Long. 2 lig.

et D. fumatus fabr. +

D. flavescens pilosus, oculis nigris.

Loc. Habitat lignum exesum.

9. D. oblongus.

Le Dermeste levrier à stries.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

D. oblongus fuscus, elytris striatis.

Loc. Habitat ligneas supellestiles in domis.

10. D. contractus.

Le Dermeste levrier ponctué & strié.

D. oblongus ferrugineus; elytris punctato-striatis.

Loc. Habitatio præcedentis.

11. *D. auriculatus*. ^{varius molis fer. corius fabr. +}
^{*Dryops auriculata* Oliv. +}

Le Dermeste à oreilles. ~~perisodiv.~~

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. tentaculis ante oculos antenniformibus mobilibus.

Loc. Vere novo in aquas natat.

12. *D. stercoreus*. ^{ips cellaris?}

Le Dermeste du fumier.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

D. oblongus, glaber, testaceus, oculis nigris.

Loc. Fimetaria habitat, identidem in domis reperitur.

13. *D. variegatus*. ^{infidela Variegata div +}
^{nit. varia fabr +}

Le Dermeste panaché.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. nigro fuscoque nebulosus, elytris vix striatis.

Loc. Habitat cortices cariosos.

14. *D. striatus.*

Le Dermeste à côtes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. nigro fuscoque nebulosus, thorace

elytrisque profundè striatis & punctatis.

Loc. Habitat vetustas arbores.

5. D. aquaticus. *De moris aquaticus*

Le Dermeste bronzé.

Long. $1 \frac{1}{2}$, $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$, $1 \frac{3}{4}$ lig.

D. viridi-ænæus, thorace fasciis quatuor
elevatis, elytris punctato-striatis.

Loc. Conervas rivorum habitat.

6. D. 4-punctata.

Le Dermeste à 4 points rouges, strié.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

D. niger, coleoptris punctis rubris quatuor
ternis, elytris striatis oblongus.

Loc. Habitat arbores; rarus.

7. D. hortensis. *Sphæridium scarabæoides* +

*Le Dermeste à 4 points rouges,
sans stries.*

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{3}{4}$ lig.

D. niger, coleoptris punctis rubris quatuor
ternis, elytris lævibus subrotundus.

Loc. Habitat arbores in sylvis & hortis.

8. D. gagatinus. *Sphæri. marginatum* +

Le Dermeste jayet.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. niger subrotundus elytris lævibus.
Loc. Habitat flores.

19. D. lugubris. *Sphaeridium lugubre +*
Le Dermeste en deuil.

Long. $1 \frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger subrotundus, elytris striatis.
Loc. Habitat plantas aquaticas.

20. D. longicornis.

Le Dermeste noir à longues antennes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. niger subrotundus, elytris lævibus,
 antennis thorace longioribus.

Loc. Habitat flores.

21. D. fulvipes. *nitidula atrata? oliv +*

Le Dermeste noir à pattes fauves.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. niger oblongus, elytris punctatis,
 pedibus fulvis.

Loc. Habitat flores.

22. D. pellucidus.

Le Dermeste à étuis transparens.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. elytris corneis pellucidis, thorace
 obscuriore.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

. D. futuratus.

Le Dermeste à couture.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. totus niger, subrotundus, thorace elytrisque profunde striatis & punctatis.

Loc.

. D. trifulcus.

Le Dermeste à tête noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. oblongus, fuscus capite nigro, thorace costis tribus elevatis, elytris striatis.

Loc.

. D. fasciatus.

Le Dermeste à bande noire.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. oblongus, niger, pedibus coleoptrisque fulvis, elytrorum fasciâ transversâ nigra.

Loc.

. D. scapularis.

Le Dermeste à épaulettes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. capite thoraceque rubro, elytris nigris, maculis antice extusque rubris.

Loc.

27. D. pygmaeus.

Le Dermeste puce.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. ovatus testaceus, subpilosus oculis nigris.

Loc.

28. D. thoracicus.

Le Dermeste puce à corcelet rouge.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. ovatus, capite, thorace pedibusque rubicundis, elytris nigris.

Loc.

29. D. testudinarius.

Le Dermeste-tortue noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

D. niger nitens ovatus, elytris postice lividis.

Loc.

30. D. tricolor.

Le Dermeste-tortue à tache rouge.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

D. niger nitens ovatus, elytris postice,
antice maculâ rubrâ.

Loc.

31. D. tessellatus.

Le Dermeste à l'échiquier.

Lon. $1 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger; maculis fuscis, plurimis connexis, elytris punctatis.

Loc.

32. D. semi-coleopterus.

Le Dermeste noir à étuis courts.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. ater, elytris marginatis brevibus, pedibus fuscis.

Loc.

33. D. dimidiatus.

Le Dermeste à demi-étuis.

Long. $1 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger, elytris dimidiatis pone flavis.

Loc.

VII. BIRRHUS. *LA VRILLETTE.*

Antennæ articulis tribus ultimis longissimis semi-clavatæ.

1. B. domesticus. *Anobium striatum* +
La Vrilette des tables.

Long. $1 \frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. $\frac{1}{2} \frac{3}{4}$ lig.

B. testaceo-niger, thorace subhirsuto.

Loc. Ligneas suppelectiles foraminibus rotundis terebrat.

2. B. paniceus.

La Vrilette de la farine.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

B. testaceus glaber oculis nigris.

Loc. Habitat cerealia.

3. B. mollis. *Anobium castaneum* +
La Vrilette fauve.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

B. fulvus obscurus, oculis nigris.

Loc. Habitat pinum.

4. B. pertinax. *Anobium tessellatum* +
La Vrilette savoyarde.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

B. totus nigro-fuscus.

Loc. Habitat ligna tabulata domorum.

5. B. fasciatus. *Permethon trifasciatus*? Oliv. 4761K -
La Vrilette brune à bandes grises.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. fuscus, fasciis elytrorum transversis cinereis.

Loc.

6. B. coeruleescens.

La Vrilette bleuâtre.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. totus nigro-coeruleus subvillosus.

Loc.

III. ANTHRENUS. L'ANTHRÊNE.

Antennæ clavatæ integræ, clavâ solidâ compressâ.

1. A. scrophulariæ. a. *pimpinellæ* +
L'Anthrène à broderie.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. squamosus niger, fasciâ punctisque coleopterorum albis, futuris fuscis,

Loc. Habitat flores, multiplex.

2. A. florilegus. an. *Verbasci* +
L'Amourette.

Long. $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. squamosus niger, elytris fuscis, fasciâ triplici undulatâ albâ.

Loc. Larva cadavera habitat, alatus flore

IX. CISTELA. *LA CISTELE.*

Antennæ extrorsum crassiores nonnihil
perfoliatæ.

Thorax conicus non marginatus.

1. C. viridescens. *N. pilula* +
La Cistele satinée.

Long. 4 lig. Larg. $2 \frac{2}{3}$ lig.

C. subvillosa viridescens, fasciis longitu-
dinalibus fuscis interruptis.

Loc. Habitat arenam & gramina.

2. C. atra. *N. fasciatus* + *N. dorsalis* fabz
N. marinus? fabz + *var. du*
La Cistele à bande. *prédant*

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{3}{4}$ lig.

C. subvillosa atra, fasciâ elytrorum trans-
versâ aurato-fulcâ.

Loc.

3. C. nitens. *N. semistriatus*? +
N. picipes Oliv.? +
La Cistele noire lisse.

Long. $1 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. nigra nitens glabra.

Loc.

. PELTIS. LE BOUCLIER.

*Sylpha fabr.
oliv.*

Antennæ extrorsum crassiores nonnihil
perfoliatæ.

Thorax & elytra marginata.

1. P. atrata. *Sylpha atrata, obscura, reticulata*
Le Bouclier noir à trois raies & cor-
celet lisse.

Long. 4, 5, 6 lig. Larg. 2, 3, 4 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis,
spatio interjecto punctato, thorace lævi.

atrata + *Variet.* A. ead. spatio interjecto punc-
tato, thorace lævi, utrin-
que sulco armato.

obscura + B. ead. spatio interjecto punc-
tato, thorace lævi, ubi-
que æquali.

C. ead. spatio interjecto punc-
tato, thorace lævi, punc-
tis duobus impressis.

reticulata + D. ead. spatio interjecto punc-
tis latis inæqualibus,
thorace lævi.

Loc. Habitat putrefacta animalium cadavera.

2. P. scabra. *Silpha sinuata* +

Le Bouclier noir à corcelet raboteux.

Long. 5, 6 lig. Larg. 2, 3 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis, spatio interjecto minutissime punctato, thorace scabro.

Loc. Habitat cadavera, rarior.

3. P. gibbosa. *S. littoralis* fab. +
Silpha gibbosa fab.
~~*S. rugosa* fab. +~~
Le Bouclier à bosses.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis, primâ & secundâ gibbositate connexis, thorace lævi.

+ Loc. Habitat cadavera.

4. P. complicata. *Silpha rugosa* fab. ?

Le Bouclier noir chiffonné à corcelet raboteux.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis acutis, spatio interjecto veluti complicato, thorace scabro.

Loc. Habitat cadavera.

5. *P. inæqualis.*

Le Bouclier noir chiffonné à corcelet lisse.

Long. 1 lig. Larg. 2 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis acutis, spatio interjecto veluti complicato, thorace lævi.

Loc. Habitat cadavera.

6. *P. thoracica.* *Silpha Thor. oliv. +*

Le Bouclier à corcelet jaune.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

P. nigra, lineis tribus elevatis acutis, thorace ferrugineo.

Loc. Habitat cadavera.

7. *P. maculata.* *S. quadripunctata +*

Le Bouclier jaune à taches noires.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

P. nigra, thorace elytrisque testaceis, thoracis maculâ coleoptrorumque punctis quinque nigris.

Loc. Habitat cadavera, rarior.

8. *P. excavata.* *S. levigata +*

La Goutiere.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

P. nigra tota, elytris lævibus, punctis minimis excavatis.

Loc. Habitat ligna humida.

9. P. testacea. *S. pedemontana*
Le Bouclier fauve.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

P. tota testacea.

Loc.

10. P. villosa. *Catops morio Fabr. +*
Koleva morio Latr. +
Le Bouclier brun velouté.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. nigro-fusca subvillosa.

Loc. Habitat arenam.

XI. CUCUJUS. *LE RICHARD.*

Antennæ ferratæ breves. *Suprestis*

Thorax subtus nudus.

Caput dimidium intra thoracem crassum.

1. C. chryso stygma. *Sup. Chr. +*
Le Richard à fossettes.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

C. aureus, elytrorum fossulis quatuor impressis nitentibus.

Loc. Habitat excelsas arbores; frequenter in insula luteriana *Louvier* dicta reperitur, ad quam cum ligno advehitur, ex sylvis.

2. *C.* 8-guttatus. *Sup. biguttata* +
Le Richard à points blancs.

Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

C. viridi-æneus, punctis quatuor impressis albis.

Loc. Idem.

3. *C.* rusticus. *Sup. rustica* +
Le Richard doré à stries.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

C. viridi-auratus, oblongus, thorace punctato, elytris striatis.

Loc. Habitat arbuscula sepium.

4. *C.* rubinus. *Sup. manca* +
Le Richard rubis.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. æneus, elytris fuscis, thorace rubro fasciis fuscis.

Loc. Habitat rosas.

5. *C.* viridis. *Sup. vir.* +
Le Richard vert allongé.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridi-cupreus, lævi oblongus.

Loc. Habitat arbores sepium.

6. C. minutus. *Nep. minutus* *

Le Richard triangulaire ondé.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. fusco-cupreus, triangularis, fasciis undulatis villoso albidis.

Loc. Idem.

* 7. C. ater.

Le Richard noir allongé.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. niger oblongus, punctatus, elytris striatis.

Loc.

* 8. C. dentatus.

Le Richard noir chagriné.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. niger thorace punctato, postice dentato, elytris fulcatis.

Loc. Habitat insulas Sequanæ propè locum dictum *le Gros Caillou.*

KII. ELATER. *LE TAUPIN.*

Antennæ ferratæ vel filiformes intra
capitis cavitatem subtus receptæ.

Thorax subtus aculeo intra cavitatem
abdominis recepto.

1. *E. ruber. l. ferrugineus +*
Le Taupin rouge.

Long. 8 lig. Larg. 3 lig.

E. thorace elytrisque rubris.

Loc. Habitat cariosas falices.

2. *E. sanguineus. bon +*
Le Taupin à étuis rouges.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. niger, elytris rubris.

Loc. Habitat cortices arborum,

3. *E. flavescens.*

Le Taupin à étuis jaunes & corcelet lisse.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

E. niger, elytris flavis.

*Varietas A. niger, elytris om-
nino flavis.*

*B. niger, elytris flavis
apice nigris.*

B vj

C. niger, elytris testaceo-fuscis.

Loc. Habitat vetustas arbores.

4. E. castaneus. bon +

Le Taupin à corcelet velouté.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. thorace villoso, elytris testaceis apice nigris.

Varietas A. thorace villoso, elytris flavescens apice nigris.

B. thorace villoso, elytris rubescens apice nigris.

Loc. Idem.

5. E. ruficollis. f. *thoracicus* +

Le Taupin noir à corcelet rouge.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

E. niger, thorace rubro.

Loc.

6. E. cruciatus. bon +

Le Taupin porte-croix.

Larg. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. thorace nigro, circulo rubro, elytris fulvis, cruce-nigra.

Loc.

7. E. pectinicornis *ℓ. germanus (æneus (abr.) +*
Le Taupin brun cuivreux.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

E. fusco-viridi-æneus.

Loc. Habitat gramina.

8. E. niger. *ℓ. murinus +*
Le Taupin brun nébuleux.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

E. nigro-fuscus, cinereo-nebulosus.

Loc. Habitat messes.

9. E. tessellatus. *bon +*
Le Taupin à plaques velues.

Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

E. niger, villosus undulatus.

Loc. Habitat agros.

10. E. murinus. *ℓ. holosericus +*
Le Taupin gris de souris.

Long. 4, 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

E. niger, elytris villosus - murinis.

Loc.

11. E. balteatus. *ℓ. marginatus*
Le Taupin bedeau.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

E. niger, elytris fuscis, singulo fasciâ
 longitudinali fulvâ.

Loc. Habitat arva.

12. E. obscurus.

Le Taupin noir à étuis bruns.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

E. niger, elytris fuscis.

Loc. Idem.

13. E. ater. *ℓ. niger*

Le Taupin en deuil.

Long. 5 lig. Larg. $1\frac{1}{2}$ lig.

E. totus niger nitidus.

Loc. Idem.

14. E. rufipes. *ℓ. +*

Le Taupin noir à pattes fauves.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

E. niger pedibus rufis.

Loc. Habitat cortices.

15. E. bimaculatus. *ℓ. bipunctatus +*

Le Taupin noir à taches rouges.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

E. niger, elytrorum basi maculis rubris.
Loc. Habitat cortices.

16. E. clavicornis. *Troscus verumontoides latr.*
Le Taupin à antennes en masse.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

E. fuscus, antennis ferrato-clavatis.
Loc. Habitat sylvas.

17. E. rachifer.

Le Taupin à bandes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

E. niger, elytris fulvis, rachi nigra.
Loc.

18. E. melanophthalmos.

Le Taupin fauve aux yeux noirs.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

E. fuscus, oculis nigris.
Loc.

19. E. fuscus.

Le Taupin brunet.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. totus fuscus, thorace punctato, elytris striatis.

Loc.

* 20. E. villosus.

Le Taupin brun velouté.

Long. 9 lig. Larg. 2 lig.

E. fulvus vellere, levi fasciatim confusus.

Loc.

XIII. BUPRESTIS. *LE BUPRESTE.*

Carabus Antennæ filiformes.

fabr. Trochanter magnus seu appendix ad basim femorum posteriorum.

FAMIL. I. *thorace cordato capite latiore elytris angustiore.*

1. B. coriaceus. *Carabus corr. fabr. +*

Le Bupreste noir chagriné.

Long. 14 lig. Larg. 6 lig.

B. ater, elytris rugosis.

Loc. Habitat humida hortorum loca.

2. B. nitens. *Car. auratus +*

Le Bupreste doré & sillonné à larges bandes.

Long. 11 lig. Larg. 4 lig.

B. viridis, elytris obtuse fulcatis, non

punctatis, pedibus antennisque ferrugineis.

Loc. Habitat frequentissimè hortos & agros.

. B. granulatus. *Carabus gran.* +
Le Bupreste galonné.

Long. 11 lig. Larg. 5 lig.

B. niger, elytris æneis convexe punctatis striatisque.

Varietas A. totus violaceus, elytris convexe punctatis striatisque.

Loc. Idem. rarior.

4. B. purpurascens. *Carabus purp.* +
Le Bupreste azuré.

Long. lig. Larg. lig.

B. totus nigro-violaceus, elytris densè striatis.

Varietas A. Elytro singulo striis XVI, oris aureo-cupreis.

B. Elytro singulo striis XVI, tribus interruptis.

C. Elytro singulo striis XXII, tribus interruptis.

Loc. Habitat hortos humidos.

5. B. fycophanta. *Calosoma Syc. Fabr.*

Le Bupreste quarré couleur d'or

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

B. nigro-violescens, elytris latis æneis è viridi purpureis, singulo striis sexdecim.

Loc. Habitat ilicem, ubi papilionum larvas devorat.

6. B. antiquus. *Calos. inquisitor. + indagator*

Le Bupreste quarré couleur de bronze antique.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

B. totus è fusco-viridi cupreus, elytris latis, singulo striis sexdecim.

Loc. Idem.

7. B. leucophthalmos. *harp. melanocephalus Fabr. + Carabus leuco. Fabr. +*

Le Bupreste tout noir. ^{omplet et} ~~inquisitor~~ ^{Walt.}

Long. 8 lig. Larg. 3 $\frac{3}{4}$ lig.

B. ater, elytro singulo striis octo lævibus, pedibus nigris.

Loc. Idem.

- * 8. B. longicornis. *Car. longi.*

Le Bupreste luisant.

Long. 10 lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

B. ater, elytro singulo striis octo lævibus.

bus vix impressis pedibus nigris,
antennis fuscis, thorace duplo lon-
gioribus.

Loc. Idem.

9. B. rufipes. *Carabus ruficornis*

Le Bupreste noir à pattes rougeâtres.

Long. 4, 5 lig. Larg. 2 lig.

B. niger, elytro singulo striis octo punc-
tatis, pedibus ferrugineis.

Loc. Idem.

10. B. flavipes. *Car. fulvicornis*

Le Bupreste noir à pattes jaunes.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger, elytro singulo striis octo lævi-
bus, pedibus lividis.

Loc. Idem.

11. B. vinearum. *Car. sin. loricera aenea latr.*
Car. pilicornis fabri.

Le Bupreste à six points enfoncés.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

B. nigro-viridis, elytro singulo striis octo
punctis tribus impressis.

Loc. Habitat vites.

12. *B. agrorum.* *Car. agr. viridatus* } *au marginatus*
harp. viridatus
Le Bupreste vert pointillé à huit stries
& pattes fauves.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

B. viridis punctatus, elytro singulo striis octo, pedibus pallidis.

Loc. Habitat agros.

13. *B. lucorum.* *Car. luc.* *harpalus marginatus latr. + ?*

Le Bupreste vert lisse, à huit stries
& pattes fauves.

B. viridis nitens; elytro singulo striis octo, pedibus pallidis, punctis tribus impressis.

Loc. Habitat sylvas aridas.

14. *B. bicolor.* *Car. pratensis fabr. harpalus (mab.)*
Car. viridanus oliv. +

Le Bupreste à étuis verts & bruns.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

B. viridis, elytro singulo striis octo, pedibus elytrorumque anticâ parte & margine fulvis.

Loc. Habitat arenam.

5. B. 6-punctatus. *pungatus 6 p. latr + carabus 6 punc. +*
Le Bupreste à étuis cuivreux.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

B. nitens, capite thoraceque viridi, elytris cupreis punctulis duodecim.

Loc. Habitat arenam, propè rivulos.

6. B. thoracicus.

Le Bupreste à corcelet cuivreux.

Long.

B. nitens, capite elytrisque viridibus, thorace cupreo, punctis duodecim.

Loc. Idem.

7. B. cyano-cephalus. *labia cyan. + latr. car. cyan. +*
Le Bupreste bleu à corcelet rouge.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. capite elytrisque caruleis, thorace rubro.

Loc. Idem.

8. B. equestris. *(naucorum group major car. linguatatus group major)*
Le Chevalier noir.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

B. niger, thorace atro, elytris rubris cruce nigrâ.

Loc. In loco dicto Fontainebleau frequens.

19. B. crux major. *Car. crux major elytr. +
lebia crux minor latr. +*
Le Chevalier rouge.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

B. niger, thorace pedibusque rubris elytris rubris, cruce nigra.

Loc.

20. B. crepitans. *brachium crep. f. latr. latr. +
Carabus crep. +*
*Le Bupreste à tête, corcelet & pat-
tes rouges & étuis bleus.*

Long.

B. capite, thorace, pedibusque rubris, elytris cæruleo-nigris.

Loc. Habitat humum umbrosum, sub lapidibus.

21. B. ustulatus. *Car. la guttatus + bembidion
lebia la gutt. latr. + littorale latr.*
*Le Bupreste quadrille à corcelet
rond & étuis striés. Claph. litt. f. latr.*

Long. $1 \frac{1}{2}$, $2 \frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$, 1 lig.

B. niger, thorace ovato, nigro, elytris striatis maculis quatuor lividis.

Loc. Habitat rivo- rum ripas.

22. B. 4-maculatus. *Car. la mac. +
lebia la mac. latr. +*
*Le Bupreste quadrille à corcelet
plat & étuis lisses.*

Long. idem. Larg. idem.

B. niger, thorace plano ferrugineo, elytris lævibus, maculis quatuor lividis.

Loc. Idem.

B. crucifer.

Le Bupreste quadrille à corcelet plat, brun & étuis striés.

Long. idem. Larg. idem.

B. niger, thorace plano ferrugineo, elytris striatis, maculis quatuor lividis.

Loc. Idem.

B. quadrifer. *car. ustulatus*

Le Bupreste quadrille à corcelet plat & noir & étuis striés.

B. niger, thorace plano nigro, elytris striatis, maculis quatuor lividis.

Loc. Idem.

B. octo-maculatus. *beumbidia varium latr. car. ~~una~~ ustulatus? fabr.*

Le Bupreste noir à huit taches fauves.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. niger, elytris striatis, maculis octo lividis.

Loc. Habitat arenam.

26. B. fulvus. *Car. atricapillus +
lebia atricap. latz +*
Le Bupreste fauve à tête noire.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. testaceus, capite nigro.

Loc. Idem.

27. B. minutus. *car. bipunctatus*
Le Bupreste noir sans stries.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

B. totus niger, lævis.

Loc. Habitat arenam.

FAMIL. II. *Thorace capite elytrisque
angustiore.*

28. B. campestris. *Cicadela camp. +*
Le Velours vert à 12 points blancs.

Long. 6 lig. Larg. $2\frac{1}{2}$ lig.

B. inauratus, supra viridis, coleoptris
punctis duodecim albis.

Loc. Habitat loca sicca, arenam.

- * 29. B. episcopalis. *Carabus caeruleus*
Le Bupreste épiscopal.

Long. 4 lig. Larg. $1\frac{1}{2}$ lig.

B. totus violaceus, pedibus antennisque fuscis.

Loc. Idem.

0. B. fasciatus. *Cicindela hybrida* +
Le Bupreste à broderie blanche.

Long. 6 lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

B. inauratus, supra fusco-viridis, coleoptris fasciis sex undulatis albis.

Loc. Idem.

1. B. futuratus.

Le Bupreste à bandes.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. niger; elytris striatis, coleoptro-
rum anticâ parte futurâque lividis.

Loc.

2. B. germanicus. *Cicindela germanica* +
Le Bupreste vert à 6 points blancs.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

B. inauratus, supra fusco-viridis, coleop-
tris punctis sex albis.

Loc. Habitat arenam, prope rivulos.

3. B. marginatus.

Le Bupreste bordé.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. fulvus, oculis nigris; elytris nigris, postice fulvis.

Loc.

34. B. riparius. *Elytrus rip.* +
Le Bupreste à mamelons.

Long. $2 \frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. 1 lig.

B. viridi-æneus, elytris punctis latis excavatis mammillofis.

Loc. Habitat arenam humidam.

* 35. B. scapularis. *Car. Scap.*
Le Bupreste taché à corcele rouge.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. testaceus, capite nigro: elytris striatis nigris utrinque maculâ antice fulvâ.

Loc.

36. B. aquaticus. *Elytrus aquaticus* +
Le Bupreste à tête cannelée.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

B. fusco-æneus, capite profunde striato, elytrorum striâ primâ remotissimâ.

Loc. Habitat arenam humidam.

37. B. contractus.
Le Bupreste levrier.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. niger, elytris fulvis striatis, femoribus latis, pedibus valde spinosis.

Loc.

8. B. impressus. (*Elastrus flavipes*) +
Le Bupreste à 4 points enfoncés.

Long. $1 \frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$, 1 lig.

B. cupreo viridique variegatus, punctis quatuor impressis, pedibusque pallidis.

Loc. Habitat arenam prope rivulos.

9. B. lunulatus.

Le Bupreste à lunules.

Long. $1 \frac{2}{3}$ lig. Larg.

B. niger, elytris striato punctatis; postice maculis duabus, & apice flavis.

Loc.

10. B. stagnorum. (*clavipes*) ~~lit~~. littoralis +

Le Bupreste bronzé à 2 points enfoncés.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

B. fusco-æneus elytris striatis, punctis duobus impressis.

Loc. Habitat arenam humidam, rarior.

* 41. *B. foveatus.*

Le Bupreste strié à 4 points enfoncés.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. totus niger, elytris striatis, punctis quatuor impressis.

Loc.

FAM. III. *Thorace capite latiore, elytrorum latitudine.*

42. *B. piger.*

harpalus piger lat. + Car. gibbus + Carabus madidus? Bupr. tardus lat.

Le Bupreste paresseux.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

B. ater, thorace lato, elytrorum striis punctatis.

Loc. Habitat siccam arenam,

* 43. *B. capitatus.*

Le Bupreste brun à tête noire.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. totus fuscus, capite nigro.

Loc.

44. *B. viridulus.*

harp. aeneus + Car. aeneus + Car. viri.? Car. aeneus oliv.

Le Bupreste verdet.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

B. totus viridis, thorace lato.

Loc.

5. B. maxillofus.

Le Quadrille à mâchoires brunes.

Long. 2 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 lig.

B. niger maxillis thoraceque ferrugineis :
elytris striatis, maculis quatuor luteis.

Loc.

6. B. vulgaris. ^{harpalus communis latr. +}
~~Car. vulgaris?~~

Le Bupreste rosette.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

B. infra niger, supra nigro-æneus, tho-
race lato.

Loc. Habitat arenam.

7. B. plateosus. ^{harp. lunatus latr. +}
~~Car. lunatus +~~

Le Bupreste à plaques.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. capite cœruleo-nitido, thorace fulvo;
elytris luteis striatis maculis sex atris.

Loc.

8. B. luctuosus. ^{au Car. frigidus? au binotatus?}
~~Car. latus?~~

Le Bupreste en deuil.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

B. totus niger, thorace lato lævi, elytrorum striis lævibus.

Loc. Habitat humum sub lapidibus.

*

49. B. fumosus.

Le Bupreste noir à pattes brunes.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. totus niger, elytris striatis, pedibus fuscis.

Loc.

*harp. rufic. lat 2. +
Carabus ruficornis +*

50. B. sericeus. *Car. agrestis ?*

Le Bupreste noir velouté.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

B. ater subvillosus, antennis pedibusque ferrugineis.

Loc. Habitat agros.

51. B. æruginosus.

Le Bupreste cuivreux à pattes brunes.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. totus nigro-auratus, elytris striatis, pedibus fuscis.

Loc.

2. B. leporinus. *harpalus latus latr.*

Car. flavipes oliv
Le Bupreste noir à pattes brunes.

B. ater, laevis, pedibus antennarumque
basi ferrugineis.

Loc.

3. B. connexus. *Carabus connexus*

Le Bupreste à suture.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

B. niger, pedibus fulvis : elytris fulvis
futurâ margineque postico nigris.

Loc.

4. B. psittaceus. *harpalus cupreus +*
Carabus cupreus +

Le Bupreste perroquet.

Long. 5, 3 lig. Larg. 2, 1 lig.

B. totus viridi cupreus, antennis nigris.

Loc. Habitat agros & hortos, frequentissimus.

5. B. variegatus. *harpalus agrorum latr. +*
Carabus marginatus ?

Carabus agrorum oliv +
Le Bupreste vert à bordure.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

B. viridis, pedibus elytrorumque mar-
gine exteriori pallide testaceis.

Loc. Habitat agros.

56. *B. melanocephalus*. *Car. mel.*

Le Bupreste noir à corcelet rouge.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

B. niger, thorace, antennis pedibusque ferrugineis.

Loc. Habitat agros.

57. *B. rubescens*. *Car. apriacris + harp. apr. +*
Car. ferrugineus?

Le Bupreste fauve.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. ferrugineo-lividus, elytris punctato-striatis.

Loc.

* 58. *B. rosaceus*. *Car. ros.*

Le Bupreste rouget.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger lævis, thorace antennis pedibusque rubris.

Loc.

* 59. *B. rusticus*. *Car. rust.*

Le Bupreste brunet.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger punctatus, thorace capite antennis pedibusque fuscis.

Loc.

o. B. humeralis. *car. hum.*

Le Bupreste à nœud d'épaule.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger striatus, pedibus pallidis, elytrorum basi maculâ flavâ.

Loc.

KIV. BRUCHUS. LA BRUCHE.

Antennæ filiformes.

Thorax subrotundus gibbus.

Corpus sphæroidæum, dorso convexo.

1. B. fur. *ptinus fur. +*

La Bruche à 2 bandes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. testaceus, elytrorum fasciâ duplici albidâ.

Loc. Habitat herbaria, plantas siccas devorat.

2. B. apterus. *gibbium ^{scoticus} apterus latr. +*
ptinus scoticus latr.

La Bruche sans ailes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. totus testaceus, elytris coadunatis.

Loc. Habitat plantas siccas.

* 3. *B. cruciatus.*

La Bruche à croix de S. André.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. fuscus subvillosus, scutello albo, elytris cruce divaricatâ albidâ.

Loc.

XV. LAMPYRIS. *LE VER-LUISANT.*

Antennæ filiformes.

Caput clypeo thoracis marginato tectum.

Abdominis latera plicato-papillosa.

1. *L. nocticula. Lamp. splendida*

Le Ver-luisant à femelle sans aîles.

Le mâle. Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

La femelle. Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

L. fæminâ apterâ.

Loc. Fæmina abdomine nudo campos habitat, mas in hortis volitat per noctem.

2. *L. hemiptera. bon +*

Le Ver-luisant à demi-fourreaux.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

L. hemiptera.

Loc. Idem.

3. *L. sanguinea*. *lyon sanguineus fabr. +*
Le Ver-luisant rouge.

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{3}{4}$ lig.

L. elytris rubris, thorace rubro, nigrâ maculâ.

Loc. Idem.

XVI. CICINDELA. LA CICINDELE.

Antennæ fili formes.

Thorax planus, marginatus.

Caput detectum.

Elytra flexilia.

1. *C. fusca*. ~~*fabr.*~~ *Telephorus fuscus oliv. +*
Cantaris fusca fabr. +
La Cicindele noire à corcelet maculé.

Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

C. elytris nigricantibus thorace rubro, nigrâ maculâ.

Loc. Habitat flores.

2. *C. livida*. ~~*fabr.*~~ *T. liv. oliv. +*
Can. liv. fabr. +
La Cicindele à corcelet rouge.

Long. 5, 6 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. thorace rubro immaculato, genubus posticis nigris.

Varietas A. elytris testaceis, thorace rubro immaculato, genubus posticis nigris.

B. elytris nigricantibus, thorace rubro immaculato, genubus posticis nigris.

Loc. Habitat flores.

3. *C. nigra.* *Th. thoracicus oliv. +*
Can. Thor. fabr. +

La petite Cicindele noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. elytris nigricantibus, thorace rubro immaculato, genubus omnibus rubris.

Loc. Idem.

4. *C. pallida.*

La petite Cicindele pâle.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. elytris testaceis, thorace rubro immaculato, genubus omnibus rubris.

Loc. Idem.

5. *C. maculata.* *Zel. melanura oliv. +*
Cass. melanura fabr. +

La Cicindele à étuis tachés de noir.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. rubra, elytris testaceis, apice nigris.
 Loc. Habitat flores.

6. C. lutescens. ^{cant. testacea fabr +}
^{telephus testaceus +}
La Cicindele noire à étuis jaunes.

Long. 2, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. nigra, elytris pedibusque pallidis.

Varietas A. nigra, thorace omni
^{Cant. pallida fabr.} ... nino nigro, elytris
^{tel. multicolor oliv.} pedibusque pallidis.

^{B.} nigra, thoracis mar-
^{cant. testacea fabr.} gine flavo, elytris
^{tel. testaceus oliv} pedibusque pallidis.

Loc. Idem.

7. C. ænea. ^{malachius æneus oliv. fabr. +}
La Cicindele bedeau.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridi-ænea, elytris extrorsum rubris.
 Loc. Idem.

8. C. bipustulata. ^{malachius bipustulatus oliv. +}
^{malachius bipustulatus oliv. +}
La Cicindele verte à points rouges.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. æneo-viridis, elytris apice rubris.
 Loc. Habitat flores.

9. *C. elegans. malachius ele. +*

La Cicindele verte à points jaunes.

C. æneo-viridis, elytris apice flavis.

*Varietas A. tota æneo-viridis,
elytris apice flavis.*

*B. cœruleo-viridis, tho-
racis margine rubro,
elytris apice flavis.*

au mal. marginellus ?

Loc. Habitat flores.

10. *C. minima. malachius pulicarius +*

*La Cicindele noire à points jaunes
& corcelet rouge.*

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

*C. fusca, elytris apice flavis, thorace
rubro nigrâ maculâ.*

Loc. Idem.

11. *C. biguttata. malachius pedicularius +*

*La Cicindele noire à points jaunes
& corcelet noir.*

*C. fusca, elytris apice flavis, thorace
fusco.*

Loc. Idem.

2. *C. fasciata.* *mal. fas. +*

La Cicindele à bandes rouges.

C. elytris nigris, fasciis duabus rubris.

Loc. Habitat flores.

3. *C. thoracica.* *mal. thor. +*

La Cicindele verte à corcelet rouge.

Long. $1 \frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. viridis, thorace rubro immaculato.

Loc. Idem.

4. *C. viridi-cœrulea.* *Dactylus cœruleus fabr +*
melgus cœr. oliv +

La Cicindele verdâtre.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. viridi-cœrulea.

Varietas A. viridis.

B. cœrulea.

C. viridi-cœrulea.

Loc. Idem.

5. *C. plumbea.* *elytris plumbeis.*

La Cicindele plombée.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. plumbeo-nigra.

Loc. Idem.

16. *C. cinerea.**La Cicindele cendrée.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.*C. villoso-cinerea.**Loc. Habitat flores.*17. *C. rotundata.**La Cicindele bronzée.*

Long. 1 lig.

*C. plumbeo-cuprea, tibiis pallidis, abdomine subrotundo.**Loc. Idem.*XVII. OMALISUS. *L'OMALISE.*

Antennæ filiformes.

Thorax planus tetragonus, angulis posterioribus in spinam productis.

1. *O. fontis bellaquæi. s. suturalis +*
*L'Omalise.*Long. 2 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 lig.*Loc. Habitat fontem bellaquæum.*

VIII. HYDROPHILUS. L'HYDROPHILE.

Antennæ clavatæ perfoliatæ antennulis breviores.

Pedes natatorii.

1. H. picæus. *bon +*

Le grand Hydrophile.

Long. 17 lig. Larg. 9 lig.

H. niger, elytris sulcatis, antennis fuscis.

Loc. Habitat rivulos & stagna.

2. H. caraboides. *bon +*

L'Hydrophile noir picoté.

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

H. niger, elytrorum punctis per strias digestis, antennis nigris.

Loc. Habitat aquas.

3. H. punctatus. *h. orbicularis fabri. +*

L'Hydrophile lisse à points.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

H. niger, elytris lævibus dense punctatis.

Loc. Idem.

4. *H. fuscipes*. ^{bon latr. +}
^{h. scarabaeoides fabr. +}
L'Hydrophile noir strié.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

H. niger, elytris striatis, pedibus fuscis.

Loc. Habitat aquas.

5. *H. fulvus*. ^{h. lividus latr.}
^{h. apertus fabr.}
L'Hydrophile fauve.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

H. fulvus.

Loc. Idem.

XIX. DYTICUS. LE DITIQUE.

Antennæ filiformes, capite longiores.

Pedes natatorii.

1. *D. stagnalis*. ^{var. defunctus}
^{D. punctulatus oliv. fabr.}
Le Ditique brun à bordure.

Long. 8 lig. Larg. 4 lig.

D. fuscus, margine coleoptrorum thoracisque flavo.

Loc. Habitat stagnantes aquas.

2. *D. marginalis*. ^{bon + D. punctulatus}
Le Ditique noir à bordure.

Long. 1 pouce. Larg. 6 lig.

D. niger, margine coleoptrorum thoracisque flavo.

Loc. Habitat stagna.

3. D. semistriatus. ~~Var. de précédent.~~

Le Ditique demi-silloné. marginalis

Long. 14 lig. Larg. 7 lig.

D. elytris striis viginti dimidiatis.

Loc. Habitat aquas.

4. D. cinereus. ~~bon~~ { ce n'est qu'une Var. du précédent
et non le D. cin. Fabr. +

Le Ditique à corcelet à bandes.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

D. cinereus, margine coleoptorum flavo, thoracis medietate flavâ.

Loc. Habitat stagna.

5. D. fulcatus. bon +

Le Ditique silloné.

Long. 6 lig. Larg. 4 lig.

D. elytris fulcis decem longitudinalibus, thoracis medietate flavâ.

Loc. Idem.

6. D. luctuosus. D. bipunctulatus.

Le Ditique en deuil.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

D. totus niger lævis.

Loc. Idem.

7. *D. tessellatus.* bon

Le Ditique fauve à taches noires.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

D. fulvus, maculis sparsis nigris.

Loc. Habitat aquam.

8. *D. variegatus.* *D. punctulatus lin +*

Le Ditique à bordure panachée.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. fuscus, elytris antice & externe flavis.

Loc. Idem.

9. *D. lividus.* *D. rufipes oliv. +*

Le Ditique noir à étuis bruns.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. ater, elytris fuscis.

Loc. Idem.

10. *D. ovatus.* ! bon + *hyphidrus ferrugin.?*

Le Ditique sphérique.

Long. 2 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

D. ovatus fuscus, capite thoraceque rubicundis.

Loc. Idem.

11. *D. melanophthalmos.* bon

Le Ditique aux yeux noirs.

Long. $1 \frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C'est l'aeneus div. l'obscurus panz.

(hyalinus) degeer. +

D. flavo-fuscus, oculis nigris, elytris lævibus.

Loc. Habitat aquas stagnantes.

2. D. thoracicus. *halipus impress. latr. + D. impressus oliv. subr. +*
Le Ditique strié à corcelet jaune.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. cinereus, capite nigro, thorace luteo, elytris nigro-maculatis punctato-striatis.

Loc. Habitat stagna.

3. D. quadratus. *D. granularis*

Le Ditique panaché sans stries.

Long. 2 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

D. niger, thorace flavo, elytris lævibus, maculis limboque luteis.

Loc. Idem.

4. D. monostriatus. *D. unistriatus*

Le Ditique à une seule strie.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. niger, elytris maculis & limbo luteis, striâ unicâ.

Loc. Idem.

15. *D. clavi-cornis.* *D. crassicornis* +

Le Ditique à grosses antennes.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. fuscus, capite thoraceque fulvo, antennis subclavatis, scutello nullo.

Loc. Habitat aquas stagnantes.

* 16. *D. hebraicus.*

Le Ditique hébraïque.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

D. niger, capite thoraceque antice flavis, elytris lævibus, maculis aliquot luteis, nonnullis connexis.

Loc. Habitat stagna.

* 17. *D. punctatus.*

Le Ditique picoté.

Long. 5 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

D. thorace flavo maculâ nigrâ, elytris fuscis punctis nigris confertis.

Loc. Habitat aquas.

* 18. *D. marmoratus.*

Le Ditique marbré.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. fusco-pallidus, elytris externe maculis obliquis lineisque albidis.

Loc. Habitat rivulos & stagna.

X. GYRINUS. *LE TOURNIQUET.*

Antennæ rigidæ, capite breviores.

Pedes natatorii.

Oculi quatuor.

1. C. natator. *bon*

Le Tourniquet.

bruné brillant; Elytres à stries ponctuées; pattes jaunes

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

Loc. Habitat aquarum superficiem quam per orbem concentricos vivacissime peragrat.

ORDO SECUNDUS.

Caract. Ordinis II.

Tarforum articuli quatuor.

XI. MELOLONTHA. *LA MELOLONTE.*

Antennæ ferratæ ante oculos positæ.

1. M. quadri-punctata. *Clythra à punctata*

La Melolonte quadrille à corcelet noir.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

M. coleoptris rubris , maculis quatuor
nigris , thorace nigro.

Loc. Habitat pruni sylvestris folia.

2. M. rubra. *Cly*

*La Melolonte quadrille à corcelet
rouge.*

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

M. coleoptris rubris , maculis quatuor
nigris , thorace rubro nigrâ maculâ.

Loc. Habitat prunum sylvestrem.

3. M. pallida. *Clythra 3 dentata*

La Melolonte lifette. Cryp. 3 dent

Long. 2 lig. Larg. 1 lig. *fabr.*

M. nigro-viridis , elytris luteo-pallidis.

Loc. Habitat sylvas.

4. M. cœrulea. *Clythra cyanea Schneider*

La Melolonte bleurette.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. cœrulea , thorace pedibusque ferru-
gineis. *Cryptoph. cyaneus fabr*

Loc. Idem.

5. M. muscoides.

La Melolonte mouche.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. 1 lig.

M. viridi-cœruleo, thorace rubro cœruleâ maculâ, tibiis ferrugineis.

Loc. Habitat sylvas.

5. M. cuprea.

La Mélolonte cuivreuse.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. oblonga nigro-cuprea, subvillosa elytris punctatis.

Loc. Idem.

XII. PRIONUS. *LE PRIONE.*

Antennæ ferratæ in oculo positæ.

1. P. coriarius. *bon*

Le Prione.

Long. 15 lig. Larg. 9 lig.

Loc. Habitat sylvas, larva arborum truncos.

XIII. CERAMBYX. *LE CAPRICORNE.*

Antennæ à basi ad apicem decrescentes, in oculo positæ.

Thorax aculeatus.

1. C. cerdo. *C. heros fabr.*

Le grand Capricorne noir.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ pouce. Larg. 6 lig.

C. fusco-niger, elytris rugosis, apice

interiore spinosis, antennis corpore longioribus.

Loc. Larva truncos arborum habitat; cerambix sylvas.

2. *C. piceus.* *C. cerdo* *fabr.*

Le petit Capricorne noir.

Long. 9 lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

C. ater, elytris rugosis integris, antennis corpore longioribus.

Loc. Idem.

3. *C. textor.* *Lamia textor*

Le Capricorne noir chagriné.

Long. 1 pouce. Larg. 5 lig.

C. ater, elytris punctis elevatis, antennis corpore brevioribus.

Loc. Idem.

4. *C. alpinus.* *bou*

La Rosalie.

Long. 15 lig. Larg. 4 lig.

C. cinereo-cœrulescens, elytrorum maculis sex fuscis.

Loc. Habitat exesos arborum truncos.

5. *C. moschatus.* *bou*

Le Capricorne vert à odeur de rose.

Long. 1 pouce. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridi-cærulescens.

Loc. Habitat truncos & folia salicis.

C. ruber. C. Kæhleri

Le Capricorne rouge.

Long. 8 lig. Larg. $2 \frac{2}{3}$ lig.

C. niger, elytris thoracisque lateribus rubris.

Loc. Habitat truncos arborum.

C. monilis. C. nebulosus lamia nebulosa latr

Le Capricorne noir marbré de gris.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. niger, elytris vellere cinereo marmoratis, antennis pedibusque cinereo intersectis.

Loc. Habitat salices.

C. fasciatus. lamia fuliginator

Le Capricorne ovale cendré.

Long. 6 lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

C. ater ovatus, antennis corpore dimidio brevioribus, elytris vellere cinereo albidis.

Varietas A. elytris fuscis vellere cinereo fasciatis.

Loc. Habitat sepium arbusta.

9. *C. hispidus*. *bon ? auctor hisp. latr.*

Le Capricorne à étuis dentelés.

Long. 3 lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. ovatus, fuscus, elytris antice cinereis, apice bidentatis.

Loc. Habitat pratorum gramina.

10. *C. ovatus*.

Le Capricorne brun de forme ovale.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. ovatus fuscus, elytris integris.

Loc. Idem.

11. *C. compressus*.

Le Capricorne applati.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger, compressus, scaber, thorace utrinque serrato, pedibus fulvis.

Loc.

- * 12. *C. dentatus*.

Le Capricorne à pointes.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. fusco-nebulosus, elytris antice cinereis, apice unidentatis.

Loc.

. C. nebulosus.

Le Capricorne nébuleux.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. fusco-nebulosus, elytris antice thoracisque medio subcinereis, ^o lytris integris.

Loc.

IV. LEPTURA. LA LEPTURE.

Antennæ à basi ad apicem decrescen-
tes, in oculo positæ.

Thorax inermis.

FAMIL. I. *Thorace cylindraceo. Saperda*

L. carcharias, *sap. carth. oliv. fabr. Yabr.*

La Lepture chagrinée.

Long. 1 pouce. Larg. 4 lig.

L. cinerea, nigro-punctata, thorace cylindraceo.

Loc. Habitat truncos arborum.

L. subcœrulea, *sap. cylindrica oliv. fabr.*

La Lepture ardoisée.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

L. tota cœruleo-atra, capite thoraceque subvillosa.

Loc. Habitat flores.

3. *L. betulina*. *Saperda populea* Oliv. Fabr.

*La Lepture à corcelet cylindrique
& taches jaunes.*

Long. 4, 5, 6 lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig.

L. nigra, thoracis lineis tribus, elytrorumque maculis villosis-flavis, thorace cylindraco, antennis corpus æquantibus.

Loc. Habitat betulam.

4. *L. pilosa*. *Sap. prænusta* Oliv. Fabr.

La Lepture noire à étuis jaunes.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

L. nigra; elytris flavis, apice nigris.

Loc. Habitat hortos.

5. *L. oculata*. *Lomus cuneicornis* Desb.

La Lepture aux yeux de Paon.

Long. 5 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

L. nigro-cinerea, thorace elytrisque maculis oculiferis atris, circulo cinereo, thorace subcylindraco.

Loc. Habitat hortos, rara, in horto regio inventa.

- * 6. *L. nebulosa*.

La Lepture nébuleuse.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

L. fusca, subvillosa, maculis cinereis
marmorata,

Loc.

7. L. ferruginea.

La Lepture rouillée.

Long. 17 lig. Larg. 5 lig.

L. tota nigro-ferruginea, thorace subcylindraceo.

Loc. Habitat sylvas.

8. L. fulvipes.

La Lepture à pattes fauves.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

L. atra, punctata, pedibus flavis, thorace cylindraceo.

Loc. Habitat agros fontis-Bellaquæi.

FAMIL. II. Thorace globoso. *Calidion*

9. L. variegata. *Cal. liciatum* ^{*fabi*}

La Lepture[#] à corcelet rond & taches jaunes.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

L. nigra, maculis villosa-flavis, thorace globoso, antennis corporis dimidio brevioribus.

Loc. Habitat hortos.

^{D iv}
est le même que le *lepture liciata* & le *lepture rustica* de Linnaeus

10. *L. villosa. cal. fere punctatum**La Lepture velours jaune.*

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

L. nigra, villoso-flava, maculis duabus in elytro singulo glabris nigris.

Loc. Habitat flores.

11. *L. punctata.**La Lepture à corcelet rouge ponctué.*

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

L. nigricans, capite thoraceque rubro; punctis nigris.

Loc. Habitat hortos.

12. *L. arcuata. cal. arcuatum**La Lepture aux croissans dorés.*Long. 5, 6, 8 lig. Larg. $1\frac{1}{2}$, 2 lig.*L. nigra, elytrorum lineis quatuor arcuatis, punctisque flavis, pedibus testaceis.*

Loc. Habitat arborum truncos.

*no. regardé de Call. detritum comme Var. de L. arcuata.*13. *L. arietis. cal. arietis**La Lepture à trois bandes dorées.*

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

L. nigra, elytrorum lineis tribus transver

sis punctisque flavis, pedibus testaceis.

Loc. Habitat flores.

4. *L. rustica.* *Cal. maphitica*

La Lepture à raies blanches.

Long. $2 \frac{1}{2}$, 4 lig. Larg. 1, $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. nigra, elytrorum lineis transversis punctisque albis.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

5. *L. signata.*

La Lepture noire à étuis gris tachés de jaune.

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

L. nigra, elytris pallido-fuscis, signaturis flavis.

Loc. Habitat flores.

16. *L. gammoides.* *Cal. verbasca*

La Lepture jaune à bandes noires.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

L. villosa-flava, elytris lineis tribus transversis nigris.

Loc. Idem.

17. *L. mystica.* *Cal. mystica*

La Lepture arlequine.

Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

L. nigra, elytris maculis testaceis, nigris, albidis, lineisque nigris & albicantibus variegatis.

Loc. Rar. hab. hortos, in regio horto inventa.

18. *L. cyanea*. *Cal. rufipes*

La Lepture bleue.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

L. cœrulea, tribus rufis thorace subgloboso.

Loc. Habitat arborum truncos.

FAMIL. III. // *Callidium oliv. f. alb.*
Thorace inæquali scabro.

19. *L. quadri-punctata*. *Calli. bajulus*

La Lepture brune à corcelet rhomboïdal.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

L. testaceo-fusca, thorace rhomboidali villoso, elytrorum maculis quatuor albidis transversim positis.

Loc. Habitat arbores.

20. *L. vidua*. *Cal. clavipes*

La Lepture veuve.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

L. tota atra, dense punctata.

Loc. Habitat arbores.

21. L. testacea. *Cal. testaceum*

La Lepture livide à corcelet lisse.

Long. $4 \frac{3}{4}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

L. testacea, thorace glabro.

Loc. Habitat flores.

22. L. punctuosa. *Cal. femoratum*

La Lepture maroquinée.

Long. 6 lig. Larg. $1 \frac{3}{4}$ lig.

L. atra, dense punctata, femoribus rufis.

Loc.

23. L. femorata. *Callidium ferrugineum*

La Lepture noire à corcelet rougeâtre.

L. atra, thorace testaceo, femoribus
crassis.

Loc. Habitat flores.

24. L. turcica.

La Lepture aux croissans d'argent.

Long. $2 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

L. nigra, elytris antice rufis, postice
lineis quatuor albis arcuatis.

Loc. Habitat hortos.

25. L. crassipes. *Cal. luridum*

*La Lepture noire à grosses cuisses
brunes.*

L. atra, femoribus crassis rufis.

Loc. Habitat flores.

26. L. fusca.

La Lepture brune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

L. tota fusca punctata.

Loc. Idem.

27. L. sanguinea. *Cal. sanguineum fabr.*

*La Lepture veloutée couleur de
feu.*

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

L. nigra, thorace coleoptrisque sericeo-
rubris.

Loc. Habitat truncos arborum & frequentissime
loca domorum ubi lignum servatur.

28. L. attenuata. *Mydalis rufa det. fabr.*

La Lepture à étuis étranglés.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

L. nigra, elytris pedibusque rubescentibus lividis, coleoptris attenuatis.

Loc. Habitat flores.

XXV. STENOCORUS. LE STENCORE.

Antennæ à basi ad apicem decrescen-
tes, ante oculos positæ.

Elytra apice angustiora.

FAMIL. I. *Thorax armatus spinâ
vel tuberculo laterali.*

1. S. parifinus.

Le Stencore lisse à bandes jaunes.

Long. 8, 9 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

S. glaber, è fusco niger, elytro singulo
lineis tribus elevatis, maculis duabus
luteis, thorace spinoso.

Loc. Habitat sylvas.

2. S. inquisitor.

*Thagium mordax Fabr.
St. inq. Olivier
Cer. inquisitor L.*

Le Stencore noir velouté de jaune.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

S. niger, vellere flavo variegatus, ely-

tris lineis duabus elevatis, thorace spinoso.

Loc. Habitat flores.

3. *S. geniculatus.* *Leptura meridiana* Oliv.

Le Stencore à genoux noirs.

Long. 7, 8, 10 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$, 2, $2 \frac{1}{3}$ lig.

S. è fusco niger, femoribus rufis articulis nigris.

Loc. Idem.

4. *S. rubro-violaceus.*

Le Stencore rouge à étuis violets.

Long. 9 lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

S. ruber, oculis nigris, elytris violaceis.

Loc. Habitat arbores.

5. *S. rubeus.* *Leptura calcarata* Oliv.

Le Stencore jaune à bandes noires.

Long. 6 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

S. niger, elytris testaceo-flavis, punctis duobus, cruce fasciisque nigris.

Loc. Habitat rubum.

FAMILIA II. *Thorax inermis.*

6. *S. lamed.* *Leptura hastata* Oliv.

Le Stencore bedeau.

S. niger, elytris rubescentibus, apice futuræque medietate nigris.

Loc.

7. S. melanurus. *Leptura melanura* Oliv. Fabr.
Le Stencore noir à étuis rougeâtres.

S. niger, elytris rubescentibus lividis, apice nigris. Mas.

S. niger, elytris rubescentibus lividis, apice simili. Fœmina.

Loc. Habitat sepes & arbores.

8. S. lutescens. *Leptura lutescens* Oliv.
Le Stencore noir à étuis jaunes.

S. niger, elytris luteis, apice nigris.

Loc. Habitat rubum.

9. S. piceus. *Leptura nigra* Oliv.

Le Stencore noir à ventre rougeâtre.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

S. niger nitidus, abdomine fusco-rubente.

Loc. Idem.

10. S. clavipes. *Leptura atrata*

Le Stencore noir à cuisses rouges.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, femoribus clavatis rufis, apice nigris.

Varietas A. S. totus niger.

Long. $3 \frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

Loc.

11. S. sylvestris. *Leptura collaris*

Le Stencore noir à corcelet rouge.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

S. niger, thorace rubro.

Loc. Habitat urbem Fontainebleau.

12. S. aquaticus. *Donacia crassipes* Fab.

Le Stencore doré. *Water.*

Long. $2 \frac{1}{2}$, 3, 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 lig.

S. deauratus, femoribus posticis dentatis.

Varietas A. Stenocorus rubro-æneus, femoribus posticis dentatis.

B. Stenocorus viridi-æneus, femoribus posticis dentatis.

** Leptura aqua. L.*

D. saxatilis.

C. Stenocorus flavo-æneus, femoribus posticis dentatis.

D. crassipes

D. Stenocorus violaceo-æneus, femoribus posticis dentatis.

E. Stenocorus nigro-æneus, femoribus posticis dentatis.

Loc. Habitat rivulorum ripas, & irides pratorum.

13. S. ruber.

Le Stencore rouge.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

S. totus ruber, oculis nigris.

Loc.

14. S. ignitus.

Le Stencore noir à étuis rouges.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, elytris, ruberrimis dense punctatis.

Loc.

15. S. funereus.

Le Stencore en deuil.

Long. 9 lig. Larg. 3 lig.

S. totus niger punctatus.

Loc.

XXVI. LUPERUS. LE LUPERE.

Antennæ filiformes articulis longis.

Thorax planus, marginatus.

1. L. ulmarius.

Le Lupere noir à corcelet & pattes rouges.

Cucaris flavipes Fabr.

Galeruca flav. Latr.

L. niger, thorace pedibusque rufis.

Loc. Habitat ulmum.

2. L. betulinus. *criocaris rufipes* Fabr.
fabr. rufipes Latr.

Le Lupere noir à pattes rouges.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

L. niger, pedibus rufis.

Loc. Habitat betulam.

XXVII. CRYPTOCEPHALUS. LE GRIBOURI.

Antennæ filiformes articulis longis.

Thorax gibbus hemisphaericus.

1. C. alni.

Le Gribouri bleu de l'aulne.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. violaceus, punctis inordinatis.

Loc. Habitat alnum.

2. C. vitis. *pour Cuneolus Vitis* Fabr. Latr.
met d'esp pour
Le Gribouri de la vigne.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. niger, elytris rubris.

Loc. Habitat vitis folia.

3. *C. sericeus.* *bon*

Le Velours vert.

Long. 3, 4 lig. Larg. 2 lig.

C. viridi-auratus sericeus.

Loc. Habitat salicem.

4. *C. bolati.*

Le Gribouri à deux bandes jaunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. niger, elytro singulo duplici linea longitudinali flava.

Loc. Habitat prata & sepes.

5. *C. 4-maculatus.* *C. moræi*

Le Gribouri à deux taches jaunes.

C. niger, capite thoraceque antice luteis, elytro singulo externe maculâ duplici flavâ.

Loc. Idem.

6. *C. bi-punctatus.* (*bon*)

Le Gribouri rouge strié à points noirs.

Long. 2 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger, elytris rubris striatis, maculis quatuor limboque nigris.

Loc. Habitat cirsum.

7. C. cirsi. *C. cordiger*

Le Gribouri rouge sans stries, à points noirs.

C. niger, thorace lineis flavis, elytris rubris punctatis, maculis quatuor limboque nigris.

Loc. Idem.

8. violaceus.

Le Gribouri bleu strié.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. cœruleo-violaceus, punctis per strias digestis.

Loc.

9. S. cœruleus.

Le Gribouri bleu à points.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. cœruleus, punctis sparsis, tibiis anticis ferrugineis.

Loc.

10. C. niger.

Le Gribouri noir strié.

Long. $1 \frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. niger striatus, pedibus rufis.

Loc.

11. C. rufipes.

Le Gribouri noir à corcelet rouge.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. niger striatus, thorace pedibusque rufis.

Loc.

12. C. fulvus.

Le Gribouri fauve.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. capite thoraceque fulvo, elytris pallidis.

Loc.

13. C. 10-maculatus.

Le Gribouri rouge à 10 taches noires.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

C. niger, elytris rubris punctatis maculis decem nigris.

Loc.

* 14. *C. limbosus.**Le Gribouri rouge à corcelet jaune.*Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.*C. thorace flavo maculis nigris; elytris rubris punctatis, maculis sex limboque nigris.**Loc.** 15. *C. chermesinus.**Le Gribouri couleur de feu.*Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.*C. niger thorace elytrisque rubris punctatis.**Loc.** 16. *C. fuscipes.**Le Gribouri à pattes brunes.*Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.*C. cœruleus, punctis inordinatis, pedibusque villosis-fuscis.**Loc.*XXVIII. CRIOCERIS. *LE CRIOCERE.*Antennæ cylindraceæ articulis globosis.
Thorax cylindraceus.

1. *C. merdigera.* *oliv. lema merid. fabr.*
Le Criocere rouge du lys.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. rubra.

Loc. Habitat lilia.

2. *C. 12-punctata.* *oliv. lema 12 punct. fabr.*
Le Criocere rouge à points noirs.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

C. rubra, punctis tredecim nigris.

Loc. Habitat asparagum.

3. *C. asparagi.* *oliv. lema asp. fabr.*
Le Criocere porte-croix de l'as-
perge.

Long. $2 \frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. thorace rubro punctis duobus nigris,
coleoptris flavis, cruce cœruleo-nigra.

Loc. Idem.

4. *C. hordei.* *C. melanospa oliv. lema melan. fabr.*
Le Criocere bleu à corcelet rouge.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. cœruleo-viridis thorace femoribusque
rufis.

Loc. Habitat hordeum & avenam.

5. *C. cyanella*. *oliv. lema cya. Fabr.*
Le Criocere tout bleu.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. tota coeruleo-viridis.

Loc.

6. *C. pallida*. *cri. fulvicollis Fabr.*
orsodacna chlorotica Latr.
Le Criocere aux yeux noirs.

Long. 2 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 lig.

C. pallida, oculis nigris.

Loc.

- * 7. *C. spinosissima*. *hispa atra Latr.*
La Châtaigne noire. h. spinosa Fabr.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. tota atra, spinis horrida.

Loc. Habitat gramen loliaceum.

- * 8. *C. thoracica.*

Le Criocere noir à corcelet rouge.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. atro-coerulea, thorace femoribusque fuscis, elytris punctis sparsis.

Loc.

- * 9. *C. atrata.*

Le Criocere noir strié.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C.

C. tota atro-cœrulea striata.
Loc.

10. C. paleata.

Le Criocere paillet.

Long. $2 \frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. nigra, elytris pedibusque pallidis.
Loc.

XXIX. ALTICA. L'ALTISE.

Antennæ ubique æquales.

Femora postica crassa subglobosa.

1. A. helxines. *a. steracea*

L'Altise bleue.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A. viridi-cœrulea.

Loc. Habitat hortos.

2. C. malvæ. *a. rufipes*

L'Altise de la mauve.

A. nigra, elytris cœruleis, thorace pedibusque rubris.

Loc. Habitat folia malvæ.

3. A. bicolor. *a. fusipes*

L'Altise bedaude.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, elytris nigro-æneis striatis, thorace rubro, pedibus nigris.

Loc. Habitat malvam.

4. A. hortensis. *A. erythrocephala*
L'Altise noire dorée.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigra-ænea, elytris striatis, pedibus ferrugineis.

Loc. Habitat hortos frequentissima.

5. A. ovata. *a. nigripes*
L'Altise noire ovale.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. nigro ænea, ovata, pedibus nigris.

Loc. Habitat hortos.

6. A. brassicæ. *a. hortensis*
L'Altise noire allongée des crucifères.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. nigro-ænea, oblonga, pedibus nigris.

Loc. Habitat cruciferas.

7. A. lævis. *bon*
L'Altise noire à pattes fauves.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{5}{6}$ lig.

A. nigra, ovata, pedibus rufis, elytris non striatis.

Loc. Habitat hortos.

8. A. minuta. *a. atra*

L'Altise noire à jambes jaunes.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigra, subrotunda, tibiis ferrugineis.

Loc. Idem.

9. A. nemorum. *bon*

L'Altise à bandes jaunes.

Long. $\frac{1}{2}$, 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ lig.

A. atra, elytris longitudinaliter in medio flavescentibus.

Loc. Habitat aromaticas plantas.

10. A. marginata. *bon*

L'Altise à bordure noire.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. nigra; thorace elytrisque flavis, oris nigris.

Loc. Habitat hortos.

11. A. hyosciami. *bon*

L'Altise du choux.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. cœrulea, elytris striatis, tibiis ferrugineis.

Loc. Habitat brassicam & hyosciamum.

12. A. cœrulea. *bon*

L'Altise bleue sans stries.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

A. cœrulea, elytris punctis sparsis, tibiis ferrugineis.

Loc. Habitat brassicam.

13. A. nitidula. *bon*

L'Altise rubis.

Larg. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigro-aurata, thorace aureo, femoribus ferrugineis.

Loc. Habitat salicem.

14. A. aurea. *a. helvina*

Le Plutus.

Long. $1 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. aurea, pedibus flavis.

Loc. Habitat hortos.

15. A. 4-punctata. *a. 4 punctulata*

L'Altise à points rouges.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

A. nigra, coleoptris punctis quatuor
rubris.

Loc. Idem.

16. A. ferruginea. *α. exoleta*
L'Altise fauve à stries.

A. oblonga, ferruginea, elytris striatis.
Loc. Idem.

17. A. fulva. *α. testacea*
L'Altise fauve sans stries.

Long. lig. Larg. lig.

A. ovata ferruginea, elytris punctis sparsis.
Loc. Idem.

18. A. exoleta. *α. tabida*
L'Altise jaune.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. flava.
Loc. Idem.

19. A. pallida. *α. atricilla*
La Paillette.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. elytris pallido-flavis, capite nigro.
Loc. Idem.

* 20. *A. ænea.*

L'Altise bronzée.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. nigro-ænea, ovata, pedibus rufis, elytris punctis sparsis.

Loc. Habitat hortos.

XXX. GALERUCA. LA GALERUQUE.

Antennæ ubique æquales, articulis subglobosis.

Thorax inæqualis, scaber, marginatus.

1. *G. tanaceti.*

La Galeruque brunette.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

G. atro-fusca, elytris lineis tribus elevatis, punctis numerosis.

Varietas A. fusca, elytris lineis elevatis interruptis.

Loc. Habitat tanacetum, & flores compositos in pratis.

2. *G. sanguinea.*

La Galeruque sanguine.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

G. sanguineo-rubra.

Loc. Habitat flores.

3. G. ulmi. *G. Calvarius*

La Galerique à bandes de l'orme.

Long. 2, 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig.

G. pallida, thorace nigro variegato, elytris fasciis duabus longitudinalibus nigris.

Loc. Habitat folia ulmi, abundans.

4. G. aquatica.

La Galerique aquatique.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

G. pallida, thorace nigro variegato, elytris unicoloribus pallidis.

Loc. Habitat potamogeton in rivis & stagnis.

5. G. livida.

La Galerique grisette.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

G. nigra, thorace elytris que luteo-lividis.

Loc. Habitat betulam.

6. G. violacea.

La Galerique violette.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

G. nigro-violacea.

Loc.

* 7. G. viridis.

La Galerique verte.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

G. thorace pallide flavescente, elytris viridibus nitentibus.

Loc.

8. G. 4-maculata.

La Galerique quadrille.

Long. $2 \frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

G. rubro-lutea, maculis quatuor nigris.

Loc.

XXXI. CHRYSOMELA. LA CHRY- SOMELE.

Antennæ à basi ad apicem crescentes,
articulis globosis.

Thorax æqualis marginatus.

1. C. populi. bon.

*La grande Chrysomele rouge à
corcelet bleu.*

Long. 5, 6 lig. Larg. 4 lig.

C. nigro-cœrulea, elytris rubris apice nigris.

Variet. A. ead. elytris omnino rubris.

La petite Chrysomele rouge à corcelet bleu.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

Loc. Habitat populum.

2. *C. polita. C. tremula*

La Chrysomele rouge à corcelet doré.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $2 \frac{1}{3}$ lig.

C. viridi-ænea, elytris rubicundis, punctis sparsis.

Loc.

3. *C. striata. C. lurida*

La Chrysomele rouge à corcelet noir.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{3}{4}$ lig.

C. nigra, elytris rubris striatis, striis punctatis.

Loc.

4. *C. 10-punctata. bou*

La Chrysomele rouge à points noirs.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. rubra, elytro singulo maculis quinque nigris.

Loc. Habitat salicem.

5. C. hæmoptera. *bon*

La Chrysomele violette.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

C. tota violacea.

Loc.

6. C. violaceo-cœrulea.

La Chrysomele bleue à corcelet violet.

Long 4 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. cœrulea, thorace violaceo.

Variet. ead. thorace nigro-violaceo.

Loc.

7. C. nigra.

La Chrysomele noire à aîles rouges.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. tota nigra.

Loc.

8. C. sanguinolenta. *bon*

La Chrysomele noire à bordure rouge.

Long. 5 lig. Larg. 4 lig.

C. nigro-coerulea, elytris atris punctatis, margine exteriori rubro.

Loc. Habitat sylvas.

9. C. marginata. *C. limbata*

La Chrysomele bleue à bordure rouge.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

C. nigro-coerulea, elytris lucidis, punctatis margine exteriori & anteriore rubris.

Loc. Habitat prata; rara.

10. C. graminis.

Le grand Vertubleu.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. viridi-coerulea.

Loc. Habitat galeopsis, lamium, mentham & gramina.

11. D. viridula.

C. fastuosa

La Chrysomele dorée. *C. cenea*

Long. 2, 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig.

C. viridis nitida, thorace antice aequali, elytris pone contiguus.

Loc. Habitat flores labiatis.

12. *C. ænea.* *bon Ch. fastosa*

Le petit Vertubleu.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridis nitida, thorace antice excavato, fasciis elytrorum longitudinalibus cœruleis.

Loc. Habitat flores labiaros.

13. *C. nitidula.*

La Chrysomele à gallons.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. viridis nitida, striis decem cupreis, punctorum duplici serie divisis.

Loc. Idem.

14. *B. fasciata. C. cerealis*

L'Arlequin doré.

Long. 3, 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2, 2 $\frac{1}{4}$ lig.

C. aurea, fasciis cœruleis, cupreisque alternis, punctis inordinatis.

Loc. Habitat colles aridos.

15. *C. rubro-cuprea. C. cuprea*

La Chrysomele briquetée.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

C. ~~supra~~ rubro-cupræa, infra nigra
nitens.

Loc.

16. C. malvæ.

*La Chrysomele verte à corcelet
rouge.*

Long. $1 \frac{1}{4}$, $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. nigra, elytris cœruleo-viridibus,
thorace pedibus antennarumque basi
rufis.

Loc. Habitat malvam.

17. C. betulæ.

La Chrysomele bleue du saule.

Long. $1 \frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. 1, $1 \frac{1}{3}$ lig.

C. nigro-purpurea, punctis excavatis,
striata.

Loc. Habitat salicem & betulam.

18. C. thoracica.

La Chrysomele à suture noire.

Long. $1 \frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. rubra, thorace punctis duobus nigris,
coleoptrorum suturâ nigrâ.

Loc.

19. *C. caraboides*. *C. tenebriosa* Fabr. *fabr.*
La Chrysomele à un seul étui.

Long. 3, 6, 7 lig.

C. atro - purpurea, elytris coadunatis,
 alis nullis.

Loc. Habitat hortos & sylvas; larva Gallium.

20. *C. phellandrii*. { *masowis* Phell. latr.
kelodes Vericouris Phell. fabr.
La Chrysomele à bandes jaunes.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. oblonga nigra, elytrorum lineis dua-
 bus longitudinalibus luteis.

Loc. Habitat phellandrium.

21. *C. ferruginea*.

La Chrysomele brunie.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. nigro cuprea, punctis elytrorum per
 strias digestis.

Loc.

22. *C. gemellata*.

La Chrysomele à stries jumelles.

Long. $2 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

C. viridis, punctis elytrorum per strias
 gemellas digestis.

Loc.

* 23. C. scabra.

La Chrysomele gresillée.

Long. $1 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. viridi-aurea, elytris scabris nitentibus.

Loc.

24. C. antiqua.

La Chrysomele antique.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. tota fulvo cuprea punctata.

Loc.

25. C. futurata.

La Chrysomele couturée.

Long. $1 \frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. rubescens, elytrorum striis punctatis;
futura nigra.

Loc.

26. C. tulipa.

La Chrysomele tulipe.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. thorace pedibusque fulvis; elytris antice luteis maculâ fuscâ; postice fuscis, maculis luteis.

Loc.

XXXII. MYLABRIS. *LE MYLABRE.*

Antennæ sensim crescentes, articulis hemisphaericis, rostro brevi plano insidentes.

Antennæ quatuor in extremo rostri.

1. *M. crucigera.* *Bruchus pisi*

Le Mylabre à croix blanche.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

M. fusca, cinereo - nebulosa abdominis apicè cruce albâ.

Loc. Larva legumina habitat, mylabris flores.

2. *M. fusca.*

Le Mylabre brun.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. tota fusca.

Loc.

3. *M. sericea.*

Le Mylabre satiné.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, abdomine albo sericeo.

Loc. Habitat flores.

XXIII. RHINOMACER. *LE BEC-*
MARE.

Antennæ clavatæ integræ, rostro longo
insidentes.

1. R. elongatus.

Le Becmare levrette.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

R. corpore angusto longo niger, thorace
fasciis quatuor albicantibus.

Loc. Habitat carduum.

2. R. viridis. *attelabus betuleti*

Le Becmare vert.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

R. totus viridi-sericeus.

Loc.

3. R. auratus. *att. populi*

Le Becmare doré.

Long. 2 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

R. viridi-auratus, subtus nigro-violaceus.

Loc.

4. R. ruber. { *attelabus Macchus*
att. sequatus

Le Becmare doré à étuis rouges.

Long. $1 \frac{1}{4}$, 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 lig.

R. niger, elytris rubris, capite thoraceque aureis, proboscide longitudine fere corporis.

Loc.

5. R. cœruleus.

Le Becmare bleu à poil.

Long. 1, 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$, 1, 1 $\frac{1}{4}$ lig.

R. subvillosus cœruleus.

Loc. Habitat flores.

6. R. niger.

Le Becmare non strié.

R. nigro-fuscus, glaber, punctato-striatus.

Loc. Idem.

7. R. oblongus.

Le Becmare allongé.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

R. nigro-viridescens, oblongus striatus.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

8. R. fulvipes. att. *flavipes*

Le Becmare noir à pattes fauves.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

R. subglobosus, niger, striatus, femoribus rufis.

Loc. Habitat flores.

9. R. minutus.

Le Becmare puce.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

R. subglobosus, villosus, niger, pedibus elytrisque rufis.

Loc. Idem.

10. R. coccineus. *attelabus curculionoides*

Le Becmare laque.

Lon. $1\frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, $1\frac{1}{4}$ lig.

R. niger, thorace elytrisque rubris, proboscide longitudine capitis.

Loc.

11. R. coryli. *att. coryli var B latr.*

La Tête écorchée.

Long. 3 lig. Larg. $1\frac{1}{2}$ lig.

R. niger, thorace elytrisque rubris, capite pone elongato.

Loc. Habitat corylum.

12. R. striatus.

Le Becmare noir à trompe fauve.

Long. $1\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

R. oblongus, nigro cupreus; pedibus & proboscide fulvis, punctis elytrorum per strias digestis.

Loc.

* 13. R. fulgidus.

Le Becmare rouge.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

R. ovatus, striatim punctatus, supra ruber, infra cupreus; antennis, proboscide pedibusque nigris.

Loc.

XXXIV. CURCULIO. LE CHARANSON.

Antennæ clavatæ fractæ, rostro longo corneo infidentes.

FAMIL. I. *Femoribus inermibus.*

1. C. nebulosus. *C. fulcristrius*
lixus Sula, latr.
Le Charanson à trompe sillonnée.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

C. albo nigroque varius, proboscide planiusculâ carinatâ, thoracis longitudine.

Loc. Habitat arbores,

2. *C. rugosus. C. variatus*

Le Charanson ridé.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

C. totus fuscus rugosus.

Loc. Habitat prata.

3. *C. fulcatus. C. plicatus*

Le Charanson à corcelet sillonné.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. fusco-nebulosus, thorace fulcato, elytris striatis.

Loc. Idem.

4. *C. paraplecticus. bon*

Le Charanson à suture noire.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, elytris villoso-cinereis, futurâ nigrâ.

Loc.

5. *C. pictus. C. punctatus*

Le Charanson à côtes tachetées.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. fuscus, fulvo maculatus; elytris striatis, striis alternatim nigro maculatis.

Loc. Habitat loca arida.

6. *C. bipunctatus*. *C. colon*

Le Charanson à deux points blancs.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, *fuscus* thoracis lateribus
albidis, elytris striatis puncto albo.

Loc.

7. *C. fasciatus*. *C. nebulosus*.

Le Charanson à deux bandes trans-
verses.

Long. $5 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

C. nigro-fuscus, thorace utrinque fasciâ longitudinali, elytris duplici transversâ cinereâ.

Loc. Habitat carduum.

8. *C. cardui*. *C. cyaneus* *C. jacei* *fabr.*

Le Charanson tacheté des têtes de
chardon.

Long. $2 \frac{1}{2}$, 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$, 2 lig.

C. niger, striatus, maculis villosio-fuscis nebulosus.

Loc. Idem.

9. *C. elegans*. *C. abbreviatus* *fabr.*

Le Charanson brodé.

Long. $2 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

C. niger, thorace punctato, elytris alternatim striatis & punctatis.

Loc.

D. C. incanus. (boia)

Le Charanson gris, strié & sans aîles.

Long. $2 \frac{1}{2}$, 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$, $2 \frac{1}{4}$ lig.

C. cinereus, squamosus, alis carens, elytris striatis.

Loc. Habitat hortos, flores, arbores; abundans.

II. C. incisus. (boia)

Le Charanson noir à sillons.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

C. oblongus, totus niger, thorace punctato, elytris sulcatis.

Loc.

2. C. argentatus. C. pyri

Le Charanson à écailles vertes, & pattes fauves.

Long. 2, 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, $1 \frac{1}{3}$ lig.

C. squamoso-viridis, rostro thorace brevior, pedibus rufis.

Loc. Habitat hortos, arbores, &c.

- 13.
- C. fasciolatus*
- .
- C. lineatus*
- ?

*Le Charanson à corcelet rayé.*Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.*C.* rostro thoracis longitudine, thorace tribus striis pallidioribus.*Loc.* Habitat arbores sepium.

- 14.
- C. intersectus*
- .
- bon*

*Le Charanson écailleux à bandes.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C.* rostro thorace brevior, squamis nitentibus, thoracis elytrorumque fasciis longitudinalibus.*Loc.* Habitat flores.

- 15.
- C. modestus*
- .
- C. humilis*

*Le Charanson grisette.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.*C.* rufus, subvillosus, capite nigricante, rostro thorace brevior.*Loc.* Idem.

- 16.
- C. viridis*
- .
- C. cupri rostris*

*Le Charanson satin-vert.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.*C.*

C. cœruleo-viridis nitens, thorace punctato, elytris striatis.

Loc. Habitat cruciferas.

17. C. funereus.

La Pleureuse.

Long.

C. oblongus, niger; abdomine squamoso, lateribus albis.

Loc.

18. C. granarius. *bon*

Le Charanson brun du bled.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. rufo-testaceus oblongus, thorace elytrorum fere longitudine.

Loc. Habitat grana; horreis infestus.

19. C. saltator. *C. viminalis*

Le Charanson sauteur brun.

C. rufus, femoribus posticis crassioribus, elytris rufis.

Loc. Habitat ulmum.

20. *C. alni.* *bon*

Le Charanson sauteur à taches noires.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. rufus, femoribus posticis crassioribus, elytris maculis quatuor nigris.

Loc. Habitat ulmum & alnum.

21. *C. quadrilis.* *bon*

Le Charanson quadrille à courte trompe.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. cinereus elytrorum puncto quadruplici nigricante, proboscide thorace brevior.

Loc.

22. *C. 5-maculatus.* *C. 5-maculatus*

Le Charanson quadrille à longue trompe.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. cinereus, elytrorum puncto quadruplici albo, proboscide thorace longior.

Loc.

23. *C. communis. C. asperatus?*

Le Charanson satin gris.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. niger, ovatus, striatus, totus villosocinereus, thorace inermi.

Loc

24. *C. armatus.*

Le Charanson à corcelet épineux.

Long.

C. ovatus, nigro-cinereus, thorace utrinque denticulato.

Loc.

25. *C. pultiaris. C. pygmaeus*

Le Charanson à bandes blanches.

Long.

Larg.

C. subrotundus, niger, squamosus, elytris striatis; thorace utrinque occuleato, lateribus lineâque mediâ albis.

Loc.

26. *C. floriger. C. floralis*

Le Charanson noir strié.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. subglobosus, cinereo-ater, striatus,
proboscide thoracis longitudine.

Loc. Habitat flores.

27. C. cinctus. *C. triciuctus*

*Le Charanson roux à bande trans-
versale blanche.*

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. globosus rufus, elytris striatis, fasciâ
transversâ albâ.

Loc.

28. C. vittatus. *C. transversus*

*Le Charanson noir à bande trans-
versale blanche.*

C. globosus niger, elytris striatis, fasciâ
transversâ albâ.

Loc. Habitat salicem.

29. C. murinus. *bon*

Le Charanson souris.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. subvillosus-murinus, scutello albicante.

Loc.

30. *C. spinifer.*

Le Charanson à côtes épineuses.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. totus fuscus spinosus, elytris striis elevatis villoso-spinosis.

Loc.

31. *C. denticulatus.*

Le Charanson noir à côtes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger, scutello albicante, elytrorum striis utrinque denticulatis.

Loc.

32. *C. acridulus.* *bon*

Le Charanson pyriforme.

Long. $1 \frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. pyriformis, nigro-coerulescens, abdomine ovato.

Loc. Habitat flores.

33. *C. marmoratus.*

Le Charanson marbré à bandes.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. lividus, coleoptris fasciis plurimis obscuris.

Loc. Habitat flores salicariæ.

FAMIL. II. *Femoribus denticulatis.*34. *C. coronatus.* *C. germanus**Le Charanson à corcelet couronné.*Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.*C. niger apterus*, thorace utrinque puncto duplici fulvo, basi pilis fulvis coronatâ.*Loc.** 35. *C. scabrosus.**Le Charanson noir chagriné.*

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

C. totus niger, nitidus, elytris striatis subrugosis.*Loc.*36. *C. tigrinus.* *C. pictus**Le Charanson tigré.*

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

C. niger, maculis villoso-flavis, elytris subrugosis.*Loc.* Habitat Normanniam.* 37. *C. contractus.**Le Charanson levrier.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus, totus niger; thorace punctato, elytris striato-punctatis.

Loc.

38. C. monopterus. *C. ligustici*

Le Charanson gris à étuis réunis & chagrinés.

Long. 6 lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

C. cinereus, squamosus, alis carens, elytris rugosis.

Loc.

* 39. C. fuscipes.

Le Charanson noir à pattes brunes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger striatus, pedibus fuscis.

Loc.

40. C. rugosissimus.

Le Charanson cartisanne.

Long. 3, $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$, $2 \frac{1}{2}$ lig.

C. fuscus, apterus, elytris rugoso-striatis.

Loc.

41. C. auratus. *C. argentatus*

Le Charanson à écailles vertes.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

F iv

C. squamosus, viridi-auratus.

Loc. Habitat hortos, arbores.

42. C. querneus. *C. oblongus*

Le Charanson à étuis fauves.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, niger, elytris pedibusque testaceis.

Loc. Habitat arbores.

43. C. geographicus.

Le Charanson géographique.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. subglobosus, nigro-fuscus, squamosus, lineolis albis variegatus.

Loc. Habitat viperinam.

44. C. stellifer. *bon*

Le Charanson brun à bandes transverses de taches blanches.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. fuscus, elytris striatis macularum albarum fasciâ triplici transversâ.

Loc.

5. *C. nucum.* *bon*

Le Charanson trompette.

Long. 2, 3, 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{2}{3}$ lig.

C. rufo-marmoratus, scutello cordato
albo, proboscide subulatâ longissimâ.

Loc. Habitat nuces.

6. *C. tessellatus.* *C. Duparum*

Le Charanson damier.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. flavescens, elytris luteo & rufo tessellatis.

Loc.

7. *C. scrophularis.* *C. Verbasci oliv. Fabr.*

*Le Charanson à lozange de la
scrophulaire.*

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. subglobosus niger, punctis duobus
atris futuræ longitudinalis coleoptro-
rum, thorace exalbido.

Loc. Habitat scrophulariam.

8. *C. hortulanus.* *C. scrophulariae oliv. Fabr.*

Le Charanson gris de la scrophulaire.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. subglobosus, cinereus, punctis duobus nigris suturæ longitudinalis coleoptorum.

Loc. Habitat scropuulariam.

49. C. pericarpus, ^{oliv.} ~~C. Verbesina longipennis~~

Le Charanson porte-cœur de la Scrophulaire.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. subglobosus; fusco-nebulosus, maculâ cordatâ albâ in medio dorso.

Loc. Idem. *Scrophularia*

50. C. tripunctatus. *C. guttula*

Le Charanson brun à points blancs.

C. subglobosus, squamosus, cinereo-fuscus elytrorum maculis tribus & apice albis.

Loc. Habitat prata.

51. C. armiger. *C. cerasi*

Le Charanson noir à corcelet armé.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. niger, thorace utrinque dentato.

Loc. les Marais, au printemps — Censier, prunier

52. *C. plebeius.* *C. pruni*

Le Charanson noir à corcelet sans points.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. fusco-niger thorace inermi.

Loc. curieux.

53. *C. scutellatus.* *bon*

Le Charanson brun à écusson blanc.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. fuscus, scutello puncto albo, elytris maculâ rubescente.

Loc.

54. *C. rubiginus.* *C. tortus*

Le Charanson couleur de rouille.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. ferrugineus, elytris striatis, oculis nigris.

Loc. peuplier; il torde & ronge les feuilles

55. *C. villosus.*

Le Charanson velouté.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. obscure rufus, villis cinereis aspersus, rostro, thorace brevior.

Loc.

§ 6. C. virgo. *bon*

Le Charanson vierge.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, villis cinereis aspersus, rostro thoraci æquali.

Loc. Habitat flores.

* 57. C. punctulatus.

Le Charanson noir picoté.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. totus niger, oblongus, thorace punctato, elytris punctato-striatis, femoribus denticulatis.

Loc.

* 58. C. cordifer.

Le Charanson à cœur.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. cinereus, scutello albo, fasciâque elytrorum interruptâ albâ, proboscide longissimâ.

Loc.

59. *C. fasciatus.*

Le Charanson fascié.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. fusco-cinereus villosus elytrorum futurâ maculisque albis.

Loc.

XXXV. BOSTRICHUS. *LE BOSTRICHÉ.*

Antennæ clavatæ, clavâ ex articulis tribus compositâ, capiti infidentes.

Rostrum nullum.

Thorax cubicus caput intra se recondens.

Tarsi nudi spinosi.

1. *B. ruber.* { *Mos. capucinus oliv.*
 apate cap. fabr.

Le Bostriche.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

B. niger, elytris rubris.

Loc. Habitat sylvas.

* 2. *B. fuscus.*

Le Bostriche brun.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. fuscus, thorace costis, elytris striis punctatis elevatis.

Loc.

XXXVI. CLERUS. *LE CLAIRON.*

Antennæ clavatæ, clavâ ex articulis tribus compositâ, capiti insidentes.

Rostrum nullum.

Thorax subcylindræus, non marginatus.

Tarsi spongiosi.

1. C. apiarius. *C. alveolaris Oliv. +
Trichodes alv. Fabr. +*
Le Clairon à bandes rouges.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

C. nigro-violaceus, hirsutus, elytris fasciâ triplici coccineâ.

Loc. Larva nidos apium habitat, clerus flores.

2. C. violaceus. *neurobia violacea Latr. +
conqueter Viol. Fabr. +*
Le Clairon bleu.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1, 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. nigro-cœruleus.

Loc. Larva & clerus putrida loca habitat frequens in domis.

3. *C. cruciger*. <sup>clerus mollis oliv. +
opile mol.Fabr. - notoxan molle; Fabr. +</sup>
Le Clairon porte-croix.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. fuscus, villosus, elytris flavis cruce
fusca.

Loc. Habitat flores.

4. *C. villosus.*

Le Clairon satiné.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger, subovatus, villis cinereis.

Loc. Habitat flores resedæ.

5. *C. fasciatus.* *C. formicarius* oliv. Fabr. Ha.
Le Clairon porte-livrée.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger villosus, elytrorum fasciâ an-
ticâ rufâ, posticâ albâ.

Varietas A. Id. thorace rufo.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

B. Id. niger subvillo-
sus, elytrorum fas-
ciâ anticâ rufâ, me-
diâ flavâ, posticâ
albâ.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

Loc. Habitat arbores vetustas.

* 6. *C. maculatus.**Le Clairon à taches jaunes.*

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

*C. fusco-niger subvillosus, elytro singulo maculis duabus flavis.**Loc.*XXXVII. ANTRIBUS. *L'ANTRIBE.*

Antennæ clavatæ, clavâ ex articulis tribus compositâ capiti insidentes.

Rostrum nullum.

Thorax latus, marginatus.

Tarsi spongiosi.

1. *A. marmoratus. scabrosus latr.**L'Antribe marbré.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{5}$ lig.*A. ovatus, niger, elytris striatis, rubro nigroque marmoratis.**Loc.* Habitat jaceam pratensem.2. *A. variegatus. aut. varius fabr.**L'Antribe minime.*Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*A. ovatus subvillosus, è fusco cinereoque variegatus.**Loc.* Habitat flores.

3. A. ater. *an. latirostris*

L'Antripe noir strié.

Long. 6, 7 lig. Larg. $2 \frac{1}{3}$ lig.

A. ater, elytris apice cinerascens;

Loc. Habitat flores.

4. A. pulicarius. *utridula pedicularia +*

L'Antripe des fleurs.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. niger, elytris abdomine brevioribus.

Loc. Habitat umbelliferas plantas.

5. A. bimaculatus. *phalacrochus bicolor latr.*
anaspisoma bicolor fabr.

L'Antripe à deux points rouges
au bout des étuis.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. niger ovatus, elytris apice punctis
duobus rubris.

Loc. Habitat flores.

6. A. lævis.

L'Antripe noir lisse.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. niger, ovatus, elytris abdomen te-
gentibus.

Loc. Idem.

- * 7. *A. fulvus.* *Ips cellaris* Oliv. +
Dermaestus cellaris Fabr. +
L'Antribe fauve.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

A. oblongus, totus rufus.

Loc. Habitat vetusta ligna.

- * 8. *A. connexus.*

L'Antribe panaché.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. oblongus niger subvillosus, elytri
 maculis connexis luteis.

Loc. Habitat flores.

- * 9. *A. nitidus.*

L'Antribe perlé.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. ovatus totus fuscus.

Loc. Idem.

- * 10. *A. vittatus.*

L'Antribe à bandes.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. ovatus fuscus, futurâ longitudinali
 nigrâ.

Loc. Idem.

1. *A. pallidus.*

L'Antribe paillet.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. ovatus, subtus pallidus, supra fuscus
subvillosus.

Loc. Habitat flores.

2. *A. interfectus.*

L'Antribe bigaré.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig,

A. oblongus ater, elytris signaturis al-
bis pedibusque annulis albis interfectis.

Loc. Idem.

XXVIII. SCOLYTUS. LE SCO- LYTE.

Antennæ clavatæ, clavâ solidâ.

Rostrum nullum.

S. niger. *S. bostrichus oliv.*

Le Scolyte. *Bostrichus scolytus fabr.*

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig. *Sc. destructor latr.*

Loc. Habitat cortices.

XXXIX. CASSIDA. *LA CASSIDE.*

Antennæ extrorsum crassiores, nodosæ.

Thorax & elytra marginata.

Caput thorace tectum,

1. *C. viridis.*

La Casside verte.

Long. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 lig.

C. viridis, corpore nigro.

Loc. Habitat plantas verticillatas & carduos.

2. *C. nebulosa.*

La Casside brune.

Long. 2, 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. nebulosa, pallida, corpore nigro.

Loc. Idem.

3. *C. nobilis.*

La Casside à bandes d'or.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. pallida, lineâ duplici longitudinali, viridi-deaurata.

Loc. Idem.

4. *C. thoracica.**La Casside verte à corcelet brun.*Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.*C. viridis*, thorace ferrugineo.]

Loc. Habitat asteris varias species.

5. *C. variegata.**La Casside panachée.*Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.*C. viridis* maculis nigris variegata.*Varietas A. Cassida rubra* maculis
nigris variegata.

Loc. Habitat enulam campanam.

KL. ANASPIS. *L'ANASPE.*

Antennæ filiformes sensim crescentes.

Scutellum vix apparens.

Thorax planus, lævis non marginatus.

1. *A. nigra.* *α. frontalis* var. latr.*L'Anaspe noire. mordella front. fabr.*Long. 1, $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg $\frac{1}{2}$ lig.*A. tota nigra.*

Loc. Habitat flores.

2. A. bicolor.

L'Anaspe à taches jaunes.

A. nigra, elytro singulo antice maculâ
flavâ.

Loc. Habitat flores.

3. A. thoracica.

L'Anaspe à corcelet jaune.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

A. nigra, thorace luteo.

Loc. Habitat rarior.

4. A. maculata.

L'Anaspe fauve.

Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. villosa-flavescent, coleoptrorum ma-
culis tribus obscuris.

Loc. Idem.

ORDO TERTIUS.

Caract. Ordinis III.

Tarforum articuli tres.

II. COCCINELLA. *LA COCCI-
NELLE.*

Antennæ extrorsum crassiores, nodosæ, antennulis breviores.

Corpus hæmisphæricum.

. C. bi-punctata.

*La Coccinelle rouge à 2 points noirs.*Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis duobus nigris.

Loc. Habitat alnum; aphivora.

. C. 5-punctata.

La Coccinelle rouge à 5 points noirs.

C. coleoptris rubis punctis quinque nigris.

Loc. Habitat hortos.. C. 7-punctata. *bon**La Coccinelle rouge à 7 points
noirs.*Long. 3, 4 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$, 3 lig.

C. coleoptris rubris, punctis septem nigris.

Loc. Habitat tiliam.

4. C. 9-punctata.

La Coccinelle rouge à 9 points noirs & corcelet noir.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis novem nigris, thorace nigro, lateribus albis.

Loc. Habitat arbuta.

5. C. carpini.

La Coccinelle rouge à 9 points noirs & corcelet varié.

C. coleoptris rubris, punctis novem nigris, thorace nigro, antice albo.

Loc. Habitat carpinum.

6. C. 13-punctata.

La Coccinelle rouge à 13 points noirs & corcelet jaune varié.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C.

C. coleoptris rubris, punctis tredecim nigris.

Loc. Habitat arbuta.

7. C. trinacris.

La Coccinelle rouge à 13 points noirs & corcelet rouge à bande.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis tredecim nigris, thorace rubro, medio nigro,

Loc. Habitat flores.

8. C. 11-punctata.

La Coccinelle rouge à 11 points & corcelet jaune.

Long. $1 \frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. 1, $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. coleoptris rubris, punctis undecim nigris; thorace luteo nigro punctato.

Loc. Habitat ulmum.

9. C. argus.

11 punctata Fabr.

La Coccinelle argus.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

C. rubra, punctis undecim nigris, thorace rubro immaculato.

Loc. Habitat sepes.

10. C. 19-punctata.

La Coccinelle rouge à 19 points noirs.

Long. 2 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. coleoptris rubris, punctis novem decim nigris.

Loc. Habitat sepes.

11. C. 24-punctata.

La Coccinelle rayée.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. coleoptris rubris, punctis viginti-quatuor nigris, quibusdam connexis.

Loc. Habitat flores.

12. C. conglobata.

La Coccinelle à bordure.

Long. 2 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. coleoptris rubris, punctis plurimis nigris, quibusdam connexis futurâ longitudinali nigrâ.

Loc. Habitat hortos.

12. C. 14-guttata.

La Coccinelle à 14 points blancs.

Long. 2, $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$, 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis quatuordecim albis.

Loc. Habitat hortos.

14. C. marginata.

La Coccinelle à points & bordure blanche.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis quatuordecim limboque albis.

Loc. Idem.

15. C. 14-punctata.

La Coccinelle à l'échiquier.

Long. $2 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $1 \frac{3}{4}$ lig.

C. coleoptris flavis, punctis quadratis nigris, quibusdam connatis.

Loc. Idem.

16. C. 16-punctata.

La Coccinelle jaune à suture.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. coleoptris flavis, punctis sexdecim nigris, plurimis connexis, suturâ nigrâ.

Loc. Idem.

17. C. 22-punctata.

*La Coccinelle jaune sans suture.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. coleoptris flavis, punctis viginti nigris.

Loc. Habitat sepes.

18. C. 14-pustulata.

*La Coccinelle noire à 14 points jaunes.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{5}$ lig.

C. coleoptris nigris, punctis quatuordecim flavescentibus.

Loc. Habitat arbores.

19. C. 10-pustulata.

La Coccinelle noire à 10 points jaunes.

C. coleoptris nigris, punctis decem flavescentibus aut rubris.

Loc. Habitat hortos.

20. C. 6-pustulata.

*La Coccinelle noire à points rouges.*Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. 1 lig.

C. ovata, coleoptris nigris, punctis sex rubris.

Varietas A. punctis quatuor rubris.

B. punctis duobus rubris.

C. punctis duobus luteis.

Loc. Habitat hortos.

21. C. fasciata.

La Coccinelle velue à bandes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. subvillosa nigra, fasciis duabus transversis rubris.

Loc. Habitat flores.

22. C. villosa. *bis-tiverrucato*

La Coccinelle velue à points.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. subvillosa nigra, punctis quatuor luteo-rubris.

Loc. Idem.

23. C. interrupta.

La Coccinelle velue à bande interrompue.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. subvillosa nigra, coleoptrorum basi fasciâ transversâ rubrâ interruptâ.

Loc. Habitat cortices & folia pruni; larva pilis albis & longis conspersa dicitur, *le Barbet blanc des écorces.*

24. C. pygmæa. C. parvula

La Coccinelle velue à taches rouges au corcelet.

Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. subvillosa nigra, thorace utrinque maculâ rubrâ.

Loc. Habitat flores.

25. C. 4-pustulata.

La Coccinelle tortue à 4 points rouges.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

C. rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, punctis quatuor rubris.

Loc. Habitat urticam.

26. C. 2-pustulata.

La Coccinelle tortue à bande rouge.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, fasciâ transversâ rubrâ.

Loc. Habitat urticam.

27. C. testudinaris.

La Coccinelle noire à points rouges au corcelet.

C. rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, thorace utrinque maculâ rubrâ.

Loc. Idem.

28. C. 16-guttata.

La Coccinelle à 16 points blancs.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis sexdecim albis.

Loc.

29. C. 12-guttata.

La Coccinelle à 12 points blancs.

Long. $1 \frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. coleoptris rubris, punctis duodecim albis.

Loc.

XLII. TRITOMA. *LA TRITOME.*

Antennæ extrorsum sensim crassiores,
antennulis longiores.

Corpus oblongum.

1. T. bimaculata. *Mycto plagues*
La Tritôme. bimaculatus

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

Loc. Habitat corticis salices; rarissima.

ORDO QUARTUS.

Caract. Ordin. IV.

Tarforum primi & secundi pedum paris
articuli quinque: pedum vero poste-
riorum articuli quatuor.

XLIII. DIAPERIS. *LA DIA-
PERE.*

Antennæ taxiformes, articulis lenti-
formibus per centrum perfoliatis.

Thorax convexus, marginatus.

1. D. fasciata. *D. boleti**La Diapere.*Long. 3 lig. Larg. 1, 1 $\frac{3}{4}$ lig.*Loc.* Habitat ilicem, Fontis Bellaquæi incolæ;XLIV. PYROCHROA. *LA CAR-*
DINALE.

Antennæ uno versu pectinatæ.

Thorax inæqualis, scaber, non marginatus.

1. P. ruberrima. *S. rubens**La Cardinale.*

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

Loc. Habitat sepes, autumnalis.XLV. CANTHARIS. *LA CAN-*
THARIDE.

Antennæ filiformes.

Thorax inæqualis, scaber; non marginatus.

FAMIL. I. *Tarforum articulis nudis.*

- 1.
- C. vesicatoria.*
- bon late. lytta Ves. fabr.*

*La Cantharide des boutiques.*Long. 4, 5, 8, 9 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$, 2, 3 lig.*C. viridi-aurata antennis nigris.**Loc.* Habitat fraxinos.

- 2.
- C. attenuata.*
- sitaris humeralis lytr.
neuralis hum. fabr.*

*La Cantharide à bande jaune.*Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.*C. nigra, elytris attenuatis, antice luteis.**Loc.*FAMIL. II. *Tarforum articulis
spongiosis.*

- 3.
- C. crassipes.*
- cedemera coerulea late.
neuralis coer. fabr.*

*La Cantharide verte à grosses
cuissees.*Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. viridi-coerulea, elytris attenuatis, fe-
moribus posticis globosis.**Varietas A. viridi-coerulea, elytris
attenuatis.**Loc.* Habitat prata.

4. *C. fulva.*

La Cantharide fauve à grosses cuisses.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. nigra, elytris attenuatis fulvis, femoribus posticis globosis.

Loc. Habitat flores.

5. *C. villosa.*

La Cantharide jaune veloutée.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

[*C. flavescens*, subvillosa, elytris attenuatis.

Loc. Idem.

6. *C. flava.* *Lagria hirta*

La Cantharide noire à étuis jaunes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. subvillosa, nigra, elytris flavis, extremo antennarum articulo reliquis triplo majore.

Loc. Habitat sylvas.

7. *C. testacea.*

La Cantharide fauve avec la pointe des étuis noire.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. testacea, elytris apice nigris.
Loc.

8. C. formicoides.

La Cantharide fourmi.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. fusca, elytris antice, thoraceque elongato rubris.

Loc.

* 9. C. variegata.

La Cantharide fourmi panachée.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigra, elytris fulvis maculis quinque nigris connexis, thorace elongato.

Loc.

XLVI. TENEBRIO. LE TÉNÉBRION.

Antennæ filiformes.

Thorax planus marginatus.

FAMIL. I. *Antennæ articulis globosis, extrorsum crassiores.*

1. T. mortifaga. *blaps uort.*

Le Ténébrion lisse à prolongement.

Long. 10 lig. Larg. 4 lig.

T. atra, aptera, coleoptris lævibus, pone acuminatis.

Loc. Habitat plantas coacervatas & exesas in hortis.

2. T. rugosa. *asida opusca latr.*
opatum griseum latr.
 Le Ténébrion ridé.

Long. 5 lig. Larg. 3 lig.

T. atra, aptera, coleoptris rugosis, pone acuminatis.

Loc. Habitat arenam.

3. T. gemellata.

Le Ténébrion à stries jumelles.

Long. 4 lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, aptera, elytrorum striis octo punctatis per paria dispositis.

Loc. Habitat hortos.

4. T. striata. *helops striatus latr. oliv.*
h. caraboides pauc. ruficollis fabr.
 Le Ténébrion à 8 stries lisses.

Long. $5 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

T. nigro-fusca ovata, elytro singulo striis octo lævibus.

Loc. Habitat arva.

5. T. cuprea. *helops laevis fab. fab. soliv.*
Le Ténébrion bronzé.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

T. nigro-cuprea, elytro singulo striis octo, coleoptris pone acuminatis.

Loc. Idem.

6. T. molitoria. *t. molitor.*

Le Ténébrion à 9 stries lisses.

Long. 7 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

T. atra, oblonga, elytris striis novem laevibus.

Loc. Larva farinam habitat; tenebrio domos.

7. T. sabulosa. *opatum sabulosum*
Le Ténébrion à stries dentelées.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

T. atra, elytris striis quinque utrinque dentatis.

Loc. Habitat putrida loca.

8. T. nigra. *pedinus glaber latr. blaps fab. helops soliv. glaber*
Le Ténébrion noir lisse.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, tota lævis, coleoptris pone rotundatis.

Loc. Habitat arenam.

9. T. villosa.

Le Ténébrion fauve velu.

Long. $1 \frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. tota ferruginea subvillosa.

Loc.

10. T. ferruginea.

Le Ténébrion fauve lisse.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. tota ferruginea lævis.

Loc.

11. T. sulcata. *pinetia bi punctata*

Le Ténébrion cannelé.

Long. 7 lig. Larg. $4 \frac{1}{2}$ lig.

T. atra, aptera rotundata, elytris fulcibus tribus elevatis.

Loc. Habitat provincias Galliae meridionales.

FAMILIA II. *Antennæ articulis longis, ubique æquales.*

12. T. lutea. *Cistela sulphurea*

Le Ténébrion jaune.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

T. lutea.

Loc. Habitat flores.

* 12. T. arenaria.

Le Ténébrion à étuis fauves.

Long. $6 \frac{1}{2}$, 6, $5 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

T. nigra, elytris striatis ferrugineis.

Loc.

* 13. T. rotundata.

Le Ténébrion arrondi.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

T. nigra - cuprea, elytris singulis striis octo punctatis, coleoptris pone rotundatis.

Loc.

* 14. T. globulosa.

Le Ténébrion à corcelet arrondi.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

T. atra scabra, thorace globoso.

Loc.

* 15. T. cœrulea.

Le Ténébrion bleu.

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

*T. cœrulea punctata, elytris striatis,
tarsis fulvis.*

Loc.

L VII. MORDELLA. *LA MOR- DELLE.*

*Antennæ subserratae, articulis triangu-
laribus.*

Thorax antice attenuatus, convexus.

1. *M. aculeata.*

La Mordelle noire à pointe.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. atra, caudata, unicolor.

Loc. Habitat flores.

2. *M. iriformis. m. aculeata*

La Mordelle veloutée à pointe.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

M. atra, caudata, fasciis villoso-aureis.

Loc. Idem.

3. *M. striata. Cistela Ceraurides*

La Mordelle à étuis jaunes striés.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, elytris fulvis striatis.

Loc. Habitat arbores in sylvis.

4. T. fulva.

*La Mordelle à étuis jaunes sans
sries.*

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, elytris fulvis lævibus.

Loc. Idem.

5. M. flavipes.

La Mordelle brune à pattes fauves.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{3}{4}$ lig.

M. fusca, pedibus ferrugineis.

Loc. Idem.

XLVIII. NOTOXUS. *LA CUCULLE.*

Antennæ filiformes.

Thorax cucullatus, dente acuto.

1. C. cucullatus. *N. monoseros*

La Cuculle. anthicus mon. fabr.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

Loc. Habitat umbelliferas, rarissimus.

LIX. CEROCOMA. LA CEROCOME.

Antennæ ultimo articulo clavato:
(masculis complicatæ, in medio
pectinatæ).

I. C. viridis. *C. schaefferi*
La Cerocome.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

Loc.

ARTICULUS SECUNDUS.

Caract. articuli II.

Coleoptra dimidiata dura.

ORDO PRIMUS.

Caract. ordinis I.

Tarforum articuli quinque.

L. STAPHYLINUS. LE STAPHYLIN.

Antennæ filiformes.

Alæ testæ.

Abdomen inerme.

1. *S. maxillofus.* *St. oleus* +

Le grand Staphylin noir lisse.

Long. 11 lig. Larg. 2 $\frac{3}{4}$ lig.

S. ater, extremo antennarum articulo lunulato.

Loc. Habitat sylvas, hortos, &c.

2. *S. coerulefcens.* *St. cyaneus* +

Le Staphylin bleu.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. atro-coerulefcens, extremo antennarum articulo lunulato.

Loc. Habitat hortos.

3. *S. globulifer.* *St. similis* +

Le petit Staphylin noir.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

S. ater, extremo antennarum articulo subgloboso, elytris thorace brevioribus.

Loc. Idem.

4. *S. macroclytron.*

Le Staphylin noir à longs etuis.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. ater, elytris thorace duplo longioribus.
 Loc. Habitat hortos.

6. S. nebulosus. *st. macillofus* +

Le Staphylin nébuleux.

Long. 8 lig. Larg. 2 lig.

S. niger, elytris abdomineque cinereo-
 nebulosis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

7. S. tessellatus. *st. pubescens*

Le Staphylin velouté.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{5}{4}$ lig.

S. villosus, è fusco cinereoque viridi
 tessellatus.

Loc. Habitat hortos.

8. S. hirtus. *bon* +

Le Staphylin bourdon.

Long. 10 lig. Larg. 3 lig.

S. niger villosus, capite thorace anoque
 pilis fulvo-aureis.

Loc. Habitat sylvas, rarus.

9. S. chrysocephalus. *bon* +

Le Staphylin à tête jaune.

Long. 5 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{4}{5}$ lig.

S. pubescens, capite flavo, thorace elytrisque fusco nigroque nebulosis, punctis impressis.

Loc. Habitat arva.

9. *S. erythropterus*. *Bou. +*

Le Staphylin à étuis couleur de rouille.

Long. $6 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

S. ater, non nitens, elytris pedibusque rufis.

Loc. *Sables, cadavres, prairies*

10. *S. flavopterus*.

Le Staphylin noir à étuis fauves & lisses.

Long. 1, 3, 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ lig.

S. niger nitens, pedibus, elytrisque lævibus testaceis.

Varietas A. *Staphylinus niger nitens*, pedibus elytrisque lævibus testaceis, thoracis punctis per strias digestis.

Le Staphylin à étuis fauves & corcelet strié.

Loc.

1. *S. fulvopterus*. *κ. vitidus*. +

Le Staphylin à étuis marons pointillés.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. niger, nitens, pedibus coleoptrisque testaceis, elytris punctatis.

Loc.

2. *S. brachypterus*.

Le Staphylin à étuis très-courts.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

S. niger, nitens, pedibus elytrisque fuscis punctatis, thorace plano marginato.

Loc.

3. *S. compressus*.

Le Staphylin applati à étuis bruns.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, nitens, antennis, pedibus, elytris, anoque testaceis, thorace marginato.

Varietas A. Idem; antennis clavatis.

Loc. Habitat flores.

14. *S. punctatus*. ^{*poderus brunneipes* Fabr. +}
^{*latrobitus* brun. latr. Gress. +}

*Le Staphylin noir à pattes fauves
& étuis pointillés.*

Long. $3 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

S. niger, punctatus, antennis pedibusque ferrugineis.

Loc. Habitat flores.

15. *S. rufipes*. ^{*oxytelus carinatus* latr.}

*Le Staphylin noir à corcelet lisse
& bordé.*

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, thorace marginato laevi, pedibus rufis.

Loc. Habitat arenam.

16. *S. fulcatus*. ^{*oxytelus carinatus* latr. +}
^{*staph. carin.* Fabr. +}

*Le Staphylin noir à corcelet sillonné
& bordé.*

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, thorace marginato suturato, pedibus rufis.

Loc. Idem.

17. *S. æneus*. ^{*st. politus* +}

Le Staphylin à étuis bronzés.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

S. niger, elytris nigro-æneis.

Loc.

18. *S. chrysomelinus.* *Eachynorus chrys. latr.*
oxyp. chrys. fabr. +

Le Staphylin couleur de paille.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. niger, thorace, elytris, pedibusque subtestaceis.

Loc. Habitat arenam.

19. *S. marginatus.* *Tachinus rufipes latr.*
oxyp. rufipes fabr.

Le Staphylin à étuis bordés de jaune.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. niger, elytris fuscis margine flavo.

Loc. Habitat arva.

20. *S. maculatus.*

Le Staphylin noir à taches jaunes.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. niger; thorace utrinque, singuloque elytro, maculâ flavâ.

Loc. Idem.

21. *S. riparius. padanus rip. (abr. +*

*Le Staphylin rouge à tête noire
& étuis bleus.*

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. rufus, elytris cœruleis, capite abdominisque apice nigris.

Loc. Habitat arenam humidam.

22. *S. rufus. Oxypterus rufus (abr. +*

*Le Staphylin jaune à tête, étuis
& anus noirs.*

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

*S. flavus, capite, elytris abdomineque
pone nigris.*

Loc.

23. *S. thoracicus. padanus inficollis +*

Le Staphylin noir à corcelet rouge.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. atro-cœrulescens, thorace rubro.

Loc.

24. *S. biguttatus. Stenus biguttatus*

Le Staphylin jonon.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. ater, oculis prominentibus crassis.

Varietas A. Id. elytro singulo puncti
~~Stenus biguttatus Fabr. + to flavo. st. bigutt. later +~~
~~juv. latr +~~
Loc. Habitat arenam. & St. juv. latr +

25. S. clavicornis.

Le Staphylin à antennes en demi-massues.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. antennis subclavatis.

Loc.

26. S. melanophthalmos.

Le Staphylin fauve aux yeux noirs.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. pallidus, oculis anoque nigris, antennis subclavatis.

Loc.

27. S. elongatus. bon +

Le Staphylin noir à bandes de points.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger nitens, elytris punctatis, thorace elongato lævi, firiis quatuor punctatis.

Loc.

28. *S. angustatus.*

Le Staphylin à corcelet étranglé.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, thorace angustato fulvo, pedibus fuscis.

Loc.

29. *S. variegatus.*

Le Staphylin applati à étuis bigarrés.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. niger compressus, elytris postice pedibusque fuscis.

Loc.

* 30. *S. arenarius.*

Le Staphylin à étuis jaunes au milieu.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. ater, elytris in medio flavescens.

Loc.

* 31. *S. melonocephalus.*

Le Staphylin à tête noire.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. fulvus, capite anoque nigris.

Loc.

32. *S. nigro-fulvus*.

Le Staphylin arlequin à longues mâchoires.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, thorace pedibus elytrorum abdominisque basi fulvis, apice nigris, maxillis longitudine capitis.

Loc.

33. *S. cupreus*.

Le Staphylin cuivreux.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. æneus punctatus, elytris veluti tessellatis.

Loc.

ORDO SECUNDUS.

Caract. ordinis II.

Tarforum articuli quatuor.

III. NECYDALIS. LA NECYDALE.

Antennæ filiformes.

Alæ nudæ.

1. N. punctata. *Telephorus biguttatus* +
cauliculus biguttatus Fabr. +
La Necydale à points jaunes.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

N. elytris apice puncto flavo.

thiurus ~~flavus~~ *Varietas* A. *Necydalis* elytris apice
 puncto flavo, thorace
 luteo.

thiurus marginatus B. *Necydalis* elytris apice
 puncto flavo, thorace
 nigro.

Loc. Habitat folia ilicis.

- * 2. N. major.

La grande Necydale.

Long. 2 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

N. elytris ferrugineis immaculatis, antennis corpore brevioribus.

Loc.

ORDO TERTIUS.

Caract. ordinis III.

Tarforum articuli tres.

CLII. FORFICULA. *LE PERCE-OREILLE.*

Antennæ filiformes.

Alæ tectæ.

Abdomen forficibus armatum.

1. F. auricularia. *bon*

Le grand Perce-oreille.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

F. antennarum articulis quatuordecim.

Loc. Habitat hortos, gramina, flores.

2. F. minor. *bon*

Le petit Perce-oreille.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

F. antennarum articulis undecim.

Loc. Habitat arenam humidam.

ORDO QUARTUS.

Caract. ordinis IV.

Tarforum primi & secundi pedum paris articuli quinque, pedum vero posteriorum articuli quatuor.

LIII. MELOE. *LE PROSCARABÉ.*

Antennæ à medio ad basim & apicem decrecentes.

Alæ nullæ.

1 M. proscarabeus. *bon*

Le Proscarabé.

Long. 10, 11 lig. Larg. 5 lig.

Loc. Habitat hortos.

ARTICULUS TERTIUS.

Caract. articuli III.

Coleoptra mollia membranacea.

ORDO PRIMUS.

Caract. ordinis I.

Tarforum primi & secundi pedum paris articuli quinque, pedum vero posteriorum articuli quatuor.

LIV. BLATTA. *LA BLATTE.*

Antennæ filiformes.

Ad ani latera apendices vesiculosi transversim sulcati.

1 B. orientalis. *bon*

La Blatte des cuisines.

Long. 9 lig. Larg. $4 \frac{1}{2}$ lig.

B. ferrugineo-fusca, elytris sulco ovato impressis, abdomine brevioribus.

Loc. Habitat loca calida domorum; farinam.

2. B. Aurelianensis. *A. americana*

La grande Blatte. *Kakerlac*

Long. 15 lig. Larg. 5 lig.

B. fusco-flavescens, elytris sulco ovato impressis, abdomine longioribus.

Loc. Habitat agrum Aurelianensem.

3. B. laponica. *bouy. livida fabr.*

La Blatte jaune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$, 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

B. flavescens, elytris ad angulum acutum striatis.

Loc. Habitat farinam.

4 *A. pallida oliv.*

ORDO SECUNDUS.

Caract. Ordin. II.

Tarforum articuli duo.

LV. TRIPS. *LE TRIPS.*

Antennæ filiformes.

Os rimulâ longitudinali.

Tarsi vesiculosi.

1. T. juniperina. *bou*

Le Trips à pointe.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

T. elytris albidis, corpore nigro, abdominali setâ.

Loc. Habitat cortices arbor. vetustas.

2. T. physapus. *bon*

Le Trips noir des fleurs.

Long. $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{10}$ lig.

T. elytris glaucis, corpore atro.

Loc. Habitat flores compositos.

3. T. fasciata. *bon*

Le Trips à bandes.

T. elytris albis nigrisque fasciis, corpore atro.

Loc. Idem.

ORDO TERTIUS.

Caract. Ordin. III.

Tarforum articuli tres.

LVI. GRILLUS. *LE GRILLON.*

Antennæ filiformes.

Cauda bifida.

Ocelli tres.

1. G. grillo-talpa. *achetta gr. fabr.*

La Courtillière ou le Gaupe-Grillon.

Long. 18 lig. Larg. 4 lig.

G. pedibus anticis palmatis.

Loc. Habitat humum recentem, horticolis infestus.

2. G. domesticus. ^{achetta}
~~G. domestica~~

Le Grillon. ou orion

Long. 1 pouce. Larg. 4 lig.

G. pedibus anticis simplicibus.

Loc. Habitat loca calida domorum & arva.

LVII. ACRYDIUM. LE CRI- QUET.

Antennæ filiformes corpore dimidio breviores.

Ocelli tres.

1. A. cyaneum. *Gryllus cœruleus* Fabr.
Le Criquet à aîles ^{acr. cœr. oliv.} *bleues.*

Long. 1 pouce. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. elytris fuscis, alis subcœruleis.

Loc. Habitat arva sicca. *rare*

2. A. cœrulescens. *Gryllus Cœr.* Fabr.
Le Criquet à aîles bleues & noires.

Long. 1 pouce. Larg. 3 lig.

A. elytris nebulosis, alis cœruleis extimo nigro.

Loc. Habitat, prata.

3. A. stridulum. *Gryllus stridulus* Fabr.
Le Criquet à ailes rouges.

Long. 5 lig. Larg. 1 1/2 lig.

A. elytris nebulosis, alis rubris extimo nigris.

Loc. Habitat vineas.

4. A. grossum. *Gryllus grossus* Fabr.
Le Criquet ensanglanté.

Long. 5, 10, 11 lig. Larg. 1 1/2, 3 lig.

A. femoribus sanguineis, alis subfuscis reticulatis.

Loc. Habitat arva.

5. A. bi-punctatum. *bon*
Le Criquet à capuchon.

Long. 4 lig. Larg. 1 1/2 lig.

A. elytris nullis, thorace producto abdomini æquali.

Loc. Idem.

6. *A. subulatum.* *bon*

Le Criquet à corcelet allongé.

Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

A. elytris nullis, thorace producto abdomine longiore.

Loc. Habitat arva.

ORDO QUARTUS.

Caract. Ordin. IV.

Tarforum articuli quatuor.

LVIII. LOCUSTA. *LA SAUTERELLE.*

Antennæ filiformes corpore longiores.

Ocelli tres.

1. *L. viridissima.* *L. viridissima fabi.*

La Sauterelle à sabre.

Long. 11 lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

L. caudâ ensiferâ curvâ.

Loc. Habitat arva & prata.

2. L. vermivora. *L. Viridissima* *fabr.*

La Sauterelle à coutelas.

Long. 22 lig. Larg. 3 lig.

L. caudâ ensiferâ rectâ.

Loc. Habitat arva & prata.

ORDO QUINTUS.

Caract. Ordin. V.

Tarforum articuli quinque.

LIX. MANTES. *LA MANTE.*

Antennæ filiformes.

- I. M. gongylodes. *bon m. oratoria*

La Mante.

Long. 2 pouces. Larg. 5, 6 lig.

Loc. Habitat agrum Aurelianensem.



SECUNDA SECTIO INSECTORUM.

INSECTA HEMIPTERA.

Caractères sectionis.

Alæ superiores elytris accedentes.

Os sub thorace inflexum.

LX. CICADA. *LA CIGALE.*

*les cicada
sont des
tettigonia
d'oïst.*

Articuli tarforum tres.

Antennæ capite breviores.

Ocelli duo.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor, inferiores cruciatae.

1. *C. nervosa.* *C. plebeia*
Tettigonia ple. Fabr.
La Cigale à ailes transparentes.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

C. fusca, alis aqueis fusco maculatis,
nervis punctatis.

Loc. Habitat plantas & gramina.

2. *C. spumaria.* ~~*Cicopis*~~ *spu. Fabr.*
La Cigale bedeaude.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

tettig. orni Fabr.
C. orni Latr.

C. fusca, elytris fasciâ duplici interruptâ transversâ albidâ.

Loc. Habitat prata & medicaginem.

3. *C. lateralis.* *bon*

La Cygale à bordure.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{5}$ lig.

C. nigra, elytrorum lateribus albis.

Loc. Idem.

4. *C. membranacea.*

La Cigale à ailes membraneuses.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. fusco-pallida, elytris membranaceis venosis, scutello maculâ duplici triangulari.

Loc. Idem.

5. *C. viridis.* *bon*

La Cigale verte à tête panachée.

Long. $2 \frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. elytris viridibus, capite flavo punctis nigris.

Loc. Idem.

6. *C. sanguinea.* *Cécopis sanguinolenta*

La Cigale à taches rouges.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

C. nigra, elytris maculis sex rubris.

Loc. Habitat prata & medicaginem; rarior.

7. *C. gibbosa*.

La Cigale bossue.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. fusco-viridis reticulata, alarum basi dilatata.

Loc. Id. rara.

8. *C. pallida*.

La Cigale pâle.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. flavo-pallida, thorace punctis sex impressis.

Varietas A. Cicada flavo-pallida, oculis nigricantibus.

B. Cicada flavo-pallida, dorsi lineâ longitudinali nigra.

C. Cicada flavo-pallida, thoracis posticâ, scutelli antica parte, fuscis.

Loc. Idem.

9. *C. interrupta*. *bon*

La Cigale jaune à raies noires obliques.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. elytris flavis , lineâ abruptâ duplici longitudinali nigrâ.

Loc. Idem.

110. C. regalis.

La Cigale à diadème.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

C. fusca , capitis thoracisque fasciâ transversâ flavâ.

Loc. Idem.

111. C. torquata.

La Cigale à collier jaune.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

C. fusco-nebulosa , scutelli cavitate rotundâ , thorace punctis luteis impressis transversim positis.

Loc. Idem.

112. C. variegata.

La Cigale à pattes bigarées.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. fusco-nebulosa , scutello transversim sulcato , tibiis posticis , elytrorumque limbo è flavo fuscoque variegatis.

Loc. Idem.

13. *C. marginata*. *Cecropis leuccephala*

La Cigale à tête & bordure jaune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. fusco-nebulosa; capite, thoracis anticâ parte, elytrorumque limbo flavis.

Loc. Habitat prata & medicaginem.

14. *C. venosa*.

La Cigale à veines blanches.

Lon. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. fusco-nebulosa punctata, nervis elytrorum albidis.

Loc. Idem.

15. *C. nigra*.

La Cigale noire.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. tota nigra.

Loc. Habitat castaneas.

16. *C. fasciolata*.

La Cigale noire à bandes jaunes sur le corcelet.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. nigra, thorace elytrisque fasciâ croceâ.

Loc. Habitat prata.

7. *C. aurita.* *membrans aurita*

Le grand Diable.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

C. thorace obtuse bicorni.

Loc. Habitat prata; rarissima.

8. *C. cornuta.* *Membrans cornu*

Le petit Diable.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. thorace acute bicorni, pone producto.

Loc. Habitat in sylvis filicem, cirsium, saltator.

9. *C. infernalis.* *Membr. genitor*

Le demi-Diable.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. thorace inermi pone producto.

Loc. Rar. in agro lutetiano; in Campaniâ frequens.

10. *C. striata.*

La Cigale rayée.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. elytris albido nigroque striatis ad angulum acutum futuræ dorsalis.

Loc.

21. *C. trifasciata.**La Cigale à 3 bandes brunes.*Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. fusca*, elytris albidis, fasciis tribus transversis fuscis.*Variet. A.* Eadem elytris unicoloribus, thorace antice punctorum nigrorum fasciâ transversâ.*Loc.*22. *C. transversalis.**La Cigale à deux bandes brunes.*Long. $1 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. flava*, elytrorum fasciis duabus transversis fuscis.*Loc.* Habitat arbores.23. *C. cœca.**La Cigale jaune aux yeux noirs.*Long. $1 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. flava compressa*, oculis nigris.*Loc.*24. *C. flammigera.**La Cigale flamboyante.*Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. flava, fasciâ duplici longitudinali rubrâ undulatâ.

Loc. Habitat domos.

5. C. carpini.

La Cigale verte à points noirs.

C. viridi-flava, elytris punctis tribus nigris, apice fuscis.

Loc. Habitat folia arborum.

6. C. geographica.

La Cigale géographique.

C. viridis, elytris maculis plurimis fuscis ovatis.

Loc. Idem.

7 C. ulmi. *bon*

La Cigale moucheron verte.

C. alis viridi-luteis apicibus nigrantibus deauratis.

Loc. Habitat folia ulmi.

8. C. rosæ. *bon*

La Cigale des charmilles.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

C. flava, alis albis apicibus membranaceis.

Loc. Habitat arbores & rosam.

* 29 C. nervoptera.

La Cigale à nervures.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. fusca, thoracis margine flavo; alis aqueis nervis fuscis.

Loc.

* 30. C. acephala.

La Cigale verte à tête renfoncée.

Long. 2, 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 lig.

C. tota viridis, capite brevi lato.

Loc.

* 31. C. tristis.

La Cigale à bandes blanches.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. nigro-fusca, fasciis quatuor transversis albis, mediâ interruptâ.

Loc.

* 32. C. porrecta.

La Cigale à tête allongée.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C.

C. pallida, oculis nigris, capite antice
producto acuto, thorace duplo longiori.

Loc.

33. C. dilatata.

La Cigale renflée.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

C. fusca, maculis irregularibus albis,
elytrorum lateribus dilatatis.

Loc.

CICADA. (1) TETIGONIA nostras

LA CIGALE. LA PROCIGALE.

Antennæ capite breviores, setaceæ, articulis quinque.

Ocelli tres.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor laterales.

Articuli tarforum tres.

Antennæ capite breviores, articulis duobus globoso & setaceo.

Ocelli duo.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor, inferiores cruciatæ.

Articuli tarforum tres.

(1) Adduntur hîc caracteres *Cicadæ veræ* Gallo-provincialis, nostræ *Cicadæ Tetigonia* vocatæ oppositi

Annumerantur duæ præcipuæ *Cicadæ veræ* species Gallo-provinciam habitantes, quæ in musæis nostris frequentissime asservantur.

1. *La Cigale à bordure jaune.*

C. fusca, thoracis & scutellis margine flavo, alis nervosis.

Loc. Habitat Gallo-provinciam.

2. *La Cigale panachée.*

C. fusca, thorace scutelloque flavis, variegatis, alis nervoso-punctatis.

Loc. Habitat Gallo-provinciam.

LXI. CIMEX. LA PUNAISE.

Articuli tarforum tres.

Antennæ capite longiores articulis quatuor vel quinque.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor, superiores semi-elytra.

FAMIL. I. *Antennarum articuli*
quatuor.

1. *C. lectularius.* *acanthia lectuaria* fabr.
La Punaise des lits.

C. apterus.

Loc. Habitat lecta.

2. *C. scutellatus.* ~~*C. horticola*~~ *fabr.*
C. scarabeoides *fabr.*
La Punaise cuirasse.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

C. hemisphericus nigro-æneus, scutello
totum abdomen tegente, amplissimo.

Loc. Habitat viciniam multifloram fontis Bella-
quæi.

3. *C. testudinarius.* *C. lynceus* *fabr.*
pentatoma *moros* *oliv.*
La Punaise tortue brune.

Long. 3 lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

C. fuscus, scutello totum abdomen te-
gente, amplissimo.

Loc. Habitat sylvas.

4. *C. personatus.* *reduvius personatus* *fabr.*
La Punaise mouche.

Long. 7, 8 lig. Larg. 2 lig.

C. oblongus niger, rostro arcuato, antennis apice capillaceis, elytris membranaceis.

Loc. Habitat domos.

5. C. annulatus. *2edarius annulatus*

La Punaise mouche à pattes rouges.

Long. $5 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus niger, rostro arcuato, elytris membranaceis, pedibus abdomineque rubro nigroque variegatis.

Loc. Habitat sylvas.

6. C. bidentatus.

La Punaise porte-épine.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

C. longus, fuscus, rostro arcuato, thorace subtus antice bidentato.

Loc. Habitat plantas, rarus.

7. C. pellucidus.

La Punaise brune à étuis transparents.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, fusco-niger, pedibus pallidis, elytris pellucidis apice fusco.

Loc.

8. C. boopis.

La Punaise marbrée aux gros yeux.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, luteo nigroque marmoratus, oculis crassissimis.

Loc.

9. C. leviatan.

La Punaise leviatan.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. planus, fuscus, thorace elytrisque alatis, capite antice cornuto, antennis brevibus crassis.

Loc.

10. C. eryngii.

La Punaise rouge à taches triangulaires.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

C. oblongus niger, thorace elytrisque rubris, elytrorum extremo maculâ triangulari nigrâ.

Loc. Habitat folia Eryngii.

11. *C. apterus*. *hygeus apt. fabr.*

La Punaise rouge des jardins.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus,
elytris maculâ rotundâ, punctuloque
nigris.

Loc. Habitat arborum infimam partem, multiplex.

12. *C. hyosciami*. *hygeus hyos. & hygeus equestis fabr.*

La Punaise rouge à croix de chevalier.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus,
scutelli nigri apice rubro.

Loc. Habitat folia hyosciami,

13. *C. stellifer.*

*La Punaise rouge à base des aîles
blanches.*

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus,
centro crucis albo.

Loc. Habitat hortos.

14. C. equestris. *lygus eq. fabr*

*La Punaise rouge à bandes noires
& taches blanches.*

Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{3}{4}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus,
elytris fasciâ nigrâ, alis fuscis macu-
lis albis.

Loc.

15. C. nobilis.

*La Punaise rouge à point noir
& taches blanches.*

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus,
elytris punctulo nigro, alis fuscis ma-
culis albis.

Loc.

16. C. tessellatus.

La Punaise rouge à damier.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, thorace nigro lineis tribus
rubris, elytris rubro nigroque tesse-
latis, limbis nigris.

Loc. In Campaniâ multiplex.

17. *C. croceus.* *Captus Darius*

La Punaise safranée.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

C. croceus, elytrorum apice rubro, alis nigris, antennarum articulo secundo clavato.

Variet. A. *Cimex niger*, pedibus rufis, antennarum articulo secundo clavato.

B. *Cimex niger*, capite, thorace pedibusque rufis, antennarum articulo secundo clavato.

Loc.

18. *C. gothicus.* *lygeus Goth. Fabr.*

La Punaise rougeâtre à antennes incarnat.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

C. oblongus, fusco-ruber, elytris apice sanguineis, antennarum articulo secundo longissimo incarnato.

Loc.

19. *C. variegatus.*

La Punaise à brocard jaune.

Long. $4 \frac{1}{4}$ lig. Larg. 2 lig.

C. oblongus niger, thoracis lateribus scutelloque flavis, elytris antennis pedibusque flavo-variegatis.

Loc.

20. C. marginatus. *Coreus* ~~marginatus~~ ^{scaphus} ~~fabr.~~ ^{fabr.}
La Punaise à aîlerons. ~~Cucur. oliv.~~

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, fuscus, immaculatus, thorace utrinque obtuse angulato, capite prope antennis externe denticulato.

Loc.

21. C. rostratus. *Coreus* ~~marginatus~~ ^{marginatus} ~~fabr.~~ ^{fabr.}
La Punaise à bec.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, fuscus, immaculatus, thorace utrinque obtuse angulato, capite inter antennis bidentato.

Loc.

22. C. acutus. *Coreus* ~~venator~~ ^{venator}
La Punaise brune à corcelet pointu & lisse.

Long. 9 lig. Larg. 2 lig.

C. oblongus rufus, immaculatus, thorace utrinque acute angulato, margine lævi.

Loc.

23. C. fimbriatus.

La Punaise brune à corcelet pointu & épineux.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, rufus, immaculatus, thorace utrinque acute angulato, margine spinoso.

Loc.

24. C. chelifer. { *phymata crassipes latz*
{ *Syrtes crassipes fabr.*
La Punaise à pattes de crabes.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus fuscus, pedibus primi paris cheliformibus.

Loc. Habitat sylvas.

25. C. fabulosus.

La Punaise à nervures pointillées.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, viridi-fuscus, elytrorum nervis punctatis, antennis rufis.

Loc.

26. C. monilis.

La Punaise brune à antennes & pattes panachées.

Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus, fuscus, antennis, pedibus abdominisque marginibus nigro luteoque variegatis.

Loc.

27. C. cathariæ.

La Punaise grise panachée de noir.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, cinereo nigroque variegatus, alis glaucis.

Loc. Habitat labiatis, præcipue cathariam.

28. C. crucifer. *Lygeus pini*

La Punaise grise porte-croix.

C. oblongus niger, thorace postice cinereo, elytris cinereis, maculâ nigrâ, alisque nigris.

Loc. Habitat arida loca.

29. *C. apicaris.*

*La Punaise brune à pointe des
étuis blanche.*

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus niger, thorace postice cinereo, elytris fuscis apice albo.

Loc.

30. *C. femoralis.*

*La Punaise verdâtre à cuisses
pointillées.*

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, pallide-viridescens, femoribus nigro-punctatis.

Loc.

31. *C. constellaris.*

*La Punaise noire à taches fauves
& ailes panachées.*

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus, niger, elytris antice rufis, alis albo maculatis.

Loc. Habitat cortices arborum.

32. *C. fuliginus.*

La Punaise brune ponctuée.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, atro-fuscus punctatus, alis venosis.

Loc.

33. *C. pratensis. Lygeus pr. Fabr.*

La Punaise gris-fauve porte-cœur.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. griseus, scutello maculâ cordatâ flavâ, elytris apice puncto fusco.

Loc.

34. *C. campestris. Lygeus Cam. Fabr.*

La Punaise verte porte-cœur.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus, viridis, scutello maculâ cordatâ viridi, elytris maculâ ferrugineâ.

Varietas A. Cimex oblongus, fusco-luteus, scutello maculâ cordatâ viridi, elytris fasciâ duplici fuscâ.

Loc. Habitat flores,

35. *C. cordatus.*

La Punaise porte-cœur à taches jaunes au bout des étuis.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, fusco-ruber, scutello maculâ cordatâ luteâ, elytris apice luteis.

Loc.

36. *C. porrectus.*

La Punaise jaune à antennes droites.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, flavescens, thorace fasciis duabus nigris, scutello maculis flavis, antennis antice porrectis.

Loc.

37. *C. ternatus.*

La Punaise à trois taches.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus niger, thorace fasciis tribus flavis, scutello elytrorumque apice maculis luteis.

Loc.

8. *C. striatus*. *myris striata* Fabr.

La Punaise rayée de jaune & de noir.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus niger, thorace fasciis tribus flavis, scutello nigro, elytris flavis apice fulvo.

Loc.

9. *C. nigro-punctatus*.

La Punaise jaune à corcelet tacheté & étuis verts.

Larg. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus viridi-flavus, capite thoraceque nigro maculatis, elytris viridibus.

Loc.

10. *C. viridescens*.

La Punaise verdâtre à tache brune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus viridis, elytrorum maculâ fuscâ.

Loc.

41. *C. albinus.*

La Punaise verdâtre à taches blanches.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus viridis, elytrorum apice albido, scutello lineolâ fuscâ.

Loc.

42. *C. elongatus.*

La Punaise verdâtre à bande brune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus viridis, thorace scutelloque lineis quatuor nigris, elytris interne fuscis.

Loc.

43. *C. ærugineus. Miris pabulinus fabr.*

La Punaise verte aux yeux bruns.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. oblongus, totus viridis, oculis fuscis.

Loc.

44. *C. cruentatus.*

La Punaise verte ensanglantée.

Long. 3 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus viridis, elytrorum lineis sanguineis.

Loc.

5. C. ruficornis.

La Punaise verte à antennes fauves.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, pallido-viridis, antennis setaceis rufis.

Loc.

6. C. lateralis.

La Punaise blanchâtre aux yeux noirs.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. longus albidus, oculis nigris.

Loc.

7. C. recticornis.

La Punaise verte à antennes droites.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. longus totus viridis antennis antice porrectis.

Loc.

48. *C. sponsalis.*

La Punaise pâle à tache noire sur l'écusson.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. longus, albidus, oculis fuscis scutello maculâ nigrâ,

Loc.

49. *C. conicus.*

La Punaise grise conique.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus conicus, fusco - cinereus, oculis prominentibus, elytris nervosis.

Loc. Habitat hortos.

50. *C. flammeus.*

La Punaise noire à pointe des étuis rouges.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus niger, capite, elytrorum apice, genibusque ferrugineo-rubris.

Loc.

2. C. rolandri. *Lygeus Nol. Fabr.*

La Punaise couleur de suie à ailes jaunes.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus atro-fuscus, alarum maculâ flavâ.

Loc.

3. C. plæffæus.

La Punaise noire à pattes panachées.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus niger, pedibus viridi nigroque variegatis.

Loc.

3. C. atramentarius.

La Punaise toute noire.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus totus ater, alis atris.

Loc.

4. C. ater. *Lygeus ater Fabr.*

La Punaise à grosses antennes terminées par un fil.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus ater, antennis setâ terminatis.

Loc. Habitat sylvas.

55. C. carthusianus.

La Punaise chartreuse.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. oblongus, infra niger, supra albolaëteus, antennis crassiss antice porrectis, capite pedibus antennisque nigris.

Loc. Habitat Eryngium.

56. C. clavicornis. *auctoria clav. fabr.*

La Punaise tigre.

Long. $1 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. ex albo fuscoque cinereus, elytrorum thoracisque margine punctato antennis subclavatis.

Loc. Larva flores chamædrys distendit.

57. C. appendiceus. *lingis cristata*
lappei fabr.

La Punaise à fraise antique.

Long. $1 \frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. antennis clavatis, thorace elytrisque corpore multo latioribus diaphanis, reticulatis, fasciâ duplici transversâ.

Loc.

8. *C. vagabundus.* *Gerris Vag. Fabr.*
La Punaise culiciforme.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. linearis pedibus anticis brevissimis,
 cæteris antennisque filiformibus lon-
 gissimis, albo fuscoque variis.

Loc. Habitat arbores.

59. *C. lacustris.* *oliv. Gerris lac. Fabr.*
La Punaise nayade. *hydrometra lac. Latr.*

Long. 4 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. linearis suprà niger, pedibus anticis
 brevissimis.

Loc. Habitat aquarum stagnantium superficiem.

60. *C. stagnorum.* *oliv. Gerris stag. Fabr.*
La Punaise aiguille. *hydr. stag. Latr.*

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. linearis nigricans compressus, capite
 cylindraceo, pedibus anticis brevissi-
 simis.

Loc. Habitat stagna.

FAMIL. II. *Antennarum articuli
quinque. Pentatoma Fabr.*61. *C. juniperinus. bon Fabr.**La Punaise verte.*Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.*C. subrotundus viridis.**Loc. Fetidissimus, habitat grossulariam.** 62. *C. tridentatus.**La Punaise à trois cornes.*Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.*C. planus, depressus, atro-fuscus, ca-
pite antice tridentato, thoracis mar-
gine ferrato, elytris parvis.**Loc.*63. *C. carminaris.**La Punaise verte lavée de rouge*Long. 6 lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.*C. ovatus, thorace obtuse angulato, à
viridi rubroque nebulosus.**Loc.** 64. *C. biclavatus.**La Punaise à double masse.*Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus lividus, antennarum articulo primo & extremo clavatis.

Loc.

5. C. pungens. *an C. hamonhoi? alii! fabr.*
La Punaise verte à pointes du corcelet rouges.

Long. 6 lig. Larg. 3 fig.

C. subovatus viridis, angulis thoracis acutis rubris apice nigris, abdomine subtus acuto.

Loc.

6. C. baccarum. *bon.*

La Punaise brune à antennes & bords panachés.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

C. fuscus, antennis abdominisque margine nigro croceoque variegatis.

Loc. Habitat grossulariam, fetidus.

67. C. annularis.

La Punaise brune à pattes panachées.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

C. fuscus, pedibus abdominisque limbo luteo fusco variegatis.

Loc.

68. C. fecalinus. *f. hottentotta fabr.*

La Punaise porte-chappe brune.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigro-ferrugineus, scutello ad anum usque producto.

Loc. Habitat fecale & gramina.

69. C. cappatus.

La Punaise porte-chappe noire.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

C. ater punctatus, scutello ad anum usque producto.

Loc. Habitat domos.

70. C. italicus. *{ C. nigro-lineatus fabr.
pentatoma nig. oliv.*

La Punaise siamoise.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. rotundatus ruber, supra fasciis longitudinalibus, infra punctis nigris, scutello amplo totum fere abdomen tegente.

Loc.

1. C. ornatus. *bon*

La Punaise rouge du chou.

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

C. rotundato-ovatus, nigro rubroque variegatus, capite alisque nigris.

Loc. Habitat brassicam.

2. C. carbonarius. *C. tristis*

La Punaise noire.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

C. ovatus, totus niger, alis pallidis.

Loc.

3. C. fumosus.

La Punaise brune luisante.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. ovatus, fusco-niger, alis pallidis.

Loc.

4. C. limbosus.

La Punaise noire à bordure blanche.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. ovatus niger, elytrorum limbo exteriori albo.

Loc.

75. *C. bicolor.* bon

La Punaise noire à quatre taches blanches.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. ovatus niger, thoracis lateribus, elytrorumque maculis quatuor albis.

Loc.

76. *C. oleraceus.* bon

La Punaise verte à raies & taches rouges ou blanches.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. ovatus cœrulescenti-æneus, thorace lineolâ, scutelli apice, elytris puncto albo rubrove.

Loc.

77. *C. cœruleus.* bon

La Punaise verte bleuâtre.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. ovatus, viridi cœruleus æneus.

Loc.

78. *C. saltator.* au *Syngus leucocephala?* Fabr.
ou *C. albo-marginatus?* Fabr.

La Punaise sauteuse.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. rotundato-ovatus niger, capite genubusque ferrugineis, pedibus saltatoriis.

Loc.

79. C. acuminatus. *bow*.

La Punaise à tête allongée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. ovatus, antice attenuatus, fasciis longitudinalibus cinereo-exalbidis, antennis extremo rufis.

Loc.

LXII. NAUCORIS. *LA NAUCORE,*

Articuli tarforum duo.

Antennæ brevissimæ infra oculos positæ.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor cruciatæ.

Pedes sex, primi cheliformes.

Scutellum præsens.

1. N. cimicoides. *bow*

La Naucore.

Long. 4, 5 lig. Larg. 3 lig.

Loc. Habitat aquam.

LXIII. NOTONECTA. *LA PUNAISE A AVIRONS.*

Articuli tarforum duo.

Antennæ brevissimæ infra oculos positæ.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor cruciatæ.

Pedes sex natatorii.

Scutellum præsens.

1. N. glauca. *bon*

La grande Punaise à avirons.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

N. capite luteo, elytris fusco croceoque variegatis, scutello atro.

Loc. Habitat aquam.

2. N. minutissima. *bon*

La petite Punaise à avirons.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

N. cinerea anelytra.

Loc. Idem.

LXIV. CORIXA. *LA CORISE.*

Articulus tarforum unicus.

Antennæ brevissimæ infra oculos
positæ.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor cruciatæ.

Pedes sex, primi cheliformes, pos-
tici natatorii.

Scutellum nullum.

1. C. striata. bon *figura striata*
fabr. Halk.
La Corise.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

Lôc. Habitat rivulos & stagna, fetidissima.

LXV. HEPA. *LE SCORPION AQUA-
TIQUE.*

Articulus tarforum unicus.

Antennæ cheliformes.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor cruciatæ.

Pedes quatuor.

1. H. linearis. *Nanatra linearis* Fabr.

Le Scorpion aquatique à corps allongé.

Long. 13 lig. Larg. 1 lig.

H. corpore lineari.

Loc. Habitat aquam stagnantem.

2. H. cinerea. *Nepa cin.* Fabr.

Le Scorpion aquatique à corps ovale.

Long. 8, 9 lig. Larg. 3 lig.

H. corpore ovato.

Loc. Idem.

LXVI. PSYLLA. LA PSYLLE.

Articuli tarforum duo.

Rostrum pectorale inter primum & secundum par femorum.

Alæ quatuor laterales.

Pedes saltatorii.

Abdomen acuminatum.

Ocelli tres.

1. P. ficûs.

La Psylle du figuier.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. fusca, antennis crassis pilosis, alarum nervis fuscis.

2. P. chermes buxi.

La Psylle du buis.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. viridis, antennis setaceis, alis fusco-flavescentibus.

3. P. Alni. *bou*

La Psylle de l'aune.

P. viridis, antennis setaceis, alis aqueis.

4. P. fraxini.

La Psylle du frêne.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. nigro luteoque variegata; alarum oris in apice fuscis.

5. P. abietis.

La Psylle du sapin.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. pallidè flavesens, oculis fuscis, alis aqueis.

6. *P. pini.**La Psylle du pin.*

Long.

Larg.

*P. lanata pini.*7. *P. lapidum, feu lichenis.**La Psylle des pierres.*Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.*P. fusca, nigro punctata, antennis corpore longioribus, alis nervosis fusco maculis.*8. *P. fusca.**La Psylle brune à antennes sétacées & aîles nerveuses.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*P. fusca, antennis setaceis lævibus, alis nervosis.*9. *P. rubra.**La Psylle rouge.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*P. rubra, alis nervosis.**Loc.*

XVII. APHIS. *LE PUCERON.*

Articulus tarforum unicus.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor erectæ vel nullæ.

Pedes ambulatorii.

Abdomen bicornè.

1. A. ulmi. *bon*

Le Puceron de l'orme.

A. ulmi.

2. A. fraxini. *bon*

Le Puceron du frêne.

A. fraxini, nigro viridique variegata.

3. A. sambuci. *bon*

Le Puceron du sureau.

A. sambuci tota cœruleo-atra.

4. A. roboris.

Le Puceron du chêne.

A. quercûs atro-fusca.

5. A. aceris. *bon*

Le Puceron de l'érable.

A. aceris, viridis, maculis nigris.

6. *A. tiliaë.* *bou*

Le Puceron du tilleul.

A. tiliaë, alis, antennis, pedibusque nigro punctatis.

7. *A. betulæ.*

Le Puceron du bouleau.

A. betulæ, marginibus incisurarum abdominis punctis nigris.

8. *A. tanaceti.* *bou*

Le Puceron de la tanaïsie.

A. tanaceti fusca, abdomine nigro-cœruleo antice viridi.

9. *A. acetosæ.* *bou*

Le Puceron de l'oseille.

A. acetosæ, atra fasciâ transversâ viridi.

10. *A. padi.* *A. pruni*

Le Puceron du prunier.

A. pruni.

A. bursaria. a. *populi nigra*

Le Puceron du peuplier noir.

A. populi nigra lanata.

A. fagi. *bon*

Le Puceron du hêtre.

A. fagi lanata.

A. lactucæ. a. *sonchi*

Le Puceron du laiteron.

A. sonchi caudata.

A. quercûs. a. *quercûs robur*

Le Puceron des écorces à longues trompes.

A. fusca proboscide corpore triplo longiore.

KVIII. CHERMES LE KERMÈS.

Rostrum pectorale inter primum & secundum par femorum.

Alæ duæ masculis, erectæ.

Abdomen appendicibus setaceis.

Fæmina folliculi formam induens.

1. C. polonicus. *Coccus*

Le Kermès des racines.

C. radicum purpureus.

Loc. Habitat polygoni Knawel radices.

2. C. hesperidum. *Coccus hesperidum*

Le Kermès des orangers.

C. hesperidum.

3. C. clematitis. *C. alui*

Le Kermès de la clematite.

C. clematitis oblongus.

4. C. persicæ. *bon*

Le Kermès oblong du pêcher.

C. persicæ oblongus.

5. C. amygdali. ~~C. amygdali~~

Le Kermès rond du pêcher.

C. persicæ rotundus.

6. C. vitis.

Le Kermès de la vigne.

C. vitis oblongus.

7. C. abietis.

Le Kermès du sapin.

C. abietis rotundus.

8. C. ulmi. *Coccus ulmi*

Le Kermès de l'orme.

C. ulmi rotundus.

9. C. tilia.

Le Kermès du tilleul.

C. tilia hemisphaericus.

10. C. coryli. *Coccus coryli*

Le Kermès du coudrier.

C. coryli hemisphaericus.

11. C. quercûs.

Le Kermès rond & brun du chêne.

C. quercûs rotundus fuscus.

12. C. roboris.

*Le Kermès du chêne rond & de
couleur panachée.*

C. quercûs rotundus, ex albo flavescente
nigroque variegatus.

13. C. reniformis. *Coccus quercus*

Le Kermès reniforme du chêne.

C. quercûs reniformis.

14. C. sericeus.

Le Kermès ovale & cotonneux du chêne.

C. quercûs oblongus serico albo.

15. C. carpini.

Le Kermès cotonneux du charme.

C. carpini serico albo.

16. C. mespili.

Le Kermès cotonneux du néslier.

C. mespili serico albo.

17. C. linearis.

Le Kermès en écaille de moule.

C. arborum linearis.

18. C. aceris.

Le Kermès ovale de l'érable.

C. aceris ovatus.

LXIX. COCCUS. *LA COCHENILLE.*

Rostrum pectorale inter primum &
secundum par femorum.

Alæ duæ masculis, erectæ.

Abdomen appendicibus setaceis.

Fæmina insecti formam servans.

1. C. adonidum. *bon*

La Cochenille des serres.

C. adonidum, corpore roseo, farinaceo,
alis setisque niveis.

2. C. phalaridis. *le suspiridum bon*

La Cochenille du chien-dent.


C. graminis corpore roseo.

3. C. ulmi.

La Cochenille de l'orme.

C. ulmi, corpore fusco, serico albo.

Finis primæ Partis.



ENTOMOLOGIA PARISIENSIS;

S I V E

CATALOGUS Insectorum quæ in Agro
Parisiensi reperiuntur ;

*SECUNDUM methodum Geoffræanam in
sectiones , genera & species distributus :*

CUI addita sunt nomina trivialia & fere trecentæ novæ
Species.


*Edente A. F. DE FOURCROY , Doct.
Med. Paris. ; è Reg. Scientiar. Academ. ;
è Reg. Soc. Medic. &c.*

P A R S S E C U N D A .



P A R I S I I S ,

V I A E T Æ D I B U S S E R P E N T I N E I S .



M. D C C. L X X X V.

S U B P R I V I L E G I O A C A D E M I Æ .

ENTOMOLOGIA

PARISIENSIS;

SINE

ANNO 1830

PARISIENSIS;

ANNO 1830

PARISIENSIS;

ANNO 1830

PARISIENSIS;

ANNO 1830

PARISIENSIS;

ANNO 1830

PARISIENSIS;

PARISIENSIS;

PARISIENSIS;

PARISIENSIS;

PARISIENSIS;

PARISIENSIS;

PARISIENSIS;



ENTOMOLOGIA PARISIENSIS.

SECTIO TERTIA. CLASSIS INSECTORUM.

Insecta tetraptera alis farinaceis.

LXX. PAPILO. LE PAPILLON.

Antennæ clavatæ.

Chrysalis nuda.

FAMIL. I. *Tetrap.*

§. I.

Erucis⁺ spinosis, alis angulosis.

1. P. antiopa. bon

Le Morio.

Longueur 1 $\frac{1}{2}$ pouces. Largeur 3 pouces.

L

{ à quatre
pattes; les
2 ant. jaunes
et 2 sup. en palatines }

+ chemises
épines
ou les ang

P. alis nigris, margine postico albido.

Locus. Larva habitat salicem.

2. P. jo. *bon*

Le Paon du jour, ou l'œil du Paon.

Long. 13 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ pouc.

P. alis fulvis nigro maculatis, omnibus ocello cœruleo variegato.

Loc. Larva habitat urticam majorem.

3. P. polychloros. *bon*

La grande Tortue.

Long. 15 lig. Larg. 2 pouc. 4 lig.

P. alis fulvis nigro maculatis, primariis punctis quatuor nigris.

Loc. Larva habitat ulmum.

4. P. urticæ. *bon*

La petite Tortue.

Long. 11 lig. Larg. 2 pouc.

P. alis fulvis, nigro maculatis, primariis punctis tribus nigris.

Loc. Larva habitat urticæ majoris folia.

5. P. G album. *bon*

Le Gamma ou Robert-le-Diable.

Long. 10 lig. Larg. 22 lig.

P. alis laceris fulvis nigro maculatis, secundariis subtus G albo notatis.

Loc. Larva habitat upulum & grossulariam.

6. P. atalanta. *bon*

Le Vulcain.

Long. 13 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ pouc.

P. alis nigris albo maculatis, omnibus fasciâ arcuatâ coccineâ.

Loc. Larva habitat urticam.

7. P. cardui. *bon*

La Belle-dame.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc. 5 lig.

P. alis fulvis albo nigroque variegatis, secundariis ocellis quinque.

Loc. Larva habitat carduum & cirsium.

§. II.

Erucis spinosis, alis rotundatis.

8. P. paphia. *bon*

Le Tabac d'Espagne.

Long. 15 lig. Larg. 1 pouc. 7 lig.

P. alis dentatis fulvis nigro maculatis,
subtus lineis transversis argenteis.

Loc. Habitat sylvas; larva o.

9. P. aglaia. *bon*

Le grand Nacré.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc. 3 lig.

P. alis dentatis fulvis nigro maculatis,
subtus maculis 21 argenteis.

Loc. Idem.

10. P. lathonia. *bon*

Le petit Nacré.

Long. 10 lig. Larg. 2 pouc.

P. alis dentatis fulvis nigro maculatis,
subtus maculis 37 argenteis.

Loc. Idem.

11. P. euphrosine. *bon*

Le Collier argenté.

Long. 7 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 18 lig.

P. alis dentatis fulvis nigro maculatis,
subtus maculis 9 argenteis.

Loc. Idem.

2. P. cinxia. *bon. ou a fait des 4 Var.*
Le Damier. A, B, C, D 4 especes

Long. 6 lig. Larg. 18 lig.

P. alis dentatis fulvis nigro variegatis,
 subtus fasciis tribus flavis.

Varietas A. Papilio alis dentatis fulvis
P. cinxia nigro maculatis, subtus
 fasciis tribus flavis.

B. Papilio alis dentatis ful-
P. athalia vis nigro reticulatis, sub-
 tus fasciis tribus flavis.

C. Papilio alis dentatis fulvis
P. Delia nigro reticulatis, & punc-
 tatis, subtus fasciis tribus
 flavis.

D. Papilio alis dentatis fulvis
P. artemis nigro reticulatis & punc-
 tatis, utrinque fasciis tri-
 bus flavis.

Loc. Habitat sylvas: larva o.

§. III.

chenilles non spinosae; pedes aut. corti, unum prius enipaltrix
Erucis non spinosis, pedibus anticis brevif-
simis collare non efficientibus.

13. *P. silene.* *p. herminone*

Silene.

Long. 14 lig. Larg. 2 pouc. 3 lig.

P. alis rotundatis dentatis nigro-fuscis,
 omnibus fasciâ albidâ, primariis ocello
 duplici, secundariis unico.

Loc. Habitat sylvas; larva o.

14. *P. hyperantus.* *bru*

Le Tristan.

Long. 9 lig. Larg. 18 lig.

P. alis rotundatis fuscis, subtus primariis
 ocello triplici, inferioribus quintu-
 plici.

Loc. Idem.

15. *C. saltator.* *D. dejanire*

La Bacchante.

Long. 10 lig. Larg. 13 lig.

P. alis rotundatis fuscis, singulis subtus ocellis quinque & limbo pallidiore.

Loc. In sylvis undèquaque volitat; larva o.

6. P. ægeria. *bon*

Le Tircis.

Long. 8 lig. Larg. 20 lig.

P. alis rotundatis dentatis fuscis, fulvo maculatis, primariis ocello unico, secundariis superne quadrupli.

Loc. Habitat sylvas; larva o.

7. P. jurtina. *P. jania 8. A*

Le Corydon.

Long. 9 lig. Larg. 21 lig.

P. alis rotundatis fuscis, primariis subtus fulvis, ocello unico.

Loc. Idem.

8. P. mirtyllus. *P. jania 4. B*

Le Mirtil.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc.

P. alis rotundatis dentatis supra fuscis, primariis maculâ fulvâ, infra è fulvo & fusco undulatis, primoribus utrinque ocello.

Loc. Idem.

19. *P. mœra.* & *P. magra*
Le Satyre.

Long. 11 lig. Larg. 2 pouc.

P. alis rotundatis fulvo fuscoque nebulosis; primariis sesqui-ocello, secundariis suprâ tribus, infrâ septem ocellis.

Loc. Habitat sylvas, hortos; larva gramen *Pea* dictum.

20. *P. amaryllis.* bon
L' Amaryllis.

Long. $7 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 17 lig.

P. alis rotundatis fulvis oris fuscis, primariis ocello duplici continuo, secundariis duobus, infrâ fusco cinereoque nebulosis.

Loc. Habitat sylvas; larva o.

21. *P. pamphylus.* bon
Le Procris.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouc.

P. alis rotundatis fulvis, oris fuscis, primariis subtus ocello unico, secundariis subtus albo cinereoque variegatis.

Loc. Habitat erucas; larva socialis gramen filo intricato obvestit.

22. *P. cephalus*. *P. arcadius*

Le Céphale.

Long. 7 lig. Larg. 17 lig.

P. alis rotundatis, superioribus fulvis oris fuscis, subtus ocello unico; secundariis suprâ fuscis, infrâ cinereis, fasciâ albâ ocellisque quinis.

Loc. Habitat sylvas; larva o.

FAMIL. II. *Hexapi pedibus sex unguiculatis, chrysalide horizontali in medio filo suspensâ. les Chevaliers*

§. I.

Caudiferi majores.

3. *P. machaon*. *bon*

Le grand Papillon à queue de fenouil.

Long. 28 lig. Larg. 3 pouc.

P. alis flavo nigroque variegatis, secundariis angulo subulato maculâque fulvâ.

Loc. Habitat sylvas; larva fœniculum & umbelliferas.

24. *P. flammæus*. *P. podalyrus*

Le Flambé.

Long. 18 lig. Larg. 3 pouc. 4 lig.

P. alis pallidè flavis, rivulis transversis
nigris, secundariis angulo subulato
maculâque croceâ.

Loc. Habitat sylvas.

§. II.

Caudiferi minores.

25. *P. piforum*. *hesperia Noctua*

Le Porte-queue bleu strié.

Long. 7 lig. Larg. 15 lig.

P. suprâ cœruleus, subtus lineis undu-
latis fuscis & albicantibus striatus, alis
secundariis infrâ fasciâ albâ, maculâ
duplici, nigro-auratâ, & in imo caudatis.

Loc. Habitat sylvas; larva coluteam, pisos, le-
gumina.

26. *P. quercûs*. *bon*

*Le Porte-queue bleu à une bande
blanche.*

Long. 7 lig. Larg. 15 lig.

P. supra cœruleus subtus fuscus, lineâ undulatâ transversâ albicante, alis secundariis infrâ maculâ duplici fulvâ, & in imo caudatis.

Loc. Habitat sylvas, larva quercûs folia.

27. P. betulæ. *bon*

Le Porte-queue fauve à deux bandes blanches.

Long. 9 lig. Larg. 17 lig.

P. supra fuscus maculâ flavâ, subtus fulvus lineâ duplici transversâ albidâ, alis secundariis in imo caudatis.

Loc. Habitat sylvas, larva betulam.

28. P. pruni. *bon (c'est plutôt le P. lineus?)*

Le Porte-queue brun à deux bandes de taches blanches.

Long. 7 lig. Larg. 15 lig.

P. fuscus, maculâ fulvâ, subtus fasciâ duplici transversâ macularum albicantium, alis secundariis lunularum ferruginearum serie & in imo caudatis.

Varietas A. Papilio fuscus, supra puncto albido, subtus lineâ transversâ albâ, alis secundariis margine fulvo angulato, & in imo caudatis.

Loc. Larva habitat prunum, ulmum.

§. III.

Ocelliferi. hesperies

29. *P. jris.* *bon*

Le Mars.

Long. 14 lig. Larg. 2 pouc. 10 lig.

P. alis subangulatis, supra nigro violaceis; albo fasciatis, subtus fulvo, fusco albidoque variis, singulis ocello nigro cœruleo.

Loc. Habitat hortos.

30. *P. argus.* *bon*

L'Argus bleu.

Long. 6 lig. Larg. 14 lig.

P. alis rotundatis integerrimis cœruleis, subtus ocellis numerosis.

Loc. Habitat prata, larva frangulam.

31. P. semi-argus.

Le Demi-Argus.

Long. 5 lig. Larg. 14 lig.

P. alis rotundatis integerrimis cœruleis;
subtus ocellorum fasciâ solitariâ.

Loc. Habitat prata, larva frangulam.

32. P. fuscior. *Hesperia argus*

L'Argus brun.

Long. 6 lig. Larg. 14 lig.

P. alis rotundatis integerrimis nigro-fuscis,
fasciâ marginali fulvâ, subtus cinereis ocellis numerosis.

Loc. Id. rarior.

33. P. rubi. *Hesperia phœas*

L'Argus myope.

Long. 6 lig. Larg. 13 lig.

P. alis rotundatis integerrimis nigro fuscis
fulvo maculatis, subtus ocellis numerosis.

Loc. Id. rarior; larva habitat rubum.

34. P. cæcus. *Hesperia rubi*

L'Argus vert, ou l'Argus aveugle.

Long. 6 lig. Larg. 14 lig.

P. alis rotundatis integerrimis, subtus viridibus immaculatis.

Loc. Idem.

35. **P. virgaureæ.** *hesperia Virga aureæ*
Le Bronzé. *ou plutôt hesp. phloæas?*

Long. 5 lig. Larg. 13 lig.

P. alis rotundatis fulvis, utrinque punctis nigris.

Loc. Habitat prata.

36. **P. speculifer.** *hesperia aracinthus*
Le Miroir.

Long. 6 lig. Larg. 15 lig.

P. nigro-fuscus nitens, alis subtus limbo dentato fulvo, secundariis maculis duodecim albis.

Loc. Habitat sylvas.

§. IV. *hesperies*

Divaricati.

37. **P. divaricatus.** *hesperia Comma*
La Bande noire.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouc.

P. alis divaricatis fulvis, limbo nervisque nigris, primariis maculâ oblongâ nigrâ.

Loc. Habitat prata.

38. P. malvæ. *bon*

Le Plein-chant.

Long. 5 lig. Larg. 14 lig.

P. alis divaricatis denticulatis nigris, albo punctatis.

Loc. Larva habitat carduum fullonum & malvam.

39. P. tages. *hesperia tages*

Le Papillon grisette.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouc.

P. alis divaricatis cinereis, punctorum alborum serie duplici transversâ.

Loc. Idem.

S. V. *papillons Danaïde*

Brassicarii.

40. P. brassicæ. *bon*

Le grand Papillon blanc du chou.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc. 4 lig.

P. alis rotundatis albis, primariis bima-
culatis, apice nigris, major.

Loc. Habitat hortos; larva brassicam.

41. P. rapæ. *bon*

Le petit Papillon blanc du chou.

Long. 11 lig. Larg. 23 lig.

P. alis rotundatis albis, primariis bima-
culatis, apice nigris, minor.

Loc. Larva habitat rapam, brassicam, carda-
mindum.

42. P. napi. *bon*

Le Papillon blanc veiné de vert.

[Long. 7 lig. Larg. 19 lig.

P. alis rotundatis albis, inferioribus sub-
tus fasciis virescentibus.

Loc. Idem.

43. P. cratægi. *bon* *C'est un parvaßien*

Le Gasé.

Long. 13 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ pouc.

P. alis rotundatis albis; venis nigris.

Loc. Larva habitat cratægum, pomum sylves-
trem, padum.

44. *P. cardamines.* *bou*

L'Aurore.

Long. 8 lig. Larg. 19 lig.

P. alis rotundatis albis, secundariis subtus viridi-nebulosis, primariis lunulâ nigrâ, masculis maculâ croceâ.

Loc. Larva habitat thlaspim.

45. *P. luctuosus.* (*c'est un satyre*)

Le Deuil. *P. sibilus*

Long. 9 lig. Larg. 23 lig.

P. alis dentatis, supra nigris, subtus fusco-rubris, utrinque maculis albis fasciatim positis.

Loc. Habitat sylvas.

46. *P. leucomelanos.* *P. galathea* (*idem*)

Le demi-Deuil.

Long. 10 lig. Larg. 22 lig.

P. alis rotundatis albis, lineis maculisque nigris pulchrè tessellatis.

Loc. Idem.

47. *P. rhamni.* *bou*

Le Citron.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc. 2 lig.

P. alis angulatis flavis, puncto ferrugineo.

Loc. Larva habitat rhamnum.

48. P. croceus. *P. hyale*

Le Souci.

Long. 9 lig. Larg. 21 lig.

P. alis luteis limbo nigro, primariis maculâ nigrâ, secundariis fulvâ.

Varietas A. Papilio alis croceis limbo nigro immaculato, primariis maculâ nigrâ, secundariis fulvâ.

est le ♂

B. Papilio alis croceis limbo nigro flavo maculato, primariis maculâ nigrâ, secundariis fulvâ.

est la ♀

C. Papilio alis sulphureis, primariis limbo nigro fasciâ flavâ maculato, maculâque nigrâ, secundariis fulvâ.

P. palæno
Wolff

Loc.

LXXI. SPHINX. *LE SPHINX.*

Antennæ prismaticæ.

Chrysalis in puppa.

FAMIL. I. *Antennæ prismaticæ ubique fere æquales, elingues.*

1. *S. ocellata.*

bon

Le Demi-Paon.

Long. 17 lig.

S. elinguis alis angulatis, superioribus fuscis, inferioribus rubris ocello cœrulescente.

Loc. Larva salicem habitat.

2. *S. tiliaæ.*

bon

Le Sphinx du tilleul.

Long. 1 pouce.

S. elinguis, alis laceris superioribus cinereo-virescentibus, fasciâ obscuriore transversâ inæquali, inferioribus fusco-aurantiis.

Loc. Larva habitat tiliam.

3. *S. populi.* *bon*

Le Sphinx à ailes dentelées.

Long. 1 pouce.

S. elinguis, alis ferratis, cinereo-fuscis;
superioribus fasciis obscurioribus trans-
versis, inferioribus basi maculâ fulvâ.

Loc. Larva habitat populum.

4. *S. bombyciformis.* *fesia bomb.*

Le Sphinx mouche.

Long. 5 lig.

S. elinguis, alis lanceolatis vitreis venis
nigris, superioribus maculâ limboque
nigris, fulvoque nebulosis.

Loc.

FAMILIA II. *Antennæ prismaticæ*
ubique fere æquales, spirilingues.

5. *S. fuciformis.* *bon*

*Le Sphinx vert à ailes transpa-
rentes.*

Long. 10 lig.

S. spirilinguis viridis alis vitreis pelluci-
dis, venis limboque fusco-ferrugineis.

Loc.

6. *S. stellarum.* bon

Le Moro-Sphinx.

Long. 13 lig.

S. spirilinguis, alis superioribus fuscis nebulosis, inferioribus ferrugineis.

Loc. Larva habitat gallium.

7. *S. ligustri.* bon

Le Sphinx du troëne.

Long. 22 lig.

S. spirilinguis, alis superioribus fuscis, inferioribus abdomineque fasciis transversis rubris.

Loc. Larva habitat ligustrum.

8. *S. atropos.* bon

Le Sphinx à tête de mort.

Long. 2 pouc. $\frac{1}{3}$. Larg. 9 lig.

S. spirilinguis, alis superioribus fusco-nebulosis, inferioribus abdomineque fasciis transversis luteis, thorace maculis caput mortuum referentibus.

Loc.

9. *S. convolvuli.* *bon*

Le Sphinx à cornes de bœuf.

Long. 2 pouces.

S. spirilinguis alis omnibus fuscis, fasciis dentatis obscurioribus, abdomine fasciis transversis rubris.

Loc. Larva habitat convolvulum.

10. *S. elpenor.* *bon*

Le Sphinx de la vigne.

Long. 16 lig.

S. spirilinguis, alis viridi purpureoque fasciatis, fasciis linearibus transversis.

Loc. Larva habitat vitem.

11. *S. euphorbiæ.* *bon*

Le Sphinx du tithymale.

Long. 17 lig.

S. spirilinguis, alis viridi fulvo purpureoque varie fasciatis & maculatis subtus purpureis.

Loc. Larva habitat tithymalum.

2. *S. porcellus.* *bon*

Le Sphinx à bandes rouges dentelées.

Long. 1 pouce.

S. spirilinguis, alis viridi purpureoque fasciatis fasciis ferratis transversis.

Loc. Idem.

FAMILIA III. *Antennæ prismaticæ in medio crassiores, spirilingues. zygena. Larva villosa, non cornigera.*

3. *S. filipendulæ.* *zygena filip.*

Le Sphinx belier.

Long. 8 $\frac{1}{2}$ lig.

S. spirilinguis, alis superioribus subcæruleis punctis sex rubris, inferioribus rubris.

Varietas A. *Sphinx spirilinguis*, alis rubris, superioribus limbo maculisque sex nigris.

Loc. Larva habitat filipendulam, gramen.

LXXII. PTEROPHORUS. *Le PTEROPHORE.*

Antennæ filiformes.

Lingua spiralis.

Alæ ramosæ, ramis pilosis.

Chrysalis nuda, horizontalis.

1. P. pentadactyla. *bon*

Le Pterophore blanc.

Long. 1 pouce.

P. albus, alis superioribus bipartitis, inferioribus tripartitis.

Loc.

2. P. didactyla. *bon*

Le Pterophore brun.

Largeur 10 lig.

P. fuscus, alis superioribus, apice bipartitis, inferioribus tripartitis.

Loc. Larva habitat convolvulum.

3. P. hexadactyla. *bon*

Le Pterophore en éventail.

Larg. 6 lig.

P. cinereus, fusco maculatus, alis superioribus octo partitis, inferioribus quadripartitis.

Loc. Larva habitat lonyceram periclymenum.

XXIII. PHALÆNA. LA PHALÈNE.

Antennæ à basi ad apicem decrescentes.

Chrysalis in puppa.

Larva nuda.

FAMIL. I. Pectinicornes.

§. I.

Elingues alis reflexis.

1. P. pavonia major. *bonelbyx pav. major*
Le grand Paon de nuit.

Larg. 5 $\frac{1}{2}$ pouc. Long. 2 pouc.

P. pectinicornis elinguis, alis cinereo-fuscis, planiusculis, singulis ocello, major.

Loc. Larva habitat prunum, malum armenam.

2. P. pavonia media.
Le Paon moyen.

P. pectinicornis elinguis, alis cinereo fuscis planiusculis, singulis ocello, minor.

Loc. Larva habitat prunum, malum armenam.

3. P. pavonia minor. *bombyx pav. minor*
Le petit Paon.

Larg. 2 pouc. 5 lig. Long. 11 lig.

P. pectinicornis elinguis alis planiusculis ferrugineo fluteoque variis, singulis ocello fasciâque fuscâ. *Masc.*

P. pectinicornis elinguis, alis planiusculis cinereis in medio albidis, singulis ocello fasciâque fuscâ. *Fæmina.*

Loc. Larva habitat rubum & rosam.

4. P. coffus. *Cossus ligniperda*
Le Cossus.

Long. 15 lig.

P. pectinicornis, elinguis, alis albo-cinereis, striis transversis nebulosis nigris, abdomine annulis albis.

Loc. Larva habitat lignum salicis.

5. P. vinula. *bon*
La Queue fourchue.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albidis diaphanis, vasis obscuris.

Loc. Larva habitat salicem & populum.

P. purpurata. *Bombyx purpurea*
L'Ecaille mouchetée.

Larg. 23 lig. Long. 10 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, superioribus flavis, inferioribus rubris, nigro maculatis.

Loc. Larva habitat ranunculum.

P. villica. *Bombyx villica*
L'Ecaille marbrée.

Long. 1 pouce.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, superioribus atris, areis flavescens, inferioribus luteis nigro maculatis, abdomine rubro.

Loc. Larva habitat ulmum.

P. caja. *Bombyx caja*
L'Ecaille martre ou hérissone.

Long. 1 pouce.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis; superioribus fuscis, rivulis albis inferioribus purpureis, punctis sex nigris.

Loc. Larva habitat ulmum.

9. P. monacha. *bombyx hebe*

L'Ecaille couleur de rose.

Long. 10 lig.

P. pectinicornis elinguis alis deflexis; superioribus albis, rivulis transversis nigris, inferioribus roseis, maculâ triplici nigrâ.

Loc.

10. P. testudinaria. *bombyx plantaginis*

L'Ecaille brune.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, superioribus fuscis, maculis luteis, inferioribus rubris maculis quatuor nigris.

Loc.

11. P. quercifolia. *bombyx querc.*

La Feuille - morte.

Long. 15 lig.

P. pectinicornis elinguis, tota rufa, alarum margine ferrato.

Loc. Larva habitat gramen.

. P. cristata.

La Crête de coq.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, pallido-rufa cristâ dorsali nigrâ.

Loc.

. P. quercûs.

Bombus quercus

Le Minime à bande.

Long. 1 pouce 9 lig.

P. pectinicornis elinguis rufa, alis rotundatis fasciâ pallidiorè, superioribus puncto albo.

Loc. Larva habitat fol. quercûs, ulmi, corni, ribesiæ.

. P. dispar.

Bombus dispar

Le Zig-zag.

Long. 1 pouce.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albis, fasciâ quadruplici transversâ nigrâ, acute undulatâ.

Loc. Larva habitat ulmum.

15. *P. pudibunda.* *bombyx pud.*
La Patte étendue.

Long. 1 pouce.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, cinereo-undulatis, fasciis transversis obscurioribus, capite inter pedes porrectos.

Loc. Larva habitat prunum, &c.

16. *P. annularis.* *bombyx neustria*
La Livrée.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis pallidis, fasciâ alarum transversali saturatiore.

Loc. Larva truncos arborum habitat, abundans.

17. *P. palladia.* *bombyx graminia*
La Phalène chouette.

Long. 5, 7 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, superioribus fasciis pallido flavis nigrisque alternis longitudinalibus, inferioribus croceis fasciâ marginali nigrâ.

Loc.

3. P. mori. *Bombyx mori*

Le Ver-à-soie.

P. pectinicornis elinguis tota alba, alis reflexis, bombyx dicta.

Loc. Habitat provincias meridionales.

7. P. falicis. *B. salicis*

L'Apparent.

Long. 11 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albis, pedum annulis antennisque nigris.

Loc. Larva habitat falicem.

10. P. chrysothorax. *B. chry.*

La Phalène blanche à cul brun.

Long. 9 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albis, fœminæ ano piloso ferrugineo.

Loc. Larva habitat arbores quascunque.

11. P. lubricipeda. *B. lubr.*

La Phalène tigre.

Long. 9 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albidis, punctis nigris; abdomine ordinibus quinque punctorum.

Loc. Larva habitat pomiferas arbores.

22. *P. vernalis.*

La Printaniere.

Long. 11 lig.

P. pectinicornis elinguis albida nigro punctata, alis deflexis, superioribus fasciâ duplici fuscâ dentatâ nigro terminatâ.

Loc.

23. *P. antiqua.* *Bombus antiqua*
L'Etoilée.

Long. 7 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis rotundatis fusco-ferrugineis superioribus maculâ albâ, anguli ani; foeminâ apterâ.

Loc. Larva habitat prunum.

24. *P. pomona.*

La Phalène jaune à aîles vertes.

Long. 6 lig.

P.

P. pectinicornis elinguis, antennis & corpore luteis, alis deflexis viridibus.

Loc.

25. P. rosea.

La Rosette.

Long. 6 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis roseis, superioribus punctorum arcuumque ordine duplici.

Loc.

26. P. libatrix. *Noctuella libatrix*

La Découpure.

Long. 10 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis cinereo flavoque rufis margine laceris.

Loc.

7. P. cœruleo-cephala. *Hombyx Cœrul...*

Le Double-Oméga.

Long. 10 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis fuscis maculâ duplici albido flavescente geminatâ.

Loc. Larva habitat pyrum, cerasum, &c.

28. *P. bucephala.* *Bombyx buce....*

La Lunule.

Long. 11 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis tectiformibus, superioribus cinereis, fasciâ duplici ferrugineâ, & extremo circulariter palléscente, subtus omnibus flavéscentibus, fasciâ undulatâ fuscâ.

Loc. Larva habitat tiliam & ulmum.

29. *P. venosa.* *M. Zig-zag*

Le Bois veiné.

Long. 7 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis exterioribus fuscis, venis plurimis, fasciâ circulari, & marginis interioris appendice nigricantibus; inferioribus albidis limbo lineari fusco.

Loc.

30. *P. achatæa.*

La Phalène agathe.

Long. 9 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis superioribus cinereis fusco marmoratis, inferioribus cinereis.

Loc.

31. P. bi-punctata.

Le Double point.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis cinereis, limbo nigro punctato, superioribus fasciâ duplici nigro luteâ, maculâque duplici albâ puncto nigro insignitâ.

Loc.

32. P. jaspoides. *p. Syringaria*

La Phalène jaspée.

Long. 9 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis margine sinuatis, fulvo nigro fusco roseoque marmoratis, singulis subtus puncto nigro, superioribus extremo dilatato recurvis.

Loc.

33. P. glauca.

La Phalène-verdelet.

Long. 6 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis viridibus;
limbo maculâque anguli ani cinereo
fuscis.

Loc. Larva habitat ilicem

34. P. sanguinolenta.

L'Ensanglantée.

Long. 6 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis luteo
rubris, fasciâ duplici transversâ san-
guineâ.

Loc. Larva habitat acetosam.

35. P. minutella.

La Mignonette.

Long. $1 \frac{2}{3}$ lig.

P. pectinicornis elinguis cinerea, alis
ciliatis.

Loc.

* 36. P. subrubescens.

La Phalène briquetée.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis den-

tatis sanguineo fuscis, fasciis pallidioribus, interioribus angulo ani nigricante.

Loc.

37. *P. inordinata.*

La Griffonnée.

Long. $7 \frac{1}{2}$ lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis cinereis, lineis transversis nigris acute undulatis, fasciis alternatim pallidioribus.

Loc.

38. *P. obscura.*

L'Obscure.

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis nigro-fuscis, superioribus postice maculâ duplici fulvâ.

Loc.

39. *P. areolata.*

La Bordure à plaques.

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig.

P. pect. el., alis def. albis, maculâ inæquali transversâ margineque interrupto fuscis.

Loc.

* 40. P. punctata.

La Nervure picotée.

Long. 6 lig.

P. pect. el., alis def. fusco-cinereis, nervis nigro punctatis.

Loc.

41. P. zona.

La Zone.

Long. 8 lig.

P. pect. el., alis patentibus angulatis fusco-luteis, fasciâ duplici transversâ.

Loc. Larva habitat ilicem.

42. P. angulata. *P. amatoria*

L'Anguleuse.

Long. $4\frac{1}{2}$ lig.

P. pect. el., alis pat. angulatis cinereis, fasciâ duplici transversâ, punctoque obscuriore, atomis cinerascens.

Loc.

43. P. bicincta.

La Double ceinture.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. pect. el., alis pat. flavis, lineis superne
tribus, inferne duabus transversis fuscis.

Loc.

44. P. monilifera.

La Phalène à bracelets.

Long. 5 lig.

P. pect. el., alis pat. cinereo-fuscis punctis
lineisque transversis nigris, pedibus
albo nigroque intersectis.

Loc.

45. P. simplex.

La Grisonnette.

Long. 6 lig.

P. pect. el., alis pat. cinereo-pallidis,
punctis lineisque transversis nigris, pe-
dibus albidis.

Loc.

§. II.

*Linguatæ alis deflexis.*46. P. vulpinaria. *Bombus rufus**La Bordure ensanglantée.*

Long. 10 lig.

P. pectinicornis spirilinguis, alis deflexis
 pallido luteis limbo roseo, superiori-
 bus maculâ, inferioribus fasciâ du-
 plici fuscâ.

Loc.

47. P. stuticus. *Zygena statius**La Turquoise.*

Long. 6 lig.

P. pect. sp. viridi-cœrulea nitens, alis
 inferioribus fuscis.

Loc.

48. P. tristis.

*Le Phalène brune à ailes inférieures
 blanches.*

Long. 7 lig.

P. pect. sp. alis deflexis nigro fuscoque undulatis, inferioribus albis.

Loc.

49. P. domialla.

La Damerette.

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig.

P. pect. sp. triangularis, alis deflexis nigro-roseis, fasciis transversis nigricantibus.

Loc.

50. P. frontana.

Le Toupet-tanné.

Long. 5 lig.

P. pect. sp., corniculis cristatis, alis deflexis ochroleucis, lineâ duplici transversâ saturatiore.

Loc.

§. III.

Linguatæ alis planis.

51. P. lactea, *p. lactearia*

La Laiteuse.

Long. 3 lig. Larg. 7 lig.

P. pect. sp. alis patentibus rotundatis niveis, corpore flavo.

Loc.

52. P. fulvicans.

La Phalène striée fauve.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouce.

P. pect. sp., alis pat. albido-luteis, omnibus fulvo transversim dense striatis.

Loc.

53. P. cinerata.

Le Damas cendré.

Long. 4 lig. Larg. 8 lig.

P. pect. sp. alis pat. cinereis, superiorum margine exteriori maculâ triplici nigro-fuscâ.

Loc.

54. P. inæqualis.

La Bande inégale.

Long. 7 lig. Larg. 13 lig.

P. pect. sp., alis pat. cin., fusco nebulosis, lineis transversis inæqualibus.

Loc.

55. P. artriofa.

La Bande rouge.

Long. 6 lig. Larg. 13 lig.

P. pect. sp., alis pat. luteis, fasciâ transversâ rubrâ.

Loc.

56. P. marginalis.

La Bande à point marginal.

Long. 5 lig.

P. pect. sp., alis pat. cinereo-obscuris, lineâ fasciâque alarum transversâ obscuriore, puncto marginali nigro.

Loc.

57. P. picta.

La Rayure jaune picotée.

Long. 5 lig.

P. pect. sp. alis pat. flavescentibus, fasciis plurimis transversis, nonnullis connexis atomisque fuscis.

Loc.

58. P. Bandevillæa.

La Grisaille.

Long. 11, 12, 14 lig.

P. pect. sp., alis pat. cinereis, atomis
maculisque nigris.

Loc.

* 59. P. fimbriata.

La Frange pourprée.

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig.

P. pect. sp., alis pat. angulatis flavescens, fasciis tribus connexis fuscis, limboque rubro, subtus punctatis.

Loc.

* 60. P. nayas.

La grande Nayade.

Long. 6 lig.

P. pect. sp. alis pat. aqueo-viridibus, lineâ duplici transversâ albâ, antennis niveis.

Loc.

* 61. P. Malletina.

La Bordure maculée.

Long. 5 lig.

P. pect. sp. alis pat. cinereis, superiorum margine extremo maculis quatuor oblongis fuscis, limbo fusco.

Loc.

* 62. P. atomifera.

Le Damas blanc.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. pect. sp., alis pat. albis, fasciis tribus atomisque lutescentibus, oculis nigris.

Loc.

* 63. P. geminata.

La Bimaculée.

Long. 7 lig.

P. pect. sp., alis pat. cinereis fasciis transversis obscurioribus, punctisque nigris.

Loc.

* 64. P. virginalis.

La Virginal.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. pect. sp., alis pat. albis inferioribus puncto nigro.

Loc.

- * 65. *P. carthesiana.*

La Piquure.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. pect. sp., alis pat. fuscis atomis obscuris.

Loc.

- * 66. *P. nitidula.*

La Brillante.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

*P. pect. sp., alis pat. albis nitentibus ;
atomis cinereis punctoque superiorum
nigro.*

Loc.

- * 67. *P. miliata.*

La Pointillée.

Long. 3 lig.

*P. pect. sp., alis pat. cinereis , fuscis
margineque nigro punctatis.*

Loc.

68. *P. immutata.*

Les Atomes à une bande.

Long. 6 lig.

P. pect. sp., alis pat. albidis, atomis cinerascens, & fasciâ undulatâ ferrugineâ.

Loc.

FAMIL. II. *Antennis filiformibus.*

§. I.

Linguatæ alis planis.

69. P. microcosma.

La Rayure blanche picotée.

Long. 5 lig. Larg. 13 lig.

P. feticornis, spirilinguis alis patentibus cinereis, fasciis plurimis transversis nonnullis connexis, atomisque fuscis.

Loc.

70. P. clathrata. 6.00

Les Barreaux.

Long. 5 lig. Larg. 11 lig.

P. fet. sp., alis pat. fuscis, utrinque maculis albis quadranguli tessellatis.

Loc.

71. P. hortulana. p. urtica

La Queue jaune.

Long. 7 lig.

P. set. sp. alis pat. albo fuscoque nebulosis, ano flavo.

Loc. Larva habitat urticam.

72. P. glyphica. *Noctuella Gyp.*
La Doublure jaune.

Long. 6 lig.

P. set. sp., alis pat. supra fuscis pone subtusque flavescens.

Loc.

73. P. grossulariata. *bon*
La Mouchetée.

Long. 8 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ pouce.

P. set. sp., alis pat. albis, maculis inæqualibus nigris plurimis, fasciâque transversâ luteâ.

Loc. Larva habitat grossulariam.

74. P. papilionaria.
Le Celadon.

Long. 9 lig. Larg. 21 lig.

P. set. sp., alis pat. sinuatis, pallido-glau-cis, fasciâque transversâ obscuriore.

Loc. Larva habitat ilicem.

75. P. sambucaria. *bon*

La Souffrée à queue.

Long. 10 lig.

P. fet. sp. alis pat. sulphureis, lineâ duplici transversâ obscuriore, inferioribus caudatis.

Loc. Larva habitat sambucum.

76. P. luteola. *p. cratagata*

La Citronelle rouillée.

Long. 7 lig. Larg. 15 lig.

P. fet. sp., alis pat. luteis, duplici punctorum cinereorum ordine, superioribus maculis duabus & rachi croceo-ferrugineis.]

Loc.

77. P. marginata. *bon*

La Bordure entrecoupée.

Long. 6 lig. Larg. 11 lig.

P. fet. spiril., alis pat. albis, margine undique interrupte fuscis.

Loc.

78. P. panthera.

La Phalène panthère.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouce.

P. fet. spiril., alis pat. flavis, maculis
numerosis fuscis.

Loc.

79. P. atomosa.

Les Atômes à deux bandes.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 pouce.

P. fet. spiril., alis pat. albidis, atomis
cineraſcentibus, & faſciâ duplici un-
dulatâ ferrugineâ.

Loc.

* 80. P. herbacea.

L'Herbacée.

Long. 4 lig.

P. fet. spiril., alis pat. viridibus denta-
tis, lineâ duplici transversâ albâ.

Loc.

81. P. boloniensis.

*La Phalène blanche à tache &
bande noires.*

Long. 4 lig. Larg. 9 lig.

P. fet. spiril., alis pat. albis, superiori-
bus maculâ nigrâ & faſciâ duplici in
extremo undulatâ.

Loc.

2. P. interfecta.

*La Bande interrompue.*Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 8 lig.

P. fet. spiril., alis pat. niveis, omnibus pone fasciâ undulatâ fuscâ, superiorum margine externo maculis nigris.

Loc.

33. P. stratiolata. *bon**La Phalène grise à lignes brunes & point noir.*Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 9 lig.

P. fet. sp. alis pat. cinereis, fasciis linearibus fuscis, punctoque nigro.

Loc. Larva aquatica habit. stratiot. & Potomageton.

34. P. strigata.

La Phalène blanche à lignes brunes sans points.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouce.

P. fet. spiril., alis pat. albis, lineâ duplici undulatâ subfuscâ.

Loc.

85. *P. brocatella.**La Brocatelle d'or.*

Long. 5 lig. Larg. 11 lig.

P. set. spiril., alis pat. luteis, lineolis fuscis & albidis undulatis limbo dentato.

Loc. Larva habitat ilicem & ulmum.

86. *P. alabastrina.**La Brocatelle d'argent.*

Long. 5 lig. Larg. 10 lig.

P. set. spiril., alis pat. albis, lineolis fasciisque plurimis undulatis fuscis, limbo subdentato.

Loc.

87. *P. fuscata.**La Brocatelle brune.*

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis pat. cinereis, fasciis plurimis fuscis undulatis transversis, limbo subdentato.

Loc.

88. P. circulifera.

Les quatre Omicrons.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis pat. albis, singulis
fasciâ undulatâ ferratâ, & omicro albis.

Loc.

89. P. plebeia.

La Nervure brune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., alis pat. cinereis, mar-
gine exteriori fusco, punctoque ala-
rum nigro.

Loc.

90. P. virgata.

La Phalène à bandes vertes.

Long. 5 lig. Larg. 11 lig.

P. set. spiril., alis pat. viridi fuscoque
variegatis, fasciâ triplici undulatâ
obscuriore.

Loc.

91. P. alternata.

La Veinée.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., alis pat. fasciis transversis albis fuscisque alternis.

Loc.

92. P. hieroglyphica.

L'Hyéroglyphe.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis pat. dentatis cinereis, superioribus litteris duabus & margine fuscis.

Loc.

93. P. undulosa.

L'Ondoyante.

Long. 3 lig.

P. set. spiril., alis pat. albido-glaucis, fasciis arcuatis obscurioribus.

Loc.

94. P. fyrene.

La petite Nayade.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., alis pat. è viridi glaucis, fasciâ duplici albidâ.

Loc.

5. P. humeralis.

L'Humérale.

Long. 5 lig.

P. set. spiril., alis pat. albis, humeris
fasciâque transversâ nigro fulvis.

Loc.

6. P. pilofellæ.

*L'Auripeau.*Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.P. set. spiril., alis pat. flavescentibus,
fasciis inæqualibus obscuris punctoque
nigro.

Loc.

97. P. aurantiaca.

La Bande orangée.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., alis pat. flavescentibus,
fasciis aurantiis, circumflexis.

Loc.

98. P. lunularis.

La Phalène en croissant.

Long. 4 lig.

P. set. spiril. alis pat. cinereis nitentibus, superiorum puncto nigro, fasciâque marginali arcuatâ albâ.

Loc.

99. P. prolongata.

L'Apostrophe.

Long. 3. $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., alis pat. albis, superioribus puncto prolongato atro.

Loc.

100. P. asparagi.

La Damassée à points.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril. alis pat. albidis nitentibus singulis puncto nigro, fasciisque undulatis obscuris.

Loc.

101. P. cordigera.

La Ceinture brune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., alis pat. albidis, fasciis obscuris singulis puncto nigro fasciâque latâ undulatâ fuscâ.

Loc

102. P. eremitica.

La Zone blanche.

Long. 3 lig.

P. set. spiril., alis pat. nigris, maculis fasciâque transversâ arcuatâ albâ, margine alarum albido.

Loc.

103. P. albeola.

La Blanchette à points.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., alis pat. albidis, singulis punctulo nigro.

Loc.

§. II.

Linguatæ, alis deflexis.

104. P. plantaginis. *Nombyx hera*

La Phalène chinée.

Long. 11 lig.

P. set. spiril., alis deflexis, superioribus atris rivulis flavis, inferioribus rubris maculis nigris.

Loc. Larva habitat plantaginem.

105. P. jacobææ. *Howby, Jac.*

La Phalène carmin du sénéçon.

Long. 8 lig.

P. set. spiril. alis superioribus fuscis, lineâ punctisque duobus rubris, inferioribus rubris.

Loc. Larva habitat senecionem & jacobæam.

106. P. pronuba. *Noctuelle pro.*

La Phalène hibou.

Long. 1 pouce.

P. set. spiril., alis incumbentibus, exterioribus cæsis nebulosis, inferioribus luteis fasciâ atrâ marginali.

Loc. Larva habit. thlasp. & cruciferas.

107. P. altica.

La Phalène brune à tache jaune aux aîles inférieures.

Long. 5 lig.

P. set. spiril., alis deflexis, superioribus nebuloso-fuscis, inferioribus nigris, maculâ margineque luteis.

Loc.

08. P. triplicata.

La Rayure à huit lignes.

Long. 8 lig.

P. set. spiril., alis def. cinereis, fasciis transversis fuscis e triplici lineâ compositis.

Loc.

09. P. rubricollis. *Hombyx rubr.*

La Veuve.

Long. 8 lig.

P. set. spiril., alis def. nigricantibus, collari purpureo, abdomine flavo.

Loc.

10. P. leucormelas. *noctua Xanthographa*
L'Alchymiste.

Long. 10 lig.

P. set. spiril., alis def. undulato nigris, inferioribus basi albis.

Loc.

11. P. chrysitis.

Le Vert doré.

Long. 8 lig.

P. set. spiril., alis def. ferrugineo-fuscis fasciâ duplici transversâ viridi-aureâ,

Loc.

112. P. pacta. *Noctuella spouba*

La Likenée rouge.

Long. 18 lig.

P. set. spiril. alis def. superioribus cinereo fuscoque nebulosis, inferioribus rubris, fasciâ duplici transversâ nigrâ.

Loc. Larva habitat arbores.

113. P. fraxini. *n. frax.*

La Likenée bleue.

Long. 2 pouc.

P. set. spiril., alis def., superioribus cinereo fuscoque undulatis, inferioribus nigris, fasciâ transversâ coeruleâ.

Loc. Larva habitat fraxin, rarissima.

114. P. meticulosa. *Noc. met.*

La Meticuleuse.

Long. 10 lig.

P. set. spiril., alis def., margine eros-
fis, cinereo-fuscis, superioribus trian-
gulo marginali fuscescente incarnatum
includente; thorace gibbo.

Loc. Larva habit. pimprifellam, absinthium, &c.

115. P. mediata.

L'Aile brune à base fauve.

Long. 7 lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis, superio-
ribus lineis rufis, basique maculâ
fulvâ.

Loc.

116. P. fluctuans.

Le Flot.

Long. 1 pouce.

P. set. spiril., alis def. cinereo-fuscis,
superioribus fasciâ undosâ triplici,
punctoque obscuro marmoratis.

Loc.

117. P. tripartita.

*La Phalène blanchâtre à deux
bandes brunes.*

Long. 7 lig.

P. fet. spiril., alis def. albo-flavescentibus, fasciâ duplici transversâ fuscâ.

Loc.

118. P. inchoata.

La Tache marginale.

Long. 5 lig.

P. fet. spiril., alis def. albido-flavescentibus, fasciâ marginali oblongâ fuscâ.

Loc.

119. P. quatrilis.

La Phalène jaune à quatre points.

Long. 6 lig.

P. fet. spiril., alis def. flavescentibus, superioribus singulis punctis duobus fuscis.

Loc. Larva habitat ulmum,

120. P. decolorata.

La Décolorée.

Long. 7 lig.

P. fet. spiril., alis def. albido fulvis immaculatis.

Loc.

121. P. psi. *noct. psi*

Le Psi. †.

Long. 9 lig.

P. set. spiril., alis def. canis, maculis psiformibus nigris.

Loc. Larva habitat poma.

122. P. gamma. *noct. gamma*

Le Lambda.

Long. 9 lig.

P. set. spiril., alis def. exterioribus fuscis, lambda græco inscriptis.

Loc. Larva habitat acetosellam, &c.

123. P. omicron. *noct. chi*

L'Omicron nébuleux.

Long. 11 lig.

P. set. spiril., alis def., superioribus cinereo fuscoque nebulosis, lineis undulatis & omicro nigris, inferioribus cinereis.

Loc. Larva habitat ilicem, betulam, &c.

124. P. graphica. *noct. particularia*

L'Omicron géographique.

Long. 7 lig.

P. fet. spiril., alis def. superioribus fuscis, lineis undulatis & omicro albis, inferioribus cinereis.

Loc.

125. P. iota. *Noctuella absinthii*

L'Iota.

Long. 9 lig.

P. fet. spiril., alis def. albido-cinereis, lineis longis nigris.

Loc. Larva habitat absinthium, abrotanum, santolinam.

126. P. verbasci. *Noc. Ver.*

La Striée brune de verbasum.

Long. 9 lig.

P. fet. spiril., alis def., fusco-cinereis, superioribus fuscis longitudinaliter striatis.

Loc. Larva habitat verbasum, scrophulariam, amygdalum.

* 127. P. zonata.

La Double zone.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. fet. spiril., alis def. lutescentibus,
fasciâ duplici transversâ fuscâ.

Loc.

128. P. herminata.

La Phalène petit gris.

Long. 6 lig.

P. fet. spiril., alis def. fusco-nebulosis,
superioribus maculis irregularibus
albis.

Loc.

129. P. navicularis. *noctuelle pyramidee*

*La Brunette à aîles inférieures
rougeâtres.*

Long. 11 lig.

P. fet. spiril., alis def., superioribus
fuscis, lineis transversis undulatis
nigris, inferioribus ferrugineis.

Loc.

130. P. ferrata.

La Dent de scie.

Long. 8 lig.

P. set. spiril., alis subdeflexis, exterioribus cœsio purpureis, fasciis transversis undulatis, interioribus pallididis, omnibus margine serrato.

Loc. Larva habitat humum.

131. P. bimaculata.

La Double tache.

Long. 8 lig.

P. set. spiril., alis def., superioribus ferrugineo cinereis, maculâ duplici longâ rotundâque nigrâ, inferioribus albidis.

Loc.

132. P. tessellata.

La Frange bigarrée.

Long. 7 lig.

P. set. spiril., alis def. fusco-nebulosis, limbo tessellato, superioribus maculâ duplici punctoque albis.

Loc. Larva habitat linariam.

133. P. xi.

L'Ix.

Long. 6 lig.

P. set. spiril. alis def. cinereis , superioribus fasciâ decussatâ fuscâ , puncto nigro , lineisque transversis albidis.

Loc.

134. P. astroites.

La Phalène noire à une tache blanche sur chaque aîle.

Long. 6 lig.

P. set. spiril. , alis def. atris , singulis maculâ albâ.

Loc.

135. P. constellata.

La Phalène noire à deux taches blanches sur chaque aîle.

Long. 7 lig.

P. set. spiril. , alis def. nigris , singulis duabus maculis , & lineis undulatis albis.

Loc.

136. P. funebris.

La Phalène noire à lignes blanches.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., alis def. nigris, lineis punctis albis.

Loc.

137. P. bifasciata.

La Phalène brune à deux bandes blanches.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis, superioribus fasciâ duplici obliquâ albâ.

Loc.

138. P. nacarata. *Noctua Delphinii*

Le Nacarat.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., alis roseo purpureoque variegatis, superioribus maculâ duplici marginali albâ.

Loc. Larva habitat ulmum.

139. P. incarnata.

L'Incarnat.

Long. 7 lig.

P. set. spiril., alis def. roseis, superioribus fasciâ duplici limboque albidis.

Loc.

140. P. areolata. *p. palustrata*
La Plaque dorée.

P. set. spiril., alis def. nigro fuscis, maculis plurimis albido-flavescentibus.

Loc. Larva habitat brassicam.

141. P. forficalis. *crambus forficatus Fabr.*
La Bande esquissée.

Long. 6 lig.

P. set. spiril. triangularis, alis deflexis flavis, lineis duabus ferrugineis obliquis.

Loc. Larva habitat brassicam.

142. P. inversa. *p. verticalis*
La Bande à l'envers.

Long. 7 lig.

P. set. spiril. triangularis, alis def. albo-virescentibus, subtus lineis duabus transversis nigris.

Loc.

143. *P. erecta.*

La Phalène à ventre relevé.

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril. triangularis, alis superioribus fusco-purpureis, fasciâ transversâ albido-ferrugineâ, abdomen suprà protendens.

Loc.

144. *P. lemopicta.*

La Phalène quadrille.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., alis def., superioribus nigris, punctis quatuor albis, inferioribus flavis fusco marginatis.

Loc.

145. *P. virginea.*

L'Albâtre.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril. alba, oculis nigris, antennis pedibusque subflavescentibus.

Loc.

146. P. verrucosa.

Le Toupet à points.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., corniculis magnis cristatis
alis fusco-fumosis, medietate posticâ
albidior, punctis verrucosis eminen-
tibus.

Loc.

147. P. argyrata.

*La Phalène à trois bandes ar-
gentées.*

Long. 1 lig.

P. set. spiril., alis def. nigris, fasciis
tribus argenteis transversis, tertiâ
interruptâ.

Loc. Larva habitat cerefolium sylvestre.

148. P. cappata.

La Chappe brune.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., humeris latis, ferrugi-
neo-fusca, fasciis tribus transversis
saturatioribus.

Loc.

149. *P. umbratilis.*

*La Chappe à bande & tache
brune.*

Long. 4 lig.

P. set. spiril., humeris latis, aurato-
flavescens, alarum fasciâ transversâ
maculâque duplici fuscâ.

Loc.

150. *P. densata.*

La Chappe brune au sautoir.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., humeris latis, alis an-
ticè pallidis fasciâ obliquâ fuscâ,
pone fuscis fasciâ maculâque cinereis.

Loc. Larva habitat acerem.

151. *P. angulosa.*

La Chappe jaune à bande brune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., hum. latis, flava, fasciâ transversâ fuscâ.

Loc.

52. *P. nitens.*

La Chappe bronzée.

Long. 3 lig.

P. set. spiril., hum. latis, fusco-aurea, fasciâ duplici auratâ, maculâ purpureâ.

Loc.

53. *P. flavipes. pyralis viridana*

La Chappe verte.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., hum. latis, antennis flavescens, alis dilute virescentibus.

Loc. Larva habitat folia ilicis.

54. *P. nacellaris. pyr. malinaria*

La Chappe verte à bande.

Long. 9 lig.

P. set. spiril., hum. latis, alis viridibus, lineâ duplici transversâ albidâ.

Loc. Idem.

55. *P. fulvicornis.*

La Phalène verte ondée.

Long. 7 lig.

P. fet. spiril., alis def. viridibus, fasciâ duplici transversâ saturatiore.

Loc.

156. P. culiciformis. *aley rodas chadâ torni*
La Phalène culiciforme de l'éclaire.

Long. 2, 3 lig.

P. fet. planilinguis, corpore roseo alis rotundatis planiusculis niveis, singulis puncto cinereo.

Loc. Larva habitat chelidonium majus.

* 157. P. duplicata.

La Phalène à nervures noires.

Long. 7, 8 lig.

P. fet. spiril. alis def. albis inferne nervis nigris.

Loc.

* 158. P. hilaris.

La Coquette.

Long. 13 lig.

P. fet. spiril., dense villosa alis albis, maculis nigro-cœruleis conspersa.

Loc.

59. P. irregularis.

La Clair-obscur.

Long. 7 lig.

P. set. spiril., alis superioribus maculis irregularibus nigro fuscis, limbo pallido; inferioribus fuscis, macularum albidarum serie duplici transversâ.

Loc.

60. P. fuscoptera.

La Phalène à trois points.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., corpore flavo, oculis nigris, alis fuscis superioribus punctis tribus albis, inferioribus basi flavis.

Loc.

61. P. dianæa.

La Lunaire.

Long. 9 lig.

P. set. spiril., alis cinereis, margine interiore, & exteriori fuscis, interne lunulâ.

Loc.

- * 162. *P. circulata.*

Le Cerceau pointillé.

Long. 9 lig.

P. set. spiril., alis fusco-cinereis punctis nigris fasciatim dispositis, & maculâ circulari.

Loc.

- * 163. *P. hesperidea.*

L'Orangère.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., alis aurantiis, inferioribus basi fasciâque nigrâ.

Loc.

- * 164. *P. graminea.*

Le Lampas vert.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., alis viridescentibus, fasciis irregularibus albis nigro terminatis.

Loc.

- * 165. *P. usta.*

La Phalène brûlée.

Long. 1 lig.

P. fet. spiril., alis cinereo-nigris, & veluti deustis.

Loc.

66. P. millesima.

La Millerage.

Long. 7 lig.

P. fet. spiril., alis albis, nervis longitudinalibus lutescentibus densis.

Loc.

67. P. heraclitæa.

Le Funéraire.

Long. 6 lig.

P. fet. spiril. fusca, alis superioribus maculis albidis longitudinaliter & transversim positis.

Loc.

68. P. pulchella.

La Mignogne.

Long. 4 lig.

P. fet. spiril., alis def. albis, lineis undulatis nigris, maculâ triplici obscurâ, pedibus nigro intersectis.

Loc.

* 169. *P. marina.*

La Phalène ondée.

Long. 6 lig.

P. set. spiril. alis def. fuscis, fasciâ latâ transversâ, punctoque obscuriore.

Loc.

* 170. *P. chryso-pallida.*

La Damassée jaune.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis pallidis, fasciis undulatis luteis, mediâ latiore fuscâ, puncto nigro.

Loc.

* 171. *P. antrorum.*

La Damassée brune.

Long. 7 lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis, fasciis undulatis albis, subtus puncto nigro.

Loc.

72. P. nocturna.

La Nocturne.

Long. 5 lig.

P. fet. spiril., alis def. fuscis, supra lineis quatuor undulatis obscurioribus,

Loc.

73. P. mandarina.

La Mandarine.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. fet. spiril., alis def. fuscis, omnibus inferne, inferioribus supra fasciâ transversâ croceâ.

Loc.

74. P. ocularis.

L'Oculaire.

Long. 4 lig.

P. fet. spiril., alis corporis circumvolutis cinereis, albicantibus, maculâ internâ connexâ fulvâ.

Loc.

* 175. *P. pomacea.*

L'Omicron vert.

Long. 8 lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis superioribus maculâ albâ fasciis undulatis omicro viridibus inferioribus cinereis.

Loc.

* 176. *P. columbina.*

La Gorge de Pigeon.

Long. 7 lig.

P. set. spiril. alis def. albido-roseis nitentibus fasciis undulatis fuscis.

Loc.

* 177. *P. littorea.*

La Brunette à taches en bordure.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis, parte anticâ obscuriore, posticâ maculâ duplici fuscâ.

Loc.

* 178.

178. P. multicolor.

La Marbrure brune.

Long. 5 lig.

P. set. spiril., alis deflexis, superioribus fusco fulvo albidoque marmoratis, inferioribus fuscis.

Loc.

179. P. fenestralis.

Le Grillage.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis antice fasciis transversis confertis albidis.

Loc.

180. P. donzella.

La Donzelle.

P. set. spiril., capite nigro, alis def. pallidis, superioribus fasciis albis striisque lutescentibus minute marmoratis.

Loc.

181. P. pretiosa.

Le Jaspe brun.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., alis def. cinereis, fusco nigroque marmoratis nitentibus.

Loc.

* 182. P. opalæa.

L'Opale.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., alis def. cinereo-fuscis, limbo albido fasciâ latâ sinuatâ sub-cœruleâ nitente.

Loc.

* 183. P. focorum.

Le Bord enfumé.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., alis def. albidis, sub-flavescentibus margine infimo fufescente.

Loc.

* 184. P. vinosa.

La Vineuse.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis def. antice albidis, posticè rubescentibus, maculâ albicante punctoque nigro.

Loc.

185. *P. pellicea.*

L'Herminée.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

*P. set. spiril., alis def. fuscis, maculis
latis albis numerosis connexis.*

Loc.

186. *P. doliata.*

La Phalène à cerceaux jaunes.

Long. 3 lig.

*P. set. spiril., alis def. fuscis, fasciis
transversis flavis nonnullis connexis.*

Loc.

187. *P. franciscana.*

La Brunette à ceinture.

Long. 3 lig.

*P. sect. spiril. alis def. fuscis, superio-
ribus maculis aliquot obscuris, infe-
rioribus transversâ flavâ.*

Loc.

188. *P. ferruginea.*

La Rouillée.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis, superioribus maculis obscuris subferrugineis.

Loc.

* 189. P. arcuata.

La Grisette à zig-zag.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., oculis nigris, antennis fulvis, alis deflexis albidis, fasciis arcuatis nigricantibus.

Loc.

* 190. P. Kermesina.

Le Velours cramoisi.

Long. 7 lig.

P. set. spiril. alis def., superioribus rubescentibus, inferioribus rubris, puncto margineque nigris.

Loc.

* 191. P. hispana.

La Doublure brune.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril. alis def. infra fuscis, supra lineis undulatis fuscis.

Loc.

192. P. citrella.

La Jonquille.

Long. 5 lig.

P. set. spiril. alis def. flavis, areis pallidioribus.

Loc.

193. P. sinuosa.

La Sinuée.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis def. utrinque flavis, lineis undulatis fuscis.

Loc.

194. P. mediata.

La Ceinture grise.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril. alis def. fuscis, medietate posticâ cinereâ, margine fusco.

Loc.

* 195. *P. ovata.*

La Tache brune.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis def. flavescentibus,
maculâ ovatâ fuscâ.

Loc.

* 196. *P. modesta.*

La Modeste.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., alis def. albidis lineis
transversis maculâque duplici exter-
nâ oblongâ fuscis.

Loc.

* 197. *P. circumscripta.*

L'Agathe brune.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., alis def. fusco-nigrican-
tibus, alarum superiorum basi & api-
ce pallidioribus, lineâ duplici cir-
cumscriptis.

Loc.

* 198. *P. auriculata.*

La Phalène à panaches.

Long. $6 \frac{1}{2}$ lig.

P. fet. spiril., alis def. subrubescens
tibus, fasciâ transversâ lutescente,
margine alarum externo inter-
fecto.

Loc.

199. *P. rosacea.*

La Chappe couleur de rose.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig.

P. fet. spiril., humeris latis, alis ro-
seis, maculâ externâ margineque
flavis.

Loc.

200. *P. anglica.*

La Chappe grise.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig.

P. sect. spiril. humeris latis, cinerea;
penicillis plurimis alarum elevatis.

Loc.

* 201. P. bidella.

La Chappe bedeaude.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., humeris latis, alis antice
albis, postice fulvis.

Loc.

LXXIV. TINEA. LA TEIGNE.

Antennæ filiformes à basi ad apicem
decrecentes.

Frons prominula.

Larva involucro testâ.

Chrysalis in involucro larvæ.

1. T. hirondinella.

*La Teigne à queue d'hirondelle.*Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.T. corniculis duobus subulatis recurvis,
cinerea, alis maculâ fuscâ.

Loc.

2. T. radiata.

La Teigne à bandes rayonnées.

Long. 5 lig.

T. corniculis duobus subulatis, alis flavescens nitidis, striarum albidarum ordine duplici transverso.

Loc.

3. T. corniculata.

La Teigne à rayure d'argent.

Long. 4 lig.

T. cinerea, corniculis duobus cristatis, fasciâ alarum longitudinali argenteâ.

Loc.

4. T. evonymella. *bow*

La Teigne blanche à points noirs.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis superioribus albis punctis nigris inferioribus fuscis.

Loc. Larva socialis habitat folia pomorum.

5. T. arlequinetta.

L'Arlequinette jaune.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis flavis fasciis maculisque nigris.

Loc.

6. *T. pellionella*. *b_{na}**La Teigne commune.*

Long. 2 lig.

T. plumbæa nitida, puncto nigro in medio alarum.*Loc.* Larva habitat vestes laneas.7. *T. plumbæa*.*La Teigne plombée nébuleuse.*

Long. 2 lig.

T. atro-plumbea, alis superioribus fusce nebulosis.*Loc.*8. *T. melanopis*.*La Teigne blanche.*Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.*T. tota alba oculis nigris.**Loc.*9. *T. marginatella*.*La Teigne à bordure de points.*Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.*T. cinerea*, alarum margine inferiore punctis nigris.*Loc.*

10. T. crucifera.

La Teigne à croix de S. André.

Long. $2 \frac{3}{4}$ lig.

T. aurata, alis superioribus cruce decussatâ fusco rubrâ.

Loc.

11. T. granella.

La Teigne brune à tête blanchâtre.

Long. $3 \frac{2}{3}$ lig.

T. tota fusco-nebulosa, capite albido.

Loc. Larva habitat domos.

12. T. equestris.

La Teigne à croix de Chevalier.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig.

T. fusca, cruce dorsi decussatâ albâ.

Loc.

13. T. tapetzella. *pyralis trapezana*

La Teigne bedeaude à tête blanche.

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig.

T. nigra capite niveo, alis pone albidis.

Loc. Larva lanam, pennas avium devorat, musæis infesta.

14. T. bidella. *pyralis trapurana**La Teigne bedeaude à tête brune.*

Long. 4 lig.

T. fusca capite fusco, alis pone albidis.

Loc.

15. T. bicolorata.

La Teigne bedeaude à trois triangles.

T. nigra, alis ponè albidis, maculâ triplici triangulari nigrâ.

Loc. Larva habitat glandes.

16. T. quadratella. *pyralis dorjella**La Teigne à quarrure.*Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis nigris, superioribus maculâ quadratâ albâ ex quatuor lineolis albis transversis compositâ.

Loc. Larva habitat sylvas.

17. T. inversella.

*La Teigne à quadrille.*Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, alis antice albidis, maculis quatuor nigris; pone nigris, maculis duabus albis.

Loc.

18. T. monilifera.

La Teigne à deux rangs de points blancs.

Long. $1 \frac{1}{4}$ lig.

T. alis atris, punctorum alborum lineâ duplici transversâ.

Loc.

19. T. nebulosella.

La Teigne marbrée à plaques brunes.

Long. $2 \frac{1}{3}$ lig.

T. cinerea, alarum maculis nigro-nebulosis.

Loc. Larva habitat domos.

20. T. undulatella.

La Teigne à quatre bandes brunes ondulées.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig.

T. alis delute cinereis, fasciis tribus fuscis transversis undulatis.

Loc.

21. T. circumvoluta.

Le Manteau à points.

Long. 8 lig.

T. alis argenteis, corpori circumvolutis fasciâ duplici transversâ punctorum nigrorum.

Loc.

22. T. ochrocephala.

Le Manteau à tête jaune.

Long. 7 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

T. alis albis corpori circumvolutis, capite collarique flavis.

Loc.

23. T. viridella.

Le Manteau à bandes verdâtres.

Long. $6 \frac{1}{2}$ lig.

T. alis corpori circumvolutis albido-roseis, fasciis tribus obscure virescentibus.

Loc.

24. T. crocella.

Le Manteau jaune.

Long. 7 lig.

T. alis corpori circumvolutis croceis,
oculis pedibusque nigris.

Loc.

25. T. rosella.

Le Manteau couleur de rose.

Long. 7 lig.

T. alis corpori circumvolutis abescenti-
bus margine roseo.

Loc.

26. T. rhomboidella.

Le Lozange cendré.

Long. 3 lig.

T. fusco-cinerea, alarum maculâ rhom-
boideâ albidâ oblongâ.

Loc.

27. T. nervosa.

La Teigne à nervures.

Long. 5 lig.

T. alis cinereis, superioribus nitentibus
nervis multifidis fuscis.

Loc.

28. T. Reaumurella. *alvata* R.

La Teigne noire bronzée.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, alis exterioribus deauratis,
antennis corpore duplo longioribus.

Loc. Larva habitat arbores.

29. T. de Geerella. *alvata* Deg.

La Coquille d'or.

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, alis superioribus lineis longitudinalibus, fasciâ latâ transversâ infernèque radiis plurimis, antennis corpore triplo longioribus.

Loc. Larva habitat salicem.

30. T. intermediata.

L'Entre-ligne.

Long. 5 lig.

T. alis flavescentibus, lineis duabus &

maculâ intermediâ fuscis in extremo superiorum.

Loc.

31. T. bimaculosa.

La Teigne à deux taches jaunes en bordure.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. fusco-rubra, alarum superiorum margine exteriori maculis duabus flavis.

Loc.

32. T. funigera. *T. podella*

La Teigne Cordelière.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, fasciâ transversâ albâ.

Loc.

33. T. mays.

La Teigne à deux taches blanches en bande.

Long. 3 lig.

T. fusco-rubra, alis superioribus maculis duabus croceis transversim positis.

Loc. Larva habitat semina mays.

34. T. marmorella.

La Teigne à marbrure.

Long. 5 lig.

T. nigro-fusca, rivulis flavescentibus marmorata.

Loc.

34. T. xilostella.

La Teigne à bandelette blanche.

Long. 3 lig.

T. cinerea, dorso vittâ longitudinali albâ.

Loc.

36. T. trifasciata.

La Teigne grise à trois sautoirs bruns.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. cinerea, alarum fasciâ triplici obliquâ undulatâ fuscâ.

Loc.

37. T. thoracica.

La Teigne à corcelet rayé.

Long. 4 lig.

T. capite thoraceque flavo lineis longitudinalibus fuscis, alis albo-flavescentibus, fasciis transversis fuscis.

Loc.

38. T. intermittens.

La Teigne à bande interrompue.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig.

T. albo flavescent, fasciis duabus obliquis ferrugineis, posteriore interruptâ.

Loc.

36. T. ternatella.

La Teigne à triangle marginal.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig.

T. alba margine alarum exteriori maculis tribus fuscis, triangulum referentibus.

Loc.

40. T. quinnata.

La Teigne blanche à cinq bandes brunes.

Long. $1 \frac{2}{3}$ lig.

T. alba, alis superioribus lineis quinque transversis fuscis.

Loc. Larva habitat sepes.

41. T. herminata.

La Teigne à bordure herminée.

Long. 2 lig.

T. fusca, lineâ duplici transversâ flavâ, margine alarum undique flavo intersecto.

Loc. Larva habitat lichenem scriptum.

42. T. annulifera.

La Teigne à bande dorée & anneau blanc aux antennes.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig.

T. alis superioribus nigris, fasciâ longitudinali maculisque duabus aureis, antennis medio albis.

Loc.

43. T. Merianella. bon

La Teigne dorée à bandes d'argent.

Long. 1 lig.

T. nigro-aurata, lineis argenteis transversis tribus antennis extremo albis.

Varietas A. T. Wilkella.

Long. $1 \frac{3}{4}$ lig.

T. nigro-aurata, lineis argenteis transversis quatuor, antennis nigris.

Loc. Habitat folia ulmi.

44. T. Malletella.

La Teigne dorée à bande & toupet jaunes.

Long. $2 \frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, alis exterioribus deauratis, capitis vertice alarumque fasciâ transversâ flavis.

Loc.

45. T. Linnæanella.

La Teigne dorée à quatre points d'argent.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig.

T. flavo-aurata, punctis quatuor argenteis, antennarumque apice albo.

Loc.

46. *T. plumbæa.**La Teigne crayonnée.*Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.*T. crocea*, lineis transversis fusco-argenteis interruptis, alarum medio maculâ albâ punctisque plumbeis.*Loc.*47. *T. mucosa.**La Teigne moisie.*

Long. 4 lig.

T. albida, lineis longitudinalibus reticulatis fuscis, involucro villosa - abescente.*Loc.* Larva habitat gramen.48. *T. pedifera.**La Teigne à fourreau en crosse.*

Long. 4 lig.

T. alis cinereis, lineis albis fasciâque longitudinali fuscâ, involucro fusco pediformi.*Loc.* Larva habitat ilicem.

9. T. lamellifera.

La Teigne à fourreau à deux lames.

Long. 3 lig.

T. nigro-cinerea, involucro fusco recurvo lamina duplici foliosâ tectâ.

Loc. Larva habitat folia arborum.

10. T. palearis. ^{Bombus} ~~T.~~ *visciella*.

La Teigne à fourreau de paille simple.

T. involucro palearum ordine unico tecto.

Loc. Idem.

11. T. fasciculifera.

La Teigne à fourreau de paille composé.

T. involucro palearum longitudinalium ordine multiplici composito.

Loc. Larva habitat herbam pratorum.

12. T. graminifera.

La Teigne à fourreau de pailles transverses.

T. involucro ex paleis transversis composito.

Loc. Larva habitat herbam pratorum.

53. T. lichenosa.

La Teigne des pierres à fourreau rond en capuchon.

T. lapidum, involucro conico recurvo.

Loc. Larva habitat lichenem parietinum.

54. T. lapidosa.

La Teigne des pierres à fourreau triangulaire à pans.

T. lapidum, involucro triangulari.

Loc. Idem.

* 55. T. cincta.

La Teigne d'or à anneaux.

Long. 4 lig.

T. fusca, alis superioribus flavis; punctis margine externo, circuloque infra croceis.

Loc.

- * 56. T. punctulata.

La Teigne à points noirs.

Long. 3 lig.

T. cinerea, alis superioribus punctorum
nigrorum tribus paribus.

Loc.

- * 57. T. atratella.

La Teigne jaune.

Long. 2 lig.

T. tota atra.

Loc.

- * 58. T. virgata.

La Teigne à bande noire.

Long. 2 lig.

T. fusco-cinerea, fasciâ transversâ pilis-
que flavo-aureis.

Loc.

59. T. vittata.

La Teigne à ceinture blanche.

Long. 2 lig.

T. nigro-fusca, fasciâ transversâ albâ.

Loc.

- * 60. T. signatella.

La Teigne brochée d'or.

Long. 3 lig.

T. alba, signaturis fulvis aureisque marmorata, margine alarum externo albo intersecto.

Loc.

- * 61. T. lucidula.

La Mine de plomb.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. fulva, fusco lineisque plumbeis marmorata punctis plumbeis.

Loc.

- * 62. T. radiatella.

Le Manteau rayone.

Long. 5 lig.

T. fusca, alis corpori circumvolutis fuscis, fasciis longitudinalibus radiatis albis.

Loc.

- * 63. T. scapulata.

La Teigne à mantelet.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. cinerascens, fasciis transversis fuscis, capite collarique albo, oculis nigris.

Loc.

64. T. turcica.

L'Ottomane.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, alarum basi maculâ duplici lunulari albâ.

Loc.

65. T. crassicornis.

La Teigne à grosses antennes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, antennis crassis, alarum basi, fasciâque transversâ luteâ.

Loc.

66. T. purpuratella.

La Purpurine.

Long. 4 lig.

T. nigro-violacea, alis antice flavis postice maculâ marginali flavâ, lineis cœruleis nitentibus, pedibus annulis albis.

Loc.

- * 67. T. cinerata.

Le Manteau cendré.

Long. 4 lig.

T. alis corpori circumvolutis albidis ,
margine cinereo.

Loc.

- * 68. T. antennulata.

La Lozange jaune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. atra, alarum basi maculâ longitudinali,
margine externo puncto medio, ma-
culâ rhomboidæâ flavis, antennis medio
albis.

Loc.

- * 69. T. citrinella.

La Citrine.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis superioribus flavis, maculis ali-
quot aurantiis.

Loc.

- * 70. T. pallidula.

La Paillette.

Long. 4 lig.

T. corpore fusco, oculis nigris, alis pallido-flavis.

Loc.

71. T. tan.

Le Tan.

Long. 4 lig.

T. cinereo fuscoque marmorata, alarum apice lineâ albâ acutè circumflexâ.

Loc.

72. T. argentinetta.

La Teigne brochée d'argent.

Long. 3 $\frac{1}{3}$ lig.

T. fusco-violacea, lineis punctisque argenteo-violaceis.

Loc.

73. T. stellata.

La Tache de neige.

Long. 3 lig.

T. crocea subviolacea, margine externo maculâ albidissimâ.

Loc.

* 74. *T. aurantiaca.**La Teigne orangée.*Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. corniculis duobus cristatis nigro-cœrulea, alarum parte superiore maculisque duabus flavis.

Lec.

SECTIO QUARTA
CLASSIS INSECTORUM.

Insecta tetraptera alis nudis.

ARTICULUS PRIMUS.

Tarforum articuli tres.

LXXV. LIBELLULA. LA DEMOI-

le Geometre divisé en 3 par Fabr. SELLE.
il est conservé par Olivier.

Antennæ brevissimæ.

Os maxillosum.

Cauda masculis forcipata.

Ocelli tres ante aut inter oculos.

FAMILIA I. *Alis erectis.*

agrien Fabr.

1. L. ludovicea.

agrien Virgo Fabr.

La Louise.

Long. 21 lig.

L. corpore viridi cœruleo nitido, alis medio cœrulescentibus, basi & apice albidis margine immaculato.

Loc. Habitat prata & stagnorum ripas.

2. **L. virgo.**

Var. de l'aigron Virgo
fabr.

L'Ulrique.

Long. 20 lig.

L. corpore viridi sericeo, alis subfuscis puncto marginali albo.

Loc. Idem.

3. **L. puella.**

Var. de l'aigron puella
fabr.

L'Amélie.

Long. 14 lig.

L. corpore cœruleo cinereoque alterno, alis puncto marginali nigro.

Loc. Idem.

4. **L. dorothea.**

Var. de l'aigron puella
fabr.

La Dorothee.

Long. 14 lig.

L. corpore infra cœruleo-viridi supra fusco, thorace fasciis fuscis cœrulescentibusque alternis, puncto alarum marginali nigro.

Varietas A. L. corpore infra fulvo,
supra nigro, thorace fulvo
fuscoque variegato, puncto
alarum marginali fusco.

Loc. Habitat prata & stagnorum ripas.

5. L. sophia.

Var. de l'agrieu puelle

La Sophie.

Long. 16 lig.

L. corpore viridi pallide incarnato, tho-
race fasciis tribus longitudinalibus ni-
gris, alis puncto marginali fusco.

Loc. Idem.

6. L. adelaïs.

L'Adélaïde.

Long. 17 lig.

L. corpore viridi sericeo, alis albis,
puncto marginali.

Loc. Idem.

FAMILIA II. *Alis patentibus.*

7. L. quadrimaculata.

bon

La Française.

Long. 19 lig.

L. alis maculâ duplici marginali.

Loc. Id. rarissima.

8. L. flaveola.

bon

L'Eléonore.

Lib. depressa fabr.

Swit. latz. +

Long. 16 lig.

L. alis albis, basi luteis abdomine lutescente.

Loc. Habitat amnium ripas.

9. L. philintha.

Var. in Lib. depressa +

Swit. latz.

La Philinthe.

L. alis albis, basi luteis; abdomine supra pulvere cinereo - cœrulescente confuso.

Loc. Idem.

10. L. sylvia.

Lib. Tr. dit que c'est en 1785

Le d. Depressa fabr. +

La Sylvie.

Long. 2 pouces.

L. thorace viridi nitido, lineis flavis; alis albis abdomine nigro cœrulescente

Loc. Idem.

11. L. *Ænea*. *bou**L' Aminthe.*

Long. 18 lig.

L. viridi-inaurata, alis pallidis, pedibus nigris.

Loc. Habitat amnium ripas.

12. L. vulgatissima. *bou**La Justine.*

Long. 17 lig.

L. lateribus flava, alis albis.

Loc. Idem.

13. L. grandis. *Aeshna Grandis fabr.**La Julie.*

Long. 28 lig.

L. fulva alis flavescentibus, thoracis lateribus lineis duabus flavis, fronte flavescente, caudâ diphyllâ.

Loc. Idem.

14. L. forcipata. *Aeshna forcipata fabr.**La Caroline.*

Long. 23 lig.

L. thorace luteo virescente lineis nigris,
abdomine nigricante caracteribus flavis.

Loc. Habitat amnium ripas.

15. L. cecilia.

La Cécile.

L. thorace virescente abdomine fusco
caracteribus flavis.

Loc. Idem.

16. L. victoria.

La Victoire.

Long. 15 lig.

L. corpore flavo, abdomine cylindrico,
alarum basi flavicante.

Loc. Idem.

LXXVI. PERLA. *LA PERLE.*

Antennæ filiformes.

Alæ incumbentes, cruciatae æquales.

Os tentaculis quatuor.

Cauda bifida.

Ocelli tres.

1. P. bicaudata. *b. simili bic. Fabr.*
La Perle brune à raies jaunes.

Long. 8 lig.

P. fusca, capite thoraceque lineâ longitudinali flavâ alis fusco reticulatis.

Loc. Habitat amnium ripas.

2. P. flavipes.
La Perle brune à pattes jaunes.

P. fusca, abdominis lateribus pedibusque pallido flavis, alis fusco-venosis.

Loc. Idem.

3. P. nebulosa.
La Perle brune à aîles pâles.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. nigro-fusca, alis subcinereis pallidis, caudæ fetis truncatis.

Loc. Idem.

4. P. flava.
La Perle jaune.

Long. 2 lig.

P. flava, alis albis oculis nigris.

Loc. Idem.

ARTICULUS SECUNDUS.

Tarforum articuli quatuor.

LXXVII. RAPHIDIA. *LA RAFIDIE.*

Antennæ filiformes.

Alæ incumbentes.

Os tentaculis quatuor.

Cauda nauda.

Ocelli tres.

1. R. ophiopsis.

*La Rafidie.*Long. 6^l lig.

Raphidia.

Loc. Habitat sylvas, rara.

ARTICULUS TERTIUS.

Tarforum articuli quinque.

LXXVIII. EPHEMERA. *L'EPHÉ-
MÈRE.*

Antennæ brevissimæ.

Alæ inferiores multo breviores.

Cauda setosa.

Ocelli tres magni ante oculos.

1. E. vulgata. *bou*

*L'Ephémère à trois filets & aîles
tachetées.*

Long. 8 , 9 lig.

E. alis nebuloso-maculatis, caudâ tri-
setâ.

Loc. Habitat rivulorum ripas.

2. E. reticulata. *E. lutea*

*L'Ephémère à trois filets & aîles
réticulées.*

Long. 5 lig.

E. lutea, alis albis reticulatis, caudâ
trisetâ.

Loc. Idem.

3. E. viridescens. *E. marginata*

*L'Ephémère à trois filets & aîles
brunes.*

E. luteo-fusca, alis fusco-viridibus, caudâ
trisetâ.

Loc. Idem.

4. E. nigra. *E. Vespertina*

L'Ephémère noire à trois filets.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

E. nigra, caudâ trifetâ.

Loc.

5. E. lutea. *E. bioculata*

L'Ephémère jaune à deux filets
& aîles réticulées.

Long. 4 lig.

E. lutea, alis albis reticulatis, caudâ
bisetâ.

Loc.

6. E. culiciformis. *bon*

L'Ephémère à deux filets & aîles
blanches.

Long. 2 lig.

E. fusca, caudâ bisetâ, alis albis.

Loc.

7. E. bioculata. *E. striata*

L'Ephémère à deux filets & aîles
brunes.

E. thorace fusco, abdomine albo, caudâ bisetâ, alis fuscis striatis.

Loc. Habitat aquatica prata.

B. E. horaria. *bon*

L'Ephémère à deux filets & ailes marginées.

Long. 3 lig.

E. alis albis, margine crassiore, nigricantibus, caudâ bisetâ.

Loc. Habitat domos.

XXIX. PHRYGANEA. LA FRIGANE.

Antennæ filiformes.

Alæ laterales, tectiformes, pone affurgentes.

Os tentaculis quatuor.

Cauda nuda.

Ocelli tres.

H. P. striata.

La Frigane de couleur fauve.

Long. 11 lig.

P. alis testaceis, nervoso-striatis.

Loc. Habitat amnium ripas.

2. *P. rhombica.**La Frigane panachée.*

Long. 7 lig.

*P. alis deflexo compressis flavescentibus
maculâ rhombeâ laterali albâ.**Loc. Habitat amnium ripas.*3. *P. vulgata.**La Frigane brune à aîles fauves.*

Larg. 5 lig.

*P. nigro-fusca, alis pedibusque testaceis.**Loc. Idem.*4. *P. plumbea.**La Frigane plombée à aîles fauves.*Long. $4 \frac{1}{2}$ lig.*P. atra, alis plumbeis pedibus fulvis.**Loc. Idem.*5. *P. interfecta.**La Frigane à antennes panachées.*Long. $4 \frac{1}{2}$ lig.*P. cinereo-fusca, futurâ alarum maculâ
albâ, antennis albo fuscoque inter-
sectis corpore duplo longioribus.**Loc. Idem.*

6. *P. maculata.*

La Frigane à aîles tachetées & courtes antennes.

Long. 4 lig.

P. alis superioribus nebulosis, antennis longitudine corporis.

Loc. Habitat amnium ripas.

7. *P. longicornis.*

La Frigane à aîles tachetées & longues antennes.

Long. 3, 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. alis superioribus nebulosis nigro-punctatis, antennis corpore triplo longioribus.

Loc. Idem.

8. *P. venosa.*

La Frigane noire à aîles pâles & veinées.

Long. 5 lig.

P. atra, pedibus albis, alis pallidis venosis.

Loc. Idem.

9. *P. viridis.**La Frigane verte.*Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.*P. viridis*, oculis nigris, alis niveis.

Loc. Habitat amnium ripas.

10. *P. sex-punctata.**La Frigane à ailes ponctuées.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.*P. fusca*, alis albis fusco maculatis.

Loc. Idem.

11. *P. funerea.**La Frigane mouche en deuil.*Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.*P. tota atra*, corpore rotundiore, antennis corpore brevioribus.

Loc. Idem.

12. *P. musciformis.**La Frigane-mouche de couleur pâle.*

P. fusca, corpore rotundiore, antennis corpore brevioribus, alis pallidis venosis.

Loc. Habitat amnium ripas.

3. P. variegata.

La Frigane marbrée à pattes panachées.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

P. nigro-fusca, maculis cinereis, pedibus nigro cinereoque intersectis,

Loc. Idem.

14. P. lugubris.

La Frigane enfumée.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. tota atra, alis fuscis, venis nigris,

Loc. Idem.

15. P. nervosa.

La Frigane à nervures.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

P. pallida, alis albis, nervis fusco punctatis,

Loc. Idem.

16. *P. atra.**La Frigane savoyarde.*Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.*P. tota atra oblonga, alis nigris.**Loc. Habitat annuum ripas.*17. *P. gallata.**La Frigane demi-deuil.*Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*P. nigra, fasciâ duplici albâ interruptâ,
antennis albo intersectis.**Loc. Idem.*LXXX. HEMEROBIUS. *L'HÉME-
ROBE.*

Antennæ filiformes.

Alæ sæpe æquales.

Os prominens tentaculis quatuor.

Cauda nuda.

Ocelli nulli.

1. *H. perla.**Le Lion des puccrons.*

Long. 6 lig.

H. luteo-viridis, alis aqueis vasis viridibus.

Loc. Habitat arbores, rosam.

2. H. chrysops.

L'Hémérobe à ailes ponctuées.

Long. 3 lig.

H. luteus, alis aqueis, vasis fusco punctatis.

Loc. Habitat hortos.

3. H. flavilater.

L'Hémérobe aquatique.

Long. 7 lig.

H. ater, alis fuscis nigro-reticulatis, margine exteriori dilatato.

Loc. Habitat rivulorum ripas.

XXXI. FORMICALEO. LE FOURMILION.

Antennæ breves, clavatæ, crassæ.

Alæ æquales.

Os prominens tentaculis quatuor.

Cauda nuda.

Ocelli nulli.

I. F. nostras.

Le Fourmilion.

Long. 12 lig.

Loc. Habitat arenam.

LXXXII. PANORPA. LA MOUCHE
SCORPION

Antennæ longæ filiformes.

Alæ æquales.

Rostrum corneum cylindraceum.

Cauda chelifera forcibus armata.

Ocelli tres.

I. P. communis.

La Mouche-Scorpion.

Long. 7, 8 lig.

Loc. Habitat prata ad amnes.

LXXXIII. CRABRO. *LE FRÉLON.*

Antennæ clavatæ.

Alæ inferiores breviores.

Os maxillosum.

Aculeus ani dentatus.

Abdomen ubique æquale thoraci con-
natum.

Ocelli tres.

1. *C. humeralis.*

Le Frélon à épaulettes.

Long. 10 lig. Larg. 3 lig.

C. niger, subhirsutus, fronte, thorace
superne, abdomineque flavis, seg-
mento 1^o, 2^o & 4^o ex parte nigris.

Loc.

2. *C. maculatus.*

*Le Frélon à échancrure & ventre
jaune.*

Long. 10 lig. Larg. 3 lig.

C. niger, abdomine flavo, segmentis tri-
bus superioribus nigris maculis flavis.

Loc.

3. *C. lunulatus.*

Le Frélon noir à échancrure.

Long. 1 pouc. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

C. totus niger, abdominis segmento primo ovatim margine inciso lunula flavâ.

Loc.

- * 4. *C. annulatus.*

Le Frélon à anneau noir.

Long. 10 lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

C. ferrugineus, thorace superne abdominisque segmento primo nigris.

Loc.

LXXXIV. UROCERUS. L'UROCERE

Antennæ filiformes.

Alæ inferiores breviores.

Os maxillosum.

Aculeus ani dentatus prominens corniculo tectus.

Abdomen ubique æquale thoraci cornatum.

Ocelli tres.

i. U. gigas.

L'Urocère.

Long. 13 lig. Larg. 3 lig.

Loc.

LXXXV. TENTHREDO. LA MOU-
CHE-A-SCIE.

Antennæ filiformes.

Alæ inferiores breviores.

Os maxillosum.

Aculeus ani dentatus non promi-
nens.

Abdomen ubique æquale thoraci con-
natum.

Ocelli tres.

FAMIL. I. *Antennis novem-nodiis.*

i. T. hebraica.

La Lettre hébraïque verte.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

R ij

T. viridis, capite thoraceque supra caracteribus nigris.

Loc. Habitat flores.

2. T. crocea.

La Mouche-à-scie safranée.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. crocea, antennis oculisque nigris.

Loc. Habitat flores.

3. T. melanocephala.

La Mouche-à-scie safranée à tête noire.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. crocea, capite, pedibus, thoracisque apice nigris.

Loc. Idem.

4. T. rosæ.

La Mouche-à-scie du rosier.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. crocea, capite thorace supra, alarumque margine exteriori nigris.

Loc. Habitat rosam.

5. T. ochroptera.

La Mouche-à-scie noire à ailes jaunes.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

T. nigro - cœrulescens , pedibus , tibiis
alisque exterioribus croceis , maculâ
marginali fuscâ.

Loc.

6. T. maculata.

*La Mouche-à-scie noire , à ventre
jaune noir en haut & en bas.*

Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

T. nigra , thorace maculis flavis , abdo-
mine luteo basi & apice nigro , pedi-
bus variegatis.

Loc.

7. T. unifasciata.

*La Mouche-à-scie à une bande
jaune.*

Long. $5 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, thoracis apice flavo, segmentis abdominalibus quarto & quinto luteis.

Loc.

8. T. punctata.

La Mouche-à-scie noire marquée de jaune sur le premier & dernier anneau du ventre.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigro-cœrulea, alis pedibusque flavis, segmentis abdominalibus primo & ultimo maculâ luteâ.

Loc.

9. T. bifasciata.

La Mouche-à-scie à deux bandes jaunes.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, segmentis abdominalibus primo & quinto luteis.

Loc. Habitat plantas umbelliferas.

10. T. trifasciata.

La Mouche-à-scie à trois bandes jaunes.

Larg. $4 \frac{2}{3}$ lig. Long. 1 lig.

T. nigra, pedibus abdominisque segmentis primo, quinto, sexto & ultimo margine flavis.

Loc.

11. T. rustica.

La Mouche-à-scie à quatre bandes jaunes.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, segmentorum abdominalium marginibus, excepto secundo, tertio & sexto, flavis, pedibus ferrugineis.

Loc. Habitat salicem.

12. T. virgata.

La Mouche-à-scie à deux bandes noires sur le ventre.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, pedibus segmentorumque abdominalium marginibus, excepto secundo, tertio & quinto, flavis.

Loc.

13. T. scrophulariæ.

La Mouche-à-scie de la scrofulaire.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, segmentorum abdominalium marginibus, excepto secundo & tertio, flavis.

Loc. Habitat scrophulariam.

14. T. multi-fasciata.

La Mouche-à-scie à ventre rayé.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, segmentorum abdominalium omnibus flavis.

Loc.

15. T. cordata.

La Mouche-à-scie porte-cœur.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis apice maculis albis, pedibus anticis abdominisque posticâ parte ferrugineis.

Loc.

16. T. bimaculata.

La Mouche-à-scie à deux taches blanches au corcelet.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, thoracis apice maculis albis,
pedibus anticis abdominisque medio
ferrugineis.

Loc.

7. T. stellata.

*La Mouche-à-scie noire à ventre
bordé de taches jaunes.*

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis apice maculâ flavâ,
segmentis abdominalibus utrinque ma-
culis luteis.

Loc.

8. T. labiata.

*La Mouche-à-scie noire à pattes
& corcelet variés de jaune.*

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis maculis tribus abdo-
minisque apice flavis, pedibus flavo
nigroque variis.

Loc.

19. T. multicolor.

La Mouche-à-scie noire à pattes rouges & bandes du ventre fauves.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis abdominisque apice maculis flavis, abdominis medio fulvo, pedibus rubris.

Loc.

20. T. falicis.

La Bedeade du saule.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. flava, capite thoraceque supra nigro.

Loc. Habitat falicem.

21. T. litterata.

La Mouche-à-scie à ventre & pattes fauves & corcelet panaché.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. capite thoraceque nigro caracteribus flavis, pedibus abdomineque ferrugineis.

Loc.

22. T. albicornis.

La Mouche-à-scie à antennes blanches au bout.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, antennarum apice albo, abdominis basi maculâ utrinque albâ, apice fulvo.

Loc.

23. T. albipes.

La Mouche-à-scie noire à pattes argentées.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra pedibus albo variegatis.

Loc.

24. T. ligustrina.

La Mouche-à-scie à pattes argentées & milieu du ventre fauve.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

T. nigra, femoribus maculis albis, abdominis medio ferrugineis.

Loc.

25. T. atra.

La Mouche-à-scie noire à pattes fauves.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, pedibus ferrugineis.

Loc.

26. T. flavipes.

*La Mouche-à-scie noire à pattes jaunes & milieu du ventre fauve.*Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, pedibus flavis, abdominis medio ferrugineis.

Loc.

27. T. rufipes.

*La Mouche-à-scie noire, à pattes & milieu du ventre fauves.*Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, pedibus abdominisque medio ferrugineis.

Loc.

28. T. dumetorum.

La Mouche-à-scie noire, à points de devant jaunes & milieu du ventre fauve.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, pedibus quatuor anticis flavis, femoribus posticis abdominisque medio ferrugineis.

Loc.

29. T. annulata.

La Mouche-à-scie noire, avec le milieu du ventre fauve.

Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, abdominis medio ferrugineo.

Loc.

30. T. cœrulefcens.

La Mouche-à-scie noire bleuâtre.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

T. tota nigro-cœrulea, alis nigricantibus, margine exteriori nigro.

Loc.

31. *T. geniculata.**La Mouche-à-scie noire à genoux
fauves.*Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.*T. nigra, geniculis ferrugineis.**Loc.*32. *T. cerasi.**La Mouche-à-scie noire à pattes
jaunes.*Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.*T. nigra, pedibus flavis.**Loc.*33. *T. pectinicornis.**La Mouche-à-scie noire, à anten-
nes pectinées.*Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*T. nigra, antennis uno versu pectinatis,
tibiis tarsisque flavis.**Loc.*34. *T. cordigera.**La Mouche-à-scie cordelière.*

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, segmento abdominali quinto albo, pedibus pallidis, genubus albis.

Loc.

35. T. Astroites.

L'Etoile d'or.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, humeris, thoracis apice, tibiisque luteis.

Loc.

36. T. palmata.

La Mouche-à-scie aux pieds blancs.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, humeris thoracisque apice flavis, pedibus abdominisque medio ferrugineis, palmis posticis albis.

Loc.

37. T. perlata.

La Mouche-à-scie perlée.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, thoracis apice flavo, pedibus abdominisque medio ferrugineis, palmis posticis albo maculatis.

Loc.

38. *T. apicaris.**La Mouche-à-scie fauve à point
jaune.*

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

*T. ferruginea, thoracis apice flavo, oculis nigris.**Loc.*39. *T. thoracica.**La Mouche-à-scie à pattes fauves
& taches blanches.*Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.*T. nigra, thoracis apice maculis albis,
pedibus ferrugineis.**Loc.*FAMILIA II. *Antennis undecim-
nodiis.*40. *T. vernalis.**La Mouche-à-scie noire à corcelet
rouge.*Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.*T. nigra, thorace rubro.**Loc.*

1. *T. viridescens.*

*La Mouche-à-scie noire à ventre
bordé de vert.*

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

*T. nigra, pedibus, lateribus thoracis
abdominisque viridescentibus.*

Loc.

FAMIL. III. *Antennis octodecim-nodiis.*

2. *T. cynosbati.*

La Mouche-à-scie à jambes variées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

*T. nigra, pedibus ferrugineis, tibiis pos-
ticis albo nigroque annulatis.*

Loc.

3. *T. rubi.*

*La Mouche-à-scie à point jaune
au corcelet & milieu du ventre
fauve.*

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

*T. nigra, puncto thoracis luteo, pedi-
bus abdominisque medio ferrugineis.*

Loc.

44. *T. longicornis.*

La Mouche-à-scie à longues antennes.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, segmentis abdominalibus margine flavis, antennis duas tertias corporis partes æquantibus.

Loc.

45. *T. longicollis.*

La Mouche-à-scie à col allongé.

Long. 10 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, utrinque luteo-maculata, collo elongato.

Loc.

46. *T. fertifera.*

La Mouche-à-scie à bouquet.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, antennis utrinque pectinatis, pedibus flavis. *Masc.*

Long. $3 \frac{1}{2}$, 4, $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, $1 \frac{1}{2}$ lig.

T. tota ferruginea, antennis nigris thorace brevioribus subserratis. *Femin.*

Loc.

47. *T. prolongata.*

La Mouche-à-scie à prolongement.

Long. 5, 6 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, pedibus abdominisque medio
fulvis collo elongato.

Loc.

LXXXVI. CYNIPS. *LE CINIPS.*

Antennæ cylindræ fractæ.

Alæ inferiores breviores.

Os maxillosum.

Aculeus ani conicus intra valvas
abdominis.

Abdomen subovatum ad latera com-
pressum, subtus acutum, petiolo
thoraci connexum.

Ocelli tres.

FAMIL. I. *Antennarum articuli*
undecim.

1. *C. bedeguaris.*

Le Cinips doré à queue, du bedeguar lisse.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. thorace viridi-æneo, abdomine aureo,
fetis ani corpore longioribus.

Loc. Habitat tumorem rosæ *Bedeguar* dictum,
& gallam quercinam.

2. C. viridis.

Le Cinips doré sans queue.

C. thorace viridi æneo, abdomine au-
reo, fetis ani non exsertis.

Loc. Idem.

3. C. auratus.

Le Cinips porte-or.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

C. punctatus sericeo-auratus, fetis ani
corpore brevioribus.

Loc.

4. C. fungosus.

*Le Cinips de la galle fongueuse
du chêne.*

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigro-viridis, tibiis flavis, gallæ fun-
gosæ quercûs.

Loc. Habitat gallam quercinam.

5. *C. pomaceus.*

*Le Cinips de la galle lisse & ronde
du chêne.*

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigro-cupreus, pedibus fuscis, gallæ
rotundæ, glabræ, duræ, foliorum
quercûs.

Loc. Habitat minorem gallam foliorum quercûs,
solitarius.

6. *C. punctatus.*

Le Cinips noirâtre à point marginal.

C. nigro-cupreus, pedibus fuscis alarum
puncto fusco.

Loc.

7. *C. foliaceus.*

*Le Cinips de la galle du chêne
qui vient de la substance même
de la feuille.*

Long. 1 lig.

C. viridi-sericeus, abdomine aurato, pedibus albis, gallæ intra foliorum quercûs substantiam delitescens.

Loc. Habitat gallam intra foliorum quercûs laminas quasi insufflatam.

8. C. gemmæ quercûs.

Le Cinips de la galle en rose du chêne.

Long. 1 lig.

C. nigro-cupreus, pedibus fuscis, gallæ imbricatæ quercûs.

Loc. Habitat gallam quercûs in rosæ formam expansam & extûs dissectam.

9. C. baccarum quercûs.

Le Cinips de la galle en chapeau du chêne.

C. niger, pedibus fulvo flavis, gallarum fungiformium quercûs.

Loc. Habitat gallam quercûs pediculo foliis inhaerentem, fungiformem.

10. C. fimbriatus.

Le Cinips de la galle platte & frisée du chêne.

Long. 1 lig.

C. nigro-aureus, pedibus fusco-variegatis, gallæ planæ rubræ fimbriatæ quercûs.

Loc. Habitat gallam quercûs compressam, orbicularem, & fimbriatam.

11. C. racemosus.

Le Cinips de la galle en grappe du chêne.

C. fuscus nitens, capite nigro, abdominis apice villoso, gallæ racemosæ quercûs.

Loc. Habitat gallam quercûs duram in racemos super foliorum pediculis dispositam.

12. C. minutus.

Le Cinips de la galle tête d'épingle du chêne.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. viridis nitens, pedibus pallidis galla
globosæ vix sensibilis foliorum quercûs.

Loc. Habitat gallam acutam & minutissimam
quercûs.

13. C. scaber.

*Le Cinips de la galle raboteuse des
feuilles de chêne.*

C. gallæ scabræ foliorum quercûs.

Loc. Insectum incognitum, Galla sola noscitur.

14. C. tuberculatus.

*Le Cinips de la galle à tubercules
du chêne.*

C. gallæ tuberculatæ quercûs.

Loc. Idem.

15. C. numismalis.

*Le Cinips de la galle en écusson
de chêne.*

C. gallæ numismatis quercûs.

Loc. Idem.

16. C. pedunculi quercûs.

*Le Cinips de la galle en pomme
des extrémités des branches du
chêne.*

C. gallæ pomiformis extremitatis ramo-
rum quercûs.

Loc. Insectum incognitum, Galla sola noscitur.

17. C. radicum.

*Le Cinips de la galle ligneuse des
racines.*

C. gallæ lignæ radicum.

Loc. Idem.

18. C. salicis strobili.

*Le Cinips de la galle des feuibles
de saule.*

C. nigro-viridis nitens, pedibus pallidis,
gallæ foliorum salicis.

Loc. Habitat gallam salicis folia vestientem.

19. C. graminis.

*Le Cinips de la galle à filets du
chiendent.*

C. gallæ graminis filamentosæ.

Loc. Habitat gallam capillarem, quæ circa
basim foliorum graminis nascitur.

20. C. glechomæ.

*Le Cinips de la galle du lierre
terrestre.*

C. totus fuscus, thorace subvillosa, gal-
læ hederæ terrestris.

Loc. Habitat gallam duram & orbicularem folia
glechomæ hederaceæ occupantem.

21. C. aurantii.

*Le Cinips fauve & le sauteur de
l'oranger.*

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. aurantii, ferrugineus, alarum basi
albâ puncto nigro, antennis nigris, pe-
dibus saltatoriis.

Loc.

22. C. saltator.

Le Cinips sauteur noir.

Long. $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger nitens, pedibus saltatoriis.

Loc.

23. *C. cruciatus.*

Le Cinips sauteur noir à pieds fauves.

Long. $1 \frac{1}{4}$ lig.

C. ater, pedibus saltatoriis fulvis.

Loc.

4. *C. pupparum.*

Le Cinips des chrysalides de papillons.

Long. $1 \frac{2}{3}$ lig.

C. viridi-fericeus, abdomine aureo, pedibus pallidis, chrysalidum papilionum.

Loc. Habitat puppas papilionis brassicæ.

. *C. ovulorum.*

Le Cinips des œufs des insectes.

Long. $\frac{1}{3}$ lig.

C. niger, pedibus pallidis, ovorum insectorum.

Loc. Larva habitat ova papilionum, &c.

26. *C. aphidum.**Le Cinips de l'ichneumon des pucerons.*Long. $\frac{2}{3}$ lig.*C. niger nitens, pedibus pallidis, ichneumonum aphidum.**Loc.* Larva habitat aphides & ichneumonem aphidum.* 27. *C. bifasciatus.**Le Cinips à bandes sur les ailes.*Long. $1 \frac{1}{3}$ lig.*C. nigro-viridis nitens, pedibus fuscis, alarum fasciis duabus transversis nigris.**Loc.*FAMIL. II. *Antennarum articuli septem.*28. *C. foliorum.**Le Cinips des feuilles sans galle.*Long. $\frac{3}{4}$ lig.*C. foliorum sine gallâ, totus nigro-viridis nitens.**Loc.* Larva vel chrysalis foliis adhæret.

29. *C. gregarius.*

Le Cinips du rosier, sans galle.

Long. $\frac{2}{3}$ lig.

C. rosæ, sine gallâ, totus niger.

Loc. Chrysalis fol. rosæ subtus adhæret.

30. *C. circularis.*

Le Cinips du chêne, sans galle.

Long. $1 \frac{1}{4}$ lig.

C. quercûs sine gallâ, totus viridi-aureus
pedibus flavis.

Loc. Chrysalis fol. ilicis subtus adhæret.

31. *C. eulophus.*

*Le Cinips à antennes rameuses,
sans galle.*

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig.

C. viridis nitens, antennis ramosis pallidis.

Loc. Chrysalis foliis tiliæ subtus adhæret.

32. *C. tripunctatus.*

Le Cinips à ailes pointillées.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. nigro-viridis nitens , alis punctis tribus
nigris.

Loc.

33. C. antiquus.

*Le Cinips vert bronzé à pattes
blanches.*

Long. $\frac{2}{3}$ lig.

C. viridis nitens , pedibus albido flavis

Loc.

34. C. albipes.

Le Cinips noir à pattes blanchâtres.

Long. 1 lig.

C. nigro nitens , pedibus pallidis.

Loc.

35. C. crassipes.

Le Cinips brun à grosses cuisses.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. fuscus , femoribus clavatis.

Loc.

LXXXVII. DIPLOLEPIS. *Le DI-
PLOLÈPE.*

Antennæ filiformes longæ articulis
quatuordecim.

Alæ inferiores breviores.

Os maxillosum.

Aculeus ani conicus intra valvas
abdominis.

Abdomen ovatum, ad latera com-
pressum, subtus acutum, petiolo
brevi thoraci connexum.

1. *D. quercus.*

*Le Diplolèpe de la galle ronde &
dure du chêne.*

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. fuscus, gallæ, globosæ, glabræ &
duræ foliorum quercûs.

Loc. Habitat gallam rotundam & glabram infe-
rioris foliorum quercûs superficiei.

2. *D. rosæ.*

Le Diplolèpe du bedeguar.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. bedeguaris niger, abdomine ferrugineo apice nigro, pedibus rufis.

Loc. Habitat bedeguem rosæ.

3. D. bedeguaris.

Le Diplolèpe de la galle fongueuse & lisse du rosier.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. bedeguaris levis fungosi, fuscus oculis nigris.

Loc. Idem.

4. D. niger.

Le Diplolèpe noir à ventre brun & antennes noires.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{5}$ lig.

D. niger, abdomine fusco lucido, pedibus rufis, antennis nigris.

Loc.

5. D. fuscus.

Le Diplolèpe brun à ventre luisant & antennes brunes.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. fuscus, abdomine lucido, pedibus
rufis, antennis fuscis.

Loc.

6. D. flavipes.

Le Diplolèpe à pattes jaunes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

D. totus niger, pedibus flavis.

Loc.

LXXXVIII. ICHNEUMON. L'ICH- NEUMON.

Antennæ filiformes, longæ vibratiles.

Alæ inferiores breviores.

Os maxillosum.

Aculeus ani triplex.

Abdomen petiolo tenui longo thoraci
connexum.

Ocelli tres.

1. I. globatus.

L'Ichneumon à coton blanc.

Long. 1 lig.

I. serico conglobato albo.

Loc. Habitat sericum album herbis pratorum inhaerentem.

2. I. glomeratus.

L'Ichneumon à coton jaune.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

I. serico conglobato flavo.

Loc. Habitat larvam papilionis brassicæ.

3. I. alveariformis.

L'Ichneumon à coques en forme de rayons de ruche.

I. serico alveari-formi.

Loc. Habitat sericum alveariformem.

4. I. aphidum.

L'Ichneumon des pucerons.

Long. 1 lig.

I. aphidum.

Loc. Larva aphides perforat & occidit, ipsam cynips terebrat.

5. I. manifestator.

L'Ichneumon à longue queue.

Long. 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, fetis ani corpore
duplo longioribus.

Loc. Habitat sylvas.

6. I. fetosus.

*L'Ichneumon noir à queue de la
longueur du corps & ventre lisse.*

Long. 7 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, fetis ani longi-
tudine corporis, abdomine lævi.

Loc. Habitat arbores.

7. I. tuberculatus.

*L'Ichneumon à queue de la lon-
gueur du corps & ventre à tu-
bercules.*

Long. 6 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, fetis ani longitu-
dine corporis, abdomine tuberculis
lateralibus.

Loc. Idem.

8. I. compunctor.

*L'Ichneumon à pattes fauves &
courte queue.*

Long. 6 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, fetis ani corpore triplo brevioribus, abdomine fere sessili.

Loc. Habitat chrysalides papilionum.

9. I. petiolatus.

L'Ichneumon à pattes fauves & ventre en filet.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, fetis ani corpore triplo brevioribus, abdominis basi tenui longa petiolatu.

Loc.

10. I. frontalis.

L'Ichneumon noir à pattes fauves & devant de la tête jaune.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, fronte flava.

Loc.

11. I. femoralis.

L'Ichneumon noir à pattes brunes & grosses cuisses.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, femoribus
posticis crassis globosis.

Loc. Habitat vitra domorum.

12. I. ruspator.

*L'Ichneumon à pattes brunes &
grosses cuisses dentelées.*

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, femoribus
posticis crassis denticulo armatis.

Loc.

13. I. geniculatus.

*L'Ichneumon noir à pattes fauves
& genoux blancs.*

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, genibus annulo
albo.

Loc.

14. I. inguinalis.

*L'Ichneumon noir à pattes fauves
& point blanc à la base des
cuisses.*

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, femorum basi puncto albo.

Loc.

15. I. albipes.

L'Ichneumon noir à pattes blanchâtres.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, pedibus albidis, alarum puncto nigro.

Loc. Habitat flores cirsi.

16. I. jaculator.

L'Ichneumon tout noir à pattes postérieures très-longues & grosses.

Long. 6 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. totus niger, tibiis posticis clavatis abdomine longo, tenui, falcato.

Loc.

17. I. annularis.

L'Ichneumon noir à pattes postérieures grosses & milieu du ventre fauve.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, tibiis posticis clavatis, abdomine tenui falcato circa medium fulvo.

Loc.

18. I. crassipes.

L'Ichneumon noir à pattes fauves très-grosses & tachetées.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, femoribus posticis crassissimis fulvis puncto albido.

Loc.

19. I. falcatus.

L'Ichneumon noir à pattes fauves, à cuisses postérieures grosses & ventre en faucille.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, tibiis rufis, femoribus posticis clavatis, abdomine longo falcato.

Loc.

20. I. crocatus.

L'Ichneumon jaune à tête & corcelet noirs avec la pointe jaune.

Long. 10 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

I. luteus, capite thoraceque fusco apice
flavo.

Loc.

21. I. luteus.

*L'Ichneumon jaune à ventre en
faucille.*

Long. 10 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

I. luteus totus.

Loc.

22. I. melanocephalos.

*L'Ichneumon à tête & corcelet noirs,
& à ventre jaune en faucille.*

Long. 9 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. capite thoraceque nigris, antennis pe-
dibus abdomineque falcato, luteis.

Loc.

23. I. ramidulus.

*L'Ichneumon jaune à corcelet noir
en dessous & extrémité du ven-
tre noire.*

Long. 8 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

I. luteus, oculis, thorace infra, abdominisque falcati apice nigris.

Loc.

24. I. pugillator.

L'Ichneumon noir à pattes & milieu du ventre citron.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine falcato, pedibus abdominisque medio flavis.

Loc.

25. I. virgatus.

L'Ichneumon jaune à corcelet rayé.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. luteus, thoracis fasciis tribus longitudinalibus fuscis.

Loc. Habitat ilicem.

26. I. obscurus.

L'Ichneumon brun à tête & bout du ventre noirs.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. fuscus, capite abdominisque apice nigris.

Loc.

27. I. apicarius.

L'Ichneumon jaune à pointe du corcelet noire.

Long. $2 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. flavo-ferrugineus, apice thoracis nigr.

Loc.

28. I. scutellatus.

L'Ichneumon fauve à taches noires & pointe du corcelet jaune.

Long. $5 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

I. flavo, rufo, nigroque variegatus, thoracis apice flavo.

Loc. Habitat larvas papilionum.

29. I. melanopteros.

L'Ichneumon brun à taches noires & ailes noirâtres.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. fuscus, nigro maculatus, alis nigris

Loc.

30. I. linearis.

*L'Ichneumon fauve à taches noires
& ailes croisées.*

Long. $1 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. linearis rufus nigro maculatus, alis
albis cruciatis.

Loc.

31. I. punctatus.

*L'Ichneumon noir à petites taches
jaunes.*

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, fronte punctisque humerorum
flavis.

Loc.

32. I. citratus.

*L'Ichneumon noir à ventre tacheté
de citron sur les côtés.*

Long. $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. atro-cœrulescens, abdominalibus seg-
mentis utrimque maculâ flavâ.

Loc.

33. *I. binarius.*

L'Ichneumon noir chagriné à pattes fauves & deux taches jaunes sur le ventre.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, punctatus, pedibus rufis, abdominis basi utrinque maculâ flavâ.

Loc.

34. *I. tertiarius.*

L'Ichneumon noir à cuisses postérieures fauves & deux taches blanches sur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, femoribus posticis rufis abdominis medio utrinque maculâ albâ.

Loc.

35. *I. multicolor.*

L'Ichneumon noir à pattes rougeâtres, à corcelet & ventre tacheté de blanc.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, thoracis basi lineae, apice puncto, albis abdominis segmento 1°. punctis duobus, 2°. margine albis.

Loc.

36. I. globulifer.

L'Ichneumon noir à plaque de poils bruns sur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

I. ater, alis extremo fuscis, abdominis apice villosa ferrugineo.

Loc. Habitat larvas phalænarum.

37. I. bifasciatus.

L'Ichneumon noir à deux bandes sur les ailes.

Long. 3 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, alis fasciâ duplici transversâ nigrâ.

Loc.

38. I. niger.

L'Ichneumon tout noir.

Long. 1 lig.

I. totus niger.

Loc.

39. I. comitator.

*L'Ichneumon noir à anneaux blancs
aux antennes.*

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. totus niger, antennis medio albis.

Loc. Larva habitat nidum vesparum.

40. I. funereus.

*L'Ichneumon noir, avec la pointe
du corcelet & le milieu des an-
tennes blancs.*

Long. 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, thoracis apice antennarumque
medio albis.

Loc.

41. I. dumetorum.

*L'Ichneumon noir à cuisses rou-
geâtres & anneau blanc aux
antennes.*

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, femoribus testaceis, antennis medio albis.

Loc. Habitat dumeta.

I. spiralis.

L'Ichneumon noir à pattes rougeâtres & anneau blanc aux antennes.

Long. $2 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, tibiis posticis apice nigris, antennis medio albis.

Loc.

I. punctulatus.

L'Ichneumon à points.

Long. $6 \frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

I. niger, pedibus abdominisque anticâ parte superne rufis, antennis medio albis.

Loc.

I. tibialis.

L'Ichneumon noir à pattes rougeâtres, à taches blanches sur les jambes & anneau blanc aux antennes.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, tibiis antennisque medio albis.

Loc.

45. I. tarfosus.

L'Ichneumon à pattes rougeâtre avec le milieu des tarses & des antennes blanc.

Long. 4 lig.

I. niger, pedibus rufis, tarsis posterioribus antennisque medio albis.

Loc.

46. I. articulatus.

L'Ichneumon noir, à pattes rougeâtres, avec les genoux & le milieu des antennes blancs.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, geniculis anteriorumque medio albis.

Loc.

47. I. abdominalis.

L'Ichneumon noir à ventre & jambes fauves, & anneau blanc aux antennes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, abdomine toto ferrugineo antennis annulo albo.

Loc.

48. I. ani.

L'Ichneumon noir à ventre fauve vers le bas & anneau blanc aux antennes.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, abdomine pone ferrugineo antennis medio albis.

Loc.

49. I. upsalienfis.

L'Ichneumon noir à pattes fauves & anneau blanc aux antennes.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, abdomine ferrugineo apice nigro, antennis annulo albo.

Loc.

50. *I. tripunctatus.*

L'Ichneumon noir à bande fauve sur le ventre avec la pointe du corcelet & anneau des antennes blancs.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, abdomine antice ferrugineo, postice nigro punctis tribus albis, thoracis apice annuloque antennarum albo.

Varietas A. I. femoribus omnibus nigris.

B. I. femoribus nigris, tibiisque omnibus basi albis, apice nigris.

Loc. Habitat sylvas.

51. *I. dictator.*

L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant & à anneaux blancs aux pattes & aux antennes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, abdomine ferrugineo, apice nigro, tibiis antennisque annulo albo.

Loc.

52. I. peregrinator.

L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant, noir postérieurement & terminé de blanc, & à anneau blanc aux antennes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. abdomine ferrugineo, pone nigro, apice albo; antennis medio albis.

Loc.

53. I. vorax.

L'Ichneumon panaché de noir & citron à anneau blanc aux antennes.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, thoracis apice, abdominis medio pedibusque flavo variegatis, antennis medio albis.

Loc.

54. I. palmarius.

L'Ichneumon à pointe du corcelet blanche & pattes panachées de blanc.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, fronte, thoracisque apice albis, tibiis palmisque albo variegatis.

Loc.

55. I. constellatus.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet & taches du ventre blanches.

Long. 6 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, thoracis apice maculisque abdominis quatuor albis, antennarum medio albo.

Loc.

56. I. fuscipes.

L'Ichneumon noir à pieds rouges & pointe du corcelet blanche.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, apice thoracis albo.

Loc.

57. I. scirpi.

*L'Ichneumon noir à pointe du cor-
celet & bout du ventre blancs.*

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, thoracis abdominisque apice albo.

Loc. Larva habitat scirpum palustrem.

58. I. junci.

*L'Ichneumon noir à pointe du cor-
celet jaune avec les pattes &
le milieu du ventre fauves.*

Long. 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, fronte thoracisque apice flavis, pedibus abdominisque medio ferrugineis.

Loc. Larva habitat juncum.

9. tiphæ.

*L'Ichneumon noir à antennes pat-
tes & milieu du ventre fauves.*

Long. 5 lig.

I. niger, fronte flavâ, antennis pedibus abdominisque medio ferrugineis.

Loc. Larva habitat tipham.

60. I. compressus.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet, partie des pattes & milieu du ventre fauves.

Long. $4 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, fronte, thoracis apice, tibiis ex parte abdominisque medio flavis.

Loc.

61. I. marginalis.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet jaune & partie antérieure du corcelet fauve.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, thoracis apice flavo, humeris pedibusque ferrugineis, segmentis abdominalibus margine albidis.

Loc.

62. I. interfectus.

L'Ichneumon arlequin.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, fronte, thoracis apice pedibus abdomineque supra flavis, thorace flavo maculato.

Loc.

63. I. curtatus.

*L'Ichneumon noir à ventre fauve
en devant & court pédicule.*

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine antice fulvo, petiolo
brevi.

Loc.

63. I. Frischii.

*L'Ichneumon noir à ventre fau-
ve en devant & à long pédi-
cule.*

Long. 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

I. niger, abdomine fulvo, postice nigro
petiolo longissimo.

Loc.

65. I. constrictus.

*L'Ichneumon noir à ventre fauve
en devant & tarses antérieurs
blancs.*

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine antice rufo, postice nigro, palmis anticis albis.

Loc.

66. I. nemoralis.

L'Ichneumon noir à ventre fauve au milieu & pieds de derrière blancs.

Long. $1 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, abdominis medio pedibusque anterioribus rufis, palmis posticis albis.

Loc.

67. I. trochantericus.

L'Ichneumon noir à pattes & milieu du ventre fauves, & pieds de derrière noirs.

Long. $5 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdominis medio, pedibusque rufis, palmis posticis nigris.

Loc.

68. I. scanicus.

L'Ichneumon noir à pattes postérieures panachées.

Long. $3 \frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, tibiis posticis albo nigroque variegatis.

Loc. Habitat sylvas.

69. I. Plæseus.

L'Ichneumon à anneaux du ventre rougeâtres & pattes postérieures panachées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, pedibus segmentorumque abdominis margine ferrugineis, tibiis posticis albo nigro fulvoque variegatis.

Loc.

70. I. coccineus.

L'Ichneumon noir à ventre couleur de cerises.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine coccineo.

Loc. Habitat sylvas.

71. I. rubicundus.

L'Ichneumon noir à corcelet & ventre rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, thorace abdomineque rubris.
Loc.

72. I. cruentatus.

L'Ichneumon à corcelet tacheté de rouge en devant.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger punctatus, capite thoraceque antice rubro maculatis, pedibus fuscis.

Loc.

73. I. fumosus.

L'Ichneumon noir à pattes & corcelet en devant de couleur brune.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger lævis, thorace antice pedibusque fuscis.

Loc. Larva devorat ova araneorum.

74. I. fessilis.

L'Ichneumon noir avec les deux anneaux antérieurs du ventre rougeâtres & les aîles noires.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, abdomine subfessili segmentis duobus anticis rufis, alis nigricantibus.

Loc.

75. I. viaticus.

L'Ichneumon noir avec les trois anneaux antérieurs du ventre rougeâtres & les ailes noires.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

I. ater, abdomine subseffili segmentis tribus anticis rufis, alis nigricantibus.

Loc. Habitat larvas papilionum quas in terram deponit.

76. I. ochrocephalos.

L'Ichneumon noir à ventre & tête jaunes.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. nigro, abdomine capiteque flavis alis nigricantibus.

Loc.

77. I. posticus.

L'Ichneumon noir à pattes & partie supérieure du ventre rougeâtres.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger , pedibus abdominisque posticâ
parte ferrugineis.

Loc.

78. I. anticus.

L'Ichneumon noir à pattes & partie antérieure du ventre rougeâtres.

Long. $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger , pedibus abdominisque anticâ
parte ferrugineis.

Loc.

79. I. labialis.

L'Ichneumon noir à ventre & pattes fauves & lèvres jaunes.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger fronte flavâ , pedibus ferrugineis , abdomine rufo apice nigro.

Loc.

80. I. teniola.

L'Ichneumon noir à long filet, pattes & partie antérieure du ventre fauves.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

- I. niger fronte flavâ , pedibus ferrugineis ,
abdomine rufo , postice nigro , petiolo
tenui longo.

Loc.

81. I. inculcator.

*L'Ichneumon noir à pattes & ven-
tre fauves.*

Long. $1 \frac{3}{4}$ lig.

- I. niger , pedibus abdomineque ferrugineis.

Loc.

82. I. urticæ.

*L'Ichneumon noir à antennes, pat-
tes & ventre fauves.*

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

- I. niger , antennis pedibus abdomineque
ferrugineo - fuscis , fetis ani corpore
paulo longioribus.

Loc.

83. I. cepæ.

*L'Ichneumon noir à pattes & mi-
lieu du ventre fauves.*

Long. 3 lig.

I. niger, pedibus abdominisque medio ferrugineis.

Loc. Habitat cepam, porrum, allia.

84. I. pupparum.

L'Ichneumon noir à pattes antérieures pâles, postérieures & milieu du ventre fauves.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus anticis pallidis, femoribus posticis abdominisque medio ferrugineis.

Loc. Habitat puppas papilionum.

85. I. inversus.

L'Ichneumon noir à pattes antérieures citronnées & ventre fauve en dessous.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, pedibus quatuor anticis luteis, abdomine subtus fulvo.

Loc.

86. I. cinctus.

L'Ichneumon à deux bandes sur les aîles.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, alis albis, fasciâ duplici nigrâ, posteriore majore.

Loc. Habitat vitra domorum.

87. I. extensor.

L'Ichneumon brun à filet.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

I. linearis, antennis longitudine corporis tentaculis setaceis, femoribus clavatis.

Loc. Idem.

88. I. albus.

L'Ichneumon blanc.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. linearis albus, fusco maculatus, abdominis petiolo tenui longo.

Loc. Habitat folia quercûs, rarus.

89. *I. acicularis.**L'Ichneumon à aiguillette.*Long. $1 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.*I. linearis fuscus*, capite abdominisque apice nigris, antennis corpore longioribus.*Loc.*90. *I. araneorum.**L'Ichneumon à anneaux sur le ventre & femelle sans ailes.*Long. $2 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.*I. niger*, pedibus abdominisque annulo duplici ferrugineis. *Masc.**I. apterus fulvus*, capite antennarum apice abdominisque fasciâ duplici transversâ nigris. *Femina.**Loc.* Habitat nidos araneorum.91. *I. carpini.**L'Ichneumon à pattes variées de fauve & femelle sans ailes.*

Long. 1 lig.

I. niger, pedibus rufis geniculis fuscis;
fæminâ apterâ.

Loc. Habitat dumeta.

92. I. apterus.

*L'Ichneumon noir à pattes & base
des antennes fauves & femelle
sans aîles.*

Long. $2 \frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

I. niger, pedibus antennarumque basi
ferrugineis; fæminâ apterâ.

Loc.

93. I. bedeguaris.

L'Ichneumon du bedeguar.

Long. $1 \frac{2}{3}$ lig.

I. bedeguaris niger, pedibus abdominis
que medio ferrugineis.

Loc. Habitat bedegwarem rosæ.

94. I. vittatus.

L'Ichneumon à bande jaune.

Long. $2 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. fulvus, antennis pedibusque nigris,
alis atris fasciâ transversâ luteâ.

Loc.

- * 95. *I. rusticus.*

L'Ichneumon à pattes fauves & pieds noirs.

Long. 6 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig

I. niger, pedibus rufis, setis ani corpore duplo brevioribus, tibiis posticis nigris.

Loc.

- * 96. *I. quadripes.*

L'Ichneumon chauffé de blanc.

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, abdomine falcato, palmis quatuor anticis albis.

Loc.

- * 97. *I. basilaris.*

L'Ichneumon basilaire.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, humeris thoracis apice pedibus abdominisque basi flavo maculatis, antennis medio albis.

Loc.

- * 98. *I. poplitæus.*

L'Ichneumon à jarretières.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine ferrugineo, pedibus geniculis albis, antennis annulo albo.

Loc.

99. I. cœlestis.

L'Ichneumon céleste étoilé.

Long. 7 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, abdomine ferrugineo basi nigra, tibiis fulvis thoracis apice antennarumque medio albis.

Loc.

100. I. flavipes.

L'Ichneumon à ventre fauve & pattes jaunes.

Long. 4 lig. Long. 1 lig.

I. niger, abdomine ferrugineo pedibus flavis.

Loc.

101. I. arlequinatus.

L'Ichneumon à pattes arlequinées.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, segmentis abdominalibus margine fulvis, pedibus ferrugineis annulis albis.

Loc.

- * 102. *I. signatus.*

L'Ichneumon à raies blanches.

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. fulvus, capite thoraceque supra nigris, albis fectis corpus æquantibus.

Loc.

- * 103. *I. segmentosus.*

L'Ichneumon à base du ventre rouge.

Long. 4, 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$, 1 lig.

I. ater, alis nigris segmentis abdominalibus 1^o, 2^o & 3^o rubris margine luteis.

Loc.

- * 104. *I. petiolatus.*

L'Ichneumon à bande transverse.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

I. fulvo fuscoque variegatus, abdominis petiolo tenui, alis fasciâ transversâ fuscâ.

Loc.

- * 105. *I. fasciatus.*

L'Ichneumon fascié.

Long. 9 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

I. ater, antennis pedibusque flavis, segmentis abdominalibus margine luteis.

Loc.

106. I. bipartitus.

L'Ichneumon à ventre mi-parti.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, antennarum medio, thoracisque apice flavis, pedibus fulvis, abdomine antice fulvo fasciâ nigrâ, postice nigro fasciâ flavâ.

Loc.

LXXXIX. VESPA. LA GUEPE.

Antennæ fractæ, articulo primo longiore.

Alæ inferiores breviores.

Os maxillosum, lingua membranacea inflexa.

Aculeus ani simplex subulatus.

Abdomen petiolo brevissimo thoraci connexum.

Ocelli tres.

Corpus glabrum.

1. V. crabro. *bon*

La Guêpe - frelon.

Long. 1 pouce. Larg. 4 lig.

V. thorace nigro, antice rufo immaculato, abdominis incisuris puncto nigro duplici contiguo.

Loc. Nidificat in truncis cavis arborum.

2. V. vulgaris. *bon*

La Guêpe commune.

Long. 8 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

V. thorace lineolis trium parium differentium flavescentium *

* Punctis incisurarum nullis. *Masc.*

* Punctis nigris incisurarum liberis. *Fœmina.*

Varietas A. V. thorace lineolis trium parium differentium flavescentium, punctis nigris incisurarum connexis.

B. V. thorace lineolis quatuor parium differentium flavescentium, punctis nigris incisurarum connexis.

C. V. thorace lineolis quinque parium differentium flavescentium, punctis nigris incisurarum connexis.

D. V. thorace lineolis duorum parium differentium flavescentium, punctis nigris incisurarum connexis.

Loc. Habitat domos.

3. V. arvensis. *V. diversa*

La Guêpe à anneaux bordés de noir.

Long. $5 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

V. nigra, abdomine flavo, segmentis margine nigris.

Varietas A. V. nigra, thorace punctis octo luteis, singulis segmentis abdominalibus fasciis transversis luteis, primis interruptis.

B. V. nigra, thorace punctis
decem luteis, singulis
segmentis abdominali-
bus fasciis transversis
luteis.

C. V. nigra, thoracis basi li-
neolis duabus flavis
apice lineâ flavâ, sin-
gulo segmento abdomi-
nali fasciâ transversâ
luteâ, secundâ & ter-
tiâ interruptâ.

D. V. nigra, thoracis basi li-
neolis duabus flavis
apice lineâ flavâ, sin-
gulo segmento abdomi-
nali fasciâ transversâ li-
teâ, quatuor primis in-
interruptis.

E. V. nigra, thoracis basi li-
neolis duabus flavis
apice lineâ flavâ, sin-
gulo segmento abdomi-
nali excepto 1^o & 3^o
fasciâ transversâ luteâ

Loc. Habitat arva.

4. *V. fasciata.* *V. limbata*

La Guêpe à anneaux bordés de jaune.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

V. nigra, segmentis abdominalibus margine flavis.

Loc. Habitat flores in hortis.

5. *V. bimaculata.* *V. gallica*

La Guêpe à anneaux bordés de jaune, & deux taches jaunes.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

V. nigra, thoracis maculis quindecim flavis, segmentis abdominalibus margine luteis, secundo maculâ utrinque flavâ.

Loc. Habitat alveos confertim petiolis arborum adhærentes.

6. *V. longicornis.* *bon*

La Guêpe à longues antennes, & quatre bandes noires sur le ventre.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

V. thorace nigro maculis flavis, abdomine flavo, fasciis quatuor nigris, antennis longis.

Loc.

7. V. infundibuliformis. *V. arvensis*

La Guêpe à premier anneau du ventre en poire & trois bandes jaunes.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, abdomine fasciis tribus flavis, tertiâ remotissimâ, primo articulo infundibuliformi.

Loc.

8. V. globulosa. *bon*

La Guêpe à premier anneau du ventre en poire & cinq bandes jaunes.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

V. nigra, abdomine fasciis quinque flavis, primo articulo infundibuliformi.

Loc.

9. V. parietum. *bon*

La Guêpe à cinq bandes jaunes sur le ventre, la première éloignée des autres.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, abdomine fasciis quinque flavis, primâ remotissimâ.

Loc. Habitat parietes.

10. V. coarctata. *bon*

La Guêpe à premier anneau du ventre en poire, & le second en cloche.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, abdominis articulo primo infundibuliformi, secundo campanulato maximo.

Loc. Habitat nidum terreum ericis inhærentem.

11. V. ordinata. *V. feriatâ*

La Guêpe noire à raies de points jaunes sur le ventre.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

V ij

V. nigra, abdomine punctorum flavorum ordine quadruplici longitudinali.

Loc.

12. V. quadri-punctata. *V. liguttata*

La Guêpe noire à premier anneau du ventre bordé de jaune avec deux points sur le second & le troisième.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. nigra, abdominis segmento primo margine flavo, secundo & tertio puncto duplici luteo.

Loc.

13. V. guttata. *V. quadrum*

La Guêpe noire à quatre points blancs sur le ventre.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. nigra, abdominis segmentis primo & secundo utrinque puncto albo, pedibus ferrugineis.

Loc.

14. V. pratensis. *bon*
*La Guêpe noire à lèvre supérieure
& base du corcelet jaunes.*

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

V. nigra, fronte, thoracisque basi flavis.

Varietas A. V. nigra, fronte flava.

Loc. Habitat flores.

15. V. femoralis.

*La Guêpe noire à cuisses postérieures
fort grosses.*

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. nigra, femoribus posticis globosis
ferratis, tibiis arcuatis alarum, basi
genubusque flavis.

Loc. Idem.

16. V. dearticulata.

La Guêpe déginguendée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

V. femoribus posticis crassis, globosis,
ferratis, denticulo donatis; abdomi-
nis globosi petiolo tenui longo.

Loc. Habitat aquatica loca.

17. V. nigra. *bon*

La Guêpe noire.

Long. 3 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. tota nigra cœrulescens.

Loc.

18. V. rubra. *bon*

*La Guêpe rouge à bandes noires
sur le corcelet & points jaunes
sur le ventre.*

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

V. rubra, thorace lineolis longitudinalibus nigris, abdomine maculis flavis

Loc.

19. V. sinuata.

La Guêpe sinuée.

Long. 7 lig. Larg. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

V. nigra, pedibus flavis, thoracis basilineâ viridi, abdomine fasciis quatuor undulatis viridibus, primâ interruptâ

Loc.

20. V. interfecta.

La Guêpe entrecoupée.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

V. nigra, pedibus flavis, thorace fasciis quatuor basi & apice lineis flavis, abdomine fasciis septem undulatis flavis interruptis.

Loc.

21. V. petiolata.

La Guêpe à cordons.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, thoracis basi & apice flavis, abdomine petiolato fasciis tribus luteis, tertiâ remotissimâ.

Loc.

22. V. fulvipes.

La Guêpe à pattes fauves.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, pedibus flavis, thorace punctis quatuor luteis, segmentis abdominalibus fasciis luteis, primis duabus interruptis.

Loc.

23. V. capitata.

*La Guêpe à grosse tête.*Long. 6 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

V. nigra, pedibus flavis, abdomine fasciis luteis, capite quadrato thorace latiori.

Loc.

24. V. carbunculus.

*La Guêpe dorée à corcelet mi-parti de rouge & de vert.*Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

V. viridi-cœrulea, abdomine thoracisque anticâ parte ruberrimis,

Loc.

25. V. ignita.

La Guêpe dorée à corcelet vert & derniers anneaux du ventre épineux.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

V. thorace viridi cœruleo, abdomine inaurato, pone cupreo dentato.

Lec. Habitat lapidum intervalla.

26. V. aurata.

La Guêpe dorée à corcelet vert & derniers anneaux du ventre lisses.

Long. $2 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

V. thorace viridi-cœruleo, abdomine aurato-cupreo, pone inermi.

Loc. Idem.

27. V. cuprea.

La Guêpe dorée bleue.

Long. $2 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. cœrulea nitens.

Loc.

28. V. viridis.

La Guêpe dorée verte.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

V. viridis nitens.

Loc.

29. V. rufescens.

La Guêpe dorée cuivreuse à ventre fauve & noir.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

V v

V. capite thoraceque rubro cupreo, abdomine rufo pone nigro.

Loc.

XC. APIS. *L'ABEILLE.*

Antennæ fractæ articulo primo longiore.

Alæ inferiores breviores.

Os maxillosum, linguâ membranaceâ inflexâ.

Aculeus ani simplex subulatus.

Abdomen petiolo brevissimo thoraci connexum.

Ocelli tres.

Corpus villosum.

FAMILIA I. *Corpore villoso, apis proprie dicta.*

1. *A. mellifera.*

L'Abeille domestique ou des ruches.

Long. 6 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

A. gregaria.

Loc.

2. *A. nitida.*

L'Abeille brune à ventre lisse & pattes velues.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. subhirsuta fusca, abdomine nitido pedibus villosis.

Loc.

3. *A. manicata.*

L'Abeille à cinq crochets.

Long. 7 lig. Larg. $2\frac{2}{3}$ lig.

A. abdomine fasciis flavis interruptis; apice spinâ quintuplici recurvâ armato.

Loc. Habitat flores.

4. *A. parietina.*

L'Abeille maçonne à poils roux.

Long. 7 lig. Larg. $2\frac{2}{3}$ lig.

A. nigra, thorace abdominisque basi superne lanâ rufâ.

Loc. Habitat parietes euro oppositos.

5. *A. centuncularis.*

L'Abeille charpentière à ventre velu & roux en dessous.

Long. 6 lig. Larg. $2\frac{1}{2}$ lig.

A. nigra, abdomine supra lineis albis
subtus lanâ flavâ.

Loc. Habitat lignum, arbores exætas.

6. A. hirta.

L'Abeille fauve à ventre cuivreux.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, hirsutie-flava, abdomine supra glabro nitente cupreo.

Loc.

7. A. fodiens.

*L'Abeille mineuse à corcelet roux
& velu.*

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, thorace hirsuto fulvo, abdomine glabro incisuris albis.

Loc. Terram fodit.

8. A. cinerea.

L'Abeille grise.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

A. nigra hirsutie cinerea.

Loc. Habitat terræ sectiones verticales.

9. A. incisa.

L'Abeille grise à lèvres jaunes & à houppe aux pattes du milieu.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

A. nigra, hirsutie cinerea, fronte flavâ incisuris abdominalibus albis.

Loc. =

10. A. longicornis. *Eucera long. & E. tuberculata* } Wlk.

L'Abeille à longues antennes.

Long. 6 lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

A. hirsutie flavescens, fronte flavâ, antennis articulatim compressis corpus æquantibus.

Loc.

11. A. terrestris.

L'Abeille à lèvres jaunes & anneaux du ventre blanchâtres.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

A. subhirsuta cinerea, abdomine nigro, segmentis albidis, fronte flavescente.

Loc. Terram fodit horizontaliter.

12. *A. agrestis.*

*L'Abeille à lèvres & pattes jaunes
& anneaux du ventre fauves.*

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. hirsutie cinerea, pedibus labioque superiore flavescentibus; abdomine glabro nigro incisuris rufis.

Loc.

13. *A. hortensis.*

*L'Abeille à pattes jaunes & anneaux
du ventre blancs.*

Long. 7 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

A. hirsuta, pedibus croceis, abdomine nigro, incisuris albis.

Loc. Habitat flores in hortis.

14. *A. crocipes.*

*L'Abeille à pattes jaunes & ventre
un peu cuivreux.*

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. nigra, pedibus croceis, abdomine leviter cupreo.

Loc. Idem.

15. *A. cuprea.*

L'Abeille verdâtre & cuivreuse.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. tota viridi-cuprea.

Loc.

16. *A. muraria.*

L'Abeille bleuâtre à ailes nébuleuses.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

A. nigro - coeruleascens, alis nebulosis, fronte femoribusque posticis hirsutie flavis.

Loc. Nidificat in vetustis muris.

17. *A. rufescens.*

L'Abeille noire à ventre brun & lisse.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. nigra, abdomine rufo nitido, apice nigro.

Loc.

18. *A. obscura.*

L'Abeille noire à ventre brun & anneaux noirs.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, abdomine rufo nitido, incisuris nigris.

Loc.

* 19. A. interrupta.

L'Abeille à houppes blanches.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

A. nigra, segmentis abdominalibus fasciis albis, pilosis interruptis, alis nigris punctis albis.

Loc.

FAMILIA II. *Corpore hirsutissimo, apis bombilius.*

20. A. violacea.

L'Abeille perce-bois.

Long. 10 lig. Larg. $3 \frac{1}{2}$ lig.

A. hirsuta atra, alis violaceis.

Loc. Habitat ligna exarsa.

21. A. subterranea.

L'Abeille noire à ventre brun vers l'extrémité.

A. hirsuta atra, ano fusco.

Loc. Terram fodit.

22. *A. lapidaria.*

L'Abeille noire avec les derniers anneaux du ventre fauves.

A. hirsuta atra, ano fusco.

Loc. Habitat lapidem.

23. *A. coronata.*

L'Abeille noire à couronne du corcelet citron, & extrémités du ventre fauves.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigra, fronte basique thoracis flavis, ano fulvo.

Loc.

24. *A. regalis.*

L'Abeille noire à couronne du corcelet & haut du ventre citron & l'extrémité du ventre fauve.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigra, thoracis abdominisque basi flavâ, ano fulvo.

Varietas. A. flava, abdominis medio nigro, ano fulvo.

Loc.

25. *A. virginalis.*

*L'Abeille à couronne du corcelet
& haut du ventre citron, &
l'extrémité du ventre blanche.*

Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

*A. nigra, thoracis abdominisque basi
flavâ, ano fulvo.*

Loc.

26. *A. hypnorum.*

*L'Abeille à couronne & extrémités
du corcelet & haut du ventre
citron, & l'extrémité du ven-
tre blanche.*

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

*A. nigra, thoracis basi & apice, abdo-
minisque basi flavis, ano albo.*

Loc.

27. *A. vestalis.*

*L'Abeille à couronne du corcelet
citron & extrémité du ventre
mi-partie de citron & de blanc.*

Long. 10 lig. Larg. 4 lig.

A. nigra, thoracis basi flavâ, ano supra
flavo, apice albo.

Loc.

28. A. rustica.

L'Abeille noire à ventre fauve.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

A. nigra, abdomine fulvo.

Loc.

29. A. muscorum.

*L'Abeille fauve à ventre jaune &
extrémité fauve.*

Long. 5 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. thorace fulvo, abdomine fulvo, ano
fulvo.

Loc. Nidum pilis intus paleis extus ædificat.

XCI. FORMICA. LA FOURMI.

Antennæ fractæ, articulo primo lon-
gior.

Alæ inferiores breviores, neutris nullæ.

Os maxillosum.

Abdomen petiolo brevi thoraci con-
nexum cum squamâ intermediâ.

Ocelli tres.

1. F. fuscoptera.

La grande Fourmi à aîles à moitié brunes.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

F. nigra, alarum dimidio fusco.

Loc. Habitat sylvas.

2. F. flavipes.

La Fourmi noire à antennes & pattes jaunes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

F. nigra, antennis pedibusque flavis.

Loc. Habitat hortos.

3. F. maculata.

La Fourmi brune à pattes fauves.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

F. fusca, pedibus rufis, thorace maculâ flavâ.

Loc. Idem.

4. F. rufa.

La Fourmi brune à corcelet fauve.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

F. fusca, thorace fulvo.

Loc. Idem.

5. F. fusca.

La Fourmi toute brune.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

F. fusca.

Loc.

6. F. nigra.

La Fourmi toute noire.

Long. $1 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

F. atra.

Loc.



SECTIO QUINTA.

INSECTA DIPTERA.

XCII. OESTRUS. L'OESTRE.

Antennæ setaceæ è globulo prodeun-
tes.

Os nullum, puncta tantum tria.
Ocelli tres.

1. O. hæmorrhoidalis.

L'Oestre du fondement des chevaux.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

O. villosus, pallido-flavescent, abdo-
minis medio cingulo nigro, apice fulvo.

Loc. Larva habitat intestinum rectum equi.

2. O. ovīs.

L'Oestre des moutons.

Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

O. cinereus, nigro maculatus & punc-
tatus.

Loc. Larva habitat sinum frontalem ovium.

3. O. bovis.

L'Oestre des bœufs.

O. thorace flavo, cingulo nigro; alis
nigrâ fasciâ, pedibus pallidis.

Loc. Larva habitat cutem boum.

ICIII. TABANUS. LE TAON.

Antennæ setaceo conicae à quatuor
partibus.

Os proboscide dentibusque conni-
ventibus.

Ocelli tres.

1. T. bovinus.

*Le Taon à ventre jaunâtre &
taches triangulaires blanches.*

Long. 11 lig. Larg. 4 lig.

T. thorace cinereo; abdomine flavescente
segmentis singulis triangulo albo.

Loc. Idem.

2. T. triangularis.

*Le Taon gris à taches blanches
triangulaires sur le ventre.*

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. cinereus thorace fasciis longitudinibus albis, abdominis segmento singulo triangulo maculisque albis.

Loc. Habitat prata.

3. T. albipes.

Le Taon brun à jambes blanchâtres.

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

T. fuscus, tibiis albido-pallidis.

Loc. Idem.

4. T. dichotomus.

Le Taon noir à antennes fourchues.

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

T. totus niger, antennis dichotomis.

Loc. Idem.

5. T. pluvialis.

Le Taon à ailes brunes piquées de blanc.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. fuscus, alis cinereis punctis minutissimis albis.

Loc. Idem.

6. T. interfectus.

*Le Taon noir à anneaux du ventre
bordés de blanc.*

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

T. niger, thorace lineis duabus longitudinalibus cinereis, abdominis segmentis limbo cinereo.

Loc. Habitat sylvas.

7. T. bromius.

Le Taon gris à jambes fauves.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. cinereus, tibiis flavis.

Loc.

8. T. cæcutiens.

*Le Taon brun à côtés du ventre
jaunes & aîles tachetées de
noir.*

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

T. fuscus, abdominis lateribus pedibusque flavis, alis maculis flavis.

Loc.

9. T. lateralis.

Le Taon brun à côtés du ventre jaunes & aîles blanches.

T. fuscus, abdominis lateribus pedibusque flavis, alis immaculatis albis.

Loc.

10. T. bifasciatus.

Le Taon à deux bandes noires sur les aîles.

Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

T. fuscus abdomine antice luteo, alarum margine exteriori, fasciisque duabus transversis nigris.

Loc. Habitat sylvas humidas.

11. T. marmoratus.

Le Taon à une seule bande panachée.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. cinereus, abdomine flavo maculis triangularibus nigris, alarum margine exteriori, fasciâque transversâ marmoratâ fuscâ.

Loc. Habitat prata.

XCIV. ASILUS. *L'Asile.*

Antennæ setaceo-conicæ quadripartitæ.

Os rostro subulato acuto.

Ocelli tres.

1. A. lanigerus. *Moubylin Major*
Le Bichon.

Long. 4, 5 lig. Larg. 2 lig.

A. lanigerus, alarum basi fuscâ.

Loc. Habitat flores.

2. A. fulvus.

L'Asile velu de couleur.

Long. 9 lig. Larg. 3 lig.

A. hirsutus ferrugineus, alis fulvis femoribus nigris.

Loc. Habitat prata.

3. A. crabroniformis.

L'Asile brun à ventre à deux couleurs.

Long. 1 pouce. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. ferrugineus, abdominis articulis tribus prioribus atris, posterioribus quatuor flavis.

Loc. Habitat prata humida.

4. A. gilvus.

L'Asile noir à tache fauve sur le ventre.

Long. 10 lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

A. niger, abdominis segmentis tribus à tergo rufis.

Loc. Idem.

5. A. ater.

L'Asile tout noir.

Long. 8 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

A. totus niger, subhirsutus, alis atris.

Loc. Habitat ripas amnium.

6. A. undulatus.

L'Asile noir velu à pattes & balanciers fauves & ailes noires ondées.

Long. 7 lig. Long. $1 \frac{1}{2}$ lig.

A. niger hirsutus, tibiis halteribusque ferrugineis, alis nigro undulatis.

Loc. Habitat prata.

7. A. marmoratus.

L'Asile noir lisse, à antennes, cuisses & balanciers fauves & ailes ondées de brun.

Long. $7 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

A. niger glaber, antennis, femoribus, halteribus, tibiisque secundi & postici paris rufis, alis fusco undulatis.

Loc. Habitat Fontem-Bellaquæum.

3. A. ælandicus.

L'Asile noir lisse à pattes & balanciers fauves, & ailes toutes noires.

Long. $6 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. niger glaber, femoribus halteribusque ferrugineis, alis nigris.

Loc. Habitat sylvas humidas.

9. *A. venosus.*

L'Asile noir lisse, à pattes & balanciers fauves & aîles blanches veinées.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

A. niger glaber, femoribus halteribusque ferrugineis, alis albis venis nigris.

Loc. Habitat hortos.

10. *A. tarsosus.*

L'Asile noir lisse, à pattes fauves & tarses noirs.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. niger glaber, femoribus tibiisque rufis, alarum puncto marginali nigro.

Loc. Idem.

11. *A. marginatus.*

L'Asile noir lisse à balanciers blancs & aîles bordées de noir.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

A. niger glaber, halteribus albis, alis subrotundis obscuris margine nigro.

Loc. Idem.

12. *A. gibbosus.*

L'Asile à antennes en massue & ailes brunes.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. antennis capite longioribus clavatis acuminatis, nigro rufoque varius, glaber, segmentis abdominalibus secundo & tertio margine flavis, alis fusco nebulosis.

Loc. Habitat prata.

13. *A. clavicornis.*

L'Asile à antennes en massue, & ailes brunes bordées de blanc.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. antennis capite longioribus clavatis acuminatis, nigro rufoque varius, glaber, segmentis abdominalibus omnibus margine flavis, alis fuscis margine albo.

Loc. Idem.

14. *A. Schæfferi.*

L'Asile panaché de fauve & de noir à ailes noires.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. antennis capite brevioribus clavatis
setosis, nigro rufoque varius, glaber,
alis nigris, oris aculeo in medio in-
curvato.

Loc. Habitat prata.

15. A. armatus.

*L'Asile noir lisse à pattes & devant
de la tête fauves.*

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

A. niger glaber, fronte pedibusque ru-
fis, oris aculeo in medio incurvato.

Loc. Idem.

16. A. forcipatus.

L'Asile cendré.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

A. cinereus hirsutus.

Loc. Habitat arva & prata.

17. A. tipuloïdes.

L'Asile à pattes fauves allongées.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. lividus, thoracis lineis dorsalibus tri-
bus nigris.

Loc. Idem.

18. A. reticulatus.

L'Asile fauve à ailes réticulées.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

A. pallido-fulvus, thorace lineis dorsa-
libus tribus nigris, alis incumbenti-
bus reticulatis.

Loc. Habitat arva & prata.

19. A. viridis.

L'Asile vert doré.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. viridis nitens pedibus albis.

Loc. Habitat flores.

20. A. crassipes.

*L'Asile noir à pieds de devant en
massue.*

Long. $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. niger, pedibus anticis articulo tarsi
primo crasso clavato.

Loc. Idem.

21. A. lacrymosus.

L'Asile larmoyant.

Long. 6 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

A. thorace nigro lineis cinereis, abdomine fulvo, maculis nigris longitudinaliter positis.

Loc.

* 22. A. fulvopterus.

L'Asile à ailes fauves.

Larg. 5 lig. Long. $1 \frac{1}{3}$ lig.

A. niger, thorace lineis cinereis, alis fuscis basi fulvis.

Loc.

XCV. STRATIOMYS. LA MOUCHE-ARMÉE.

Antennæ setaceæ fractæ.

Os proboscide absque dentibus.

Thoracis apex aculeatus.

Ocelli tres.

FAMIL. I. *Thoracis aculeis duobus.*

1. S. chamæleon.

*La Mouche-armée à ventre pla-
chargé de six lunules.*

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

S. fusca, thorace subhirsuto ferrugineo, abdomine glabro ovato plano, lunulis sex luteis.

Loc. Larva habitat aquam.

2. S. Schæfferi.

La Mouche-armée à ventre plat & brun.

S. fusca, thorace hirsuto ferrugineo, abdomine glabro ovato plano immaculato.

Loc. Idem.

3. S. coccinea.

La Mouche-armée à corcelet rouge satiné.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

S. nigra, thorace sericeo rubro utrinque spinoso.

Loc.

4. S. hydroleon.

La Mouche-armée à ventre vert.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

S. fusca, abdomine viridi fasciâ longitudinali nigrâ.

Loc.

5. S. albipes.

La Mouche-armée noire à pattes blanches.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

S. nigra, tibiis albidis, alarum margine exteriori nigro.

Loc.

6. S. maculata.

La Mouche-armée noire à taches jaunes.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

S. atra, thorace abdomineque maculis flavis.

Loc. Habitat Fontem-Bellaquæum.

7. S. fasciata.

La Mouche-armée jaune à bandes noires.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. luteo-virescens, thorace lineis tribus longitudinalibus, abdomine tribus transversis arcuatis nigris.

Loc. Habitat prata.

FAMILIA II. *Thoracis aculeis sex.*

3. S. nigroptera.

La Mouche-armée noire à ventre & cuisses jaunes.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. nigra, alis nigris, femoribus abdomineque luteis.

Loc. Idem.

XCVI. MUSCA. *LA MOUCHE.*

Antennæ è patellâ planâ solidâ, setâ laterali seu pilo.

Os proboscide absque dentibus.

Ocelli tres.

FAMILIA I. *Alis variegatis.*

1. M. grossificationis.

La Mouche à aîles noires & tache blanche à l'extrémité.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, alis nigris, apice maculâ rotundâ albâ.

Loc. Habitat hortos.

2. M. morio.

La Mouche à aîles noires bordées de blanc ondé.

Long. 6 lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

M. atra hirsuta, margine alarum tenuiore sinuato albicante.

Loc. Idem.

3. M. stellata.

La Mouche à l'étoile.

Long. $1 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. cinerea, alis albis apice maculâ rotundâ radiatâ.

Loc. Idem.

4. M. vibrans.

La Mouche à aîles vibrantes ponctuées.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis albis, apice nigris.

Loc. Habitat arbores.

5. *M. grossa.*

*La Mouche noire à base des aîles
jaune.*

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. atra, basi alarum ferrugineâ.

Loc. Habitat prata.

6. *M. vivipara.*

*La Mouche noire à ventre brun
& base des aîles fauve.*

M. thorace atro, abdomine fusco, basi
alarum ferrugineâ.

Loc. Habitat hederam arboream.

7. *M. cardui.*

La Mouche à zig-zag sur les aîles.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis albis, lineâ undulatâ fuscâ fig-
moïdæâ.

Loc. Larva habitat cirsum.

8. *M. figmoïdæa.*

*La Mouche à aîles réticulées avec
une tache en zig-zag.*

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis unguiculatis, albo fuscoque reticulatis, lineâ undulatâ sigmoideâ nigriore.

Loc.

9. M. duplicata.

La Mouche à aîles réticulées avec deux taches noires.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. alis unguiculatis, albo fuscoque reticulatis, maculâ duplici nigrâ.

Loc. Larva habitat capita helenii.

10. M. reticulata.

La Mouche à aîles réticulées à bandes.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, alis albo nigroque reticulatis, fasciis transversis obscurioribus.

Loc. Habitat hortos.

11. M. trimaculata.

La Mouche à aîles jaunes chargées de points & de trois taches brunes.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. flava, alis fulvis, maculâ triplici,
punctisque plurimis fuscis.

Loc.

12. M. punctifera.

La Mouche à aîles blanches chargées de points & de trois taches brunes.

M. cinerea, alis albis, maculâ triplici,
punctisque plurimis fuscis.

Loc.

13. M. solstitialis.

La Mouche des têtes de chardon.

Long. $1 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis unguiculatis albis, fasciis tribus
fuscis, thoracis apice flavo.

Loc. Larva habitat cirsium & carduos.

14. M. 4-fasciata.

La Mouche jaune à quatre bandes brunes sur les aîles.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. flavesceus, alis albis, fasciis quatuor transversis fuscis, nonnullis connexis, thorace punctis nigris.

Loc.

15. M. 5-fasciata.

La Mouche noire, à cinq bandes noires sur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, alis albis, fasciis quinque transversis nigris, nonnullis connexis.

Loc. Habitat hortos.

16. M. marmorata.

La Mouche à aîles marbrées.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

M. fulva, alis unguiculatis fulvis fusco marmoratis maculis albis.

Loc.

17. M. conferta.

La Mouche noire à aîles picotées.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. atra, alis rotundatis nigris punctis confertis albis.

Loc.

18. *M. aselliformis.*

La Mouche noire à deux bandes blanches sur les aîles.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, alis fuscis fasciâ duplici transversâ albâ.

Loc. Habitat sylvas.

19. *M. vitrata.*

La Mouche à aîles vitrées.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

M. thorace fusco lineis pallidis, abdomine basi luteâ punctis nigris; alis nigris maculis albis.

Loc.

FAMILIA II. *Ore larvato.*
à masque

20. *M. larvata.*

La Mouche cendrée à quatre bandes noires sur les aîles dont la troisième est divisée en deux.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, alis subfulvis, fasciis quatuor transversis nigris, tertiâ interruptâ.

Loc. Habitat prata.

21. M. personata.

La Mouche cendrée à points & aîles marbrées.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, nigro punctata, alis albo fuscoque marmoratis.

Loc.

22. M. tessellata.

La Mouche à aîles réticulées de brun.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis fusco tessellato-reticulatis.

Loc.

23. M. claviformis.

La Mouche à corcelet noir à gros ventre jaune & aîles enfumées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. thorace nigro, abdomine fulvo clavato, alis fusco nebulosis.

Loc. Habitat hortorum humum recentem.

24. M. cingulata.

La Mouche à zone.

Long. 3 lig. Larg. 3 lig.

M. fulva, abdomine flavo, segmenti primi & secundi margine nigro, alis fulvo nebulosis.

Loc.

25. M. longicornis.

La Mouche à tache brune sur le bord de l'aîle & point noir au milieu.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, thorace fasciis nigris, alarum margine externo maculis fuscis, medio puncto nigro.

Loc.

26. *M. aquatica.*

La Mouche à bord des aîles jaunâtre, & trois points noirs sur chacune.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, thorace fasciis fuscis, alarum margine externo flavescente singulo punctis tribus nigris.

Loc. Larva habitat lentem palustrem.

27. *M. geographica.*

La Mouche à aîles géographiques.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, abdomine fulvo fasciâ longitudinali nigra, alis albo fuscoque variegatis.

Loc.

FAMILIA III. *Variegatæ.*

28. *M. vespiformis.*

La Mouche imitant la guêpe, à courtes antennes.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

M. nigra, flavo variegata, alis fuscis,
antennis capite brevioribus.

Loc. Habitat flores.

29. M. festiva.

*La Mouche imitant la guêpe, à
longues antennes.*

M. nigra, flavo variegata, alis fuscis,
antennis capite longioribus.

Loc.

30. M. interfecta.

*La Mouche à corcelet noir taché
de jaune, & ventre jaune à
bandes noires.*

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

M. thorace nigro, flavo maculato, ab-
domine flavo, fasciis transversis nigris.

Loc. Habitat sylvas.

31. M. bombyliformis.

*La Mouche velue noire & fauve
imitant le bourdon.*

M. hirsuta nigra, thorace antice, abdomineque supra flavis.

Loc. Larva habitat radicem narcissi.

32. M. saltatrix.

La Mouche jaune à bande noire.

Long. $1 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

M. lutea, thorace lineis tribus longitudinalibus, abdomine plurimis transversis nigris.

Loc. Habitat folia plantarum.

33. M. hemisphærica.

La Mouche noire, à ventre hémisphérique roux tacheté de noir.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. nigra, abdomine hemisphærico rufo, punctorum nigrorum ordine longitudinali.

Loc.

34. M. caudata.

La Mouche noire à ventre jaune noir dans le milieu.

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, abdomine hemisphærico luteo,
fascia longitudinali nigrâ.

Loc. Larva habitat aquas stagnantes.

35. M. hortensis.

*La Mouche brune à bandes trans-
verses blanchâtres sur le ventre.*

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

M. fusca, marginibus incisurarum abdo-
minis cinereis, alis ferrugineis.

Loc. Habitat flores.

36. M. aphidivora.

*La Mouche noire à bandes trans-
verses jaunes sur le ventre.*

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, marginibus incisurarum abdo-
minis flavis, alis fuscis.

Loc. Habitat flores, aphides devorat.

37. M. nemorum.

*La Mouche cendrée à bandes blan-
ches sur le ventre, & deux gran-
des taches jaunes sur le pre-
mier anneau.*

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

M. thorace cinereo , abdominis basi fasciâ luteâ interruptâ marginibus incisurarum exalbidis.

Loc.

38. M. ribesii.

La Mouche à quatre bandes jaunes sur le ventre , dont la première est interrompue.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. abdomine ovato nigro , lunularum pari singulisque tribus flavescentibus.

Loc. Habitat ribesum.

39. M. interrupta.

La Mouche brune à deux taches jaunes à la base du ventre.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

M. fusca , abdominis basi fasciâ luteâ interruptâ.

Loc. Habitat flores.

40. *M. pendula.*

La Mouche à corcelet strié & bandes jaunes interrompues sur le ventre.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

M. thorace striis quatuor flavis; abdominalibus segmentis tribus interrupto-flavis.

Loc. Habitat flores.

41. *M. inæqualis.*

La Mouche à bandes jaunes alternativement plus larges sur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

M. thorace nigro-viridi, apice flavo, abdomine nigro fasciis transversis luteis, alternis majoribus.

Loc. Habitat hortos.

42. *M. transfuga.*

La Mouche à pointe du corcelet & bande sur le ventre de couleur jaune.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. thorace nigro-viridi, apice flavo;
abdomine nigro fasciis luteis trans-
versis æqualibus.

Loc. Habitat flores.

43. M. orbiculata.

*La Mouche à points jaunes ronds
sur le ventre.*

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

M. thorace nigro; abdomine atro, pa-
ribus tribus macularum rotundarum
lutescentium.

Loc. Larva aphides devorat.

44. M. mellina.

*La Mouche à points jaunes trian-
gulaires sur le ventre.*

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. thorace nigro-viridi apice flavo; ab-
domine oblongo, paribus tribus tri-
gonorum lutescentium.

Loc. Idem.

45. M. tetragona.

*La Mouche à six points jaune
quarrés sur le ventre.*

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

M. thorace nigro-viridi; abdomine oblongo, paribus tribus tetragonorum lutescentium.

Loc. Larva aphides devorat.

46. M. quadrata.

La Mouche à quatre points jaunes sur le ventre.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. nigro-viridis, abdomine paribus duobus tetragonorum lutescentium.

Loc. Habitat hortos.

47. M. pyrastris.

La Mouche à six taches blanches en croissant sur le ventre.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. thorace nigro-viridi, abdomine atro ovato, tribus paribus lunularum albicantium.

Loc. Habitat hortos; larva aphidivora.

48. M. lineata.

La Mouche dorée à trois paires de raies blanches sur le ventre.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. aurata abdomine nigro, tribus paribus linearum albicantium.

Loc. Habitat hortos.

49. *M. vorax.*

La Mouche brune à huit taches jaunes oblongues sur le ventre.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

M. thorace nigro-viridi apice flavo; abdomine atro, quatuor paribus macularum oblongarum flavescentium.

Loc. Larva aphidivora.

50. *M. pipines.*

La Mouche à grosses cuisses.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. oblonga femoribus posticis majoribus.

Loc. Idem.

51. *M. coalescens.*

La Mouche à antennes réunies.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

M. nigra, abdominis medio ferrugineo antennis basi coalitis.

Loc.

* 52. M. turcica.

La Mouche aux croissants d'or.

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

M. nigra thoracis lateribus & apice flavis, abdominis fasciis tribus arcuatis luteis interruptis, alarum margine lutescente.

Loc.

53. M. cruentata.

La Mouche noire à bande rouge transverse sur le ventre.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. atra, abdominis fasciâ transversâ rubrâ.

Loc. Rara in hortis.

* 54. M. doliata.

La Mouche à cerceaux.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

M. thorace hirsuto fulvo, abdomine nigro, cingulis quatuor flavis.

Loc.

55. *M. apiformis.*

La Mouche apiforme.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

M. fusca; segmentis abdominalibus tribus
margine albidis primo latere flavo,
thorace vix maculato.

Loc. Larva habitat aquam stagnant. & mucum
vegetabilem ex quo papyrus extrahitur.

56. *M. adunata.*

La Mouche à antennes en y-grec.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, flavo variegata, alarum par-
te externâ nigrâ, antennis basi coas-
litis.

Loc.

FAMILIA IV. *Auratae.*

57. *M. cæsar.*

La Mouche dorée commune.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

M. thorace abdomineque viridi nitente
pedibus nigris.

Loc. Larva habitat cadavera, undèquaque.

58. M. sericea.

La Mouche cuivreuse à pattes blanches.

Long. $2 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. thorace, abdomineque viridi sericeo
pedibus pallidis, alis albis.

Loc. Habitat hortos.

59. M. cuprea.

*La Mouche verte cuivreuse à ailes
mi-parties de brun & de blanc.*

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. thorace abdomineque viridi sericeo,
pedibus pallidis, alarum medio fusco.

Loc. Habitat superficiem aquæ & loca humida.

60. M. trinervis.

*La Mouche dorée à trois nervures
sur les ailes.*

Long. $1 \frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

M. thorace abdomineque viridi nitenti po-
dibus ferrugineis, alis trinervis.

Loc. Habitat sylvas,

61. *M. cadaverina.*

*La Mouche dorée à corcelet bleu
& ventre vert.*

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. thorace cœruleo nitente, abdomine
viridi nitente.

Loc. Larva habitat cadavera.

62. *M. putris.*

*La Mouche à corcelet vert & ven-
tre bleu.*

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. thorace viridi nitente, abdomine cœ-
ruleo nitente.

Loc. Idem.

^{bon} 63. *M. vomitoria.* ^{fabr.} ^{oliv.} (*Lispa Vomitoria la treille*)

²³ *La Mouche bleue de la viande.*

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. thorace nigro, abdomine cœruleo.

Loc. Habitat carnes apud laniones, &c. fre-
quentissima.

64. *M. hederacea.*

*La Mouche bleue à base des ailes
fauve.*

M. cœrulea, basi alarum ferrugineâ.
Loc. Larva habitat hederam, vivipara.

65. *M. cupraria.*

*La Mouche dorée à tache brune
sur les ailes.*

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. oblonga, capite viridi, thorace aureo, abdomine cupreo, alis maculâ fuscâ.

Loc. Habitat hortos.

66. *M. contracta.*

*La Mouche dorée à ventre brun
& noir.*

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

M. oblonga, thorace æneo; abdomine antèrius flavo, posterius nigro.

Loc. Habitat sylvas,

67. *M. annulata.*

La Mouche verdâtre à anneau blanc aux tarses.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. thorace viridi nitente abdomine æneo tarforum annulo albo.

Loc. Habitat humum recentem, gallice (*les couches*).

68. *M. plumbea.*

La Mouche brune bronzée.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. tota plumbea.

Loc.

69. *M. smaragdina.*

La Mouche à tête verte.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. capite viridi, capite plumbeo nitente, pedibus flavis, alis nervosis.

Loc.

FAMIL. V. *Vulgares.*70. *M. carnaria.**La grande Mouche à extrémité du ventre rougeâtre.*Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.*M. nigra*, abdomine nitido tessellato, thorace lineolis pallidioribus longitudinalibus; ano fulvâ.*Loc.* Habitat carnes & hortos; vivipara.71. *M. domestica.**La Mouche commune.*Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.*M. nigra*, abdomine nitido tessellato, thorace lineolis pallidioribus longitudinalibus, ano concolore.*Loc.* Habitat domos, frequentissima.72. *M. cinerascens.**La Mouche cendrée à poils noirs.*Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.*M. cinerea* tota, pilis nigris.*Loc.* Larva habitat fimeta.

73. *M. pluvialis.**La Mouche cendrée à points noirs.*Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*M. cinerea*, thorace quinque maculis nigris, abdomine maculis tridentatis.*Loc.* Larva habitat folia humida.74. *M. stercoraria.**La Mouche merdivore.*Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*M. hirsuta cinerea*, alis puncto obscuro.*Loc.* Habitat fæces bovinas.75. *M. spinifera.**La Mouche noire à pattes épineuses.*Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.*M. nigra*, alis fuscis, pedibus spinosis.*Loc.* Habitat arbores.76. *M. caracteristica.**La Mouche à caractères noirs.*Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.*M. thorace nigro*, lineolis quatuor longitudinalibus albidis; abdomine fusco, medio caracteribus nigris.*Loc.* Habitat flores.

77. M. fulvipes.

La Mouche noire à pattes fauves.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, alis incumbentibus pedibus ferrugineis.

Loc. Habitat folia humida.

78. M. guttata.

La Mouche noire à tache blanche sur le ventre.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, alis incumbentibus halteribus abdominisque maculâ albis.

Loc.

79. M. divaricata.

La Mouche toute noire.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, alis divaricatis pedibus nigris.

Loc. Habitat hortos.

80. M. globulipes.

La Mouche à tarses antérieurs très-gros.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra , tarsis anticis clavatis crassis.

Loc. Habitat hortos ; rarior.

81. M. fallax.

La Mouche noire avec un trait noir sur la moitié du bord extérieur de l'aile.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. atra ; alis albis , marginis exterioris medietate supernâ lineâ nigrâ.

Loc. Habitat flores.

82. M. fimetorum.

La Mouche noire à ailes brunes & yeux rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra , alis fuscis oculis rubris.

Loc. Habitat fimeta.

83. M. lateralis.

La Mouche noire avec le devant de la tête blanc , & les côtés du ventre fauves.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. nigra fronte albâ, abdominis lateribus ferrugineis.

Loc. Habitat hortos & arva.

84. M. marginalis.

La Mouche à point marginal brun sur les aîles.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. fusca, alis maculâ marginali fuscâ.

Loc. Habitat hortos.

85. M. longipes.

La Mouche à point marginal sur les aîles & pattes jaunes.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. fusca, alis puncto marginali fusco, pedibus flavescentibus.

Loc. Habitat flores.

86. M. tipulæa.

La Mouche grise à pattes longues & jaunes.

Long. $1 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. cinerea, pedibus flavescentibus.

Loc. Idem.

87. M. Ichneumonoides.

*La Mouche noire à pattes jaunes
& ventre allongé, semblable
à un ichneumon.*

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, pedibus flavis, antennis abdomineque tenuibus productis.

Loc. Habitat hortos, rarissima.

88. M. pulicaria.

*La Mouche noire à pattes jaunes
& bord extérieur des ailes noir.*

Long. 1 lig. Long. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, pedibus flavis alarum margine externo nigro.

Loc. Habitat flores.

89. M. libatrix.

*La Mouche à ailes vibrantes sans
taches.*

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, pedibus rufis, alis vibrantibus immaculatis.

Loc. Habitat folia arborum in sylvis.

90. *M. cellaris.*

La Mouche du vinaigre.

Long. $1 \frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. ferrugineo fusca, subpilosa, oculis ferrugineis, alis trinervis.

Loc. Habitat vinum & acetum, frequentissima.

91. *M. flava.*

La Mouche jaune aux yeux noirs.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. flava, oculis nigris.

Loc. Habitat flores & domos.

92. *M. pigra.*

La Mouche jaune à bandes noires sur le corcelet.

Long. $1 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

M. flava, abdomine supra fusco, thorace tribus striis nigris.

Loc. Habitat flores.

93. *M. cruciata.*

La Mouche jaune à aîles bleuâtres & croisées.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. flavescens, oculis nigris, alis incumben-
bentibus glaucis.

Loc. Habitat flores.

XCVII. STOMOXYS. *LE STO-
MOXE.*

Antennæ patellatæ setâ laterali pilosâ.

Os rostro subulato simplici acuto.

Ocelli tres.

1. S. calcitrans.

Le Stomoxe.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

Loc. Habitat prata, autumnalis; equos laceffit.

XCVIII. VOLUCELLA. *LA VOLU-
CELLE.*

Antennæ patellatæ setâ laterali pilosâ
capiti insidentes.

Os proboscide vaginâ acutâ seu rostro
reconditum.

Ocelli tres.

1. V. pelluceus.

*La Volucelle à ventre blanc en
devant.*

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

V. abdomine antice albo, postice nigro,
alis albis, nigrâ maculâ.

Loc. Habitat rosam.

2. V. nigra.

La Volucelle à ventre tout noir.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Long. 3 lig.

V. tota nigra, pilis fulvis; alis albis
maculâ nigrâ.

Loc. Idem.

3. V. flaves cens.

La Volucelle à ventre jaunâtre.

Larg. 4 lig. Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

V. thorace nigro, apice fulvo; abdo-
mine flavescente.

Loc. Habitat hortos, rara.

* 4. V. maculata.

La Volucelle à tache noire.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

V. nigra pilosa, abdominis apice pilis
fulvis, alis albis maculâ nigra.

Loc. Habitat flores umbellatos & aquaticos.

XCIX. NEMOTELUS. *LA NEMO- TELE.*

Antennæ moniliformes, stylo termi-
natæ rostro infidentes.

Os proboscide, vaginâ acutâ seu
rostro reconditum.

Ocelli tres.

1. N. fasciatus.

La Nemotèle à bande.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

N. niger, abdomine niveo fasciis duabus
nigris.

Loc. Habitat flores.

2. N. punctatus.

*La Némotèle noire à ventre tacheté
de blanc.*

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

N. niger, abdomine punctis albis.

Loc. Habitat prata humida.

N. stellaris.

La Némotèle à points d'argent.

Long. $5 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

N. niger, hirsutie flava conspersus, alarum basi puncto argenteo.

Loc.

SCATHOPSE. LE SCATOPSE.

Antennæ filiformes.

Os proboscide absque dentibus.

Ocelli tres.

1. S. nigra.

Le Scatopse noir.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

S. nigra.

Loc. Habitat loca humida & latrinas.

2. S. buxi.

Le Scatopse du bouis.

Long. $1 \frac{1}{3}$ lig.

S. flava, alis albis.

Loc. Habitat folia buxi, quæ subtus contorquetur.

CI. HIPPOBOSCA. *L'HIPPOBOSQUE.*

Antennæ fetaceæ brevissimæ ex unico pilo.

Os rostro cylindrico obtuso.

Ocelli tres.

1. *H. equina.*

La Mouche à chien.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

H. pedibus tetradactylis, alis cruciatis.

Loc. Habitat cutem canis, equi, &c.

2. *H. hirundinis.*

La Mouche araignée.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

H. pedibus sexdactylis, alis divaricatis.

Loc. Habitat nidos hirundinum.

CII. TIPULA. *LA TIPULE.*

Antennæ filiformes, subpectinatae
(maribus sæpe plumosæ) capite
multo longiores.

Os tentaculis incurvis articulatis.

Ocelli tres.

FAMILIA

FAMIL. I. *Alis patentibus.*

1. T. crocata.

*La Tipule variée de brun, de jaune
& de noir.*

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

T. corpore nigro, fulvo, flavoque variegata.

Loc. Larva habitat exætas arbores.

2. T. rivosæ.

La Tipule à aîles panachées.

Long. Mâle 10 lig. Femelle 14 lig.

T. alis albis fusco variegatis.

Loc. Habitat prata.

3. T. oleracea.

La Tipule à bords des aîles bruns.

Long. 8, 9 lig. Larg. 1 lig.

T. alis exalbidis, lineâ marginali fuscâ.

Loc. Idem.

4. T. lunata.

La Tipule à aîles cendrées avec une tache blanche marginale.

Long. 8 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

T. alis cinerascens, lunulâ albâ marginali.

Loc. Habitat præta.

5. T. cornicina.

La Tipule jaune à points noirs rangés en trois bandes sur le ventre.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

T. alis subfuscis, thorace flavo caracteribus nigris, abdomine luteo punctorum nigrorum lineis tribus longitudinalibus.

Loc. Idem.

6. T. caracteristica.

La Tipule jaune à tache marginale sur les aîles, & à bande brune sur le ventre.

Long. 5 lig. Long. 1 lig.

T. flava, alis subfuscis, puncto marginali fusco, thorace caracteribus nigris, abdomine lineâ longitudinali nigrâ.

Loc. Habitat prata.

7. T. melanopis.

La Tipule jaune aux yeux noirs.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. flava oculis nigris.

Loc. Idem.

8. T. contaminata.

La Tipule noire à taches jaunes & aîles maculées.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, pedibus abdominisque maculis utrinque lividis, alis nigro maculatis.

Loc. Idem.

9. T. duplicata.

La Tipule brune à double point marginal.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. fusca, alis albis puncto marginali
duplici fusco.

Loc. Habitat prata.

10. T. nigra.

La Tipule noire à ailes brunes.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis fuscis, corpore atro.

Loc. Idem.

11. T. atra.

La Tipule toute noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. tota atra lævis.

Loc. Idem.

12. T. marginata.

*La Tipule noire à ventre bordé de
jaune.*

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

T. atra abdomine utrinque limbo ferru-
gineo.

Loc. Idem.

13. *T. plumbea.*

La Tipule de couleur plombée à ailes blanches.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

T. plumbea, alis albis.

Loc. Habitat prata.

14. *T. marginalis.*

La Tipule jaune à point marginal de couleur cendrée.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

T. flaves cens, puncto marginali alarum cinereo.

Loc. Idem.

FAMIL. II. *Alis incumbentibus.*

tipulae culiciformes

15. *T. tessellata.*

La Tipule à ailes en damier.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis albo fuscoque tessellatis corpore fusco.

Loc. Idem.

16. T. plumosa.

La Tipule à corcelet vert & point marginal noir sur les ailes.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. fusca, thorace virescente; alis pelucidis puncto nigro.

Loc. Habitat ripas aquarum.

17. T. littoralis.

La Tipule brune à ventre de couleur verte en devant.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

T. fusca, abdomine anterieus viridi.

Loc Habitat folia in hortis, & vitra domorum.

18. T. motatrix.

La Tipule à pattes en forme d'antennes ornées d'un anneau blanc.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

T. pedibus anticis maximis antenniformibus motatoribus, annulo albo.

Loc. Habitat prata.

19. T. vibratrix.

La Tibule à pattes en forme d'antennes sans anneaux.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

T. pedibus anticis maximis antenniformibus motatoribus immaculatis.

Varietas A. Corpore viridi.

B. Corpore fusco, abdomine annulis pallidis octo.

Loc. Idem.

20. T. monilis.

La Tipule à pattes d'arlequin.

Long. $1 \frac{1}{3}$ lig. Long. $\frac{3}{4}$ lig.

T. pedibus albis annulis nigris, alis albis cinereo-maculatis.

Loc. Habitat prata & vitra domorum.

21. T. riparia.

La Tipule verte à ailes blanches sans taches ni points.

Long. $1 \frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{5}$ lig.

T. viridis, alis albis immaculatis.

Loc. Habitat undèquaque.

22. T. fasciata.

La Tipule verte à bande transverse sur les aîles.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

T. viridis, alarum fasciâ transversâ fuscâ.

Loc.

23. T. punctata.

La Tipule brune à quatre points bruns sur les aîles.

Long. $1 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

T. fusca, alis albidis, puncto quadruplici fusco.

Loc. Habitat vitra domorum.

24. T. reticulata.

La Tipule à aîles réticulées.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig.

T. fusca, alis albis fusco reticulatis.

Loc. Habitat loca aquatica.

25. T. immaculata.

La Tipule brune à aîles blanches.

Long. $1 \frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

T. fusca, alis albis immaculatis.

Loc.

26. T. atra.

La Tipule noire à aîles blanches.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

T. atra, alis niveis.

Loc. Habitat hortos.

27. T. variegata.

La Tipule à pattes noires & jambes blanches.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{5}$ lig.

T. luteo fuscoque variegata, pedibus nigris, tibiis albis.

Loc. Habitat sylvas & hortos.

28. T. conica.

La Tipule noire à aîles noires.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

T. atro-fusca, alis nigris abdomine conico acuto.

Loc. Habitat loca humida domorum, & hor-
torum.

CIII. BIBIO. *LE BIBION.*

Antennæ taxiformes perfoliatae, capite vix longiores.

Os tentaculis incurvis articulatis.

Ocelli tres.

1. *B. marginalis.*

Le Bibion noir à pattes jaunâtres & point marginal.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. atro fuscus, pedibus lividis, alarum puncto marginali fusco.

Loc.

2. *B. febrilis.*

Le Bibion de S. Marc noir.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

B. ater hirsutus, alis albis margine exterioriore nigro.

Loc. Habitat arbores æstivo tempore.

3. *B. hortulanus.*

Le Bibion de S. Marc rouge.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

B. alis albis margine exteriori nigro, thorace abdomineque rubris.

Loc. Larva faeces bovinas habitat.

4. B. phalænoides.

Le Bibion à ailes frangées & sans taches.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

B. alis deflexis cinereis, ovato lanceolatis, ciliatis immaculatis.

Loc. Habitat humida loca, & muros latrinarum.

3. B. ciliatus.

Le Bibion à ailes frangées & couvert de taches nébuleuses.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. alis deflexis cinereis, ovato-lanceolatis, ciliatis, nebuloso maculatis.

Loc. Habitat arbores in sylvis umbrosis.

CIV. CULEX. LE COUSIN.

Antennæ pectinatae (maribus plumosae.

Os siphone filiformi.

Ocelli nulli.

1. *C. pipines.**Le Cousin commun.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.*C. cinereus*, abdomine annulis fuscis octo.*Loc.* Habitat prata aquatica.2. *C. pulicaris.**Le Cousin à trois taches sur les aîles.*Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{8}$ lig.*C. alis maculis tribus obscuris*, antennis apice bifurcis.*Loc.* Habitat sylvas & loca excelsa.* 3. *C. annulatus.**Le Cousin à pattes panachées.*

Long.

C. fuscus, alis nervosis, pedibus albo intersectis.*Loc.* Habitat adonides horti regii Parisiensis.

SECTIO SEXTA.

INSECTA APTERA.

CV. PEDICULUS. *Le Pou.*

Pedes sex.

Oculi duo.

Antennæ filiformes.

Abdomen simplex.

1. *P. humanus.*

Le Pou ordinaire.

P. humanus.

2. *P. pubis.*

Le Morpion.

P. inguinalis.

3. *P. bovis.*

*Le Pou du bœuf à ventre chargé
de huit bandes transverses.*

P. bovis, abdomine lineis transversis
octo ferrugineis.

4. P. vituli.

Le Pou du bœuf à ventre de couleur plombée.

P. bovis abdomine plumbeo.

5. P. circi.

Le Pou du busard.

P. circi, fuscus oblongus, abdomine flavescens, medio lateribusque fuscis.

6. P. passeris.

Le Pou du moineau franc.

Long. $\frac{3}{4}$ lig.

P. subflavescens, abdomine ovato, medio diaphano, maculâ fuscâ, lateribus punctato-ferrugineis.

7. P. columbæ.

Le Pou du pigeon.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{5}$ lig.

P. oblongus, filiformis, albicans, corporis lateribus utrinque ferrugineis.

8. P. corvi.

Le Pou du corbeau.

Long. 1 lig.

P. albo nigroque varius, abdomine ovato oblongo, utrinque incisuris nigris.

9. P. meleagridis.

Le Pou du dindor.

P. galli-pavonis.

10. P. caponis.

Le Pou de la poule à ventre bordé de noir.

P. gallinæ, abdominis margine nigro.

11. P. gallinæ.

Le Pou de la poule à tête & corcelet pointus des deux côtés.

P. gallinæ, thorace capiteque utrinque mucronato.

12. P. pulfatorius.

Le Pou du bois.

P. ligni antiqui.

Pediculi Rhedi & Linnæi.

- 1°. *Pediculus accipitris*, abdomine oblongo.
- 2°. *P. accipitris*, abdomine ovato.
- 3°. *P. gruis*.
- 4°. *P. fulicæ*.
- 5°. *P. picæ*.
- 6°. *P. ardeæ*.
- 7°. *P. ardeolæ*.
- 8°. *P. cygni*, abdomine oblongo immaculato.
- 9°. *P. cygni*, abdomine ovato utrinque lineis fuscis notato.
- 10°. *P. lari*.
- 11°. *P. anseris*, capite ovato, abdomine oblongo, incisuris utrinque maculatis.
- 12°. *P. anseris*, capite triangulari, abdomine immaculato.

- 13°. P. pluvialis, abdomine margine simplici.
- 14°. P. pluvialis, abdomine margine dentato ferrato.
- 15°. P. querquedula.
- 16°. P. falconis tinnunculi.
- 17°. P. pavonis, antennis dichotomis capite longioribus, abdomine utrinque immaculato.
- 18°. P. pavonis, antennis simplicibus capite brevioribus, abdomine immaculato.
- 19°. P. sturni.
- 20°. P. sternæ.
- 21°. P. recurvirostræ.
- 22°. P. hæmathopi.
- 23°. P. lagopi.
- 24°. P. asini.
- 25°. P. cervi, abdomine fusco, medio albo.

26°. P. cervi, abdominis incisuris punctis nigris.

N. B. Adde pediculos animalium exoticorum.

CVI. PODURA, *LA PODURE*.

Pedes sex.

Oculi duo.

Antennæ filiformes.

Abdominis cauda bifurca inflexa saltatrix.

Corpus squamis tectum.

FAMIL. I. *Globulosæ*.

1. P. signata.

La Podure noirâtre à taches fauves sur le ventre.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

P. fusco-nigra, abdomine globoso signaturis ferrugineis.

Loc. Habitat lapides humidos.

2. P. viridis.

La Podure verte aux yeux noirs.

Long. $\frac{1}{4}$ lig.

P. viridis, oculis nigris, capite flavesc-
cente, antennis in medio fractis.

Loc. Habitat plantas in mense aprili.

3. P. longicornis.

La Podure brune enfumée.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

P. fusca non nitens, antennis longitu-
dine corporis.

Loc. Habitat cortices arborum.

FAMILIA II. Longæ.

4. P. communis.

La Podure commune velue.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. fusco nigroque variegata villosa.

Loc. Habitat lapides humidos.

5. P. livida.

La Podure jaune à anneaux noirs.

Long. $\frac{2}{3}$ lig.

P. livido-lutea, annulis transversis nigris.

Loc. Idem.

6. *P. annularis.**La Podure porte-anneau.*Long. $1 \frac{1}{3}$ lig.*P. nigra*, thoracis limbo antennarumque
basi flavis, pedibus furcâque pallidis.*Loc.* Habitat ligna exarsa. 57. *P. viatica.**La Podure noire terrestre.*Long. $1 \frac{1}{5}$ lig.*P. atra viatica.**Loc.* Habitat vias, socialis.7. *P. aquatica.**La Podure noire aquatique.**P. atra aquatica.**Loc.* Habitat superficiem aquarum stagnantium.9. *P. plumbæa.**La Podure grise commune.*

Long. 1 lig.

*P. plumbea.**Loc.* Habitat arbores, prata solitaria.

10. P. violacea.

La Podure violette.

P. violacea.

Loc. Habitat cum communi.

CVII. FORBICINA. *LA FORBICINE.*

Pedes sex origine latâ & squamosâ.

Oculi duo.

Os tentaculis duobus mobilibus.

Antennæ si iformes.

Abdominis cauda tripilis.

Corpus squamis tectum.

1. F. saccharina.

La Forbicine platte.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

F. plana.

Loc. Habitat ligna exæsa, lapides, fenestra
undequaue.

2. F. saltatrix.

La Forbicine cylindrique.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

F. teres saltatrix.

Loc. Id.; rarior.

CVIII. PULEX. *LA PUCE.*

Pedes sex saltatorii.

Oculi duo.

Os inflexum.

1. *P. irritans.**La Puce.*CIX. CHELIFER. *LA PINCE.*

Pedes octo.

Oculi duo.

Antennæ cheliformes rostro longiores.

1. *C. cancroides.**Le Scorpion araignée.*Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.*C. fuscus*, abdomine lineis transversis.*Loc.* Habitat hortos sub lapidibus.2. *C. longicornis.**La Pince rouge.*Long. $\frac{1}{3}$ lig.*C. totus ruber*, antennis extremo bisetis.*Loc.* Habitat sub lapidibus & corticibus arborum.

CX. ACARUS. *LA TIQUE.*

Pedes octo.

Oculi duo.

Antennæ simplices rostro breviores.

1. A. ricinus.

La Tique des chiens.

Long. $1 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. lividus, antennis brevibus subclavatis, abdomine antice maculâ ovatâ fuscâ nitente.

Loc. Habitat aures canum.

2. A. siro.

Le Ciron de la galle.

A. humanus subcutaneus.

Loc. Habitat cutem humanam in scabie. An existat verè inquirendum?

3. A. casei.

Le Ciron du fromage.

A. casei antiqui.

Loc. Habitat caseum.

4. *A. coleoptreorum.**La Mitte des coleoptères.*Long. $\frac{3}{4}$ lig.*A. insectorum rufus, ano albicante.**Loc. Habitat scarabæos.*5. *A. gymnopterorum.**La Mitte rouge des mouches.**A. gymnopterorum ruber, punctorum
coccineorum utrinque pari.**Loc. Habitat annulos muscæ.*6. *A. muscarum.**La Mitte brune des mouches.**A. rufus muscarum, pedibus posticis longis
filiformibus.**Loc. Idem.*7. *A. holosericeus.**La Tique rouge satinée terrestre.*Long. 3 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*A. terrestris ruber abdomine depresso.**Loc. Habitat præta & gramina sicca.*

8. A. aquaticus.

La Tique rouge satinée aquatique.

A. aquaticus ruber abdomine depresso.

Loc. Habitat aquas stagnantes.

9. A. stagnalis.

*La Tique aquatique panachée.*A. aquaticus niger, abdominis medio
lateribusque flavis.

Loc. Habitat stagna.

10. A. petrarum.

*La Tique rouge des pierres à pat-
tes antérieures fort longues.*Long. $\frac{1}{3}$ lig.A. petrarum ruber, pedibus anticis lon-
gitudine corporis.

Loc. Habitat superficiem lapidum.

11. A. lucidus.

*La Tique noire & lisse des pierres.*Long. $\frac{1}{4}$ lig.A. petrarum niger, abdomine globoso
lucido, femoribus subclavatis.

Loc. Idem.

12. *A. coleoptratus.*

La Tique noire à ventre anguleux en devant.

A. ater, lateribus abdominis antrorsum acutis.

Loc. Habitat lapides & muros.

13. *A. textor.*

Le Tisserand d'automne.

A. fuscus, autumnalis, textor.

Loc. Habitat corticem arborum, quas sericeo filo obvestit.

24. *A. vespertilionis.*

La Tique de la chauve-souris.

Long. 1 lig.

A. fuscus, ovatus, pedibus pallidis, vespertilionis.

Loc. Habitat corpus vespertilionis.

CXI. PHALANGIUM. *LE FAUCHEUR.*

Pedes octo.

Oculi duo.

Antennæ angulosæ.

Tentacula duo longa antenniformia.

1. P. opilio.

Le Faucheur.

Loc. Habitat undèquaque.

CXII. ARANEA. *L'ARAIGNÉE.*

Pedes octo.

Oculi duo.

FAMILIA I. *Oculi in lunam dispositi.*
eu lunule

1. A. viatica.

L'Araignée à pattes de devant longues & arlequinées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. thorace fusco, abdomine lutescente, pedibus quatuor posticis brevissimis, anticis longis luteo nigroque intersectis.

Loc. Habitat plantas.

2. A. citrina.

L'Araignée citron.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. citrino-lutea, pedibus quatuor posticis brevissimis, abdomine utrinque fasciâ ferrugineâ.

Loc. Idem.

3. A. extensa.

L'Araignée à ventre cylindrique & pattes de devant étendues.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. abdomine longo argenteo virescente, pedibus longitudinaliter extensis.

Loc. Habitat sylvas humidas.

4. A. fasciata.

L'Araignée brune à trois raies transverses blanches sur le ventre.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A. fusca, thorace lineis quatuor obliquis fuscis, abdomine tribus transversis albis.

Loc. Habitat hortos.

5. A. interfecta.

L'Araignée à ventre roux rayé de noir & pattes arlequinées.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, abdomine ferrugineo flavo lineis transversis contiguis, nigris pedibus fusco ferrugineoque interfectis.

Loc. Habitat arva.

FAMILIA II. *Oculi in quadratum dispositi.*
eu quatre

6. A. parietina.

L'Araignée brune domestique.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

A. atro-fusca, subvillosa, pedibus atro fuscoque intersectis.

Loc. Habitat angulos murorum, domestica.

7. A. aquatica.

L'Araignée brune aquatique.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

A. aquatica tota fusca.

Loc. Habitat aquam stagnantem.

8. A. foliata.

*L'Araignée porte-feuille.*Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

A. pallida, abdomine folium longitudinaliter extensum pallide nigrum referente.

Loc. Habitat prata.

9. *A. dumetorum.**L'Araignée à feuille coupée.*Long. $4 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.*A. livido rufa, abdominis picturâ foliaceâ nigrâ, luteo intersectâ, pedum annulis nigris.**Loc. Habitat sylvas, telam verticalem construit.*10. *A. papalis.**L'Araignée à croix papale.*Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{3}{4}$ lig.*A. livido-rufa, abdomine cruce triplici luteâ.**Loc. Habitat hortos.*11. *A. longipes.**L'Araignée rougeâtre à ventre jaune ponctué de noir.*Long. $3 \frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 lig.*A. pallido-rufa, abdomine flavescente punctis nigris.**Loc. Habitat arbores.*12. *A. vittata.**L'Araignée à bande rouge.*Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

A. pallida, abdomine ovato flavo, fasciâ longitudinali coccineâ.

Loc. Habitat cupressum, in horto regio.

13. *A. phalangiodes.*

L'Araignée domestique semblable au faucheur.

Long. 6 lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

A. fusco-flavescens, pedibus longis corpore triplo longioribus.

Loc. Habitat domos.

FAMILIA III. *Oculi in duas lineas dispositi.*

sur 2 lignes

14. *A. marmorata.*

L'Araignée à feuille découpée & déchiquetée.

Long. $3 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

A. livido-rufa, abdominis picturâ foliaceâ sæpius interruptâ, pedibus nigro maculatis.

Loc. Habitat plantas, filum horizontalem confruit.

FAMILIA IV. *Oculi in tres lineas dispositi.*

15. *A. lupus.*

sur 3 lignes

L'Araignée loup.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. tota fusca fuliginea.

Loc. Habitat arva sine filo.

16. *A. palustris.*

L'Araignée cendrée à trois lignes blanches sur le corcelet.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

A. tota cinereo-villosa, thoracis lineâ triplici albidâ.

Loc. Habitat prata humida.

17. *A. scenica.*

L'Araignée sauteuse aux trois chevrons blancs.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig.

A. saliens nigra, abdomine utrinque lineis tribus albis ad angulum acutum coeuntibus.

Loc. Habitat arva & domos.

FAMILIA V. *Oculi in ferta
dispositi.*
en bouquet

18. A. meticulosa.

*L'Araignée domestique à longues
pattes.*

A. longipes, thorace pedibusque pallidis,
abdomine plumbeo fusco.

Loc. Habitat domos.

CXIII. MONOCULUS. LE MONO-
CLE.

Pedes sex.

Oculus unus.

Antennæ multiplices setis plurimis
lateribus.

Corpus crustâ tectum.

1. M. pulex.

Le Perroquet d'eau.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

M. antennis dichotomis, caudâ inflexâ:

Loc. Habitat aquam stagnantem, quam sangui-
neo colore tingit.

2. M. pediculus.

Le Monocle à queue retroussée.

M. antennis dichotomis, caudâ reflexâ.

Loc. Habitat aquam stagnantem, quam sanguineo colore tingit.

3. M. quadricornis.

Le Monocle à queue fourchue.

M. antennis quaternis, caudâ rectâ bifidâ.

Loc. Idem.

4. M. conchaceus.

Le Monocle à coquille longue.

Long. $1 \frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. antennis capillaceis multiplicibus, testâ bivalvi oblongâ.

Loc. Idem.

5. M. testaceus.

Le Monocle à coquille courte.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. antennis capillaceis multiplicibus, testâ bivalvi globosâ.

Loc. Idem.

CXIV. BINOCULUS. *LE BINOCLE.*

Pedes sex.

Oculi duo.

Antennæ simplices setaceæ.

Cauda bifida.

Corpus crustâ tectum.

1. B. apus.

Le Binocle à queue en filets.

Long. 18 lig. Larg. 10 lig.

B. caudâ bisetâ.

Loc. Habitat aquam, rarus.

2. B. foliaceus.

Le Binocle à queue en plumet.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

B. hæmisphæricus, caudâ foliaceâ, capitis puncto triplici fusco.

Loc. Habitat rivulos.

3. B. gasterostei.

Le Binocle du gasteroste.

B. gasterostei.

Loc. Idem.

540 ENTOMOLOGIA
CXV. CANCER. *LE CRABE.*

Pedes decem, primi cheliformes.

Oculi duo.

Antennæ filiformes.

Cauda foliosa.

Corpus crustâ tectum.

1. *C. astacus.*

L'Ecrevisse.

C. macrourus, rostro supra serrato, basi utrinque dente simplici, thorace integro.

Loc. Habitat fluvios, rivos.

2. *C. pulex.*

La Crevette des ruisseaux.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

C. macrourus rufescens, thorace articulado.

Loc. Habitat rivulos.

CXVI. ONISCUS. *LE CLOPORTE.*

Pedes quatuordecim.

Antennæ duæ fractæ.

1. O. armadillo.

*Le Cloporte armadille.*Long. 5 lig. Larg. $2 \frac{1}{3}$ lig.

O. caudâ obtusâ integerrimâ.

Loc. Habitat sylvas.

2. O. asellus.

Le Cloporte ordinaire.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

O. caudâ obtusâ bifurcâ.

Loc. Habitat loca humida locorum.

CXVII. ASELLUS. L'ASELLE.

Pedes quatuordecim.

Antennæ quatuor fractæ, duæ longiores.

1. A. aquaticus.

*L'Aselle d'eau douce.*Long. $1 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. caudâ bifidâ stylitis bifurcis, articulis septem.

Loc. Habitat rivos.

CXVIII. SCOLOPENDRA. *La Scolopendre.*

Pedes ad minimum viginti quatuor
sæpe plus.

Corpus planum.

Antennæ filiformes, articulis brevibus plurimis.

1. *S. forficata.*

La Scolopendre à trente pattes.

Long. 9 à 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. rufa, pedibus utrinque quindecim.

Loc. Habitat sub lapidibus in hortis.

2. *S. coleoptrata.*

La Scolopendre à vingt-huit pattes.

Long. 8 lig.

S. nigricans, pedibus utrinque quatuordecim albo nigroque intersectis.

Loc. Id. rarior.

3. *S. nigricans.*

La Scolopendre à soixante pattes.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. fusca, pedibus utrinque triginta.

Loc. Idem.

4. S. phosphorica.

*La Scolopendre à cent quarante
pattes.*

Long. 8 à 9 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

S. ferruginea, pedibus utrinque septuaginta.

Loc. Habitat terram.

5. S. fusca.

*La Scolopendre à cent quarante-
quatre pattes.*

Long. 10 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. fusca, pedibus utrinque septuaginta
duobus.

Loc. Idem.

6. S. lagura.

La Scolopendre à pinceau.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. ovalis, pedibus utrinque duodecim,
caudâ albo penicillo.

Loc. Habitat cortices arborum.

CXIX. JULUS. *L'IULE.*

Pedes plus quàm centum.
Corpus teres cylindraceum.
Antennæ articulis quinque.

1. *J. terrestris.*

L'Iule à deux cens pattes.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

J. fuscus lævis, pedibus utrinque centum.
Loc. Habitat sub lapidibus.

2. *J. tabulosus.*

L'Iule à deux cens quarante pattes.

Long. 10 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

*J. cinereus, pedibus utrinque centum
& viginti.*

Loc. Idem

FINIS.

