

De apoplexia praeserim nervea Commentarius / [Francesco Zuliani-Gibellini].

Contributors

Zuliani-Gibellini, Francesco, 1743-1806.

Publication/Creation

Brixiae : Fratres Pasini, 1789.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/bafsjxrg>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



F. Zuliani - Gibellini

55328/B

ZULIANI - GIBELLINI, Francesco

28/28.

DE APOPLEXIA
PRÆSERTIM NERVEA
COMMENTARIUS



B R I X I A E



EXCUDEBANT FRATRES PASINI
SUPERIORIBUS ANNUENTIBUS
M. DCC. LXXXIX.

P. Luigi Langrandi



АИХЭДЧОЧА ЗД
ЛАУЯЭИ МИТЯЛСЫН

COMMENATARIUS

Е. Г. Т. Я. В.

С

СОЧИЕСТВЕННИКИ И ПРИЧАСТИЕ

МЕДИЦИНСКАЯ АННОТАЦИЯ

W. DCC. 1772



Библиотека
Городской Университетской больницы

LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

FRANCISCUS ZULIANIUS

MEDICUS BRIXIENSIS.



Queruntur homines passim, apoplexiam in præsentia plus, quam anteactis temporibus sævire in humanum genus. Hoc autem, quod malo quodam fato non videtur inficiandum, etiam Medici quidam haud parvi faciendi affirmare non verentur. Quid plura? Nunc apoplexia graffatur adeo, quibusdam præsertim locis, ut, nec injuria, vifa sit epidemica. Quod si qui dubitent, an apoplexia vere sanguinea evaserit hoc sæculo crebrior, id de nervosa negari nequit omnino. Certum enim est, magis hac, quam alia ulla

ætate superiore generatim dominari ner-
vorum morbos, inter quos haud raro ma-
ximus est apoplexia. Quæ quum ita com-
periantur se habere, haud mihi videor
improbandus, si quæ ægrotos invisens,
ac sedulo observans, de hoc morbo col-
legerim, quæque de scriptis Auctorum
nobilium deceperim, hoc commentariolo
pro meis viribus exponam.

At mihi de nervea quidem apople-
xia differenti videbatur haud esse incon-
gruum, siquid de sanguinea adderem, de-
que serosa: de quibus fateor sane, me
dixisse plus, quam prius statueram; quum
disquisitioni meæ neutra præcipue esset
objecta. Haud tamen pœnitet. Qui-
busdam enim proderit forsan, si unus,
& idem libellus præter illa, quæ specia-
tim ad nerveam apoplexiæ spectant, ea
quoque exponat, quæ ad cognoscendam,

curandamque generatim apoplexiā apta
sint.


Quin forte urgetur necessitas, in pro-
prio capite quasdam spasmoticā apople-
xiā causas exposui. Id tamen ideo præ-
stiti, quod istae causae discriminantur ni-
mis, ac nimis diversam exigant curatio-
nis methodum.

Alicui forte videbor arguendus, quod
sim locutus diffusius de apoplexia ex va-
poribus mephiticis oriente, quum de ipsa
differuerint quam diligentissime Scriptores
plerique. At num in manibus omnium
versantur illorum commentaria?

Inquirebam præterea aliquantulum di-
lignantius de thermarum usu pro ea pa-
ralysi, quæ apoplexiā excipit quamcum-
que. Id enim pro aliquibus haud peni-
tus inutile duxi. Postremo tandem, ut
morem sigillatim gererem junioribus Me-

dicis, nonnulla subdidi de vi electrica,
de que ejus administratione, de quibus in
præsens tot, ac tanta differunt Phyfici.
Utinam labor meus, quicunque demum
sit, aliquibus auxilietur ita, ut, quan-
tum per me fieri potest, mortalium pro-
vehat commodum vitamque proferat.

Vale.



I N D E X

C A P I T U M.

C AP. I. De Apoplexia in genere.	Pag. 1
CAP. II. Apoplexiæ sanguineæ indicia , ejusque causæ ali- quæ : additur quoque de apoplexia ex sanguinis dissolutione , fluidique elasticæ extricatione.	12
CAP. III. Indicia Apoplexiæ serosæ , sive lymphaticæ .	42
CAP. IV. De Apoplexia convulsiva , sive nervea .	45
CAP. V. De Signis Apoplexiæ Nerveæ .	49
CAP. VI. In quo discriminantur Apoplexia Nervea præsertim mere convulsiva , Suffocatio hy- sterica , & Epilepsia .	72
CAP. VII. Apoplexiæ Nerveæ Divisio in idiopathicam , & in sympatheticam .	78
CAP. VIII. Causæ exponuntur Apoplexiæ Nerveæ , præ- sertim idiopathicæ .	82
De Apoplexia ex vaporibus Mephiticis .	104
CAP. IX. De Apoplexia , quæ ex acrimonia oritur ali- quando .	112
CAP. X. De Apoplexia , quæ oritur ex dolore quascun- que corporis partes occupante .	116
CAP. XI. De Apoplexia , quæ oritur ex exinanitione .	119
CAP. XII. De Apoplexia Nervea sympathica , sive con- sensuali .	125
CAP. XIII. De Apoplexia signanter Biliosa , quæ inter Sympathicas frequentior observatur .	140
De Apoplexia ex febri intermittenti .	161
CAP. XIV. De Apoplexia Sympathica ex causis pecto- ri insidentibus .	163

CAP. XV. Prognosis.	Pag. 171
CAP. XVI. De Curatione Apoplexiæ sanguineæ.	175
CAP. XVII. De Curatione Apoplexiæ serofæ.	195
CAP. XVIII. Ratio curandi Apoplexiæ Nerveam Sym-pathicam , sive Consensualem , & primo quidem Biliofam , sive Saburralem.	202
CAP. XIX. Ratio curandi Apoplexiæ a febri inter-mittente exortam.	219
CAP. XX. Ratio curandi Apoplexiæ ex hypochondriasi , atque ex difficultate tum fluxus men-strui , tum hæmorrhoidalis , & etiam ex podagra abdominalibus nervis insidente.	226
CAP. XXI. Ratio curandi apoplexiæ ex venenis per os sumptis , fungis , Opio , allisque similibus.	231
CAP. XXII. Ratio curandi Apoplexiæ , quam faciunt vapores Mephitici.	236
CAP. XXIII. Ratio medendi Apoplexiæ , quæ ex pe-store male affecto exoriatur.	242
CAP. XXIV. Ratio medendi Apoplexiæ Nerveæ idio-pathicæ , & primo illi , quæ a summa præcipue nervorum sensilitate , ac mobilitate exoritur.	243
CAP. XXV. Curatio Apoplexiæ , quam peculiariter di-ximus Sensorii Communis .	254
CAP. XXVI. Curatio Apoplexiæ , quæ ex dolore ori-ginem ducat .	256
CAP. XXVII. Curatio Apoplexiæ , quæ oritur ex exi-nitione .	258
CAP. XXVIII. Curatio Apoplexiæ ex acrimonia .	262
CAP. XXIX. Ratio curandi paralyfim , quæ Apoplexiæ generatim consequitur .	264



APOPLEXIAE
PRÆSERTIM NERVEÆ
COMMENTARIUS.

CAP. I.

De Apoplexia in genere.

I. **A**poplexiā sicuti Authores multimodis vocant, ita multimodis quoque definiunt. Arduum quidem est morbos haud paucos recta definitione circumscribere: hæc enim complecti debet præcipua morbi symptomata, quibus ille possit distingui ab aliis morbis, atque dignosci. At difficile est paucis perstringere apoplexiæ symptomata; tum quia multiplicantur nimis & ex varietate causarum, & ex diversitate morbi graduum; tum quia ex iis plura aliorum morbo-

A

rum assimilantur symptomatibus. Haud ergo mirandum, si ab Authoribus variimode definitur apoplexia.

2. Plures itaque inter definitiones magis illæ videntur congruere, quas tradunt MORGAGNUS, atque SCHROEDERUS. Hic apoplexiā describens afferit esse *resolutionem*, sive *magnam imminutionem virium nervosarum*, quoad mentis universum cum suo corpore commercium, aut quoad omnes fere corporis functiones animales, vitalibus saepe manifestius perseverantibus (a). Hæc autem definitio cuilibet apoplexiæ gradui videtur accommodata. MORGAGNO vero apoplexia visa est *intimorum*, qui in cerebro fiunt, motuum (cum videlicet movemus, fentimus, cogitamus) subita imminutio, tanta interdum, ut proxime ad cessationem accedat, aut in cessationem continuo transeat (b); quæ quidem definitio plerisque atridet: alicui tamen difficultatem faciunt tum hujusmodi motus intimi, tum ratio, præcipue vero celeritas summa, qua illi immittuntur: hanc enim haud satis congruere cre-

(a) *Dissert. De Apoplexiæ e Præcord. vitiis origine.*

(b) *De Sedib. & Causis Morb. Epist. II. n. 5.*

dunt ei apoplexiæ, quæ lente, ac gradatim succrescit.

3. Tres interim apoplexiæ gradus observarunt Medici. HOFFMANNUS (c) eum vocat maximum gradum, in quo cum sensibus, motibusque animalibus vitales simul, omnesque totius corporis actiones uno impetu prosternuntur: medium, qui tollit sensuum, motuumque voluntariorum, atque rationis usum, non autem vitales posternit actiones: minimus, ait, iisdem ac secundus prodit se notis; differt tamen, quod breviori tempore depellatur. Alii vero tertium hunc statuunt gradum quando ægri procidunt motu voluntario ex parte abolito, sensibus tamen vel omnibus adhuc integris, vel saltem quibusdam tantum amissis.

4. Causæ effientes eam, quam cum SCHROEDERO innuimus supra, resolutionem, imminutionemve virium nervosarum &c., plures esse possunt; internæ ex parte, ex parte externæ: sensibiles ex parte, ex parte insensibiles, quasque tantum assequi possumus conjectando.

(c) Med. Rat. Syst. Tom. IV. Part. IV. Cap. I.

5. Sensibiles inter offerunt se se sanguis , & serum , quum cerebrum occupant , uti plerumque ostendit cadaverum sectio : consulto enim externas causas hic omitto violentas , aliasque internas , uti abcessus , tumoresque varii generis cerebrum , cerebellum , medullamve oblungatam occupantes . Hinc binas morbi species distinguebant , sanguineam nempe , atque serosam .

6. Ast hæc divisio plerisque improbabatur . Objiciebant enim præter sanguineam , & serosam alias plures observari apoplexiæ species : hujusmodi præterea divisio videbatur inutilis saltem quoad curationem morbi , quoniam certa desunt signa , quibus dignosci possit utrum a sanguine , an a sero exoriatur compressio . Addantur duo ; quæ distinctionem , quam supra innuimus , haud parum impugnare videntur : primum nempe , quod in cerebro plurimorum ex apoplexia vita functorum , nec sanguinis , nec seri observabatur aut in vasis nimia congestio , aut e vasibus effusio , neque alia inveniebatur morbida cerebri immutatio : alterum tandem , quod vasibus sanguine interdum , aut alio humore nimis exhaustis mortalis non minus exoriebatur apoplexia .

7. Signanter vero apoplexiā primario sērosam negaverunt plerique ante recentiora tempora, ut refert MORGAGNUS (d). MALPIGHIIUS autem irridet, & BERGERUS eos improbat, qui serum incusant tanquiam apoplexiæ causam, ut meminit TRALLES (e). Neque putant serum cerebro inventum apoplexiā gignere primario sērosam: asserunt enim ex cursu sanguinis perturbato in vasis cerebri, & ex intercepto ejus in venas reditu, serum ab ipso sejungi, illucque tradi, atque coacervari. Id autem, ajunt, observari in celebri experimento LOWERIANO: obstricta enim vena sive jugulari, sive crurali, sive cava infra diaphragma, hydrops semper exoritur cerebri, crurisve, abdominisve.

8. Hisce etiam temporibus PORTALIUS CLARISSIMUS (f) negat apoplexiā existere vere sērosam; asseritque hanc effici a sanguinea, sive morbum utrumque ab una gigni, eademque causa. Assumptum probare conatur observatio-

(d) Epist. Anat. Med. 2. n. 7.

(e) Usus Vesicant. Salubr. & Noxius in Morbor. medela Sect. Post. pag. 20.

(f) Giornale per servire alla Storia della Medicina di questo secolo Tom. IV. pag. 49. Venezia 1787.

nibus. Sectis enim eorum cadaveribus, qui e vita decesserant omnia prudentes signa apoplexiæ lymphaticæ, purum sanguinem unice invenit, aut e vasis cerebri effluxum, aut in ipsis congestum; nihil vero lymphæ, aut seri. Has inter observatione duæ, quæ sequuntur, institutæ fuerunt in duobus cadaveribus apoplecticorum, quorum primus jurisprudentiæ, alter militiæ vacabat.

Jurisconsultus morte correptus est omnia proferens signa apoplexiæ lymphaticæ; ipsi vero, vena nunquam contusa, emetica, purgantia, vesicatoria exhibuere. Sectum fuit cadaver post horas a morte quadraginta: evanescente enim post mortem gradatim pallore, facies ad naturalem colorem rediit, atque vividissimo rubore subinde tincta apparuit. At quo color fiebat vividior, eo magis augebatur cadaveris calor, qui post horas quoque viginti quatuor adhuc persentiebatur: hinc cadaveris sectio post horas quadraginta protrahebatur (1). Hanc tan-

(1) Præter hoc cadaver alia quoque alibi memorat PORTA-LIUS, inter quæ illud memorat cujusdam Cappucinorum Monspessulanensium Superioris vera apoplexia sanguinea perempti, cuius cadaver, quum diu calens observarent,

dem perficientes, ut cautius agerent, tentarunt plantam pedis utriusque variis incisionibus, e quibus effluxit protinus notabilis copia fluentis sanguinis ruberrimique. In Calvariæ cavo invenerunt sinus Crassæ Meningis, præcipue laterales atro sanguine distentos vel maxime: venæ tam duræ, quam piæ Matris, ac vasa, quæ per anfractus cerebri disperciuntur, totusque tandem plexus Choroides sanguine tumescabant. Tota Cranii basis patuit sanguine referta e vasis effluxo. Contra vero cerebri ventriculi, neque, ut solent, humescabant, sed arentes omnino inveniebantur, neque potuit in toto cerebro quidquam aquæ reperiri. Itaque Jurisconsultus iste, dum signa proferret lymphaticæ, exquisite sanguinea moriebatur apoplexia.

Id quoque accidebat in eo, quem suprà inuebam militiæ adscriptum: deportabatur iste domum apoplecticus; signa autem erant apople-

serius tumulo dederunt. Observations sur les effets des Vapours Méphitiques dans l'homme &c., avec des Observations sur les effets des plusieurs Poisons &c., pag. 8. Diligentissimus quoque MORGAGNUS illud adnotavit, quod in quibusdam cadaveribus apoplecticorum calor post diem a morte servabatur, tempore præsertim hyemali.

xiae lymphaticæ. Hinc suppeditabant emetica: consultus vero PORTALIUS iussit contundi jugularē: æger subinde levabatur. Accitus alter Medicus sanguinis emissionem improbavit, monuitque applicanda esse vesicatoria; hinc æger comatosus evasit, & nocte sequenti mortuus est. Dissecto Cranio, cavitas illa atri sanguinis copia scatebat: multum quoque concreti sanguinis inveniebatur qua lobi cerebri, ac cerebelli dividuntur: meditullium spinalis medullæ, præcipue ad collum sanguine rubebat vel maxime. Ast in ventriculis cerebri eam tantum lympham detegebant, quam in quibuscunque cadaveribus observare solemus.

9. Hisce observationibus, aliisque innixus PORTALIUS statuit in quibuscunque apoplexiis, quas dicunt lymphaticas, secandas esse jugulares, pedumque venas; asseritque hujusmodi sanguinis emissiones re ipsa mirum in modum ægros juvasse. Inter cæteros, quos memorat, describit apoplecticum quemdam athleticæ constitutionis, ætatis annorum quinque supra quinquaginta, qui stratus cubili inveniebatur pallens facie, spumas agens ex ore, prodensque pulsus satis exiles. Curabant eum emeticis, atque stimu-

lantibus: hinc res in pejus ruebant. Hanc curationis methodum PORTALIUS improbans repetitas jussit venæctiones, quibus factum est, ut æger duabus hebdomadis convaluerit omnino. Quare clariss. citatus Auctor observationibus innixus tum cadaverum, tum ægrorum, quos dicta methodo ad sanitatem perduxit, absolute existentiam negat apoplexiæ, quam serosam vocant, sive lymphaticam.

10. At mihi haud quidem videtur ex his inquisitionibus, observationibusque Auctoris optime meriti inferri posse, nullam omnino dari apoplexiæ mere serosam. Do libens, quod omnino incerta sint apoplexiæ lymphaticæ signa in suis ægris a PORTALIO observata; præcipue cum vigentes, imo & athleticæ constitutionis illos fuisse colligatur. Do quoque persuasus omnino, quod saepè serum e vasis cerebri extrudatur a nimio sanguine, qui illud urget: tunc autem optimam duco PORTALII methodum: ast extant non paucæ observationes, quibus videtur luculentissime evinci apoplexiæ unice serosæ existentia. Sectis enim plerisque apoplecticorum cadaveribus aquam cerebrum occupantem invenerunt, quin ulla va-

forum sanguiferorum appareret distensio , ex qua illa aquæ coacervatio gigneretur .

11. Has inter observationes sufficit meminisse trium apoplecticorum , quos refert MOR-GAGNUS (g) , in quorum cerebro aqua pura inveniebatur absque ulla vasorum ex sanguine distensione . His addi meretur apoplecticus , quem RONDOLINUS (h) clar. Medicus Tergestinus observavit . Convaluerat ille nuper a quibusdam artuum inferiorum ulceribus , quæ lympham guttatum demittebant : idem repente apoplecticus evasit , paulloque post vita decessit . Ejus Calvaria sero redundabat , dum vasa sanguifera omnia encephali maxime pallentia erant , vixque visibilia . Quis ergo neget hujusmodi apoplexiā a lymphā primaria productam ? Quomodo enim vocari aliter posset ? an forsan hydrops cerebri , uti vocatur hydrops pectoris , quum ipsum ab effluxo , coacervatoque sero occupatur ? At lis de nomine esset . Serum pectorē accumulatum mortem gignit nimis comprimens , irritansque pulmonem ; capite vero coactum cerebrum comprimens , irritansque .

(g) Epist. an. Med. IV. n. 6. 28. 30.

(h) Giornale per servire &c. , loc. cit.

12. Insuper eam apoplexiā cur non dicemus serofam, quam ex metastasi STELLIUS observavit? *Complures*, ait Ipse, *repente moriebantur, cum ex febre acuta convalescerent, & cruribus adhuc essent œdematosis; si forte somno indulserant plus æquo; aqua enim ex infeioribus partibus subito ad encephalon decubuit* (i).

13. Quapropter Recentiores quidam gravissimi hanc divisionem apoplexiæ in sanguineam nempe, & serofam receperunt; tertiam tamen subdentes speciem, idest convulsivam, ad quas reduci posse alias hujus morbi species arbitrabantur. Hanc convulsivam præsertim efficiunt insensibiles aliquando illæ causæ, ac conjecturis unicæ obnoxiæ, quas supra n. 4. indicabamus.

14. Quamvis autem aliquid differere ferat animus apoplexia super convulsiva præsertim, sive *Nervea*; indicia tamen minus æquivoca attingam, quibus sanguineæ, serofæque species diognoscantur. Hinc mihi patebit aditus aliquas subdendi animadversiones, quæ ad confuetam medendi iisdem apoplexiis rationem pertinebunt.

(i) Rat. Med. Part. III. pag. 410.

CAP. II.

*Apoplexiæ sanguineæ indicia, ejusque causæ ali-
quæ: additur quoque de apoplexia ex san-
guinis dissolutione, fluidique elasticis extrica-
tione.*

15. **S**anguinea facilius corripiuntur apople-
xia, qui sunt natura sanguinei, pingues, breves-
que collo; qui caput produnt amplum, faciem-
que, oculosque sæpe rubentes; qui virilem agunt
ætatem, atque senilem; qui vitam ducunt laute,
a curis semiotam quibuscumque, atque labori-
bus. Ii procul dubio addantur, qui stupori-
bus, ac resolutionibus obnoxii sunt, quin cau-
sa adsit manifesta; qui sanguinis evacuationibus
deficiunt; quibus jampridem assueti fuerint; qui
incalescentibus facile humoribus præditi sunt;
quiue nativa cerebri debilitate laborant: hac
enim de causa a Patre in Posteros diu sæ-
vientem observamus apoplexiæ. Quodlibet an-
ni tempus humidum, tepensque vires sufficit
huic morbo, cui paralysis unius lateris frequen-
ter accedit.

16. Hic autem morbus adoritur raro, quin

signa præcedant. Quare *prælonga nonnunquam habere initia* olim affirmavit ARETÆUS (k). Pleraque apoplexias *sensim genitas*, quæ tamen subito increverunt, asserit TISSOTIUS (l); nullumque morbum fortasse prænuntia antiquiora habere, quam apoplexiā idiopathicā contendit THYERIUS (m). Mihi vero pluries visa sunt hujusmodi prænuntia paucis tantummodo diebus morbum præcessisse.

17. Solent ergo morbum sæpe præcedere ea, quæ sequuntur phœnomena; nimirum vertigines, cephalalgiaeque frequentes; hæmorrhagiæ narium, mentis segnities, & aliqua evanescētia; memoriæ labes; inter legendum facilis, & frequens a linea aberratio; responsiones implicatæ; ante oculos scintillæ micantes, maculæque vario-coloratæ vagantes; mox oculi unius, mox utriusque caligo, & auditus momentanea cessatio: præterea lacrimæ spontaneæ; somnolentia, aut somnus nimis placidus, aliquando tamen & implacidus valde; aurium suffratio; lingua fugaciter balbutiens; vox tre-

(k) De Caus. & signis Diuturn. Morb. Cap. 7. pag. 66.

(l) Epist. var. argum. pag. 56.

(m) Medicinæ Experimentale pag. 145.

mula; membrorum gravedo, eorumque torpor mox ad unum, mox ad alterum latus, tactus aliqua obtusio; ad scriptionem tarditas, pedumque vacillatio: partiales tandem, licet levissimæ, momentaneæque paralyses; repentinus ex membro aliquo frigoris sensus; incubus frequens, dentium stridor inter dormiendum, doloresque sensibiles, licet fugacissimi, circum præcordia. At quibus instat terribilis hic morbus, imprimis stomacho sæpe laborant, intestinisque; ac sæpe de nausea conqueruntur, de borborygmis, desidendiique conatu; licet indigestionis abfuerint causæ, aliæve colluviei absint indicia. Hinc fit fortasse, ut apoplexia erumpat, dum quis nititur alvum deonerasare: nisus enim hujusmodi præviæ superadditus dispositioni determinat ultimo apoplexiæ invasionem.

18. Sed nullis etiam præcedentibus signis aliquando hic morbus corripit repente, præsertim si ex sanguine ob nimiam copiam, impetumque e vasibus effluxo exoriatur; tunc autem subitus, vehemensque capitis dolor sæpe antecedit. Qui hac prosternuntur apoplexia faciem produnt fere sanguineam, præsertim post aliquas ab invasione horas, aliquando tamen &

pallidam ad mortem usque ; oculos aliquando languidos , aliquando rigentes , modo clausos , modo apertos ; os hians , & aliquando spumas agens ; pulsus fere elatos , vehementesque , qui tamen morbo crescente languescunt : at languescunt , ut plurimum , etiam iis , qui melius se habentes vitam protrahunt ; nervi enim paralyti correpti destituuntur viribus ; hinc & arteriæ , quarum musculares tunicæ filamentis nervis sunt præditæ . Respiratio aliquando satis libera (2) , aliquando stertorosa . Si vero augescat morbus , graves æger trahit ronchos : accedunt tandem motus convulsivi , & paullo post interitus .

19. At quoad pulsum , libet hic animadvertere , illum aliquando perexilem esse ab invasione ad mortem usque , præsertim quum satis

(2) Imo naturalis omnino est respiratio aliquando , licet apoplexia sit validissima . Naturalis quidem observata fuit a MORGAGNO (Epist. 2. n. 13.) in quadam muliere apoplectica , quæ paucas post horas obiit . E vita pariter decessit die quarta morbi Apoplectica , cuius meminit VERRATTIUS ; ejus tamen respiratio , ut ipse subdit , *per totum morbi tempus fuit parva quidem , & rara , sed tamen ordinata , & æquabilis* . Comment. Inst. Bonon. Tom. II. Part. I. pag. 184.

valida sit hæc apoplexia.. Adnotavit MORGAGNUS (n) inter alios apoplecticum quemdam sanguineum , subpinguem , & ætate mediocri ita pulsibus adventante morbo ad mortem usque defecisse , ut ne Medici quidem venæfæctionem imperare auderent . Ego vero observabam Præbyterum quemdam , qui vita post triduum decessit apoplexia vere sanguinea , pallere ingruente morbo , ejusque pulsus adeo evanescere , ut tantum post horas septem , aut octo sensu deprehenderentur . Claris. PANZANIUS (o) vidit hominem quemdam pallere repente , gelu , & convulsione corripi , solo supinum prosterni , pulsumque perdere omnino : quum vero pulsus surgeret subinde , redibat vultus color , stertorosa apparebat respiratio , aliaque omnia æger profrebat veræ apoplexiæ phœnomena .

20. Neque id absolum est a ratione : cerebro enim oppresso , fit iners reliquum corporis , sanguinisque motui impedimenta gignuntur . Hinc liquet quanam ratione actio cordis sive penitus extinguitur , sive suspensa syncopem efficiat : quæ quidem in mortem definit , si pe-

(n) Epist. anat. Med. LX. art. 4.

(o) Giornale per seryire &c. loc. cit.

rit omnino vis vitæ; si vero sit ipsa potis subortas superare resistentias, cerebro tamen adhuc oppresso; insigniora tunc conspicuntur apoplexiæ phœnomena. Hujusmodi autem syncope est symptoma, ut ita dicam, causæ apoplexiæ.

21. Ejus causa proxima efficitur ab immunito, sublatove penitus commercio inter cerebrum, aliasque saltem corporis partes, quas ad sensus, motusque voluntarios prædestinavit natura. Hæc autem causa proxima gignitur a sanguine, qui in vasa cerebri, cerebelli, medullæ oblongatae, sive meningum congeratur, vel ab ipsis disruptis exturbetur.

22. Sed plures ejusdem morbi remotiores existunt causæ a Medicis recensitæ, quas silentio præteream. Quasdam tamen alias hic libet recensere, quæ minus vulgatae videntur; & primum eam memorabimus, quam affert Cel. **WALTHERUS** (p). Animadvertisit enim sanguinis circuitum in cerebro peculiari quodam modo peragi: neque enim sanguis ab arteriis in

B

(p) Nouveaux Mémoires de L'Academ. Roy. des Scienc. & Beaux Letr. an. 1782. Berlin. 1784.

cerebrum impulsus, a venis immediate ad cor revehitur; sed a venis exceptus cerebralibus internis in sinus inducitur duræ Matris, a quibus per venas externas ad cor redit postremo. At quisque novit, præsertim post WALTHERI, & MONROI animadversiones, sinus duræ Matris dilatari non posse: quare si qua plethora cerebro adsit, vasa cerebralia urgetur, eadem distensura, vel, ut sæpe accidit, disruptura.

23. Liceat quoque hic quærere utrum nec ne inter has causas sæpius, quam communis ferat opinio, recensenda sit convulsio? Hoc autem loci neque de hypocondriacis loquor, neque de hystericis, neque tandem de iis, qui sua natura sunt convolutionibus obnoxii. Id enim quærebam de iis tantummodo, qui, quum optimæ corporis fruantur compage, viribusque valeant, ad veram tamen propendunt apoplexiā: ac de ea convulsione mihi tantum est sermo, quæ una cum aliis causis habeat sanguinem ita disponere, ut majore impetu in cerebrum actus, illuc congeratur vasa distendens, disruptusve. Mihi videntur profecto convulsiones haud raro sanguineam præcedere apoplexiā. Observavi enim, nec semel, homines satis vigentes, nun-

quam convulsos, sed ad apoplexiā sua propria compage pronos, quos insultus quodammodo apoplecticus adoriebatur: vena ipsiſ contusa statim valebant, ita tamen, ut per diem integrum urinām paſſim dejicerent ad instar aquæ purissimam; hoc est convulsivam. Neque ex alia, ut puto, ratione THOMAS WILLISIUS (q) asserebat raro plethoram tantum, sanguinisque acrimoniam gignere hæmorrhagiam, sed ſpasmodicos insuper motus accedere, qui sanguinis impetum ad caput dirigant. A ſpasmis item aliarum partium repetit cum SCHWENKE GATTENHOFFIUS (r) hæmorrhagiarum plerumque rationem.

24. Convulsiones ergo subsequi videtur saltem haud raro vera sanguinea apoplexia; & ita quidem, ut morbus aliquando videatur originem a nervis duxisse. Id autem pendet ne semper ab incipiente cerebri compressione? an idipsum innueret principium quoddam subtilius, quod nervos habeat irritare, humorumque mafsam inflammare, & expandere?

(q) Pharmac. Ration. P. 2. S. 2. Cap. 2.

(r) FRANK Delect. Opusc. Med. Vol. 3. pag. 206.

25. Ast hic morbus nimis metuendus homines corripit s^epe, qui ad summum sanitatis gradum pervenisse videbantur. Quare videntur functiones quoque ipsæ vitales nimis auctæ, videntesque hanc aliquando efficere apoplexiā. Illæ enim sanitatem quandoque promovent ultra eum gradum, quem ferre possit animalis constitutio. Hinc diathesis inflammatoria; præsertim si aerem dominantur frigus, serenitas cœli, siccitas, aquilonesque: vel quum adsit aer quomodolibet inquinatus, aliæque invisibiles corporis dispositiones; humores ad rarefactionem, & ad alchalescentiam jam proclives excitantur ad eum motum intestinum, quem aliqui spectatissimi Viri suspicunt veræ apoplexiæ sanguineæ causam.

26. Hanc vero suspicionem ex observationibus ortam opinor adauctam ex iis, quæ de novo Recentiores differunt super caloris, motusque vitalis principio. Neque per tempus, neque per vires liceret diligentius perpendere hujusmodi doctrinam, quam quidem in nonnullis variaverunt Auctores. Videtur quidem super illam facilius aliquorum saltem morborum, apoplexiæ præcipue, adstrui posse theoriam. At

quidquid de his judicandum sit, pro certo habendum, quamdam existere apoplexiā sanguinis dissolutione exortam, *fluidique elastici extricatione*: quæ res motum procul dubio significant sanguinis intestinum. De hac interim apoplexia nobis hic habetur sermo: neque tamen prætermittimus animadvertere, quæ haud improbabiliter innuant intestinum sanguinis motum, omnes forte præcedere sanguineas apoplexias, aut plures saltem, quam communis ferat opinio.

27. Plures itaque apoplexias, quæ ex sanguinis dissolutione, *fluidique elastici evolutione* efficiuntur, observarunt Medici: imo in sectis hujusmodi apoplecticorum cadaveribus, quæ adhuc calorem, multumque sanguinis fluentis, spumosique præferebant, nullam deprehenderunt aliquoties materialem morbi causam, præter aerem extricatum, quem quidem in venis cerebralibus, jugularibus, Cavis huc illuc inveniebant cumulatum: sæpius tamen invenerunt & in abdominis, & in thoracis cavitate cruentum serum; viscera aliqua liventia; in cavo autem Calvariæ vasa meningum, ventriculosque cerebri atro sanguine, spumosoque turgere.

28. Constat jam ex sanguinis, aliorumque

humorum animalium putrefactione , atque ex institutis in vacuo experimentis aerem , & quidem magna copia , principiis sanguinem constituentibus admixtum esse . Tunc autem sensibus comprehendi solum potest vis hujusmodi fluidi elasticī , quum putredo , aut fermentatio naturalem humorum mixtionem pervertit , aut quum exterioris aeris minuitur satis compressio ; quæ omnia sanguinis intestinum motum , quem supra indicabamus , promovent satis , augentque . Lethalis autem est fere hujusmodi aeris extirratio . Animalia enim pereunt anhela , convulsa , imo & apoplextica , si in eorum venas aliquid aeris arte invehatur : quid ergo molietur magna fluidi elasticī quantitas haud raro in eorum cadaveribus observata , quos hæc peremit apoplexia ?

29. Utilitatem afferret cognitio symptomatum , quæ apoplexiā hanc ex sanguinis dissolutione præcedunt , atque illorum , quæ eam comitantur in ægro adhuc vivente . Facilior saltem ex iis redderetur forte morbi difficillimi , ac fere semper lethiferi diagnosis . Sed ex observationibus , quas de hac apoplexia adnotarunt Medici , vix quidquam colligi potest . Mihi ve-

ro huc venit tantummodo adnotandum, quod apoplexiam, quæ repente peremit rusticum quemdam Clarensem mense Octobris ann. 1777, præcesserant notabiles lassitudines, insolita ad sudorem proclivitas, & signa vitiæ in ventriculo digestionis: adnotandum quoque est, eum quatuor abhinc mensibus longa laboravisse dysenteria, a qua tamen convaluit penitus. Hujus apoplectici cadaver paucis post mortem horis magnum sanguinis dissolutionis, aerisque interni extricationis exemplum suppeditavit. Toto enim corporis habitu immaniter tumescente dominabantur crassiores vesicæ, quæ serum, & sanguinem solutum, ac putrescentem coacerabant. Quacunque parte secabatur cellularis, velut data porta aer ruebat: ater, fluensque erat sanguis, eoque turgebant valde meningum vasæ, sinusque Crassæ, ut mihi retulit Chirurgus. Eadem quidem incommoda, si dysenteriam excipias, mortem præcesserunt repentinam Æthiopis (s), & eorum aliqua mortem Piscatoris (t), quorum historias descripsit MORGAGNUS.

(s) Epist. V. art. 17.

(t) Loc. cit. art. 19.

30. Interim in seictis horum apoplectico-rum cadaveribus observata præcipue fuerunt, quæ sequuntur; nimirum vasa omnia venosa, & sæpe, quod magis adnotandum, arteriosa quoque satis plena, sanguis fluens, spumeusque, & ex ipso *elasticum fluidum* extricatum, calor præterea admodum sensibilis, membrorum flexibilitas, oculique fulgentes, & pene viventis oculos similantes; quæ quidem per plures horas post mortem inspicimus in hisce cadaveribus, quorum exterior habitus turget sæpe, maculisque livescientibus fœdatur. Hæc autem omnia humorum inquinamentum, rarefactionem, & auëtum eorum motum intestinum satis innuunt, putridam solutionem, imminutamque valde irritabilitatem (3).

(3) Congruere omnino videntur, quæ in hisce apoplecticis, eorumque in cadaveribus observamus phœnomena cum iis, quæ observantur in apoplexia ex opio, ex vaporibus mœphiticis. aliisque stupefacentibus venenis. Quæ enim in primis observantur, & in secundis deprehendebat PORTALIUS: nimirum soporem, oris spumas, pulsum turgescensem, ac difficilem respirationem dum adhuc viverent: in eorum autem cadaveribus membrorum flexibilitatem, calorem haud mediocrem per plures horas superstitem inventiebat; fluenti, spumeoque sanguine vasa satis referta, ocu-

31. Neque tamen inficiabor aerem e sanguinis massa extricari posse aliquando, atque in

Iosque fulgentes, nec ullo modo obnubilatos. Op. cit. Chapitr. V. pag. 352. & seg. Nimis ne illuderem mihi, si has apoplexias majore tantum, vel minore; aut forte promptiore tantum, vel tardiore irritabilitatis læsione discriminari suspicarer? Et tanta phœnomenorum similitudo possetne innuere affinitatem aliquam causarum apoplexiæ, quam gignunt opium, vaporesque mœphitici, ejusque, quam observamus ex sanguinis dissolutione, fluidique elasticæ evolutione? Quidquid autem de hac similitudine censeatur; nemo tamen persuadeat sibi, quod putem eadem omnino ratione curandos esse tum qui ex opio, & mœphiticis vaporibus, tum qui ex sanguinis dissolutione, fluidique elasticæ extricatione apoplectici evasere. Admissa etiam, quam supra innuebam, similitudine; ratio tamen medendi diversa quidem, aliqua saltem ex parte, esse debet. Me enim haud latet apoplecticos ex opio ex. gr. juvari ex emetico, quod aliis saepè noceret apoplecticis, ut suo loco ostendemus: nec me latet inter phœnomenorum similitudinem diversas adesse rerum circumstantias. Rationi tamen magis consonum videtur, methodum curationis refrigerantem, atque rarefactioni sanguinis obstantem, quæ valde juvat apoplecticos ex opio, & ex mœphitide, magis accommodatum esse apoplexiæ, de qua hic agimus, quam aqua submersis, ut aliqui crediderunt. Submersi enim multis ante mortem horis frigent, nec post mortem sanguinem produnt ratefactum, dissolutum, aut spumescensem.

bullas coire, licet absint dissolutionis, atque putredinis indicia, imo vero sanguis coagulatus adsit, ut post magnas sanguinis effusiones se observasse LITTRIUS (u) affirmat. Ast in apoplecti-
cīs, de quibus hic agimus, præcipue vero in eorum cadaveribus, evidenter habemus putre-
dinis indicia: quare *fluidi elastici* evolutio vide-
tur exorta ex humorum inquinamento, quod civit, auxitque putrida fermentatio, imo vero *fluidi elastici* extricata quantitas putredinis gra-
dui videtur respondere. Hinc tum majora pu-
tredinis indicia, tum copiam aeris majorem in Piscatore, quam in Æthiope, quos observabat,
deprehendit MORGAGNUS (x).

32. Nec una videtur mors, ex quo celer, atque subita sit, *fluidi elastici* evolutionem pa-
rere. Novi quidem observatum fuisse aeris evo-
lutionem *sæpius in subito morientibus* occurre-
re (y), sed contra tum de repente, tum ex apo-
plexia pereunt, juxta WALTERII (z) præsertim animadversiones, qui aquis submerguntur: ab

(u) Histoir. de L' Acad. Roy. des Sc. an. 1714.

(x) Loc. cit.

(y) QUYSCH apud MORGAGNUM loc. cit. art. 25.

(z) Nouveaux Memoires de L' Acad. Roy. des Scienc. &c.

eorum tamen cadaveribus abest omnino aer extricatus: abest & ab eorum cadaveribus, qui de repente propter vulnera obiere. Ast absunt quidem & calor, & sanguis fluens, aliaque putridæ corruptionis indicia.

33. Aliis ergo causis, quæ plures esse possunt, diversæque, promovetur hujusmodi intestina sanguinis agitatio, & dissolutio: earum viribus, naturæque respondere debent phænomena, quæ vel præcedant, vel comitantur, vel hanc apoplexiæ subsequantur. Ex hisce causis aliqua quamvelocissime agens sanguinem rarefacit, suum perturbat circulum, vasorum omnium auget distensionem; quæ omnia minores ob resistentias majora præcipue minantur cerebro: hinc nullo modo prævisa erumpit apoplexia. Ad hunc modum agere possunt & quædam myasthæta, & quædam atmospheræ vicissitudines, quæ præsertim validissimæ sint, ac repentinae (4). Et enimvero; cadavera apoplectico-

(4) Omnes quidem norunt atmosphæram, prout ferunt præsertim substancialiæ, quæ aeri dominantur, generatim in corpus humanum notabiliter influere: quas inter substancialias electricitatem libet hoc loci recensere, quæ quidem vel maxime agere videtur, id licet negetur ab aliquibus,

rum, quos observavit frequentes MUGAILLIUS (a) mense Decembris ann. 1747, cæruleas quasdam

in corpus humanum, juxta tamen diversas aeris vicissitudines. Certis enim temporibus fluidi electrici tum major copia, tum plures vicissitudines, & quidem diu, dominuntur atmosphæræ: hoc idem observamus quoque diebus quibusdam procellois, licet barometrum vix, aut ne vix quidem immutetur. Quare, quum sive solo, sive aere major excitetur electricitas, ut ad æquilibrium ubique fistat; ipsa quaquaversum furens pergit, ea transmeans corpora, quæ aditum patefaciant. At corpus humanum patet præ aliis fluenti electricitati, quæ per poros pellis, forte per bronchiales vesiculos, maxime vero per nervorum extrema itve, redditve; oscillationes euidem excitans alternantes, donec æquilibrata quiescat. In his autem electricismi turbis vis ejus repulsiva agit, ut ita dicam, in cohæsionis vim: hinc partes fluidæ ad motum carentur intestinum, rarefiunt, atque inflammantur: ex hac eadem actione solidæ extimulantur partes, unde motus augetur circulationis. Quæ cum ita fiant, nonne ipsa quoque apoplexia exoriri potest in iis præsertim, qui aliis de causis ad hunc morbam procliviores sint?

Hæc autem mala magis metuenda videntur, si itus, redditusve vaporis electrici forte etiam intensi nimis aliis præterea conjungatur, ut ita dicam, vitiis sive atmosphæræ, sive corporis animalis. Quoad atmosphærā enim

(a) Histoir. de L' Acad. Roy. des Sc. ann. 1747. pag. 63.
& legg.

prodebat maculas satis amplas, aliaque indubia corruptionis indicia. Adnotabat autem mercu-

notum est, quā copiosa oneretur electricitate, onerari etiam aqueis, ut plurimum, vaporibus electricitatem vehentibus; adeoque aerem satis rarefieri, & saltem ex parte inelasticum fieri sāpe: minus ergo premet externam hominis superficiem; ex quo indubia sanguinis rarefactio. Quoad homines vero; qui ad veram apoplexiā sanguineam proclives sunt, ii multis viribus, slaturaque firma vigentes, sanguine abundant, oleoque animali, adeoque ea electricitate, quam *nativam* dicunt ab aliquo quidem oppugnatam, ut videtur, injuria. In his rerum circumstantiis velut in unum conspirantibus nonne facillime exoriri poterunt rarefactio humorum, accensioque, nervorum irritamenta, atque inde apoplexia?

Ponantur itaque electricitatis atmosphæricæ augmentum, & major corporis humani electricitas, quam recentitæ excitant atmosphæræ vicissitudines; ponantur aliæ quidem noxiæ qualitates, quibus electricitas, dum corpus animale penetrat, exquiritur, circumvestiri potest; & aliæ tandem ponantur prædispositiones eorum, qui ad apoplexiā inclinantur; nonne satis explicari exinde possent etiam apoplexia ex sanguinis dissolutione, fluidique elastici extricatione, & ejus phœnomena, quæ tum in vivis, tum in mortuis observamus? Nimirum convulsiones in adhuc vivis, & in eorum cadaveribus solutionem sanguinis, fluidi elastici evolutionem, fulgorem oculorum, calorem superstitem, membrorum flexibilitatem, facillimamque partium omnium putrefactionem? Hæc perpendant

rium barometro per unum pollicem, quatuorque lineas de repente depresso fuisse; ex qua qui-

alii, judicentque: certissimum est tamen ab electrica matetie nervos irritari, vimque ejus repulsivam ad motum provocare intestinum tum partes corporis fluidas, tum partium solidarum moleculas. Præterea notum est quoque ex vapore electrico calorem augeri animalem, & novissime perempti animalis carnes molliri, atque macerari; compertumque tandem est electricitatem ad alchale-scentiam, dissolutionemque promovere animales substanzias, ut res inflammabiles ad combustionem. Hinc ob-servamus, quæ animalia vel naturali, vel artificiali icta fint fulmine, statim putrefieri, eorumque arterias adhuc sanguinis partem servare; quod certum est affectæ irritabilitatis argumentum.

At dices fortasse; apoplexiæ frequentiores sœviunt, quum venti meridionales dominantur aerem, qui tunc ine-lasticus, humescens, ac minus gravitans minus sensibilia prodit electricitatis phœnomena. Contra est tamen; quod nempe iisdem atmosphæræ constitutionibus major electri-citatis quantitas aerem quaquaversum excurrit: excitata enim copiosa solo electricitas erigit humentes vapores, quibus *Conductoris* vices agentibus ignota peragrat; adeo-que efficax tunc quoque humana corpora urgere potest, utpote quæ novum electricum continuo admittunt vapo-rem, atque transmittunt. Accedit vero, quod status hu-jusmodi atmosphæricus duo habet efficere; primo evolve-re potest electricitatem aeris propriam, de qua perapte differit Cel. BECCARIA suis in Epistolis super electricitate

dem atmosphæræ immutatione exortas deducebat frequentiores eas apoplexias.

naturali; secundo habet excitare electricitatem animalem, ut ajuat, innatam. Quam enim aer minus gravitet in corpus, cuius quoque extrema vasculosa laxantur humiditate, vires intrinsecus impellentes prævaleant, necesse est: hinc ex aucto attritu major excitabitur electricitas animalis; quæ minus quoque exhalabit, impedita ab humiditate perspiratione.

Et revera, curnam vaporibus hisce quum sit atmosphæra impura, nostrasque frangat vires; nos tamen insolito velut æstu servemus; quin hunc eundem caloris atmosphærici gradum thermometra significant? Nonne id accidit ex quo ab hisce aeris constitutionibus materies quidem vasis absorbentibus suppeditatur; verumtamen præclusa perspiratione difficilius e corpore exiliens diffunditur extrorsum electrica materies, quam hoc loci vocarent alii materiem forte caloris? Siquidem plerisque videtur probabile materiem utramque modificatione quadam discriminari tantum; re tamen vera in uno consistere igne elementari, quem pro variis ejus phœnomenis aut calorem dicunt, aut electricitatem. Hinc ecce, ut in atmosphæra, quam venti dominantur meridionales, enasci possit apoplexia a causis diversis conspirantibus, quas inter videtur electricitas quoque posse recenserri.

Rebus superius expositis subdi etiam posset, plures exoriri apoplexias ab Septembre labente ad veris usque æquinoctium, quam aliis mensibus: eo enim tempore juxta Clariss. Virorum observationes (BERTHOLON De L'Electri-

34. At crebro dissolutionis causæ lento agunt gradu in partes corporis solidas, fluidaque: harum paullatim immutant statum, crassimque; ordinem motuum, formamque pertur-

cité du Corps humain en état de Santé, & de Maladié Tom. I. pag. 107. ; HORVATH Physic. Particular. Dissert. III. pag. 388.), electricitas frequentius tum magis extensas, tum diutinas exerit in atmospharam vires. Sed addi ulterius posset argumentum, quod probet electricitatem sic motam in corpus humanum sensibiliter influere; ex quo homines plerique, mutatione temporis ingruente, doloribus afficiuntur, distensionibus, facili sudore, diversisque velut in membra ictibus. Hæc enim phœnomena nec ab aeris pressione, neque ab ejus humiditate pendunt; quium tunc barometrum saepè deprehendamus immotum, aeremque, post procellam, humentiorem. Id autem confirmatur experientia; arte enim electricizati homines supradicti ea, quæ erumpente procella, persentiant incommoda.

Quod autem dicebamus huc usque, innuit quemdam in corpore humano electricitatis excessum. Immutata vero aeris constitutione, aliisque subsequentibus electricismi vicissitudinibus, humanum corpus deonerasi sua aliquatenus potest electricitate naturali; ut saepè accidit æstivo præsertim tempore. Si enim aer egeat vapore electrico, quem e corpore humano hauriat; saepè tellus eo tempore arens haud subito eam electricitatis copiam corpori potest suppeditare: imo tempore æstivo excitata animalis electricitas facilius in aerem diffunditur circumstantem nimis

bant ; secretiones , excretionesque impediunt : hinc velut præordinatur humorum degeneratio , & motus promovetur intestinus : quæ deordinationes , si quando aliqua causa superveniens accedat , licet admodum mediocris , augentur nimis , fluidum elasticum extricant , hominique vehunt lethalem apoplexiam , cui diu prædisponebatur . Et revera si rem diligenter expendas , quam sæpiissime invenies apoplexiam subfecutam fuisse phænomena , quæ inquinatum humorum , dissolutionemque jam significabant ; ut sunt lassitudines , languores , sudores insoliti , nervorum spasmi , rubræ maculæ modo hanc , modo alteram corporis partem occu-

C

aperta perspiratione . Sed ex hujusmodi defectu electricitatis humanæ explicari possunt debilitas corporis , languor , putridæque solutiones ; hinc & aliqua apoplexia .

His tamen non obstantibus haud mihi libet omnia hæc phænomena unice ab electricitate deducere ; licet apud Gallos scriptum sit , plerisque plaudentibus , apoplexiam sanguineam ex ignis excessu , pituitosam ex ejus gigni defectu . Sed hæc adnotavi , ut Lector videat , an apoplexia promoveri possit ab electricitate , aut ejus vires aegeri ; & an fibi probabile sit , electricitatem aliis saltem caufis , quæ multæ esse possunt diversæque , conjunctam influere in apoplexias posse .

pantes, eruptionesque *erysipelatodes*, quæ vix exortæ aliquando evanescunt. Vidi haud semel fugax erysipelas præcessisse apoplexiæ; & paucis abhinc diebus in viro observabam hunc morbum, quem præcesserunt rubicundæ quædam maculæ satis amplæ, quæ mox frontem, mox genas, subinde super palpebras dominabantur; licet illi, ut mihi relatum est, contusa fuerit vena, supervenit satis valida apoplexia, quum dies maximos inter nimbos efflueret.

35. Hæc quidem probant ex motu sanguinis intestino, ejusque dissolutione plures saltem originem ducere posse apoplexiæ. Fatendum tamen est in plerisque apoplecticis, eorumque in cadaveribus sanguinem non inveniri nimis fluentem, neque satis turgentia vasa, iisque deesse omnino calorem superstitem, putrefactionemque, quæ saltem exoriatur cito: hæc autem phænomena semper apoplexiæ consequuntur præsertim, quæ ex sanguinis dissolutione fit, fluidique elastici evolutione. At quæ discriminis hujus origo? Apoplexiæ hujusmodi speciæ differunt omnino, an majori tantum, minorive humorum solutione, aut expansione? Hoc autem discrimen, siquidem existat, effici-

turne a vi diversa ejusdem causæ; an a causarum diversitate? Haud equidem inficiabor plures diversasque causas posse dictum gignere discrimen: hoc tamen effici quoque posse videtur ab una, eademque causa, quum ipsa sive diversa intrinsecus donetur efficacia, sive diversas nanciscatur vires inter eas vicissitudines, quas in corpore animali potest subire. Namque nos in omnibus fere apoplexiis vere sanguineis humorum rarefactionem deprehendimus, atque accensionem: cur ergo quæ causa aliquando humores commovet, expanditque, eosdem aucta fundere nequibit, ac putrefacere? adeoque evadat apta ad ea producenda phænomena, quæ in apoplexia conspiciuntur ex sanguinis dissolutione, fluidique elastici extricatione?

36. Extant vero non pauca, quæ ex motu sanguinis intestino innuunt omnes enasci apoplexias vere sanguineas, ut in quadam adnotatione sua (b) videtur suspicari Clariss. PANZANIUS. Et enimvero nonne sanguinem satis fluidum in apoplecticorum cadaveribus adnotavit sæpe MORGAGNUS? Nonne eundem & satis ru-

(b) Giornale per servire, &c.; Tom. IV. pag. 52.

brum observavit PORTALIUS in cadavere apoplectici jurisconsulti , quem (n. 8.) recensuimus ? Nil quidem videtur , nisi motus intestinus , fluiditatem sanguinis in cadaveribus , servare , superstitemque calorem .

37. Præterquamquod norunt omnes apoplexiam vocari ab HOFFMANNO cerebri hæmorrhagiam . Verum nonne , quum juvenes , viri que robustiores hæmorrhagiis quibuscunque laborent , solidorum coarctationem , fluidorum vero expansionem , accensionemque invenimus ? Observatum est præterea , ut idem alibi adnotabat PANZANIUS (c) , aliique , cuiuscunque speciei hæmorrhagias , ut plurimum , sœvire mercurio barometri depresso , & in aerem dominantibus humiditate , calore , ac ventis australibus , in quibus hæmorrhagiæ quoque naturales ad morbum usque augescunt . Sed latet neminem tunc & humorum expansionem satis promoveri , & frequentiores excitari apoplexias : neque id absconum a ratione videtur . In ea enim atmosphæræ constitutione imminuuntur cordi resistentiæ dum sanguinem per carotides trudit ;

qui tamen venas peragrans satis retardatur, pondere atmosphærico deficiente. Haud tamen nego apoplexias dari sanguineas gravitante præter solitum atmosphæra; sed hoc unum dico, quod nempe & minus frequentes exoriuntur ea constitutione apoplexiæ; ac repentinæ, saltem plurimorum, mortes a viribus vitalibus pendent, quæ tunc oppressæ nequeunt motum servare circulatorium. Præterea atmosphæra quoque satis gravitante, aliquando haud desunt causæ, quæ sanguinem rarefaciant, accendantque.

38. Suppetunt alia quoque, quæ quidem confirmant intestinum motum præcedere apoplexias vere sanguineas. Autumno enim, hie me, ac Vere magis graffantur apoplexiæ. At qui his anni temporibus promovetur magis motus, quem supra adnotabamus, humorum animalium intestinus. Vere enim, ut omnes norunt, expanduntur fluida, rarefiuntque; præser-tim si ex atmosphæræ vicissitudinibus pondus imminuatur aeris, atque elaterium.

39. Progrediente vero autumno augentur forte motus intestini elementa. Tunc enim consequuntur frigus, imbræ copiosiores, aer incostans sæpe, sæpius vix comprimens, & in-

elasticus; quum ipse humescat, effluviisque scateat corruptionis. Quapropter solidæ corporis partes delassantur, *fuligines* inter expirandum non excernuntur, perspirationes imminuuntur, deordinantur secretiones, humorumque tota contaminatur massa. Nonne hinc motus promovetur intestinus, quo ad ulteriorem omnia procedunt corruptionem? Addatur quoque tempore æstivo bilem copiosiorem secerni, ac facilius inquinari; olea animalia, & salia magis, magisque attenuari; parantur inde lentæ dissolutionis causæ, quæ tempore tandem autumnali erumpunt lethales. Videtur ergo autumni tempus magis causas congerere motus humorum intestini: quumque tempore eodem frequentiores exsurgant apoplexiæ; videntur probabilius a motu hujusmodi, quam ab aliis principiis originem ducere posse.

40. Hyemale quoque tempus plusquam æstivum causas vehit hujusmodi motus apoplexiferi, qui haud raro ab autumni vicissitudinibus saltem ex parte præordinatur. Hinc MORGANUS hyeme præcipue in sectis apoplecticorum cadaveribus fluidum adnotavit sanguinem, caloremque ad horas usque post mortem viginti

quatuor superstitem. Nec mirum: major enim, quum æstivo, ignei elementi quantitas dominatur humana corpora hyemali tempore: hyeme nenpe & vires augentur extricantes igni-principium, quod fluidis, solidisque præsertim partibusjuxta Recentiores latens adhærebat; & idem evaporaturum cohibetur corporibus, præclusa perpiratione. Excitata itaque intestina humorum agitatione sive ab autumni præordinatio-nib[us], sive a quacunque repentina causa, nil mirum si major percipitur calor, diutiusque ser-vatur, uti observavit MORGAGNUS.

41. Hoc insuper igneum humani corporis principium aptis quibusdam agentibus causis, & coia augetur aliquando, & magis actuosum fit hinc nisi cito evanescat, fluida omnia ani-mia, forte olea præsertim commovet, tenuat, diblvit, fortuitamque sic inducit plethoram. Cæstica insuper, & tenuissima hujusmodi ma-ters nervorum irritat filamenta, stimulus pro-fer ad cerebrum usque, mentisque facultates perurbat, destruitque aliquando.

42. Ex hac quidem causa eæ mihi viden-tu[rum] pendere, quas tamen observamus raro, apo-pexiæ, quæ quidem evanescunt, quum furens

illud prīcipium ad partem aliquam adfluat, ibique coactum gangrēnam gignat (5). Apoplecticus hac ratione probabiliter evasit, quen ego observabam hemiplecticum quoque ad latus dextrum. Illi rubebat ignito colore vultu, collum, & pectoris pars; fulgebant oculi, perturbabantur ideæ; pulsus incitati vigebant vlide: æger exagitabatur undequaque, aliquando amen quiescebat sopore occupatus. Tribus elassis diebus, et si copiosæ venæ-sectiones factæ fūsent, crus illi, & pes lateris paralysi affecti inflammabantur, aptioribusque nihil juvantibus remediis, cito subsequitur calcaneo gangrēna evanescente statim apoplexia.

43. Ex dictis huc usque constare videtur agitationem humorum intestinam, expansionem accensionemque anteire, ut plurimum saltem, apoplexiis sanguineis, præcipuæ si sint vere id est pathicæ: hinc eæ videntur promoveri a mot

(5) Tunc autem prodit saepe furentis in speciem erysipelat. Hæc ignea materies, ut mihi visum est, parvis ex caus extricatur aliquando, saevit, terribilesque gignit effectus subinde per tempus aliquod externa alicujus membra erupit superficie, ita ut æger videatur aliquantum se melius habere: at cito eadem saepius retrocedit, & aliquo coacta viscere irreparabilem vehit interitum.

magis rarefactionis , accensionisque , quam a projectionis motu ; licet uterque motus fere semper augeatur simul . Universalis ergo est hæc apoplexifera causa , pertinetque ad corpus totum , aut saltem ad ejus sanguinea vasa : universalis enim est liquidorum expansio , solidorumque distensio . Nonne id probant inflammations , gangrenæque initia , quæ in intestinis observantur , & in hypochondriis , sive in pulmonibus apoplecticorum vita functorum ? nonne id confirmat aqua cruenta , quam e vasis effluxam invenerunt in cavitate abdominalis , thoracis , signanter pericardii ?

44. Ast ego , licet probabile admodum esse exposuerim ex motu sanguinis intestino apoplexias vere sanguineas generatim enasci ; haud nego tamen sanguinis cohærentiam , segnitiem , lentamque spissitudinem gignere posse sanguineam apoplexiā in iis maxime , in quibus adfuit nativa quædam cerebri debilitas , aut difficilis sanguinis reditus e capite per venas . Hujusmodi vero sanguinis diathesis videtur potius eam apoplexiā effectura , quæ non subitanea penitus sit , quamque præcedant phænomena aliquantulum diutiniora .

CAP. III.

Indicia apoplexiæ serosæ, sive lymphaticæ.

45. **A**poplecticos ex sero evasisse conjectabimus, quos dominantur malus corporis habitus, cachexiæ principia, fibrarum lassitudo, humoris lenti, ac pituitosi copia, quosque tandem ad hydropem vergere animadvertisimus. Hujus morbi species patebit magis, siquid præcessisse constabit, quod quidem humores potuerit lentos, ac glutinosos augere; si morbus inguerit haud repente, si vox paullatim perierit, atque loquela. Rem vero confirmabit vel maxime æger, cuius os, oculique multam expriment lympham, pulsus veluti evanescant, venæ deprimantur; cuius tandem ætas increbuerit, vires defecerint, palluerit facies (6). Imo hic adnotare liceat apoplexiæ fere semper serosam esse, quæ, licet haud sit pessimus corporis habitus, ulcera consequatur exsiccata, vel suppressionem cuiuscunque fœdi, albique stilli-

(6) Plura quidem ex hisce indiciis aliquando fallere possunt, ut videbimus, quum de morbi curatione nobis erit agendum.

cidii , cui natura jampridem assueta fuerit . Hujus generis fuere apoplexiæ , quas adnotavit MORGAGNUS (d) in quodam rustico , in quodam Anguizzola , & in quodam sene (e) , licet in hoc arteriolam quamdam inveniret sanguine turgidam . Ejusdem generis apprime fuit apoplexia , quam observavit RONDOLINUS , uti retulimus supra .

46. BONIOLUS tamen præstantissimus , ut mihi relatum est , in quadam Dissertatione plerisque innixus observationibus suis communem ferme impugnans opinionem contendit ulcus nullum licet inveteratum , cui inducatur cicatrix , lymphaticam invexisse apoplexiæ , aliosve metastaticos morbos . Si ergo methodo ab eo indicata consolidetur ulcus , nihil metuendum censet Professor Clarissimus : vulneris enim expur gationem nullo modo pendere a vitio universali sibi persuadet omnino . Quare usum quoque respuit fonticulorum : ex his enim haud fiunt secretiones , ut Ipse ait , *electivæ* . Hujus autem placitis adhærentes lego UNDERVOODUM , atque CAMPERIUM (f) .

(d) Epist. An. Med. IV. n. 13.

(e) Epist. V. art. 15.

(f) Giornale per servire ec. , Tom. III. pag. 139.

Ast alii plerique, ut vidimus supra, se haud raro observasse testantur, sive arte, sive sponte exsiccatis artuum præsertim inferiorum inveteratis ulceribus, apoplexiam exortam fuisse: quid ergo dicendum? Numne eos ægros dominabuntur simul causæ aliæ, a diuturnitate forsan aperti ulceris sensim genitæ, ex quibus apoplectici evasere fortuito, quum iopsis ulcus coaliisset?

47. Huc tandem spectare videtur ea apoplexia, quæ ex leucophlegmatica cachochymia gignitur. In hoc morbo sanguis in laxiorem, frigidam, mucosamque degenerat naturam; bilis effœta est, totumque corpus iners. Homines hi valde debiles, & laxi, a quolibet ingesto tumentes, buccas tumidas, faciem inflatam, & labia prominentia habentes referunt bombyces, ut cum BOERRHAVIO loquar, ad sua duæ cenda fila paratos: ingravescente morbo frigidito corpore fiunt, torpentesque; tunicæ adnatæ color est pallidissimus, oculique humescunt; in membra quasi prementis plumbi pondus dominatur; hebescunt sensus, & perpetuo torpent; si eos alloqueris, minantur responsum, sed cuius statim sunt obliiti; tandem apoplectici decadunt.

48. Novi quidem BOERRHAVIUM hujusmodi apoplexiā deduxisse *ex spirituum defectu*: sane sive isti existant, sive tantum hypothetici sint, certissimum tamen est ad functiones animales peragendas requiri quiddam vividi, actuosi, energici, ideoque maxime elaborati in fluidis; & quamdam vim, cohesionem, & robur in solidis, quibus quidem omnibus deficiunt *cachymia leucophlegmatica* laborantes. Mihi tamen videntur humores, quibus totum eorum corpus scatet, inventuri apoplexiā potius unice *cerebrum* comprimendo.

CAP. IV.

De Apoplexia convulsiva, sive Nervea.

49. Postquam frequentiora, minusque dubia apoplexiæ tum sanguineæ, tum lymphaticæ, ac pituitosæ descripserim signa, earumdemque specierum plures saltem adnotaverim causas; de convulsiva, nervosaque, uti proposui, dicendum est; de ea nempe apoplexia, quæ *ex spasmo* exoritur, & *ex vi quadam* morbosa, si minus in nervos unice, in eos

saltem primario s̄aviente. Plerique forte dum ea legant, quæ sum dicturus de his apoplexiis, quas ad nervosam revoco, aliquam afferent sanguineam esse, aliquam vero ferosam: haud ego quidem valde obſtabo; dummodo nervos fateantur causam morbi proximam, aut hanc eandem efficientes, putentque ideo medendi rationem aliquo modo diversam adhibendam esse.

50. De hac apoplexia mentionem facit SYDENHAMIUS (g) afferens eam ab hysterismo caput exagitante produci, in hemiplegiam desinere, atque pituitosæ assimilari apoplexiæ, ab hac tamen differt causa: illa enim puerperas corripit; consequiturque partum, vel magnam hæmorrhagiam, vel gravem animi perturbationem. Scripsit de hoc morbo magnus BOERRHAVIUS docens (h), quin ulla adsit materies, aut humorum mutatio, omnes nervorum morbos effici posse usque ad apoplexiā; de qua plura quoque verba facit HOFFMANNUS (i) imo

(g) *Dissertat. Epist.*

(h) *De Morb. Nerv.* Tom. II. *De Sympath.* pag. 221. edit. Venet. 1762.

(i) *Medic. Syst.* Tom. IV. Part. IV. Cap. 1. *De nervor. resolut.* & Tom. IV. Part. II. Cap. 7.

vero in suis Consultationibus aliqua hujusmodi apoplecticorum profert exempla. Hic tamen Auctor commemorat eos unice spasmos, qui partes a cerebro semotas afficientes majorem sanguinis copiam, motuque percitam majore in cerebrum cogunt. Hinc ipse opinatur magnas animi motiones, iram præcipue, metumque apoplexiam gignere; quatenus illæ spasmodicas contractiones excitant: hinc sanguinis circuitus perturbatio, majorque ad cerebrum humorum quantitas, atque impulsus. Videtur idcirco HOFFMANNUS judicare tunc solum ex spasmo nervorum apoplexiam nasci, quum ex ipsa eadem causa nimius affluat sanguis ad cerebrum, ibique fiat ejusdem congeries, aut e vasis effluxus.

51. Apoplexiæ nerveæ meminit Scardona (k); meminit etiam MORGAGNUS (l). Uterque tamen convulsione affici meninges sibi suadet: hinc ex harum convulsione desumere conatur uterque principia apoplexiæ, aliarumque subsequentium paralysum; eademque imo ratione apoplexias explicant, quæ spasmos vi-

(k) Aphorism. De curand. Morb. pag. 11. & 22.

(l) Epist. An. Med. IV. n. 5. Epist. XI. n. 18.

scerum abdominalium, aliarumque partium subsequuntur. At me quidem latet, quid tandem intelligent Auctores isti, quum ajunt meninges convulsas. Numne eas contrahi, distrahique alternatim putant sive regulariter, sive irregulariter? Id sane concipi nequit in dura Matre, quæ quidem ubique cranio quam arctissime adhæret. Bina apoplexiæ convulsivæ exempla profert etiam Celeberrimus TISSOTIUS (m), & bina quoque profert Clarissimus LORRYUS (n). De hoc tandem morbo HAENIUS (o), POMMIUS (p), & præ aliis BURSERIUS Illustr. (q), scripsere, aliquie.

(m) Epist. var. argumenti pag. 89.

(n) De Morb. Melanchol. Tom. I. Part. I. Cap. V.

(o) Rat. Medend. Part. IV.

(p) Effai sur les Affections vapoureuses des deux sexes.

(q) Institut. Medic. Practic. Tom. III. Cap. IV.

CAP. V.

De signis Apoplexiæ Nerveæ, sive convulsivæ.

52. Semper refert valde morborum distinguere species: at, malo quidem fato, ea indubia desunt signa, quibus possit dignosci specierum maxima pars: earum contra similitudo Medicos saepe fallit perspicaciores. Nitendum est igitur, ut haec species dignoscantur, a sumptis simul, perpensisque diligenter pluribus earum signis. Hoc autem magni est momenti in apoplecticis, quibus statim mederi plerumque necesse est. Quum autem in casu nostro pars symptomatum, quæ genus apoplexiarum comitantur, cum iis coexistat necessario, quæ ad nervosas apoplexias pertinent; hinc simul loci ea descripta inveniet Lector; qui tamen res perpendens sedulo alia ab aliis facile, ut spero, sejunget.

53. Ex continua igitur, attentaque observatione colligitur illos maxime nerveæ apoplexiæ obnoxios esse, qui irritabiles admodum sunt, atque sensibles, quique multa volvunt animo, ac fervida cogitatione rem quamdam undequa-

que perpendunt, diuque. Hos inter recensendi ideo sunt hypochondriaci, atque hystericae, præsertim si puerperæ, aut spasmodis ex difficii menstruatione divexatae: addantur quoque, qui spasmodis abdominis, calculis cystidis felleæ, arthritide anomala, epilepsia, ac magnis animi perturbationibus solent excruciar; præcipue vero, si alvus difficile deoneretur, si crassioris sanguinis lentescat motus, si que fluxus hæmorrhoidum, mensiumve; aut sudor (r) pedum, axillarumque repente deficiat.

54. Hujus speciei apoplexiam aliquando per dies aliquot præcedere solent vertigines tenebrosæ, rigoresque frigoris leves, ac muscularum tremitus; tum vero quædam sensatio illi similis, quæ quidem excitaretur si aquæ rivulus aliqua corporis membra permearet: præveniunt etiam cutis ariditas, genuum nutatio, major totius corporis debilitas, perturbationes infimi ventris majores, & quædam tum cogitandi difficultas, tum res perpendendi. Quum autem imminet apoplexia augentur arteriarum pulsus, præsertim carotidum, atque durescunt; accè-

(r) D. FOLIA Morbi Nervosi Singularis Historia pag. 13.

dunt aliquando immanes cephalalgiæ , horrendæque artuum convulsiones ; extrema corporis , signanter crura gelu rigescunt , ac quidam veluti fervor caput exagitat ; aliquando angustiæ etiam ad pectus persentiuntur , & ad hypochondria .

55. Jam vero , quum invadit morbus , ægro tinniunt aures , magis accenditur facies , augetur anxietas , turbatur stomachus , viresque deficiunt : hinc solo , sed sensim , prosternitur ; aliquando etiam & stantem se servat , & aliquantulum graditur . Loquela , ut plurimum , intercipitur ægro ; si quando loquitur , proprium rerum nomen difficilime invenit , inventumque profert mancum , atque imperfectum . Vis mentis illi imminuitur saltem ; aliquando perit omnino . In ægris , quos ego observavi , debilitas tantummodo inveni , atque confusas mentis facultates . Hæ post horas aliquot restituuntur , ut plurimum ; licet post morbum , etiam levi ex causa , rursus obstupescant , ac perturbentur . Præterea isti apoplectici faciem produnt sæpe maxime floridam , aliquando tamen & lividam uti observavit LORRYUS (t) ; eorumque pulsum irregularēm , mini-

(s) De Melancholia Tom. I. Par. I. Cap. V. pag. 115.

mum, pessimum bihorio ante mortem Celeber. adnotavit TISSOTIUS (t).

56. Hunc morbum crebro sive valida, sive remissior consequitur hemiplegia. Sicuti autem in aliis apoplexiis adeat summa ad somnum proclivitas, sic abeat ut plurimum ab apoplexia spastica, qua correptos vidi saepe alienos ita a somno, ut vel maxima angerentur vigilia. In membris vero paralysi affectis, quae non raro rigida contrahuntur, subsultus saepe deprehenduntur convulsivi: praeterea cum motu careant, sensu, ut plurimum, pollent, imo haud raro exquisitissimo, ut & summis eadem membra afficiantur doloribus (7). Ast artus non modo paralytici, sed & corpus totum acutissimo fere pollet sensu in hac apoplexia: hinc & levi fri-

(t) Loc. cit.

(7) Huc venit adnotandum, quod scribit BUCHANIUS Med. Domest. Tom. IV. pag. 252. Ed. Neapol. afferens paralyses, quae membris adimunt motum, non autem sensum, frequenter hypochondriacos adoriri, atque hystericas. RIVERIUS quoque Obs. Cent. 1. Obs. 74. ad hypochondriacam, sive hysterica passionem pertinere existimabat paralyses convulsioni, ac dolori conjunctas. Credit quoque dolorem partes occupantem paralyticas significare nerveam fuisse apoplexiā, quam consecuta est paralysis.

gore apoplectici istiusmodi anguntur , & tenui quoque rumore exagitati vexantur . His autem nequeunt medicamenta tum interna , tum externa , quæ quidem irritent , exhiberi , quin maximæ in iis excitentur perturbationes .

57. Rebus huc usque expositis addenda est quoque ætas eorum , quos morbus , de quo agimus solet adoriri . Observamus enim apoplexiā convulsivam sæpius corripere juvenes ætatis annum infra trigesimum . Sed contra docet HIPPOCRATES (u) seniores magis apoplexiæ obnoxios esse . Quum ergo apoplexia , de qua agimus , juvenes sæpe adoriatur annum infra trigesimum , erit a Medico semper ætas pendenda , qua morbi diagnosim sibi faciliorem reddere possit . Semper tamen meminisse oportet apoplexiān cuiuslibet speciei aliquando nulli parcere ætati . Addatur etiam hujusmodi apoplexiā eos quoque adoriri , qui corporis structura , sive habitu carent , quibus faciliores reddi vidimus sanguineam apoplexiām , atque ferofam .

(u) Libr. II. De Morb. n. 21. & Lib. de Aphor. Sect. III.
Aphor. 31.

58. Innuebam (n. 56.) nerveam apoplexiām sēpe hemiplegiam gignere perfectam aliquando, sēpius imperfectam. Licet ne mihi ea super hemiplegia aliquot hic congerere conjecturas, quæ si fieri potest, indicia multiplicent, unde hujus morbi species distinguatur magis? Has me proferentem Medici, ut spero, haut satis arguent.

59. Primo itaque videtur paralysīs ab apoplexia frequentius lævum, quam dextrum corporis latus occupare: idque mihi quoque confirmatur ad mentem revocanti plurimos, quos ego adivi apoplecticos. Hinc ill. HAENIUS apoplexiām describens (x) Joannæ Poldin, quæ quidem nervea videtur, paralyticam memorat evasisse latere dextro; licet ut subdit veluti admirans: *paralysīs ab apoplexia in dextro latere rarius*. Auctor idem quæsitum quoddam alibi (y) instituit, quod, licet paralyses quacunque ex causa ortas respiciat, ad rem tamen nostram opinor pertinere. Sic enim ille quærit: *Si paralysīs omnes non afficit artus, cur*

(x) Rat. Medend. Par. III. Cap. VI. pag. 244.

(y) Loc. cit. Edit. altera Cap. VIII. pag. 110.

lævam potius quam dextram corporis partem occupat? In recensitis, subdit, decem casibus unius modo dextri est lateris; in cæteris hic non recensitis plerique omnes sinistrum latus sunt resoluti. Dumque adnotata mea revolvo practica, videor dudum idem observasse.

60. Alii quoque observarunt generatim paralyticum frequentius latus lævum resolvere, quam dextrum, uti, colligitur ex Cel. BARTHOLOMEO (z); & inter alios Clariſ. recenset GARDA-NEUM, qui addit latus sinistrum paralyticum consanescere difficultius quam dextrum.

61. At video adcuratissimum quoque MORGAGNUM idem observavisse: animadvertisit enim (a) quod in quindicim veræ apoplexiæ sanguineæ exemplis, tres vidi apoplecticos lævo, binos utroque, reliquos vero dextro cerebri hæmisphærio læflos; ac proinde tres tantum cum hemiplegia ad dextrum latus observavit: læfo enim dextro cerebri hæmisphærio latus fere semper resolvitur sinistrum. Ut vero expli- caret frequentiorem hauc lateris sinistri para-

(z) De L'Electricité Du Corps Humain Tom. I. pag. 470.

(a) Epist. an. Med. III. n. 18.

lysim , attendendum esse , ait , *dextras* nempe *plerasque partes corporis esse ut plurimum in frequentiori motu consuevisse* , quam *sinistras* , & quod *consequitur* , *vasa quoque non illarum modo* , sed & *cæterarum* , quæ a *dextris* sunt , ob *communicationes* , *consensusque laborare magis* , & *dilatari solita esse* . His vero positis ratio aliqua constare videtur , qua fiat ut ad *dextram cerebri partem major adfluat sanguinis quantitas* . Dilatationi autem majori , quam in *vasis lateris dextri jure quidem supponit MORGAGNUS* , mihi videtur addenda carotidis , subclaviæque *dextræ ordinaria positio* , quæ magis obsecundare debet adfluxum sanguinis ad cerebri *dextram partem* . Constat enim subclaviam , carotidemque *dextras ortum communem ducre ex arcu ipso Aortæ* , ad quas eadem ferme directione , qua in Aortam ipsam , cor sanguinem impellit . Quapropter quum ex constitutione carotidis , subclaviæque *dextræ* , & usu majori *dextrarum partium* , major in illas sanguinis copia , motuque percita majori trudatur , supponendum videtur magis infirmari paullatim debere tenuissimorum vasorum tunicas ; hinc in parte cerebri *dextra læsionem facilius posse exo-*

riri, quæ lateris oppositi, idest lævi paralysim fere gignit.

62. Quamvis autem ex his constare videatur hemiplegiam ex apoplexia generatim frequentius lævum, quam latus corporis dextrum occupare; ex auctorum nihilominus observationibus, quæ perraræ non sunt, meisque propriis videtur evinci, apoplecticos ex vitio nervorum potius parte dextra, quam sinistra paralyticos evasisse. Et revera HOFFMANNUS hemiplegiam refert (b) lateris dextri ex apoplexia, quam quidem ex nervis fuisse opinabatur. Æger enim hypochondriacus erat, & flatibus, ructibus, vigilia, tristitiaque jampridem angebatur: imo vero apoplexiā præcessere graves animi curæ, molestiæque. Hinc consultus HOFFMANNUS respondit: *hae sunt fere accessiones, quæ viros hypochondriacos, fœminasque hystericas sæpe numero infestare solent* (c). Idem Auctor alterum memorat paralyticum lateris dextri (d) ex apoplexia, quam ex vitio nervorum arguebat. Tertiam quoque hemiplegiam hujusmodi descri-

(b) Consult. & Resp. Med. Cent. Sect. I. Cas. XVI.

(c) Loc. cit.

(d) Loc. cit. Cas. XVIII.

bit (e) ab apoplexia probabiliter nervea : hanc enim præcessit magna animi perturbatio , nec subsequebatur mentis facultatum amissio : æger a somno abhorrebat quam maxime , & qua parte paralyticus , spasmo angebatur . Hemiplegiam dextri lateris refert LAZERME (f) in apoplectico , qui antea colica nephritica lacessebatur . Eandem lateris dextri hemiplegiam memorat POMMIUS (g) ab apoplexia , quam vocat spasmodicam : hic æger convaluit usu juris ex pullo , clysterum ex aqua , tepentiumque Balneorum . At contra æger in pejus ruebat , quum quodam utebatur medicamento ex enula campana , valeriana , cinnamomo , cascarilla . LANCISIUS (h) apoplexiā describens Ill. SPADÆ , eam fuisse opinatur ex acri , tenuissimoque quodam vapore nervos permeante ; & dextrum illi latus refert paralyticum . SALODINUS noster juvenis Medicus diligentissimus , bonisque studiis addictissimus hemiplegiam lateris dextri , quæ brevi tempore evanuit , in quadam muliere in-

(e) Loc. cit. Cas. XXII.

(f) De Morb. Capitis Consult. XVII.

(g) Effai sur les Affections Vapoureuses Obs. IX.

(h) Repent. Morb. Obs. IV.

venit dudum ex vitio nervorum apoplectica. JACOBUS ANDREOLUS doctissimus Medicus, meique amicissimus paralysim in parte dextra mihi retulit Presbyteri cuiusdam apoplectici, qui apprime hypochondriacus erat, irritabilis, atque sensibilis. Ejusdem apoplexia videbatur sane nervosa: eam enim præcedebant causæ, subsequebantur effectus, quibus hæc morbi species solet dignosci. Tres ego observavi epilepticos hemiplegia tandem correptos, iisque latus dextrum defecisse: eodem latere paralyticam evasisse puellam quamdam epilepticam RIVERIO scribit JACOTIUS (i).

63. Ex hisce observationibus, aliisque, quas mox describam, constare videtur id non usuvenire, si de apoplexiis nervosis loquamur, quod asserebat HAENIUS; nempe *quod paralysis dextri lateris ab apoplexia rarius*, quod tamen, ut vidi mus supra, confirmaverunt MORGAGNUS, atque GARDANEUS. Quid ergo dicendum? Numne casu quodam fortuito factum est, ut illi Medici clarissimi plurimas observarent apoplexias aliarum specierum validiores, quas sæpius conse-

(i) Observat. Communicat. pag. 115.

quantur quidem lœvi lateris paralyses ; contra paucas nervosas , quæ remissiores esse solent , quæ forte sæpius hemiplegiam gignant lateris dextri ? HIPPOCRATES quidem ea , quæ sequuntur scripsit (k) , videlicet ; *In convulsionibus vocis interceptio diu durans mala est ; parva autem aut linguae syderationem , aut brachii , aut dexterarum partium significat . Non secus ac si levi ex aphonìa metuenda sit tantum , aut saltem præcipue paralysis dexterarum partium : silentio revera præterit lœvas , innuitque tantum dexteras corporis partes .*

64. Quid ergo dicendum , si in nerveis apoplexiis dextrum potius , quam sinistrum latus resolvatur ? qua ratione , ac causa id fieret ? Numne nervorum spasmus potius , quam in dextram , agens in lœvam cerebri partem , in hanc impellit majorem sanguinis quantitatem , aut ex ipsa præcludit sanguinis redditum ? Quod dextram carotidem magis quam lœvam circumveant nervi , numne promovere hemiplegiam valeret lateris dextri potius quam sinistri in iis , qui spasmis afficiantur ? Præterea paralysis , quæ

(k) Coac. Prænot. Sect. II. vers. 175.

dextrum frequentius occupat latus, esset ne simplex s^epe spasmus nervorum in membris insidentium, quin ulla cerebri adesset l^aesio? Quæ viscera dextro lateri adhærent, essent ne ad spasmodum in suis viciniis excitandum aptiora, aliove modo ad paralysim gignendam? Re quidem vera WYTTHIUS, quem citat TISSOTIUS (l), observavit in ægris duobus debilitatem, & insensibilitatem in dextro latere exortam, quum hepar utrisque suppuraverit. Numne ergo in apoplecticis hypochondriacis ideo lateris dextri exoritur s^epius paralysis, quia eorum jecur jam male affectum est ut plurimum, & in ipsorum cadaveribus aliqua ex parte saltem observatur s^epenumero l^aesum?

65. Præterea major pars hominum plus dextro, quam l^avo utitur brachio: hinc diameter arteriis subclaviæ, brachialique augetur magis, quam arteriis iisdem partis l^avæ. At si arteriæ immutantur ita, cur non & nervi? Atqui brachiorum nervi a spinali exoriuntur medulla. Numne ergo ex usu frequentiori brachii dextri, & forte etiam, ut consequens est, ejus lateris

(l) Trat. de' Nervi Tom. II. Part. II. §. 41.

totius, nervorum status immutari posset ita, ut
ii sensibiores, mobilioresque evaderent? Num-
ne iidem nervi in vasculis cellulosoæ telæ (ex
qua magna ex parte coalescunt) exercitio di-
latatis majorem haurirent fluidi copiam? Num-
ne hæc tandem e suis receptaculis egrediens ve-
lunt hydropem invehernet in dextram spinalis me-
dullæ columnam? HIPPOCRATES ipse videtur
illud confirmare, quod paralysis in iis membris
determinetur facilius, quæ magis defatigentur
usu: *ex tussientibus*, ait ipse, *qui manibus la-*
borabant velut servus ille, qui sarmenta obtor-
quebat. ♂ Amynthæ filius ambo sola dextra re-
soluti cessaverunt. Qui vero aut equitarunt,
aut iter fecerunt in lumbis, ac femoribus reso-
luti sunt (m).

66. At causa licet ignota, effectus tamen
videtur confirmari ex aliis nerveis, quas ego
observavi, ut supra innuebam, apoplexiis, quæ
dextrum quasi constanter latus resolverunt. Ali-
quot ex iis præcipue mere convulsivis libet hoc
loci referre. Nimis fortasse prolixus in iis de-
scribindis alicui videbor: at siquid ego video,

(m) De Morb. Popular. Libr. IV. vers. 27.

ex hac nimietate luculentius hujus morbi patebunt indicia, quibus a junioribus Medicis diognoscatur.

NERVEÆ APOPLEXIÆ.

HISTORIA

I.

67. **I**llustris quidam Canonicus nunc septuagesimum quintum agens ætatis annum excesiva tum animi, tum corporis sensibilitate, anxiaque conscientia usque a juvenili ætate angabatur. Studiis enixe incumbebat, in iisque stomachi dolore certa quadam periodo laborabat: convalebat vero nocturna intermittens studia. Sacerdos initiatus magis, diuque religione solicitabatur. Quum autem quindicim abhinc annis per dies aliquot auditor adfuisse, Verbum Dei prædicantibus iis, quos Missionarios vocant; tunc continuo aucta est, quæ magna jam diu illi erat, tum conscientiæ, tum nervorum sensibilitas.

Pluribus transactis annis nox, quæ diem præcessit quartam junii, anni 1783. eum tur-

bis vexavit, magisque exagitatus sub auroram, tinnitus quodam aures percelli, mentis cogitationes sensit confundi, ac veluti primos deliquii limites adivit. Quum res ita se haberent vocatus adfui prima vice suppeditaturus artis remedia. Ejus vidi faciem non saturato, sed roseo colore tinctam: ejus mentem aliquantum confusam deprehendi, ac perturbatam; deglutiendo difficultatem observabam; linguæ usum impeditum quidem, non tamen omnino sublatum; os detortum; paralyticum latus dextrum, quod quidem non adempto sensu, sed maxime aucto, diris torquebatur doloribus. Præterea æger toto corpore acutiori sensu pollebat; difficilis a pluribus diebus erat alvus; pulsus vero, licet turgentes, non tamen duri, tardique uti sere inveniuntur in sanguinea apoplexia.

Tunc jussi e vena sanguinem mitti: hinc ægro levamen aliquod, quod tamen non augebatur secta rursus post horas circiter octo vena: glutinosus exibat sanguis, nulla deinde obductus crusta. Aperiebatur alvus clysteribus emollientibus; neque enim stimulantibus uti poteramus, quin maximæ in toto corpore excitarentur turbationes. Itaque clysteribus, sero la-

ctis depurato, aliquibusque sedantibus remediis
Æger post aliquot dies ore componebatur; post
aliquot hebdomadas libere loquebatur, ac faci-
le deglutiebat: exactis aliquot mensibus crure
quantum satis utebatur, aliquantulum & bra-
chio. Mens autem post horas aliquot a morbi
invasione sibi restituebatur omnino. Interea
tamen partibus paralyticis dira convulsione con-
flictatis, genitalibus sævo erethismo distractis,
vigiliis defatigantibus, mentis impotentia ad res
serio perpendendas, summaque tandem totius
corporis sensibilitate optimus Æger per plures
menses afflictabatur. Quæ quidem sentiendi
vis adeo acuta evasit, ut ex solo contactu pi-
lorum vestis pelliceæ, ex tenui quoipiam soni-
tu, ex urina etiam urethram percurrente ni-
mis laceffitus animo deficeret. Nunc temporis
autem retusa aliquantum hujusmodi sensibilita-
te, imminuta quoque sunt, quæ illud vitium
sequuntur incommoda.

HISTORIA

II.

68. **O**rnatissima quædam Virgo altero supra trigesimum ætatis anno structura corporis fœlix, natura summe cogitabunda, irritabilis, sensibilisque a quatuor diebus haud bene se habebat, per biduum autem somno infolito laborabat. Tunc temporis dominabantur in aere tum calor, tum humiditas. Quum sub vesperas diei decimæ sextæ Junii an. 1786. caput ejus stupiditate quadam molestissima obtunditur: vocatus adfui, quæque sequuntur observavi. Erat illi facies veluti rosea, mens confusa: verbum aliquod prolatura, illius solas primas pronunciabat syllabas; aliquando etiam nomen rei proprium perquirebat frustra, idque eadem animadvertens turbabatur. Præterea tum brachii, tum cruris dextri motus omnino impeditus, aliquantulum etiam sensus: stomachus vero, pectusque angustiis magnis opprimebantur. Decem ante dies menstruus illi sanguis solita quantitate effluxerat; a sex autem diebus fœces ab alvo nullæ.

Quæ quum ita comperissem clysterem jussi, venæque sectionem; hinc Ægra optima solabatur: mane sequenti incommoda minuebantur adhuc; motus, sensusque ferme restitutus vigebat. Contra quærebatur ventrem flatibus perturbari, & caput affici, ac si receptaculo quodam angusto coarctaretur: hinc blande alvus purgata est. Elapsis diebus circiter octo omnia sedabantur; si tamen excipias reliquum aliquid difficultatis tum ad res enixe animo perpendendas, tum ad oculos in certum quodpiam objectum diutius intendendos.

HISTORIA.

III.

69. Incepto Februario anni 1786. ingenua quædam Virgo ægrotavit. Ipsa valde sensibilis ab annis aliquot levi quodam manuum tremitu, subsultuque afficiebatur. Jamvero a pluribus diebus animo satis perturbata, menstruoque fluxu evasa, vix elapsis Februarii Kalandis, repente capite torquetur, quod primo æstus validus, sonitusque molestus urgebat. Facies, quæ quidem natura pallebat, florido

quodam rubore imbuebatur, clataque voce auxilium flagitavit: subinde vox intercepta est: mens illi confusa, tumensque lingua, atque torpescens. Familiares venam illi contusam cupiebant; Medico vero improbabatur, qui Ægræ antispasmodica obtulit remedia. Post horas aliquot soluta loquela, mens illi ordinabatur rursum, cogitatione tamen, memoriaque parum firma: imposterum lateri dextro omnis fere motus, sensusque patuit ademptus; dum membris reliquis naturalis mobilitas, atque sensibilitas mirum in modum augebatur. Post dies vero circiter decem, & latus paralyticum naturali motu, nimioque sensu vigebat.

Elapso circiter mense validior renovatur apoplexia. Virginis facies vivide iterum rubebat, tinniebant aures, lingua torpescet: magna cum difficultate Ægra deglutiebat, atque loquebatur, imo loquens saepe quædam verba invito animo proferebat, impotens ea, quæ volebat, pronuntiandi. Iterum latus ejus dextrum motu ferme, ac sensu carebat, osque detorquebatur: quæ quidem phænomena non nisi post octo dies evanescebant; latusque corporis paralysi affectum non nisi post quindicim

reviviscebatur. At major solito sensibilitas perdurabat, notabilisque tum loquendi, tum deglutiendi difficultas. Tunc temporis secta vena omnia in melius vergebant: hinc major sanguinis quantitas nova venæ-sectione emissâ est: & omnia in pejus ruebant: adeo Medicum decet circumspectio in venæ-sectione imperanda, quum de nervorum morbis agatur! Ab Ægra tunc sumpti flores *Zinci* tenuissimam adferabant utilitatem, ferrum contra certum damnum.

Ægrotans, quum res ita se haberent, me consulta advocabat. Eam inveni magnis percitam terroribus, facile mente evanescentem, ad deglutiendum, atque loquendum impeditam aliquantum. Brachium utrumque deprehendi torpens, & corpus reliquum extra modum sentiens; ita ut maxime exagitaretur Ægra si qui colloquerentur, aut gradu moverentur: imo quidquid & tenuis susurri, strepitus etiam solarum linearum, quibus fœminæ utuntur, eam vexabant ita, ut statim ejus linguam pungens torpedo; ac dentes, maxillasque lacefferet quædam molesta, terrensque distractio. Memoria ante morbum satis firma vacillabat; nec

lectioni , nec scriptioni poterat vacare : scribere volens determinatum verbum , proprias ejus literas , sed inordinate delineabat . Toto corpore angebatur , nisi tepido se colligeret loco : abhorrebat a cibis quam maxime , & linguam prodebat fœdam .

Sic stantibus rebus mannam præscripsi : hinc cibos sumpsit libenter . Subinde per dies aliquot mane aliquantulum tremoris tartari , & mediocrem seri ex lacte depurati quantitatem potabat . Circa Nonas Majas , deprehensis pulsibus exasperatis aliquantum , atque durescentibus , paucum sanguinis mittebatur ; hinc lento quidem gressu , sed continuo solabatur Ægra . Continuo illa de more lactis sero utebatur ; interjectis autem vicibus aliquantulo tremoris tartari . Post dies vero a morbi invasione circiter quinquaginta sumebat quotidie modicam dosim valerianæ , atque chinæ - chinæ . Ex his levabatur valde ; loquebatur enim facilius , melius deglutiebat , illique satis imminuebatur maxima nervorum sensibilitas , atque mobilitas ; quod ut obtineret facilius præscripsi aliquantulum spiritus vitrioli aquæ immiscendum . Ad id temporis tepens Balneum domesticum , sed

valde caute adibat : hinc majus semper levamen , quod quidem adeo crevit in dies , ut convaluerit omnino .

HISTORIA

IV.

70. **N**obilissima quædam Virgo annum ætatis agens vigesimum quintum , ingenio , animique summa virtute prædita , nervis autem valde sensibilis , post noctem somno traductam apoplexia corripitur . Rosea illi erat facies , os detortum , oculus satis monstrose protuberans , mens aliquantum confusa , dextrumque latus paralyticum . Lenibus tantum medicamentis convaluit . Reliqua tamen illi adhuc est sensibilitas solito major , oculusque haud quidem suo loco restitutus .

71. Ast oportuniōri loco aliæ hujus speciei exponentur apoplexiæ . Nunc vero , ut melius hæc nervea , sive spastica distinguatur apoplexia , præstat discrimina ostendere , quæ inter hanc , aliasque quasdam nervorum ægritudines intercedunt .

CAP. VI.

In quo discriminantur Apoplexia Nervea, præsertim mere convulsiva, Suffocatio hysterica, & Epilepsia.

72. **N**ervorum ægritudines spasticæ apoplexiæ affines sunt præsertim suffocatio hysterica, & Epilepsia. At nervea quidem apoplexia difficilius quam sanguinea, atque serosa distingui potest a suffocatione: imo ea apoplexia, quam hysterica dicunt, vocari posse videtur postremus suffocationis hystericae gradus. Verumtamen tum quæ comitantur apoplexiā hysterica, tum quæ præcipue subsequuntur, ostendunt, aliquatenus, quam ab hujusmodi morbo differat hysterica suffocatio. Mulieres enim in suffocatione pulsus produnt angustos, depresso, nulos etiam aliquando, ut in syncope, quum nempe hysterica passio sæviat vel maxime: apoplectarum nervearum pulsus nimis diversi sunt, ut supra innuimus (n. 54.). Quum vero fœmina a suffocatione hysterica resurgit, memorat quidquid assidentes dicebant, quidquid operabantur, dum vita functa vide-

batur. Me quidem haud latet apoplecticas etiam ex nervis aliquando rerum meminisse, quæ morbo ingruente acciderant; quum nempe levis eas corripuit apoplexia, in qua rerum cognitio non aufertur, sed tantum, ut supra innuimus (n. 55.) confunditur: at fere semper memoria retinet confuse, nec omnia, quæ acciderant, sed tantum aliqua. Si vero validior ingruerit apoplexia, omnium quidem rerum obliviscuntur. Hoc quoque discriminem CAELIUS asserebat (ille autem loquebatur de apoplexia generatim) inter hos morbos intercedere: sic enim ait (n.): *cessante affectione apoplectæ fœminæ nesciunt gesta; illæ vero, quæ matrice fuerint præfocatæ, resipiunt, atque narrant quemadmodum fuerint oppressæ.*

73. Accedit quod hysterica passione oppres-
farum clausos observamus oculos, & faciem na-
turali fere colore imbutam. Postremo tandem
cessante suffocatione, licet diutina, nunquam
paralysi, sed universali tantum atonia laborant:
loquela illis non remanet intercepta, sed paulo
post convalent omnino. Quid vero si vires

(n) Acutor. Morbor. Lib. III. pag. 145.

mentis attendamus? Post suffocationem hysterica^m nihil ex mentis facultatibus adimitur. At quantum contra vites tum corporis, tum mentis, ut supra vidimus, ex apoplexia lœduntur?

74. Certis quoque indiciis distinguitur hic morbus ab Epilepsia. Hæc enim ægro & omnem, & semper cognitionem aufert, si perfecta: convelluntur præterea epileptici, totumque corpus insolitis omnino motibus torquetur, atque exagitatur; quæ quidem absunt ab apoplepticis. Postremo tandem apoplexia una tantum vice plus lœdit mentis facultates, quam epilepsia pluries renovata.

75. Verum ægri recensitæ prædispositiones (n. 53.), phænomena morbum præcedentia (n. 54.), morbi ejusdem jam sœvientis symptomata (n. 55. 56. 57. 58.), & ea tandem (n. 72. 73. 74.) exposita, quibus ab morbis affinibus discriminatur apoplexia nervea; hæc, inquam, omnia observari unice possunt in ægro, qui adhuc vivat. Quoniam vero Medico rationem indicant medendi morbo, aliis præstare videntur, quæ sectis cadaveribus, queant deprehendi. Nec ista tamen spernenda sunt: & ipsa

enim morbi naturam significant, atque confirmant. Quamobrem nervosam dicunt certius apoplexiam, si sectum apoplectici cadaver cerebrum prodat, cerebellum, aliasque partes nullo vitio inquinatas, a quo gigni poterat mors.

76. Plura sine vitio observarunt Medici cadavera apoplecticorum: hoc loci aliquot satis est indicare. Duo observavit celeberrimus TISSOTIUS (o): in capite primi *ne miminum quidem inveniebatur vitium*: in altero etiam nihil vitiatum, si tamen excipias *cor paullo aequo magius, mollius, pallidiusque*. In secto juvenis fœminæ cadavere, quam vita functam describit HAENIUS (p) ex apoplexia, ipse deprehendit unice pulmonem leviter pleuræ adhærere, ileumque tres vermes continere. Nihil tandem vi-
tii observavit BOUCHERIUS (q) in cadavere Virginis, quæ anno ætatis suæ vigesimo primo convulsiva apoplexia occubuit, post iteratos epilepsiarum accessus. Mirum quidem est, re tamen vera non solum invenitur cerebrum, sed & aliæ corporis partes, quæ post mortem nullum læ-

(o) Epist. varii argumenti pag. 88.

(p) Rat. Medend. Part. IV. pag. 36. & 37.

(q) Apud BURSERIUM loc. cit. Tom. III. Cap. IV.

sionis indicium proferant, quum vivente homine vel maxime læderentur. Xenedochio Verfailliensi, ait QUESNEYUS (r), observabantur colicæ quædam convulsivæ adeo sœvientes, ut ægris mortem afferrent, quin tamen vestigium læsionis ullum in eorum intestinis post mortem posset deprehendi. Nuper clarissimus GENNARIUS (s) explicat qua ratione serum innumeras cerebri rimas, sive interstitia ab ipso observata pervadens, licet nec nimium, nec nimis densum, sed tamen præter solitum acre, morbos inferre possit lethales in cerebrum ipsum, quin ullam post mortem prodat morbidam immutationem.

77. Animadversis tamen in ægro vivente nerveæ apoplexiæ indiciis, non ideo negari posset hujus speciei fuisse morbum, dum aliqua aquæ quantitas post mortem in cerebro inveniretur. Quidquid enim actionem nervorum immisnuit, sive alio quocunque modo perturbat, imminuere quoque potest, atque turbare sanguinis motum per vasa cerebri: hinc major secernitur

(r) Memoires de L' Academ. Roy. de Chirurgie Tom. I.
Part. I. pag. 19.

(s) Giornale per servire ec. Tom. I. pag. 372.

seti copia, quæ cerebrum obruere potest; tunc vero in cadavere invenientur signa compres-
sionis, licet morbi causa sit unice sita in ner-
vis male affectis.

Id autem colligi signanter potest ex epi-
lepticis quibusdam, ut notat CULLENIUS (t). In iis enim plures post vices sœvientis, quie-
scentisque epilepsiarum subsequi observamus aliquan-
do aut dementiam, quæ quidem a nimia in
cerebro collecta pendet ferocitate; aut veram
apoplexiā, & in horum cadaveribus, sanguī-
nem, serumve, quod cerebrum opprimit, in-
venimus; licet morbus primario e nervis exo-
riretur. Apposite ergo scripsit BOERRHA-
VIUS (u) *apoplexiā aequē gignere aquam, quam*
quod gignatur ab aqua.

(t) Institut. de Médec. Pract. Tom. III. pag. 71.

(u) De Morb. Nervor. Tom. II. pag. 221.

CAP. VII.

*Apoplexiæ Nerveæ Divisio in idiopathicam ,
⁊ in sympatheticam .*

78. **S**edes diversa causarum , quæ nerveam invehunt apoplexiā , Medicos induxit ad hunc morbum distinguendum in idiopathicum , & in sympatheticum . Idiopathicam vocant hanc apoplexiā , quum causæ illam efficiētes insident initio nervorum , idest cerebro , quod spasmo , aliave ratione lacerſunt . Sympathicam dicunt quum dictæ causæ a cerebro semotæ in ipsum sympathice tantum agant . Sed quum mihi videatur aliquando arduum esse , ſedem statuere tum causarum spasmi , tum spasmi ejusdem , ideo subdo me eam vocare apoplexiā nerveam idiopathicam , quam giognunt mobilitas excessiva , & sensibilitas nervorum , aut aliæ causæ , quæ ſua natura primo , & immediate agunt vel signanter in ſenforium commune , vel in totum nervorum ſystema ; cuius generis ſunt animi pathemata , quædam venena , immanis dolor , immodicæ evacuationes , aliaque hujusmodi . E contra sym-

pathicam voco nerveam apoplexianam, cuius causae saltem occasioales semotae a cerebro videntur idem per consensum laedere; aut eam, quae signatur ex humoribus in cerebrum irruentibus; si tamen eos illuc coegerit spasmus a cerebro remotus, qui ex. gr. excitetur in imi ventris visceribus.

79. Non est forte explicatu arduum, qua ratione signatur ea apoplexia, quam supra vocabimus *idiopathicam*; quum insideant cerebro causae, quae ipsum irritantes, sive alio quounque modo laudentes, possunt apoplexiam producere. Sed difficile quidem est explicatu qua ratione illa excitetur apoplexia, quam dicunt *sympathicam*.

80. Duplici modo videntur, causae a cerebro remotae laedere cerebrum posse, unde *sympathica* exoriatur apoplexia. Primum laedunt, quod facile intelligitur, quum spasmo torqueant corporis partes in quas agunt; puta infimum ventrem: tunc enim sanguis, obstructis spasmo vasibus abdominalibus, aut saltem eorum capacitate imminuta, majori quidem impetu, ac quantitate fertur in cerebrum; cujus vasa nimium distrahere, ac forte potest disrumpere. Sic sentit

HOFFMANNUS, ut (n. 50.) innuimus. Secundo ædem causæ possunt, quod tamen difficilius explicabitur, cerebrum lædere, licet ab ipso remotæ, simplici quodam consensu; quin tamen in cerebro post mortem ulla deprehendatur morbosa immutatio. Vana enim est opinio, ac falsa, saltem sæpe, eorum, qui putant ex convulsionibus sanguinem majori semper velocitate, ac quantitate in cerebrum trudi. Nam in plerisque convulsis arteriarum pulsus satis exiles, & aliquando evanescentes haud certe innuunt majorem sanguinis impetum. Revera dissectis infantum cadaveribus, qui periere convulsi, haud vasa cerebri sanguine proderunt referta (x).

81. Hanc summam difficultatem in *consensuali*, ut ajunt, apoplexia explicanda fatetur quoque Claris. BURSERIUS (y). Hinc postquam aliorum opiniones confutare conatus est, eaque etiam, quæ docet spasmum per nervos cum medulla cerebri communicari, hac super re suas aliquas profert conjecturas. Numne, conjiciens ait, spastica contractio propagatur usque ad minimas cerebri arteriolas, quibus spasmo con-

(x) SENAC Trattato Della Strutt. del Cuore Tom. IV. pag. 44.

(y) Loc. cit. Tom. III. §. 104.

tractis commercium intercipiatur inter cerebri corticem, medullamque, atque inter hanc, & reliquas corporis partes? aut forte extrema nervorum a causis spasmī laceſſuntur adeo, atque labefactantur, ut eorum etiam origo, cerebrum nempe, ſimilem labem in tenerima elementari fabrica incurrat? hinc autem ea fibrarum subversio, aut alia quælibet præter naturam mutatio exoriatur, quæ motum, & ſenſum extinguat?

Quidquid sit de hisce Auctoris ſpectatiffimi conjecturis, fateor me latere rationem, qua ſpasmus longe a cerebro excitatus cerebrum lædat ita, ut apoplexia enascatur, quin ullum in cerebro eodem morbi vestigium relinquatur oculis proſectoris percipiendum. Ego enim ignorantiam minus odi, quam errorem. Quare his prætermiſſis ad causas ſpasmus efficientes investigandas statim tranſeo.

CAP. VIII.

*Causæ exponuntur Apoplexiæ Nerveæ præsertim
Idiopathicæ.*

82. **C**ertissimum est, præcipue hominis sensibilitatem, mobilitatem, atque irritabilitatem facilem efficere hanc apoplexiā. Iis enim positis dispositionibus, nervi levissimis causis ad extra existentibus, & ad tantos effectus imparibus perculsi eos motus vi propria excitant inordinatos, violentosque, qui turbas cident enormes; non secus ac si validissimæ in corpore adessent causæ. Cerebrum vero præsertim semper est ad spasmum proclivius: quapropter ex ejusdem spasmo enasci potest apoplexia.

83. Nil mirum ergo, si, qui multa cogitant, ac res diutius perpendunt, facilius hoc morbo corripiuntur. Studia enim, rerumque meditatio signanter, & directe cerebrum defatigant; quod his de causis spasmus adoritur facilis, quam alias corporis partes. Nuper hujusmodi forte periit apoplexia immortalis EULERUS. Agebat annum ætatis suæ septuagesimum sextum. Die septima Idus Septembris,

inito calculo , ascensum aereostaticarum Machinarum metiebatur , quæ per totam tunc celebrabantur Europam : deinde super Planetam Herschellum , ejusque orbitam subtilissime differens , delapsa de improviso , qua tabaci fumum hauriebat fistula , mathesi , ac vitæ ereptus est (z) .

84. Præterea cerebro hac ratione disposito , præcipue quum mens diutius rem unam meditatur enixe , anxieque , furor ille facile exsurgit , quem *enthusiasmum* vocant . Quot vero homines ex hujusmodi furenti , ut ita dicam , mentis œstro repente obiere ! Inter cæteros censendus est ille Actor , qui vita decepsit , dum furens tragicam agebat personam . LORRYUS (a) Rhetorem quemdam agnovit , qui HOMERI lectione extra se ipsum rapiebatur ita , ut sœpe animo deficeret . Parochus quidam , uti refert celeber . ZIMMERMANNUS (b) , sacra commendabatur eloquentia : ut laudem hujusmodi servaret sibi , augeretque , diu noctuque conabatur men-

(z) Éloge de M. EULER par M. le Marq. de CONTORCET .

(a) De Melanchol. Tom. I. Cap. VI. pag. 144.

(b) Traité De L'experience en general Tom. III. Chapitr. VII. pag. 301.

te. Hinc viribus corporis destituebatur, memoriaque, quæ, & magis deficiebat, quo nisu majori eam augere contenderet. Postremo apoplecticus evasit, atque hemiplegicus. Qui ad excessum sacris vacant meditationibus, ferri solent in eos, quos dicunt *Raptus*, *Ecstasēsque*; ac sœpe in apoplexiā desinunt. Novi paucis abhinc annis, Cœnobitam quemdam, qui magnō quum nisu res sacras meditaretur, stomacho veluti urebatur, ac pectore: paullatim defecerunt illi mentis facultates, atque lethali apoplexia correptus est. Hæc est apoplexia, quæ vocabatur a summo BOERRHAVIO (c) *apoplexia sensorii communis*, & quam immedicabilem fatebatur HELMONTIUS, scribens; quando *apoplexia oritur a superbia ideæ, hanc remedia paracelsica non curant, nam malum est spirituale; si vellem hic per medicamenta curare, nova indigerem arte.*

85. Ast haud rari sunt illi quoque, qui ex magnis animi motionibus apoplectici moriuntur. An hæc apoplexia ex eo gignatur, quod corpus spiritibus, ut ajunt, animalibus exina-

(c) De Morb. Nerv. Tom. II. pag. 221.

niatur; aut quod spasmodus universi corporis maiorem sanguinis copiam, motuque percitam majori in cerebrum cogat, quæ vasa ejusdem disrumpens haemorrhagiam gignat, uti observamus in haemophysi convulsiva; aut quod fiat paralyticum, percellentibus nimis animi motionibus, sensorum commune, uti videtur celeberrimo TISSOTIO (d); aut quod animi quædam pathemata fluidum nerveum, (quod ferme in idem recidere videtur) motu destruant, uti putat celeberrimus CULLENIUS (e); aut quod in hisce violentis animi motibus fibræ sensiorii communis obstringantur magis, magisque rigescant, adeoque actioni impares evadant, uti sustinet LORRYUS (f); an alia ratione; me libens fateor latere; meoque judicio alios quoque latere debet, cum certe pendeat a legibus commercii animam inter, & corpus; quæ densis nimis tenebris obducuntur. Certo tamen videtur hujusmodi apoplexia a nervis provenire, quos nimis percellunt animi commotiones.

(d) Tratt. De' Nerv. Tom. II. Part. I. pag. 203.

(e) Institutions De Médecine Pratique Tom. III. art. 1115.

(f) Loc. cit. Tom. I. Par. I. Cap. IV. pag. 94.

86. Re autem vera quot possunt apoplectici recenseri ex animi commotionibus , quibus homines obnoxii sunt ? Ipsa eadem lætitia , qua tamen perfruimur raro , mortem repentinam invexit aliquando . Historici Romani matrem quamdam referunt vitam liquisse repente , vix filio reviso , quem vita functum apud Cannas dudum crediderat . FOUCHETIUS celebris , vix ab ALOYSIO XIV. donatus libertate , obiit de repente . JUVENTIUS THALNA , vix novit decretum sibi de Corsis subactis triumphum , ad Aras gaudio interiit repente , dum Numini grates sacrificiis agebat (g) . TISSOTIUS DIAGORÆ mortem ex nimio gaudio commemorat , postquam tres Gnatos vidisset corona vinciri (h) . Plura hisce similia profert Auctor idem . Meminit quoque LORRYUS (i) hæredis LEIBNITZII e vita repente decedentis , inventa , ac vix inspecta , quæ auro cumulata erat , arca . Alios quoque HALLERUS (k) innuit obiisse repente aut *libertate* , aut *reddita sibi amata puel-*

(g) Apud ZIMMERMANNUM loc. cit. Tom. III. pag. 218.

(h) *Essai sur les Maladies Des Gens Du Monde* art. V.

(i) *De Morbor. Conversionibus* pag. 118.

(k) *Elem. Physiol. Corp. Human.* Lib. XVII. Sect. II.

la. Narrat BOERRHAVIUS (l) Pyratam crudelissimum præ summa lætitia repente mortuum fuisse, quum filium suum vidisset redemptum, quem pro perduto habuerat. SOPHOCLES victor pronunciatus in tragœdia repente exanimatus est: idem FILIPPIDI accidit Comœdiarum auctori. Libet tandem hic adnotare, quod apud Historicos Venetos legimus. VICTOR Patritius Venetus ex Patre ALOYSIO DIEDO, adolescens indole ingenuus, ingenio perspicax a Patre tradebatur Obses anno 1480. Turcarum Imperatori in Urbe Constantinopolitana. Suis Ipse manibus testudinem quamdam concinnavit egregie, a qua musicos eliciens sonos, Tyrannum suaviavit adeo, ut ab ipso libertate prius donatus, magnis subinde cumularetur muneribus. Progressu temporis data fide de reditu suo, Venetias, assentiente Sultano, Suos convisurus contendit. Idque vix Pater, Fratres, Sorores, Consanguineique persentiere, præcupatum juvenem multis comitantibus Cymbis obviaturi ad eum pervenerunt, quem Portum duorum Castrorum vocant. VICTOR spectaculo

(l) De Morb. Nerv. Tom. II. pag. 222.

commotus, gaudioque vocem amittens repente apoplecticus inter Suorum complexus interiit.

87. Ex ira quoque apoplexiam enasci haud raro observatum est. Id confirmat inter ceteros SCARDONA (m) observatione quadam, quam TOZZIUS refert; *Ipse novi*, scribit, *laniōnēm quemdam*, qui cum vellet quemdam adoriri, a quo fuit *injuria affectus*, ab illo frustro carnis iectus *ira simul*, & timore commotus repente concidit, & mortuus est. Apoplexiam ex eadem causa adnotavit TISSOTIUS (n). Lis erat inter puellas amicas super colore funiculi, quo vincienda erat vestiuncula cuiusdam parvi suarum deliciarum simulacri. Hac super re satis rixatæ sunt: una ex ipsis ætate annorum septem, quum summa exardesceret ira, e cubiculo evasura in januæ limen corripiebatur apoplexia: hinc ipsi læva manus paralytica, qua nunquam convaluit. Vir quidam Bernæ tum in bellicis rebus, tum in politicis præclarus magni momenti munis exposcebat: denegabatur; indignatus apoplexia, & post horam morte corri-

(m) Loc. cit. pag. 16.

(n) Loc. cit. Tom. II. Par. II. Cap. IX. §. 119.

piebatur (o). Alii quoque morbi apoplexiæ affines ex ira jam observati fuere. Uxor, referente VALERIO MAXIMO, NAUSIMENIS Atheniensis prospiciens gnatum, filiamque incestuose coire, insanabiliter obmutuit. *Pnella*, inquit STOLLIUS (p) ob negatam ab Hera mercedem irascitur. *Mox phrenitica fit*, frequenter convellitur; perit die quarta. *Cadaver sedulo perquisitum nil prorsus alieni ostendit.*

88. Terror etiam vitam repente adimere potest. TISSOTIUS refert, reum quemdam, vix nuntio auditio de mortis pœna a judice contra eum pronunciata; subito obiisse (q). Auctor idem spectatissimus alibi (r) mulierem quamdam memorat prægnantem, quæ uterinas experiebatur hæmorrhagias: fauste hæ compescebantur, vigebant vires, pariendi imminebat tempus; hinc de ejus salute spes satis certa affulgebat. At gravi perculsa terrore deficit, excitata delirat, cuncta die nova, sed prima minor accedit hæmorrhagia, & Ægra unius ho-

(o) ZIMMERMANN. Loc. cit. Tom. III. pag. 272.

(p) Rat. Med. Tom. III. De Caus. & Sed. Phrenitid. pag. 242.

(q) Loc. cit. Tom. II. Par. I. pag. 247.

(r) Epist. var. argum. pag. 91.

ræ spatio moritur. *Et quidni*, subdit, *ex nervis mors?*

89. At grandis quoque animi dolor, qui de repente excitetur, apoplexiā invehit aliquando. HELI Pontifex Hæbreorum, Judexque annum agens nonagesimum octavum interiit statim, ac dolens audivit populum ab hoste profligatum, Arcam Testamenti abreptam, gnatum utrumque peremptum (s). PUB. RUTILIUS obiit repente, quum Fratri consulatum negassent Romani (t). LANCISIUS (u) vidit Seniorem quemdam inter cœnandum repentina morte sublatum, quum ipsi adventum nuntiasserent consanguinei sui, quem non sibi honoris futurum esse putabat. Adolescens quidam (x) viduam amans perdite, accepto per epistolam repulsæ nuntio, procubuit humi, eademque die mortuus est. LORRYUS (y) observavit apoplexiā, quam quidem dicit hystericam, ac subsequentem paralyſim cuiusdam Matronæ, auditio

(s) Lib. I. Regum Cap. IV.

(t) PLIN. Natur. Hist. Lib. VII. Cap. XXXVI.

(u) De Subit. Mort. Lib. I. Cap. IX. art. 18.

(x) SAUVAGES Nosol. Clas. VI. §. XXVIII.

(y) De Morb. Melanch. Tom. II. Par. I. Cap. II. pag. 157.

vix nuntio sibi funesto. Memorat BOERRHA-
VIUS (z) Virum quemdam, qui in Galliis ad
tumulum paternum hærens, deflensque mortuus
est. Celeberrimi GAUBII quidam amicus mo-
nitus de morte Fratris sui properans pergit Ha-
gam Comitum: ejus cadaver confaciens angit-
tur, viribus destitutus sedet, moriturque ita su-
bito, ut cum Fratre tumulatus fuerit (a). In
obsidione Budæ occidebatur (b), Germanus for-
tissimus, qui vel superna virtute pollens hostes
profligare cernebatur. Dux exercitus inquire-
bat quis esset occisus? agnoscens unigenitum
suum hærens aliquantum obstupuit, & mortuus
est. Dum scribebat ZIMMERMANNUS celebrem
de Experientia librum, vita defuncta est Uxor
Principis GEORGII ALOYSII Olsatiæ: Vir mœ-
stissimus accedit feretro, quod ex lignis pretio-
sis nuper fabrefactum sustentabat Uxoris cada-
ver. Cubiculario quemdam pium librum le-
gente, ut Princeps jussérat, idem ex oculis la-
crymas, ex pectore effundens suspiria moritur
repente (c). Amicus meus, compaterque, vix

(z) Loc. cit. pag. 223.

(a) Serm. Acad. alter. pag. 27.

(b) BOERRHAV. loc. cit.

(c) Loc. cit. Tom. III. Chapitr. VI. pag. 259.

lectis litteris, quibus ille in judicium vocabatur de summa rerum, apoplecticus evasit, laterisque dextri paralyticus, loquelaam amisit omnino, non tamen cognitionem; ast ille perfecte convaluit.

90. Quum vero prægnantium, & puerperarum nervi sint ad spasmum procliviores, hinc iis periculum imminet majus hujusmodi spasticae, de qua agimus, apoplexiæ (8). Et, ut verum fatear, mihi plerumque visum est, præcipue ex spasmi causa mulieres vitæ periculum subire, sive illis immineat partus, sive in partus actu, sive expleto jam partu. Spasmo e contra evanescente eas facile adjutas, tum arte, tum natura haud raro observavi.

(8) Puerperarum nervi existimari solent ita sensibiles, morbosque obnoxii deordinationibus, ut putent plerique eandem ipsam puerperalem febrim, aliquando saltem, indolis esse nervosæ (ERN. CHR. NOLTE Dissert. de Febre Puerperar.). Hoc idem suspicatus est Clariss. FRANKIUS valde plaudendis innixus meditationibus. Ejus suspicionem confirmant quæ mulieres sub ipso partu mortali corripuntur apoplexia, quam aliquando, ut Ipse scribit, nervosæ indolis esse in parturientibus dubium non est. Delect. Opusc. Med. Vol. V. pag. 57. in Adnot.

91. Adnotavit jam BOERRHAVIUS (d) non-nullis mulieribus in extremis partus nixibus exoriri semper epilepsiam, ita ut sine ullo pariant sensu; addiditque in summis primi partus laboribus plures mulieres matuiore nuptas ætate affici epilepsia, & fere semper cum suo fœtu mori, nisi hic prompte educatur. Nuper observavi mulierem spasmo dire occupatam, cui fœtus extrahebatur, epilepticos motus prodere, subinde mori repente.

92. Hæc autem terribilia accidunt facilius, si mulieres hujusmodi animo commoveantur. MORGAGNUS (e) terrens puerperæ fatum narrat. Ipsa affectionibus hystericas obnoxia in lucem emisit fœmineam prolem, quum multiplici ex causa præcuperet masculinam. Vix partu peracto, Vir quidem imprudens sexum prolis nunciavit uxori: illico huic pulsus defecerunt, corpus friguit totum, & intra sesquihoram mortua est. Defatigatio ex partu diffici li, & terror exinde ortus in causa fuere, referente SEBASTIANO ALBRECHTO apud MORG-

(d) De Morb. Nerv. Tom. II. pag. 320.

(e) Epist. Anat. Med. XLVIII. n. 44.

GNUM (f) cur alia puerpera *inter loquendum præter omnium opinionem* mortua fuerit.

Ruricola quædam mulier pro sua condizione satis delicata paullo post partum putrida corripiebatur febre. Aptaverunt coxendicibus vesicatoria, quibus ruditer pertractatis a quodam rustico, qui vices gerebat Chirurgi, ira exardens, ac dolore pressa ululavit ægra, statimque emortua est.

LORRYUS (g) sensibiles adeo, mobilesque credit puerperas, ut aliquando subita morte eorum quasdam corripi opinetur ob nimiam, qua affluunt, lætitiam exactis partus laboribus, nuntiataque prole mascula in lucem emissa. Quare, qui sive prægnantibus, sive puerperis adstant, in primis evigilent, necesse est, sedulique caveant, ne illæ irritentur, aut alia animi commotione afficiantur; præcipue si habitudine sint sensibiles valde, mobilesque. Tunc enim unicum quandoque verbum, gestumque funestissimos gignere potest effectus.

93. Itaque affirmabam nervosæ indolis apoplexiā adoriri prægnantes, puerperasque; nec

(f) Loc. cit.

(g) Loc. cit.

tamen easdem puto esse immunes apoplexia, quæ sive fit ex partus conatu vasa cerebri disrumpente, sive ex lactea, sive ex lochiali, quæ in cerebro colligatur, *metastasis*. Non me latet in cranio post subitam mortem sæpius inventam fuisse lacteam materiem (h): nec latet HIPPOCRATEM scripsisse (i); *Si mulieri puerperii purgatio ad caput irruat (id enim contingit), plerumque statim moriuntur*; quod quidem posteriores confirmant observationes (k).

94. Ast aliqui forte censere possunt, potius ex syncope, quam ex apoplexia induci mortes hujusmodi subitaneas, quas ego cum Recentioribus plerisque clarissimis ad genus apoplexiæ revoco: nec quidem cum hisce falli existimo. Si enim, præsertim ante hæc tempora, non omnes ita opinabantur; ideo forte erat, quod violentæ animi affectiones sæpenumero mortem adferunt ita repentinam, subitamque, ut sæpe symptomata, quæ solent apoplexiæ comitari, nequeant prodire. Atqui nonnulli maximis animi perturbationibus perciti, quum dies

(h) VAN-SWIETEN aphor. 1329.

(i) De Morb. Mulier. Lib. I.

(k) VAN-SWIETEN loc. cit.

aliquot vivant, mentem ratione orbatam, aut satis confusam, os detortum, hemiplegiam, aliaque hujus generis proferunt symptomata: hinc mihi ad apoplexiā spectare posse videntur mortes subitaneæ, quas invehunt animi perturbationes, licet per tempus nequeant solita apoplexiæ phænomena observari. Et sane si plures mentis commotiones, signanter vero terror, & horror epilepsiam haud raro gignunt potius quam syncopem; cur juxta varios earum gradus, variamque virium naturam, ac juxta patientis constitutionem efficere nequibunt apoplexiā, quæ gradus Epilepsiæ maximus censetur?

95. Præterea licet concederetur cordis motum spasmo, sive paralyssi intercipi in animi perturbationibus; non ideo tamen syncope esset necessario idiopathica, sed potius sympathica ex cerebri læsione. Videtur enim certum hujusmodi causas primario in cerebrum agere. Latet quidem, quænam sit hujusmodi actio, quaque perficiatur ratione: latet quoque, quænam sit physica cerebri conditio, quum magnis afficiatur animi perturbationibus; nec semper patet, quid in cerebro physice immutetur ingru-

ente nervea apoplexia , de qua loquimur in præfens : invisibilia enim cerebri machinamenta sæpe deordinantur ita , ut mortem vehant , quin ullum deordinationis vestigium in ejus substantia reliquum conspici possit . At nihilominus cerebrum primario affici probabilius videtur : in animi enim commotionibus aliqua perceptio ne opus est , quæ quidem ad cerebrum spectat . Quapropter , inquit HIPPOCRATES (I) , cor quidem , & præcordia maxime sentiunt ; sapientia tamen minime participant , sed omnium horum cerebrum causa est .

96. Cerebrum est , quod ab animi affectionibus sive hac , sive illa vi , atque ratione affectum aliquando minus , imo & nihil penitus influit in cor ; hinc syncopes , & mors sæpe exoriuntur : e contra aliquando influit plus quam solito in cor ipsum , quod palpitat vehe menter , vique majori sanguinem ad cerebrum impellit , quod , apoplexia exorta , morbidam etiam sui immutationem post mortem conspi cuam prodit .

G

(I) Lib. De Morb. Sacr. art. 17.

97. Ex hisce vero inferri licet unam, eamdemque causam ferre posse eundem morbum pluribus, & quidem diversis modis, sicuti & morbum diversum: forte quædam animi commotiones sæpius symptomata syncopis evidentiora; quædam aliæ apoplexiæ phænomena efficient. At certum videtur, generatim mortes subitas ex animi violentis perturbationibus ad apoplexiæ præcipue, de qua hic agimus, revocari posse; syncope enim censenda est sympathica, non vero idiopathica. Hanc syncopem observamus aliquando sympatheticam ingruente etiam vera apoplexia sanguinea, uti exposuimus (n. 19. 20.) licet in ea nullam aliam post mortem observemus morbosam immutationem, nisi in cerebro sanguinem aut congestum, aut e vasis effluxum.

98. Ex dictis huc usque facile colligitur, quid responderi possit illis, qui putarent syncopem esse morbum primarium, ex quo observatum sit ventriculos cordis haud raro, ac proxima vasa sanguine coagulato satis referta esse in cadaveribus eorum, qui ex animi affectionibus repente perierunt. Verum plusquam satis forte hac super re differuimus: incæptam

igitur persequamur nerveæ apoplexiæ causarum enumerationem.

99. Adnotavimus jam (n. 76.) nihil vi-
tii BOUCHERIUM detexisse in cadavere virgi-
nis, quæ ex apoplexia occubuit, postquam plu-
ribus epilepsiaæ accessibus vexata fuisset. At
porro epileptici sæpenumero evadunt apoplecti-
ci, sive ut melius dicam, ad eum epilepsia per-
venit gradum, quem apoplexiæ dicimus. Hæc
autem apoplexia inter nerveas recensenda est;
inter quas etiam ea revocanda ut plurimum erit,
quæ in coitu exoritur, quo cerebrum in con-
vulsionem cieri potest. Novi quemdam juvenem
Pharmacopolam in coitu semper, extra coitum
numquam epilepsiaæ correptum fuisse.

100. Nerveas inter apoplexiæ ea quoque
adnumeranda est mors subitanea, in quam de-
finit aliquando mania, ut bis observavit LOR-
RYUS (m).

Odores quoque, de se licet innocui, tunc
tamen apoplexiæ, de qua agimus, efficiunt,
quum magna odoriferarum partium accumule-
tur copia, diuque inspiretur (n).

(m) Loc. cit. Tom. I. pag. 69.

(n) VOGEL De Apoplexia aphor. 558.

101. Etiam in ebrietate nervi videntur primario affecti ; meritoque ebrietatem esse affectionem nerveam brevem asseruit LORRYUS (o). Aliquos agnoscō homines , qui , dum merum , aliosque liquores potant , convulsi prius , quam ebrii fiunt . „ In Miscellaneis Naturæ Curiosorum , inquit BOERRHAVIUS , (p) „ legitur exemplum „ de milite quodam , qui se replebat tanta co- „ pia potus fermentati , ut distentus se vix pos- „ set movere , sed in scamnum se ponens paul- „ lo post ab eo delapsus expiravit . In cada- „ vere reperitur notabile nihil ; nihil in capi- „ te , nec in pectore . Hinc , subdit , effectus „ inde orti irradiationi cuidam spirituali adscri- „ bendi sunt , eodem modo , uti dixi , de va- „ pore per nates hausto “.

102. Videntur a quadam pendere nervorum lœfione mortes quoque repentinæ , quibus pestis magis , magisque sœvit , ac terret . Aut enim exoriuntur a myasmate pestilentiali , quod , quum subtilissimum , ac summe efficax circu- lando ubique penetret , actionem destruit ner- vorum ; aut a vera gignuntur asphyxia , quam

(o) Loc. cit. Part. I. pag. 123.

(p) Loc. cit. Tom. I. pag. 83.

invehit aer venenatus regionis infectæ, quamque promovent maxime dejectio animi, & Incolarum terror. Sed quidquid ex his supponas, certum est apoplexiā hujusmodi a nervis lethaliter affectis pendere.

103. Nerveam esse apoplexiā, quæ ex venenis dignitur, nemo est, qui dubitet. Certo enim constat nervos præcipue lædi a venenis. Horum autem aliqua in cerebrum fæviunt immediate: alia vero, quum immediate agant in alias corporis partes, in cerebro tamen terribiliores eorum actionis persentiuntur effectus. Id satis probant, quæ venenorū actionem subsequuntur symptomata (9). Quod autem secta veneno peremptorum cadavera nullam proferant aliquando mutationem morbo-

(9) Plura venena repente occidunt. Id præstat morsus serpentis, quem a *Sonaglio* vocant (TISSOT Tratt. de' Nerv. Tom. I. Par. II. Cap. VIII.) Aspidis morsus hominem statim obstringit sopore lethali, referentibus PLUTARCHO, atque LUCANO. Historia romana meminit tum veneni, quo statim periit VIBULENUS AGRIPPA, tum illius, quod quidem a Locusta paratum NERONIS jussu exhibitum fuit BRITTANICO, ex quo repente interiit. At Tyrannorum fastus, improborumque hominum plurima hujusmodi ostentant exempla.

sam, ex qua oriri mors posset; id probat præcipue apoplexias hujusmodi nerveas fuisse (n. 75.).

104. Ast aliud adest venenorum genus, quod aut veram infert repentinam mortem, aut mortis speciem, quam tamen verus consequitur interitus, nisi illi apta objiciantur remedia. Hæc vero terribilia efficit aer, qui tumulos mortuorum, puteos profundos, & antra quædam dominatur. Vis eadem mortifera inest quoque vaporibus, quos quidem liquores fermentescentes, ignitique exhalant carbones. Quot autem homines interiere, qui venenatis hujusmodi se obtulerunt vaporibus? Historia unicuique memorat JOVIANUM (q) Imperatorem, quem quidem cubantem invenerunt orbatum vita ab accensis carbonibus, qui ad humiditatem repellendam suo servabantur cubiculo. Sic regno eripiebatur anno ætatis suæ trigesimo tertio sapiens ille Cæsar, qui a septem tantum mensibus regnabat. Celebris est quoque historia Studiosorum Jenensium, qui, quum thesauros venarentur, a fumo accensarum prunarum interierunt (r). Ex me-

(q) EUTROPIUS Lib. X. pag. 274.

(r) HALLER Elem. Physiol. Lib. VIII. pag. 140. in Adnotat.

phitico autem aere tumulis coacervato mōrem sāpe subeunt repentinam , qui sive piētatis , sive sui muneric causa sepulchra ingrediuntur . Postremis hisce temporibus Cremonæ duo Vespillones sepulchrum quoddam publicum adeuntes repente obiere , ut refert (s) de hoc argumento optime meritus Ab. ISIDORUS BIANCHI .

105. Præstat animadvertere præter carbones , & fermentescentes liquores , alias quoque substantias *gaz* hujusmodi mephiticum , mortiferumque diffundere . Quodlibet corpus , dum comburitur , eundem præstare potest effectum ; & quilibet aer nisi renovetur , virulentus evadit , si in illo ad quoddam tempus quædam determinata combustibilis substantiæ quantitas adatur . Corporis , quod comburitur , status metitur , ut ita dicam , aeris venenum : nam quanto magis vitiatur aer , tanto magis ignis comburens tenuatur , qui quidem deficit omnino , quum aeris vitium ad summum pervenerit gradum .

(s) Lettera sulla morte apparente de' Soffocati , e de' Sommersi . Milano 1783.

106. Tristis experientia docet aerem quoque, quem expiramus, vitam aliquando adimere posse; non secus atque aer, quem liquor fermento actus, aut carbo ignitus exhalat. Sensibilitas, atque irritabilitas læditur valde, destruiturque aliquando hominibus iis, qui coacti sunt aerem inspirare diu eundem, quin renovetur. Horribilis penitus, si legeres exactam malorum descriptionem, quæ in carcere quodam Regni Bengalensis mense junio an. 1756. gignebat aer non renovatus, vitiatusque plurimorum hominum exhalationibus: eorumdem malorum existum unice attingam. Pro-regis jussu sub vesperas centum quadraginta quinque viri cum una muliere in eum carcerem una conjiciebantur, quem Angli dicunt *nigrum foramen*: ejus area pedibus quadratis constabat decem & octo: cuilibet hinc detento spatium erat pollicum quadratorum decem & octo. Carcer ampio in muro circumscriptus duabus tantum modicis finidebatur fenestellis, quæ ferreis muniebantur cancellis. Reclusis mane sequenti januis vix tres supra viginti ex centum quadraginta sex prodiere semivivi. Funestum quoque hujusmodi phænomenon observabatur in Ur-

be Oxonii ann. 1559. In ejus enim Aula publica Judices, postquam in reos quosdam sententiam dixerant, Assessoresque pene omnes de repente obiere: hinc Cives eum vocarunt *atri judicij diem*.

107. Et sane miserandum videtur, hacce cognita aeris aut nihil, aut parum renovati vi deleteria, homines nihil animum advertere ad qualitates aeris, ex quo pluribus diei, noctisque horis spiritum ducunt. Medici tristes quidem observant quotidie morbos, quibus obnoxii sunt illi, qui aeris qualitates despiciunt. Id autem mihi dolendum summopere, quod despiciant utique, qui inter viros sunt sensibiores. Spiritum enim iis in locis pervicaciter ducere volunt, in quibus aer pene mephiticus dominatur. Neque eos terrent acutissimi capitales dolores, terribiles asthmatis aggressiones, rheumata periculo plena: adeo mortales refugiunt animo ab ea vitae ratione, quae minus mentem, sensusque suaviter percellat. Sed finis fiat episodio; quod tamen non valde est abs re nostra.

108. Itaque tum aer pulmonum exhalationibus nimis refertus, tum vapores fermentantium liquorum, ignitorumque carbonum, non

secus atque venēnum quodlibet apoplexiā potest efficere, quæ quidem dicenda erit nervosa: sensibilitas enim hominum, atque irritabilitas ita lāduntur, ut & deficiant omnino. Mirabilius tamen phænomena, quod ex mephiticis vaporibus extinti proferunt, est auctum sanguinis volumen, ejusque fluiditas. At quæ horum causa? Id ne præstat vapor idem mephiticus, vel aer externus sanguinem penetrans? an forte *fluidum elasticum* ejusdem sanguinis, quod explicetur, ac turget? Recentiores aliqui vaporem causantur mephiticum; plerisque vero videtur difficultimum statuere, quænam ex recensitis vera sit phænomeni causa. Ast observatione sæpius repetita compertum est, infelices hujusmodi, qui vita functi videntur, & per diem integrum, ad vitam tamen redire. Hinc hominem decet auxilia illis suppeditare, quæ dicemus Cap. XXII.

109. Me quidem haud latet, aliquid dubium oriri posse, utrum vaporibus affecti mephiticis emoriantur ex syncope, an ex apoplexia. Apoplecticam mortem vocabunt, opinor, ii, qui ex vaporibus mephiticis putant respirationem primario impediri, sanguinisque redditum

a cerebro; cuius hinc vasa, ventriculosque turgentes sanguine aliquando observantur (t). Neque id illi negabunt, quibus persuasum est vapores mephiticos in cerebrum primario vim suam deleteriam exerere. Hi tamen facilius nervosam, illi vero sanguineam forte affirmabunt apoplexiā.

110. At contra morbum, sive mortem conjectabunt ex syncope potius cardiaca, qui eos vapores agere affirmant immediate in cor, aliosque musculos, quin cerebrum urgeant. Hoc autem sibi suasere forte Physici quidam celebres, postquam phænomenon inspexissent in corde ranarum. Corda enim ranarum suo se-jungebant corpore, earumque unum aeri mephitico, alterum naturali exponebant aeri; hoc serius, illud quamcito suam amississe irritabilitatem comperiebant.

111. Sed horum Physicorum observationibus plura opponi possunt. Et primo quidem saltem analogia probatur, vapores mephiticos vim suam exerere in cerebrum; ex eo vero in corpus reliquum. Opium enim agit

(t) PORTAL. Histoir. de L' Acad. des Sc. an. 1775.

non fecus atque vapores mephitici , uti Clariss. obseruavit PORTALIUS (u) . Sed opium , ut constat obseruationibus , quas primum instituit WYTHIUS , subinde iteravit PORTALIUS , opprimit primo cerebrum , ex eoque corpus reliquum . WYTHIUS enim binas ranas sumebat , quarum uni obtruncabat caput : utrique vero pellem detrahebat , qua Venter obtegitur : in ventrem inde utriusque quandam tinteturæ Opii quantitatem fundebat . Observabat autem cor ranæ sine capite diu servasse , alterius vero cor amississe suam quamcito irritabilitatem . Videatur ergo dicendum , quod & vapores mephitici , mediante cerebro , corpus reliquum afficiant . Hinc patet quanam ratione nervi sive compressi in sui origine , sive quomodocumque inertes effecti , neque in alias corporis partes agere queant , neque in cor ipsum .

Secundo videtur sane majorem saltem phænomenorum partem , quæ in homine efficiunt vapores mephitici , potius ad caput immediate spectare , quam ad cor , & forte etiam ad re-

(u) Observations sur les Effets de Plusieurs Poisons Dans le Corps de l'Homme Chapitr. V. pag. 352.

spirationem. Id autem propriis experti obser-
vationibus affirmant plures, celebresque Medi-
ci; quos inter enumerandus venit BOERRHA-
VIUS, qui (x) inclinationem in somnum me-
morat, dolorem capitis, ejusque tensionem ad
dies aliquot perdurantem; sed ne verbum qui-
dem facit de læsa respiratione. HOFFMANNUS
quoque nullam respirationis difficultatem, sed
innuit tantum ex hisce vaporibus stuporem in-
vectum, soporemque. Illustr. SWIETENIUS af-
ferit homines a vaporibus carbonum læsos nun-
quam de anxietate conquestos fuisse; semper ve-
ro de acutissimo capitis dolore, & de quadam
eius, ut ajunt, plenitudine (y). Id probat ob-
servatione WEPFERI, ex qua colligitur homi-
nem quemdam ab alto sopore ex hisce vaporis-
bus orto revocatum afferuisse, se haud anxi-
spiritu, sed somno suavi occupatum fuisse.
Revera neque HELMONTIUS anxietatis meminit
dum proprium a vaporibus carbonum apoplexiæ
periculum describit, incipientemque hemiple-
giam. Clarissimus BANAU (z) ad vitam revo-

(x) Loc. cit. pag. 104.

(y) Comment. §. 1010.

(z) Apud PORTALIUM Loc. cit. pag. 57.

cavit Presbyterum quemdam vaporibus mephiticis oppressum ; idque methodo refrigerante PORTALII. Redivivus Sacerdos adstantibus affirmabat ; se ignorare utrum nec ne mente quidem excogitasset auxilium petere ; nullum enim ajebat effectum pensensisse ejus vaporis metuendi , quum ab ipso afficiebatur . Fatebatur autem odorem aceti , quo sibi provisum fuit , sibi visum suisse *quid divinum* : tunc vero , nisi a quadam mentis confusione non angi . Marchio autem de TURGOT (a) Academiæ Parisiensis historiam retulit Virginis cuiusdam Normannæ , quam cum oppressisset vapor carbonum , methodo PORTALII sanaverunt . Ad vitam rursus excitata afferebat , hoc unum memoria retinere , quod ante asphyxiam parte capitis anteriore angebatur quam maxime : subinde vero per biduum dolore totius capitis torquebatur . Quid plura ? PORTALIUS meritissimus (b) afferit pluries audivisse paullo ante mortem canentes eas aves , quas Ille vaporibus mephiticis exponebat : ex vero nutantes conspicie-

(a) Apud PORTAL. loc. cit. pag. 60.

(b) Loc. cit. pag. 26.

bantur, ac velut ebriæ vacillantes; adeo verum est a vaporibus hisce potius caput, quam pulmones lædi, saltem sëpe. Hic addi quoque potest PORTALIUM (c) observasse vesicam eorum, qui ex mephiticis vaporibus defecere, urina plenam, atque distentam, uti non raro in apoplecticis conspicitur.

112. Celebres hinc plures Medici jure ergo, ac merito affirmant ex apoplexia potius, quam ex syncope perire vaporibus mephiticis affectos. Celeberrimus CULLENIUS (d) opinatur mobilitatem extingui humoris nervi, afferitque sibi videri hasce substantias neque in organa respirationis agere, neque in sanguinem; alibi vero (e) sibi persuasum ait esse, quod hujus speciei asphyxiæ ad genus spectent apoplexiæ. Postremis hisce temporibus Celeb. WALTHERUS (f) contendit mephiticis vaporibus læsos mori apoplecticos. Hisce autem plerique alii addi possent.

113. Ex hoc usque expositis satis constat,

(c) Loc. cit. pag. 67.

(d) Loc. cit. Tom. III. Cap. I.

(e) Synopsis Nosolog. Methodic. pag. 135. Edit. Ticin. 1787.

(f) Nouveaux Momoires de l'Acad. des Scienc. Berlin an. 1784.

ut spero, has asphyxias, sive mortes ad genus apoplexiæ pertinere, aut saltem eo nomine vocari posse. Si vero cadaveribus eorum observatis, qui ex hac causa periere, suspicio syncopeis suboriretur, hic ea quoque adderem, quæ (n. 19. 20. 95.) adferebam.

CAP. IX.

*De ea Apoplexia, quæ ex acrimonia
oritur aliquando.*

114. **S**i causæ nervorum principium occupent, irritent, vel alio quocumque modo ejus structuram lædant, exoriri potest apoplexia, quam (n. 78.) diximus *idiopathicam*. Hanc propterea gignere potest acrimonia, quam faciunt præcipue curæ tristes diutinæ, aut quædam sanguinis vitia. Curæ enim tristes nervos generatim lædunt, ac lente debilitant, appetitum, somnumque subripiunt, vires adimunt stomacho, vitiantque digestiones: densatur bilis, cogiturque hepate; hinc omnes deordinantur humores, atque vitiantur. LANCISIUS (g) obser-

(g) *De Subit. Mort. Lib. I. Cap. VIII. art. 14.*

vavit Cardinalem quemdam ex hac causa apoplecticum evasisse lethaliter. De hac apoplexia loqui videtur HIPPOCRATES (h), quum dicit: *cerebrum autem cladem perfert, ipsum etiam sanum non existens; sed siquidem erodatur, turbationem multam sustinet, & mens decipit, & cerebrum convellit, ac distrabit totum hominem, qui in se ipso vocem non edit, ac suffocatur; & haec affectio syderatio, ac græcae apoplexia vocatur.*

115. MORGAGNIUS (i) plures profert apoplecticos, quorum morbum non ex compressione conjicit fuisse, sed ex convulsione, & ex quadam coarctatione meatuum cerebri ab acri inducta materie. SCARDONA (k) vero contendit hanc esse apoplexiā, quam Veteres *calidam* vocarunt. *Quam calidam*, ait, *Veteres appellantur, Moderni ab acri irritante materia nerveas cerebri, ac Meningum fibrillas pungente, vellicante, convellente repetunt.* *Hæc porro eos adoritur, quorum fluida sulphureis, subtilioribus que particulis onusta sunt, solida vero nimium*

H

(h) Lib. De glandulis n. 9.

(i) Epist. Anat. Med. IV.

(k) Loc. cit. Lib. I. Cap. I. Aphor. 24.

tensa, atque ad oscillandum parata. Quæ quum ita sint, spiritus volatiles, oleosos, salia volatilia, elixiria, frictiones dolorificas, sternutatoria, purgantia, emetica, atque alia hujusmodi.... infensissima esse nemo est, qui non videat. Ad hanc propterea apoplexiæ speciem compescendam citatus Auctor remedia tantum laudat, quibus corpus refrigeretur, humectetur, atque mitescat.

116. Huc quoque revocari debent apoplexia, hemiplegia, & dolorificæ convulsiones, ac rigiditates, quas ex scorbuto observavit inter cæteros SENNERTUS (l), quasque ipse credit exoriri ab acri, calidoque vapore nervos occupante. Idem fuerunt apoplectici a Clariss. SAUVAGESIO (m) observati, quorum calida, & sicca erat temperies, alvusque constipata, dum fani erant.

Novi, & ut Medicus adivi Virum quemdam stirpe, ingenio, virtute nobilissimum, ex cuius facie certis anni temporibus erumpit admodum mediocris herpeticæ materiei quanti-

(l) Lib. III. Part. V. Sect. II. Cap. IV. De Scorbuto.

(m) Nosolog. Method. Clas. VI. Ord. V.

tas. Accidit aliquando, ut Ipse sese expone-
ret aeri, qui de improviso rigescet: ex ejus
actione materies herpetica extemplo retrocede-
bat aliquantulum: tunc & admirans, & dolens
Virum egregium subito aspiciebam velut animo
multa volitantem, inter agendum ancipitem,
dubiumque, ac summa melanicholia deordina-
tum, oppressumque. Qui vero animadvertisat
quam subito Ille laedatur, haud quidem dubi-
tare poterit, quin nervi id agant, quum a vix
retrocessa, licet pauca irritentur materie. En-
qua fieri ratione possit, ut acris quædam ma-
teries nervos magis percellens prorsus gignat
apoplexiā.

117. Hæc est quoque apoplexia, quam
gignit materies rheumatica, & morbillosa, sive
scabies retropulsa, sive, ut quidam asseruere,
perspiratio, quæ retrocesserit. Hæc quidem
apoplexiæ species dici potest *metastatica*: hu-
jusmodi tamen metastases, utpote minimæ, ut
plurimum, ac nimis subtile, potius irritando
sæviunt, quam comprimendo.

CAP. X.

De Apoplexia, quæ oritur ex dolore quascunque corporis partes occupante.

118. **D**olor, præcipue si immanis, quacumque corporis parte excitatus apoplexiæ speciem gignit aliquando, quæ nervorum læsæ actioni, præcipue vero communi sensorio vi doloris deordinato, quomodo cunque id fiat, haud dubie est attribuenda. Sive enim MORGAGNO (n), atque BURSERIO (o) adhærens putet, contracta spastice, quam occupat, parte, nimium sanguinis ad cerebrum cogere; sive aliorum probans opinionem dicas dolorem propagare spasmodum ad cerebrum usque, aut a doloris vi nervorum destrui energiam, quod probabilius videtur; hoc unum asseris, quod ex dolore exurgere possit apoplexia. Hanc vero vel sympatheticam, vel idiopathicam dicunt prout sunt partes a dolore laceritæ.

(n) Epist. An. Med. III. n. 5.

(o) Loc. cit. Tom. III. Cap. IV. §. 82.

119. Revera quantum valeat dolor & ad frangendam, & ad delendam nervorum actionem satis probatur exemplo tauri furentis, qui fractis omnino viribus procumbit statim, ac canes ei testes convellant. Hoc quoque adnotavit celeber. CALDANIUS (p) scribens neminem fugere doloribus vel ingruentibus, vel saevientibus robur plus minus infirmari, ac pene destruunt tantam vero doloris aliquando esse potentiam corporis nostri vires, motusque destruendi factetur HOFFMANNUS (q), ut effectus doloris venenorum assimilet effectibus. Animadvertisit quoque HALLERUS (r) ex dorsi dolore in caput saliente hominem ad instar mortui solo prosterni: ex multis autem observationibus, quas Ipse collegit, evincitur satis, graviorem in nervis irritationem *cerebrum primum in consensum ciere* (s). En itaque qua ratione hinc nervea exoriri possit apoplexia.

120. Hujusmodi morbum adnotavit quidem & LANCISIUS (t), asseruitque eundem a

(p) Institut. Physiol. n. 218.

(q) Tom. II. Cap. XI.

(r) Element. Physiol. Tom. IV. Lib. X. Sect. VII. pag. 225.

(s) Loc. cit.

(t) De Morb. Subit. Lib. I. Cap. IX. art. 19.

spasmo produci. Hujus est speciei apoplexia ex summo dolore exorta, qui in membrorum amputatione torquet ægrum, præsertim si debilis sit, ac summopere sentiens. Non ita pridem vidi ego ipse maxime dolens mortem repentinam amici mei, licet sanissimi, atque fortissimi, quum in eo immanis dolor ex fratre crure atrociter sœviret. Legitur in SEPULCHRETO (u) nihil morbosum inventum fuisse, nisi uterum convolutum, & in vesica fellea calculum formæ ovalis, *dactylum* integrum referentem, in cadavere mulieris cuiusdam, quæ summis doloribus lacerata obiit repente.

Prudentissimus idem MORGAGNUS non auras afferere biliares calculos, quos non comitetur dolor, efficere posse apoplexiā; hujus morbi causam esse posse pro certo habet calculos eosdem, si modo doloriferi sint (x) & nuper Clariss. BURSERIUS putat dolorem acutissimum ubicunque excitatum gignere posse apoplexiā (y). Afferit MOLLIUS *Passionem iliacam*, quæ vel maxime sœviat, spasticam apo-

(u) Tom. I. Lib. II. Sect. XI. Obs. L.

(x) Loc. cit.

(y) Loc. cit.

plexiam afferre aliquando. Et revera nuperissime affirmari video, nihil, quod sub sensus cadat, observari posse in sectis eorum cadaveribus, qui a vi dolorum, ad torturam positi, subito extinguntur (z).

CAP. XI.

De Apoplexia, quæ oritur ex inanitione.

121. **E**xhaustis e corpore humoribus ita, ut qui reliqui sunt a corde acti nequeant cerebri arterias necessaria æquabilitate adimplere, oritur illa, de qua hic agitur, apoplexia: collabuntur enim organa sensus, motusque. Sive spiritus animales, scripsit celeber. TISSOTIUS (a) secerni impedianter, & distribui, sive exhaustis viribus deficiant, oritur apoplexia, qui morbus est ille, in quo nervorum cessat sensus, & ex sensus defectu, voluntaria actio. Hujusmodi vero apoplexia fieri non videtur quidem a cerebri, ut ajunt, compressione.

(z) FRANK Loc. cit. Vol. V. pag. 57. in Adnot.

(a) Epist. var. argum. pag. 87.

122. Morbi invasionem præcedunt anxietas quædam præcordialis, difficultas ad motum, pallor faciei, oculorum languor, visus obumbratio, leves vertigines, aurium tinnitus, debilitas magna, membrorum tremor, ac sensuum internorum imminutio.

123. Huic apoplexiæ obnoxii sunt illi, qui sanguinis immodicam quantitatem amittunt, præcipue si id fiat repente: dixit ideo HIPPOCRATES hanc vulneratis accidere. Neque alia præsumenda est causa mortis repentinæ mulierum, quæ aut ex abortu, aut ex partu magnam sanguinis copiam deperdunt. Sæpe enim tanta fit hæmorrhagia, ut ægræ incipient deficere, in somnum, & stertorem delabantur, omnes sensus perdant, & brevissime moriantur. Hanc lethalem apoplexiæ observavit Clariss. STORCHIUS (b) cum paralysi lateris dextri in muliere, quæ ex nimia quidem uteri hæmorrhagia post horas tres periit convulsa.

SAXTORPHIUS (c) describit mulierem quamdam ab octo mensibus prægnantem, quæ tunc temporis haud raro uteri hæmorrhagiæ obnoxia

(b) Ann. Med. I. Tom. I. pag. 129.

(c) Act. Societ. Medic. Hauniens. Vol. I. Edit. 1777.

erat notabili. Hoc quum incommodum conjectaret Medicus exoriri, ex quo placenta jam sejungeretur ab utero, ipsum fœtum pronunciavit extrahendum. Hisce peractis mulieri quidem sedabatur hæmorrhagia; sed ipsa convulsa periit repente. Hujus subitæ mortis causam repetit SAXTORPHIUS, ex quo utero citius evacuato, vasa cerebri, cordisque de improviso deonerasabantur in vasa abdominis: hinc partes corporis mobiliores, cerebrum præcipue, stimulo naturali destituebantur, ac naturali distensione.

124. Consideranda utique est in puerperis hæc humorum copia, quæ quin exeat de corpore, irruit in viscera imi ventris, quæ a fœtu comprimebantur: hujusmodi compressione sublata, irruentibusque illuc humoribus cerebrum iisdem destituatur oportet. Eadem causa videtur mortis repentinæ quæ Paracentesim consequitur in Asciticis; præcipue si magna aquarum quantitas simul, & semel extrahatur.

125. Hinc mihi delitescit ratio, qua SYDENHAMIUS hysteriam vocat puerarum apoplexiam, quæ *easdēm* *haud infrequens* adoritur *confestim a partu, magna sanguinis vi simul eje-*

etia (d). Hæc enim apoplexia nequaquam ab hysteria, sed a tanta sanguinis jactura exoritur, ut non satis possit cortex cerebri impleri. Hanc ipsam observavit BOERRHAVIUS (e) post narium hæmorrhagiam: dum enim parabantur illa, quæ sanguinem sisterent, & corpus replerent, æger in talem incidit apoplexiā.

126. Insuper ad hujus speciei apoplexias ea quoque pertinet, quæ nimias alvi consequitur evacuationes; si præsertim hæc a causa irritante promoteantur. Ex violenta purgantium remediorum actione, signanter hellebori, observarunt sæpe Medici subsequitos spasmos, mortemque festinam: idem observarunt in cholerae morbo. Ex hacce causa lethalem vidit apoplexiā STORCHIUS (f) in viro, postquam diarrhæa adeo violenta laboraverat, ut *spatio quinque horarum viginti quatuor pintæ seri biliosi absque ullo dolore ano effluxerint*.

127.. Præterea certum est, inediā quoque apoplexiā sæpe facere, senioribus præcipue. Siquis conatur aliquid agere, conatibus-

(d) *Dissert. Epist. pag. 89.*

(e) *De Morb. Nerv. Tom. II. pag. 261.*

(f) *Loc. cit.*

que vires corporis nimio jejuno attritæ ne-
queant obsistere; miserum adoriuntur vertigi-
nes, oculorum obnubilationes, mentisque per-
turbationes, qui quidem tristissimi effectus in
veram desinerent apoplexiam, nisi conatus illi
intermitterentur. Observatum est etiam (g) ca-
nes magna fame extenuatos apoplexia sæpe ob-
iisse.

128. LANCISIUS (h) autem cūm aliis &
ex nimia venere autumat apoplexiam haud ra-
ro, maxime in senes, invectam fuisse. Hisce
inanitionis, languorisque causis libenter addo
cum Clariss. VOGELIO (i) immoderata quidem
studia, vigilias nimis productas, meditationes
intensas, ac demum diutinam tristitiam. Ab
his enim causis nervorum vel maxime delassan-
tur vires.

129. Hæc, de qua hic loquimur, apople-
xia marasmo senili finem tandem imponit.
Est apoplexiæ species ait Illustr. HAENIUS (k)
solo spirituum defectu oriunda, quæ jam pluries

(g) SCARDONA loc. cit. Lib. I. Cap. I. aphor. 7.

(h) De Subit. Mort. Lib. I. Cap. VIII. art. 14.

(i) Loc. cit. Part. II. §. 559.

(k) Rat. Med. Part. IV. Cap. V.

intenta verat mortis minas vetulæ cuidam annum ætatis centesimum alterum agenti, quæ tandem apoplectica decessit. Ab hac repente corripiuntur quoque, affirmante TISSOTIO (l), qui diutinis morbis, præsertim sanguinem dissolventibus conflictati fuere; quique tandem nimis diligunt remedia, quorum nimia assiduitate vires dejiciuntur omnino.

130. Hanc apoplexiā a solo defectu spirituum probat summus BOERRHAVIUS (m) exemplum proferens militum, qui viribus exhausti, & labore fracti dormiunt juxta ipsa bellica tormenta, unde bombardæ ejiciuntur, ad quarum sonitum vix possunt excitari. Imo & ita dormientes saepe expoliantur, moventur, deferunturque de loco in locum, quin evigilent. Vocat hunc statum *apoplexiā naturalem*, quæ sanatur dum per somnum regenerantur amissa.

(l) Loc. cit.

(m) Loc. cit. Tom. II. pag. 258.

CAP. XII.

*De Apoplexia Nervea Sympathica,
sive Consensuali.*

131. **S**icuti immodica nervorum sentienti vis, atque mobilitas facile efficiunt apoplexiā nerveam *idiopathicā*, sic faciliorem quoque reddunt *sympathicā*, sive *consensualē*. Hinc hujusmodi apoplexiæ, ut vidimus (n. 53.), hypochondriaci, fœminæque hystericæ præ aliis obnoxii sunt. Iſti enim sæpe numero solent viscerum abdominalium, artuumque inferiorum spasmis torqueri; quapropter HOFFMANNUS, aliique opinantur earum partium vasa spastro constringi, sicque sanguinis motum in iis partibus præpediri, aliorum averti, cerebrumque versus majori impetu determinari: hinc fit aliquando, ut vasa cerebri oppleantur, distrahantur, imo quandoque disrumpantur.

132. Et revera non ne sæpe observamus inter spasmos hypochondriacos, atque hystericos, carotides validius solito pulsare, dum pulsat de more ad carpum arteria? Non ne cerebro persentitur quoque enormis illa pulsatio,

qua hypochondriacorum , atque hysteriarum abdomen immaniter exagitatur , quaque tangentis manus mirum in modum percellitur ? Ex quo autem totus succutiatur abdomen , atque ex variis , profundisque punctis exoriatur pulsatio ; arguimus haud semper Cæliacæ ramum pulsare , sed Aortam ipsam . Rami , in quos ista dividitur , spasmo coarctantur : hinc in truncos quasi refluit sanguis ; sicque per carotides cor majorem illius quantitatem ad cerebrum propellit . Hac ideo ratione ex spasmis abdominalibus gigni potest apoplexia ; quæ & facilius enascitur , si nervi etiam pectoris spasmo afficiantur .

133. Hæc porro apoplexia frequentius , quam ferat communis opinio , adoritur illos præcipue , qui sive magnis negotiis , sive severioribus studiis incumbunt . Hujus enim classis viri vix , aut ne vix quidem corpus exercent , dum intercalaribus horis inordinatam non raro agunt vitam . Hinc sæpe nervea corripiuntur melancholia , obnoxiique , ut plurimum , sunt spasmodicis abdominis affectionibus .

134. Ast ex harum affectionum continua-
tione enascitur haud raro eadem atra bilis :

imminuitur enim s^epe diameter tum vasorum hepatis, quæ bilem secernunt, tum aliorum viscerum in abdome; imo vasa eadem satis arefcunt, obstruunturque. Hinc motus bilis lenteſcit nimis; quæ propterea aliunde nimis denfa cunctatur in iis visceribus, eoque inficitur colore, & acrimonia, quæ bilem *atram* conſtituunt. *Atram* hic loci vo^co eam degenerem bilem, quæ quum colorem ſumpferit nigricantem, aqua diluta virescit; nigra rursus evadens, ſi aqua evanescat. Hæc autem Priscis forte nimis horrenda, & forte a Recentioribus non ſatis æſtimata ſuas aliquando metuendas vires exerit in præcordia, quin ventrem infimum linquat: ſicque aliquando apoplexiam facit *consensualē*.

135. Quoniam autem de ſpasmis abdominalibus hypochondriacorum hic ſermo habetur, notandum credo, nerveam quoque melanochliam poſſe in cerebrum inducere metaſtaſim, ut ajuat, nervosam; quin ullum post mortem læſionis veſtigium queat obſervari. Enim vero quanam ratione negari queunt metaſtaſes illæ nervosæ, quæ ab actione potius, quam a materie alio translata ſæpenumero pendent?

Præterquamquod extiterunt, & extant adhuc doctissimi Viri, qui quidem affectiones nervorum opinantur ortas, atque ad tempus vigentes ex quadam versatili, subtilissimaque materie, a tenuissimo quodam *gaz*, cuius magna quantitas principio nervorum coacervata, licet mortem inducat, adhuc tamen observatori & diligentissimo nullum sui post mortem indicium præberet (10).

136. Hac de causa ortam putavit LANCI-
SIUS (n) apoplexiam, qua obiit Rever. SPADA.
Erat hic staturæ proceræ, habitus ad graci-

(10) BURSERIUS Clariss. loc. cit. §. 108. innuit apoplexiam hujusmodi vocandam esse metastaticam, hujusque metastasis in cerebro indicia porro non deficere debere. Ait Ille dat materiem illam, quæ ab imis ventris latibulis, aut ab utero exoritur, sanguinem densare, ut in cerebri vasis confistere, atque hæc debeat: haud omnes tamen hoc concederent. Magnus quidem BOERRHAVIUS de hypo-
chondriacis scribens cum materie sic loquitur. „ Raro in-
„ veniuntur hypochondriaci cum materia, in quibus non si-
„ mul lædantur functiones cærebri, & nervorum; hinc illi
„ plerumque patiuntur vertigines, cephalæas, donec tandem
„ moriantur apoplectici illæso tamen cerebro “. De Morb.
Nerv. Tom. I. pag. 59.

(n) Repent. Mor. Obs. IV.

lem tendentis, convulsivo asthmati obnoxius, & tensionibus etiam circa hypochondria. Post frigus, inediam, deliquium, immanesque dolores circa dextræ mandibulæ articulationem, proxime tandem post irregularem totius corporis motum apoplexia corripitur, cui dextri brachii fideratio, oris tortura, aucta que linguae naturalis hæsitatio illico successerunt: subrubra erat facies, & tensa hypochondria.

Misso sanguine ex pede, & oleo amygdalino exhibito omnia feliciter progredi videbantur. At postridie tumida, ac subrubra recurrit facies, turbatur mens, convelluntur artus: utebantur Medici anti-epilepticis, vesicatoriis, pediluviis, ac diluentibus, laxantibusque remediis. Utilitate tamen parva nimis. Tandem in femore, & crure dextri lateris efficiebatur, tanquam opportunus decubitus, paralysis. Tunc omnia satis quieta: suppeditabant ægro aquam Nucerianam; emulsiones; neque omissa fuere balnea aquæ dulcis. Moriebatur autem post aliquot hebdomadas præcedente præcordiorum, atque laryngis sensibili strangulatione. Credidit LANCISIUS materiem subtilissimam, & acrem in hoc ægro ex hypochondriis ad cerebrum,

& ex hoc per nervos ad universum corpus erroneo motu fuisse transductam.

Plura profecto nervos hujus Prælati ostendebant male affectos fuisse; uti habitus gracilis, asthma convulsivum, tensiones circa hypochondria, aggressio apoplexiæ post frigus, inediam, immanesque dolores; facies subruba; dextri brachii addatur, si placet, sideratio; præcordiorum tandem, atque laryngis constrictio.

137. Ast aliquando materies illa, quæ morbos nervorum generat, alitque, haud ita tenuis observatur: id patet præcipue, quum ex morbo nervoso tumefiunt artus. In his enim spasmum pertinaciorem deprehendimus, quia ejus causa & minus versatilis, & minus tenuis est. Id etiam patet, quum affectiones nerveæ in quosdam alios desinunt morbos. Aliquando enim observamus hypochondriacam passionem defecisse omnino, Phthysι superveniente (o). Ego quoque paucis abhinc mensibus affectionem nerveam contumaciorem observavi penitus evanuisse, suborta tussi, quam consequbantur dolor

(o) LORRYUS loc. cit. Tom. I. pag. 63.: MORTONUS Phthysiol. pag. 92.

oppressivus pectoris, sputumque puriforme; hæc autem observabam in Equite ornatissimo, cui optimus erat corporis habitus. Hypochondriasm quoque retundi vidi Clariss. FRANKIUS (p) erumpentibus lividis, latis, copiosissimis maculis. Itaque si in cerebro istæ metastases factæ fuissent, quæ forte apoplexiā induxisserent; & in cerebro procul dubio signa reliquissent morbi conspicua.

138. Cæterum non sola hypochondriasis, sed plures aliæ nervorum infirmitates desinunt in apoplexiā, aliosve morbos ob mutationem situs materiei nervos jam prius occupantis. Video, dum hæc scribo, omnium artuum tremorem, quo jam usque ab adolescentia Nobilissimus quidam Vir vexabatur, evanescere omnino suborta protinus amaurosi, atque dementia. At magis ad rem opinor levis apoplexiæ exemplum describere ab hac ipsa causa exortæ.

Auriga quidam ætatis annorum triginta septem mense Septembris 1787. hemicrania periodica sinistrorum laborabat: alvo purgata, ac sanguine emisso facile convaluit. Post men-

(p) Delect. Opusc. Vol. I. pag. 10. in Adnotar.

fes aliquot eum rursus adoritur, sed dextrorum hemicrania, vi tamen mitior, ac duratio ne. Expergefactus mane dolore vexabatur leviter usque ad meridum; subinde dolor evanescebat omnino. Post duas, tresve hebdomadas sine remediis optime convaluit: sic mihi retulit ipse.

Per dies circiter quindecim optime se habebat; quum mane repente expergefactum non dolor, sed læsit imperfecta dextri lateris paralysis cum aliqua mentis confusione. A capite aberat omnis dolor: videbantur illi aquæ guttæ permeare latus totum paralyticum: putabat faciem madere lacrymis, quas manu sana nitens abstergere, nullas esse deprehendebat: brachium dextrum videbatur illi rigere gelu, crus contra ardere. Venæ sectione, tepidisque aquæ dulcis balneis convaluit. Nonne verisimile est eandem materiam, quæ nervis infixam prius hemicraniam, effecisse postea hemiplegiam de prima sede demigrando?

139. At plures extant observationes, ex quibus colligitur unam situs mutationem ejus materiei, quæ nervos occupabat, apoplexiā invexisse. Sexagenaria quædam mulier veteri

furditate laborabat : audiebat autem quum ab apoplexia correpta fuisset, dextroque latere paralytica, ac muta evasisset. Imposterum contra, quum & paralysis deficeret, & lingua expediretur, illi rursus impediebatur auditus. Triennio post apoplectica denuo eadem prodebat phænomena (q).

140. Præterea morbos inter, quos menstruatio parit, si difficilis, ac dolorifera, enumerari potest hæc, de qua agimus, apoplexia. Hac de causa apoplecticam quamdam refert LORRYUS (r) : „ Mulier, inquit, viginti circiter & quinque annos nata, jamdudum summa mobilitate prædicta, menstruis instantibus, aliqua perturbata mœstitia, loco solitæ evacuationis, oris distortione, somnolentia alta, lateris unius paralysi corripitur. Utens & tensus erat, & dolore manifesto ad tangentis manum afficiebatur. Subsultus aderant in tendinibus etiam partis paralyticæ, & vultus præter modum, atque rationem lividus sanguinis impeditum per venas jugu-

(q) Apud TISSOTUM Tratt. De' Nerv. Tom. II. Part. II.
Cap. XI. §. 68.

(r) Loc. cit. Tom. I. Part. I. Cap. V. pag. 115.

„ latres arguebat regressum. Ipsa si e sopore
 „ excuteretur mœsta , & anxia. Plures per
 „ dies status iste perduravit; sed eam solvit
 „ insperatus successus. Etenim cum aliqua par-
 „ tium omnium convulsione illico & sui com-
 „ potem , & artubus omnibus exercendis patem
 „ fecere menstrua, quæ copiosius fluxerunt “.
Qui quidem **Auctor** haud ratam existimat hu-
 jusmodi apoplexiam , eamque vocat *spasmodi-
 cam* .

141. Quod de fœminis autem dictum est ,
 quibus menstrua difficile , ac cum dolore fluant ;
 id quoque repetendum de iis , quibus solitus
 hæmorrhoidum fluxus , aut retardetur , aut de-
 ficiat omnino . Nonne enim illarum fluxum
 antecedunt frequenter tum intestinorum flatus ,
 tum maximæ universi abdominis spasticæ per-
 turbationes ? Facile autem intelligitur , quo-
 modo nervi irritentur in iis , quorum vasa , fo-
 lito fluxu impedito , distrahantur , ac tumefiant .
 Sed hæc irritatio non uni fere respondet vaso-
 rum pressioni : *latet etiam aliquid mysterii* , in-
 quic LORRYUS , in fluxu hæmorrhoidum ; hoc-
 que evincitur , tum ex atra sanguinis natura ,
 tum ex terribilibus morbis , qui eo impedito flu-

xu suboriuntur; inter quos enumeranda venit apoplexia.

142. Insuper spasmi, qui ab irregulari podagra, præcipue vero ab ea, quam atonicam vocant, excitantur, apoplexiā gignere possunt quum sanguinis circulum satis perturbent. *Fortassis etiam*, inquit MOLLIUS agens de apoplexia biliosa, quæ arthriticis, & podagricis familiares sunt, apoplexiæ *huc referendæ* sunt (s).

Et revera nonne podagrī monentur primo flatibus, naufeis, doloribus circa ventriculum, atque intestina? Si debiliores ergo naturæ vires non amplius valeant podagricam materiem ad articulos propellere; ideoque in præcordiis relicta ibi irritationem faciat, spasmumque, mortem apoplecticam promovere potest, sive spasmum tantummodo cerebro communicando, sive ad illud majorem sanguinis quantitatem propellendo. Idem BOERRHAVIUS de hac re agens habet sequentia: *videtur ergo, quod causa hujus morbi, id est podagræ, non manifesta saepe hæreat in succo nervoso, sed manifestans se circa nervos abdominales, & quod hinc*

(s) Loc. cit. pag. 26.

fiant vertigines, dolores colici, vel iliaci, & apoplexia (t).

143. Videtur præterea materies podagræ in cerebrum lata, acriterque stimulans invehere posse immediate in cerebrum ipsum spasmos, quibus enascatur apoplexia; quæ quidem *metastatica* dicenda esset. Et revera plerique evasere repente apoplectici vix retroacta podagra. Celeber. autem CULLENIUS (u) conjicit apoplexiæ, quæ aut præcedit, aut consequitur podagram retrocedentem, exoriri a quadam potius succi nervi inducta immobilitate, quam, ut ajunt, a compressione. Id autem sibi persuadet, quia videntur ab iis ægris omnia abesse phænomena, quæ cerebri compressionem innuant; plerique contra adesse unice nervorum, qui male afficiantur, indicia. Hæc igitur quoque apoplexia ad nervosas est revocanda.

144. Sed & sympathica enasci potest aliquando apoplexia a putrefactione, & a maligna qualitate, quam pus in abscessibus internis a capite remotis acquirit; ut inter alios adno-

(t) De Morb. Nerv. Tom. II. pag. 2555

(u) Inst. Med. Prat. Tom. III. art. 1118.

tavit QUESNÆYUS (x). Hujusmodi venenatum, ut ita dicam, pus non unice erumpendo, sed aliquando etiam abscessu occlusum, aliquando ex illo & guttatum fluens mortem attulit repentinam. Nos quidem latet qua ratione hæc terribilia fiant; sed observatione haud rara istiusmodi comperiuntur effectus. SENNERTUS quidem putabat hanc diram corruptionem, ut & venena, apoplexiā inducere posse. *Quidni*, ait (y), *ergo talis spiritus in corpore generari possit, qui, cum ante quietus latuisset, aliqua causa agitatus & motus; instar venenorū subito in actum erumpat, & spiritus animales a natura sua mutet, & quasi coagulet?*

Neque ego ardenter eos impugnarem, qui hanc mortem potius ex syncope, quam ex apoplexia inventam sustinerent: subderem tamen hasce substantias agere fere in cerebrum primario; sicque eam gignere apoplexiā, quam CULLENIUS, (z) vocat *venenatam*.

(x) Memoires de L' Acad. Roy. De Chirurg. Tom. I. Par. I.

pag. 93.

(y) Tom. I. Lib. I. Part. II. Cap. XXXIII. Quæst. III.

(z) Synops. Nosol. Meth. pag. 137.

145. Sympathicam quidem dicimus , sive consensualem illam quoque apoplexiā , quam signunt plura venena , statim ac ventriculum ingrediuntur . Plures enim videmus homines ad pristinam sanitatem redire , quum haud nimis sero totum evomuerint venenum . Adeo verum est plura venena stomachum irritantia , sive quomodolibet laedentia perturbare vel maxime cerebrum , nervosque omnes ; quin tamen pars ulla veneni aut in sanguinem influat , aut illi communicetur , aut in cerebrum ipsum quomodocunque feratur .

146. Aliquando fungi quoque hunc dirum pariunt effectum . Subitam mortem ex fungorum esu adnotavit BONETUS (a) . Clariss . LUPINUS (b) exemplum habet apoplexiæ ex esu fungorum natæ , quam vomitorio sanavit . Celeb . Eques ROSA (c) dulcem memorat amicum , qui , quum quosdam fungos comedisset , horrens , furensque credebat semetipsum gehenna sepultum . Vix fungis rejectis exhilarabatur , atque sanabatur .

(a) Sepulchr. Lib. II. Sect. XI. Obs. 39.

(b) Histor. Morb. difficil. Ratisbon. 1768.

(c) Saggio di Osservazioni pag. 186.

147. Inter cœteros idem citatus Doctissimus Auctor opinatur Opium quoque tantos præstare effectus, quorum pessimus est apoplexia, quum agat præcipue in stomachi nervos : & revera ab illo ejicitur sæpe ejusdem omnino ponderis, quo, quum deglutiretur, constabat ; licet suas in nervorum præcipue imperium jam exeruerit vires. Nihil tamen prohibet, quin pars aliqua Opii halituofissimi ab hostiis vasculorum inhalantium absorbeatur, quæ vel sanguiferorum vasorum nervos afficiens actionem, vel impressionem, primo loco factam augeat ; vel cum sanguine peragrans, ejus crasim immutet. Resolutio equidem putrida sanguinis, & alia putredinis indicia, quæ in cadaveribus ex Opio exanimatis observantur (d), probare videntur illud per os ingestum haud unice viis primis coerceri. Quidquid sit tamen, huc utique revocanda, quam memorat SENNERTUS (e), *ex narcosi apoplexiā*.

(d) PORTAL Loc. cit. Chapitr. V. pag. 352. & MURRAY Apparatus Medicaminum Vol. II. Ord. XXI. pag. 187. Edit. Ticin. 1787.

(e) Tom. I. Lib. I. Part. II. Cap. XXXIII.

148. Sed & purgantia, quæ nimis stomachum, & intestina irritent, eadem aliquando ferunt mala. Describit HOFFMANNUS (f) in fœmina dum sumebat pulverem ex resina jalappæ, & tartaro vitriolato confectum, non modo vehementissima tormina, verum etiam unius lateris paralyticum cum aphonya, brachii-que contractura molestissima: curata fuit anti-spasmodicis, nervinis, & oleosis demulcentibus.

CAP. XIII.

De Apoplexia signanter Bilioſa, quæ inter sympathicas frequentior observatur.

149. **A**poplexias inter sympathicas, si-
ve consensuales ea profecto mihi frequentior vi-
detur, quam *bilioſam* dicunt. Neque *bilioſam*
eam unice voco apoplexiā, quam una pari t
bilis stomacho, aliisve, ut ajunt, primis viis
coacervata; sed eas omnes juxta plurimorum
doctrinam, præcipue Doctissimi MOLLII (g),

(f) Adnot. ad POTERIUM Centur. I. Cap. LXXIX.

(g) Differ. De Apoplexia Bilioſa pag. 22.

bilioſas appello, quæ ex quaſiam morboſa pri-
marum viarum ſaburra efficiuntur, aut ex vi-
ſcerum vicio, quod bilis colluviem promoveat.

Adnotaverat quidem mirum hunc eſſe-
tum, quo ventriculus gravatus cerebri functio-
nes turbat, HELMONTIUS (h) dicens: *Si autem
ſuboriatur mucilago putida ad amarorem prona
vertiginem, & fortius insurgens apoplexiam ſu-
ſcitat*: quam ſane inferri minus dubitabit a
pravis ad præcordia collectis humoribus, & a
vitiata viſcerum hypochondriacorum conditio-
ne, qui mente perpendat vitia, quæ in hypochon-
driis apoplecticorum oſtendit ſæpe cadaverum
ſectio, uti præ aliis adnotavit SCHROEDERUS (i).

150. Hanc promovent apoplexiæ ſpeciem
ira, mœror, ingluvies, cibus pinguis, ac faci-
le putrefcens, labor nimius, æſtivum Cœlum,
& autumnale. Illi vero præſertim huic mor-
bo obnoxii ſunt, qui hypochondriorum vitiis,
ſtomachi indigestionibus, vomitibus ſpontaneis,
diarrhæis biliotis, atque cardialgiis ſæpe vexan-
tur; qui oculos produnt aut ad flavedinem
vergentes, aut cum modica flavedine subviren-

(h) In Capit. A ſede animæ ad morbos §. 12.

(i) Loc. cit. pag. 36.

tes ; linguam vero flavescente , vel albescente viscositate obductam . Nec minus eidem morbo obnoxii sunt , quorum labia exsicca , os amarum , saliva insipida , abundans , atque spumescens : quæ vero indicia augebunt anorexia , ructus amari , anxietas tandem , repletionisque sensus ad præcordia .

151. Quare si apoplexia corripiatur , qui prius ostenderet aliquas , seu plures supradictarum dispositionum , haud equidem a ratione aberrabis , si talem ægrum afferas correptum apoplexia consensuali , quæ a regione hypochondriaca originem duxerit .

152. In quo quidem confirmaberis ulterius si diebus autumnalibus id accidat , si morbi congeneres eodem tempore graffentur , si æger valde sensibilis , & irritabilis periodicas patiatur vertigines , si ætas sit virilis , si arteriarum pulsus neque magnus , neque pressioni valde resistens , si que præcipue apoplexiæ hujusmodi præcesserint acutissimæ cephalalgiæ ; quarum indolem , & causam ex earum ipsa intentione gastricam esse dignoscimus , nullatenus inflammatoryam (k) .

(k) STHOLL Rat. Med. Part. III. pag. 201.

153. Haud rara quidem sunt biliosæ apoplexiæ exempla: Plerosque apoplecticos profert biliosos Clariss. MOLLIUS; duos autem memorat, quos refert Clariss. MEDICUS: æger uterque apoplexia periodica defunctus est: secundo utriusque cadavere, summaque diligentia perlustrato, nullum morbi vestigium in cerebro apparuit; primæ autem viæ patuere refertæ materiis biliosis, quibus membranæ, proximæque partes supra modum conspiciebantur fœdatae.

Auctor idem præterea meminit aliquorum, quorum apoplexia omnino evanuit postquam ipsi, aut sponte, aut remediorum ope biliosas matries evomuissent. Postremo quandam describit apoplecticam, quam Ipse observavit. „ Mulier „ quædam, ait, aliquot annos ante insultum „ apoplepticum hæmoptoe correpta, & ab ea „ liberata est. Mox in dysenteriam incidit, e „ qua venæfæctionis, evacuantium, & acido- „ rum auxilio iterum convaluit. Deinde fe- „ bre biliosa correpta est, a mœrore, & curis „ nata, qua profligata brevi post inter luden- „ dum in apoplexiā incidit. Oculi erant „ flavedine tincti, & pupilla valde dilatata ap- „ paruit; lingua sordibus albis obducta fuit,

„ ventet tumuit, & alvus adstricta fuit. Pur-
„ gantia, repetitaque venæ sectio eam in pri-
„ stinam restituerunt sanitatem. “

154. Duo subitæ mortis exempla a subito
bilis in ventriculum affluxu adnotavit BONE-
TUS (l). Monuerat jam summus BOERRHA-
VIUS (m): *totum systema nervosum in capite tur-
bari posse, nullo vitio in cerebro existente, sed
illo tantum in præcordiis, vel ventriculo hæren-
te.* Præceptoris doctrinam confirmavit Illuſtr.
eius Auditor, ac Commentator SWIETENIUS (n)
exemplo cuiusdam viri, qui inter amicos apo-
plexia tactus procubuit humi: post horæ qua-
drantem magnam pituitæ quantitatem præter
ingesta vomitu spontaneo rejecit: hinc sensu
rursus viguit, motuque; imo vero post noctem
quieto somno traductam optime valens futuros
elusit hæredes, qui, nuntio de eius morte au-
dito, festinanter illuc convenerant.

Non sponte, sed arte excitato vomitu pa-
rem exitum habuit affectio apopleptica cuiusdam
Agricolæ ætate annorum octo supra viginti.

(l) Sepulchr. Lib. II. Sect. XI. Obs. 34. & 36.

(m) De Morb. Nerv. Tom. II. pag. 144.

(n) Comment. Aphor. 1017.

Hic mense januario , in quo biliosæ domina-
bantur pleuritides , domum ingrediens suis co-
ram domesticis querebatur satis : nutabat enim
cruribus , viribus deficiebat , incertoque intuitu
vexabatur : subinde sedenti sensim increbuit
morbis , evanuit mens , os apparuit detortum ,
ac dextrum crus sensu , motuque orbatum ; ar-
teriarum vero pulsus videbantur naturales , vix
tamen pressi digito cedebant . Suppeditatum
fuit ægro tartarum emeticum cum Ipecacuanha ,
quo magnam ejecit materiei flavæ , viridisque
copiam : continuo ipse mente vigebat , compone-
batur ore , ejusque crus post octo dies sensu
pollebat , ac motu . Ast aliud quoque hujus-
modi apoplexiæ liceat hoc loci describere exem-
plum .

Reverendissimus N. N. ætate annorum tri-
ginta trium , optima corporis structura , magna-
que nervorum sensibilitate præditus me dudum
consulturus adivit , quum de quadam oculi sin-
istri debilitate quereretur . Hæc , quæ sequun-
tur inibi prænarrabat Ille : „ Vir dignitate sum
„ mus nuper me incusavit , acriterque arguit ,
„ injuria . Ego satis perturbatus animo me
„ cœpi male habere : progressu dierum , os mi-

„ hi amarescebat , lingua fœdabatur satis , a
 „ cibis nimium abhorrebam . Subinde crura ,
 „ & pedes frigescebant , totum corpus agitaba-
 „ tur ; a somno oculi alienabantur : die autem
 „ sequenti quodam deliquio deficiebam , vix in-
 „ cedere poteram , cogebarque caput inclinare .
 „ Accito Medico secta fuit vena , leniterque
 „ laxata alvus ; hinc levabar ita , ut iter po-
 „ tuerim milliarium viginti quatuor vigens con-
 „ fidere . Ast haud perfecte valebam : ideo
 „ mane sequenti dosim sumpsi modicam cassiæ
 „ cum tartaro , ex qua res in melius vergere
 „ videbantur . Re tamen vera post horas ali-
 „ quot omnia rufus in pejus ruebant . A ci-
 „ bis enim abhorrebam quam maxime , crura ,
 „ & pedes gelu quodam , totum corpus inquie-
 „ tudine , molestisque venter flatibus vexabantur .

„ Quapropter sub horam diei vigesimam
 „ alteram , ut mihi mœrore confecto consule-
 „ rem , convisurus adibam amicum . Sed in
 „ ejus aulæ limine corripiebar apoplexia ; quod
 „ quidem elata voce innuebam auxilium im-
 „ plorans : lente sedi ; mens aliquantulum ob-
 „ tenebrabatur ; crura gelu majori rigebant ;
 „ totum corpus torpescebat , cor palpitabat : sub

„ ore frontis quædam veluti constrictio , sub sple-
 „ ne vero quædam distractio cum summo do-
 „ lore dominabantur . Ego vero natura du-
 „ c̄tus manu tentabam qua parte dolebam ; at
 „ manus paralytica opem renuit : tunc me sen-
 „ si hemiplegia læsum latere lævo , quod ta-
 „ men nec motu , nec sensu caruit omnino .
 „ Os detorquebatur ; post aliquot tamen horas
 „ in statum pristinum rediit : lingua implicaba-
 „ tur omnino , oculusque sinister suam extra
 „ orbitam videbatur depresso .

„ Post horas aliquot a secta tum brachii ,
 „ tum pedis veria , emeticum ex Ipecacuanha
 „ suppeditarunt , quo magnam evomui bilis fla-
 „ væ , viridisque copiam . Subinde per horas
 „ octo in pejus ruebam ; præcipue vero cogni-
 „ tio mihi imminuebatur vel maxime . Mane
 „ autem sequenti valde solabar . Imposterum
 „ me curare continuabant lenibus purgantibus
 „ repetitis , venæque sectionibus , quarum post
 „ quartam , quæ fuit jugularium , ita male me
 „ habui , ut mortem mihi imminentem per
 „ dies plures putarem . Progressu temporis ta-
 „ men omnia paullatim optime restituta sunt :
 „ reliqua solum est in præsentia oculi læsio ,

„qua super te consulturus adveni“ . Sic ille . Ego vero , rebus mature perpensis , oculi sanitatem perfectam brevi consecuturum prædixi , quin ulla exhiberem remedia . Id autem factum fuisse post aliquot hebdomadas lætatus sum : nunc temporis vero optimus ille Vir bene viget omnino .

Plures forte offeret Lectori animadversiones hujus morbi historia . At si quis umquam apoplexiā huc usque descriptam ad simplices spasmoidicas potius , quam ad sibilosas spectare opinaretur ; illi , meo quidem judicio , respondendum esset , bilis tum quantitatem , tum qualitatem , quam æger evomuit , satis confirmare , quod de eo morbo sentiebat Medicus , quem magnificatio . Phænomena vero spasmoidica ad ægri pertinent sensibilitatem , atque summam irritabilitatem , quæ quidem , ut supra diximus , habent quam maxime apoplexiā quamcunque promovere consensualem .

155. Triplici autem modo videtur bilis humana apoplexiā gignere posse . Primo nempe , quum illa stomacho , ejusque viciniis insidens agit per solum , ut ita dicam , consensum in cerebrum ipsi spasmum communi-

cando. Secundo, quum (quod forte ut plurimum accidit) invehit in caput majorem sanguinis quantitatem, sive ejus impedit regressum, ex quo congesiones ibi fiant, & hæmorrhagiae (11). Ac revera ex causa hujusmodi in

(11) Materies, quæ insit stomacho irritans sæpe præcludit sanguini redditum a capite. Constat enim experimentis motum diaphragmatis interrumpi, ac respirationem, si nervum phrenicum comprimas, vel irrites (HALLER Elem. Physiol. Tom. III. Lib. VIII. Sect. I. §. 38.). Hoc autem phænomenon videtur quoque futurum Clariss. COM-PARETTO (Occurs. Medic. §. CXI.) siquidem irrites vel funiculos, qui pervadunt fibras diaphragmatis cum vasibus sanguineis, vel in ventriculo ramos plexus nervi Octavi paris, quoniam ab hoc plexu *furculi*, *sæterum ventriculo dato ad Septum transversum accedunt*, ut notat loc. cit. HALLERUS. En qua ratione acris materies ventriculo inhærens respirationem valde impedire queat, sanguinisque redditum a cerebro præcludere; hinc vero apoplexiā efficiere. Refert ORTESCHIUS (Giornale di Medicina Tom. III. n. 51.) lacrymandum juvenis cujusdam Vicetini fatum. Ipse structura corporis, viribus, valetudine satis vigens, natura vero irritabilis valde, sensibilisque, & nimis edax; repletus pane, non quidem communi, sed acriori ex nimia fermenti quantitate, quo forte abutuntur Vicetini, pectore repente angustiabatur cum spasmo insuperabili: hinc anno ætatis snæ vigesimo quarto obiit apoplecticus, & in seculo cadavere inveniebatur stomachus eo pane refertus.

primis viis agente exortas observamus ophthalmias , ac narium hæmorrhagias , quæ tamen evanescunt emeticorum usu , atque purgantium . Tertio vero , quum illa eadem bilis satis corrupta , & absorpta una cum sanguine circumit : tunc enim vires suas irritantissimas exerere potest immediate in cerebrum , apoplexiamque efficere . Et enimvero Clariss. STOLLIUS (o) observavit cerebri cujusdam substantiam *modice ictericam* .

156. Bilis autem facilius , quam humor quilibet animalis , aliquando corrumpitur adeo , ut in speciem veneni vigeat , noceatque . Quod quidem confirmatur vel maxime ab observatione diligentissimi CICOGNINI quam refert MORGAGNUS (p) . Adolescens quidam extenuatus tertiana febre , periit convulsus . Dissecto ab domine præter alia morbi vestigia , inventa est stomacho magna bilis æruginosæ copia , cuius attacitu scalpellus violaceo colore inficiebatur . Eundem scalpellum eadem bile stillantem in carnem unius , & alterius columbi cum leviter

(o) Rat. Med. Part. III. pag. 388.

(p) Epist. An. Med. LIX. n. 18.

impressissent, ita ut bilis intra vulnus remane-
ret; haud multo post uterque, ac convulsus
periit. Quin etiam mica panis, illa admixta
bile, a gallo gallinaceo devorata, hic quoque
parem habuit exitum.

PORTALIUS (q) quoque tres nuperrime af-
fert observationes, ex quibus colligitur bilem
aliquando ita acrem evadere, ut in speciem
atrocioris veneni videatur agere. Vidi ego ali-
quando vim corrodentem, quam bilis ab ægris
rejecta exercuit in metallicas æruginosas pel-
les, quibus recipiebatur. Quam sœva igitur
erit ejusdem actio, ac virulenta in stomachi
nervos, atque in præcordia, quibus insideat?

157. Ac revera a bile in præcordiis coacer-
vata, & ab aliis primarum viarum fordibus
congeneres apoplexiæ affectiones exoriri sœpe
observamus. Haud raræ quidem sunt paraly-
ses, quas gignunt degeneres materiæ, atque ir-
ritantes infimo ventre insidentes. Neglecta hu-
us colluviei evacuatione dysenterici evadunt ali-
quando paralytici. CAROLUS PISO (r) histo-

(q) Observations ec. Chapitr. V. pag. 482. et suiv.

(r) Ib. De Morb. ex Serof. Colluvie Obs. XIII.

riam narrat Virginis cuiusdam, quæ de reperente hemiplegia correpta est: conveltebatur præfertim parte capitis posteriore cum oris tortura, adstrictione maxillarum, totiusque corporis torpore, Vix tamen bilem multam evomuit, omnino convaluit. Clariss. STOLLIUS (s) quam plurimas ostendit esse phrenitides consensuales; quæ nempe a bile, aliave putrida materie primarum pendent viarum. Omnes pene norunt, deliria sive acuta, sive chronica, utplurimum excitari a materie corrupta, atque vellicante præcordiis insidente. Neque enim hujusmodi deliria evanescunt, nisi ea materies, quæ fere semper biliosa est, eliminetur.

158. A colluvie primis viis hærente nos semel terrentes observavi sopores. Hoc unum sufficiat exemplum. Ab humanissimo Clararum PRÆPOSITO inventus est publica via Gallus quidam mortali sopore occupatus, cui quidem adstebat uxor gemitibus auxilium implorans. Illo curante adsportabatur æger ad Xenodochium, ubi ego aderam Medicus. Uxor interrogata mihi negavit virum sumpsisse cibos, aut potus,

(s) Loc. cit. Part. III. De Caus. & Sed. Phrenitid.

qui tantum adferre possent detrimentum: fatebatur autem eum præcedentibus diebus, a cibis satis alienum, morbosaque siti, ac lassitudine laborantem: nuper vero aliquid quietis captare volentem teterimo illo sopore oppressum fuisse. Pulsus nil durescabant; videbantur contra molles, ac vix febriles. Curavi ut æger aliquot tartari emetici grana deglutiret; excitabatur vomitus, sed levis; soporque persistebat. Jussi validiorem ejusdem emetici dosim propinari, qua ille magnam bilis viridantis, oleosæque quantitatem evomuit. Repente sopor evanuit, convaluitque æger omnino.

Legitur in Sepulchreto (t), bilem subfuscam, quæ vesicam felleam distendebat, causam fuisse mortis in puerō, qui sævissima cephalalgia excruciatuſ aliquando, subsequente tandem sopore perit. Nullum enim in cerebro vitium inveniebatur.

159. Aphoniam quoque ex hac eadem causa genitam observavit PROSPER ALPINUS, quem citat MOLLIUS (u), eamque observavit ex ven-

(t) BONET. Tom. I. Lib. I. Sect. I. Obs. 37.

(u) Loc. cit. pag. 28.

triculi vitio SIMSONUS, quem memorat HALLERUS (x). Vedit etiam HOFFMANNUS (y) sæpe aphoniam a vermibus stomachum, aut intestina vellicantibus; & ex verme terete cum involuntaria fœcum dejectione aphoniam vedit SWIETENIUS (z); imo, & ex binis vermibus adhuc vivis vomitu ejectis catalepsin conspexit mulieris quadragenariæ (a). CULLENIUS in sua Nosologia jam *verminosam* adnotavit apoplexiā.

160. At vis apoplexifera colluviei biliosæ colligitur quoque ab iis apoplexiis, quas veluti epidemicas observarunt Medici aliquando. Isteiusmodi enim apoplexiæ videntur quidem ex vitiata saburra, præsertim biliosa, primarum viarum exoriri, quum iis temporibus frequentiores sint causæ, quibus bilis vitiata solet infimo ventre coacervari. Et revera MALOVINUS (b) Parisiis observavit apoplexiā velut epidemicā decur-

(x) Loc. cit. Tom. IV. Lib. X. Sect. VII. pag. 224.

(y) Med. Syst. Tom. IV. Part. IV. Cap. VII.

(z) Aphor. 1364.

(a) Aphor. 1040.

(b) Histoir. & Memoir. de L' Acad. Roy. Des Scienc. ann.

1748. pag. 551., et pag. 553.

rentibus mensibus Junio, Julioque anni 1748., a qua corripiebantur homines cujuscunque ætatis, & pueri etiam. Adnotabat Ille tamen aerem eo mense Junio præter solitum humentem æstuasse, hominesque fuisse valde vexatos biliosis tum vomitibus, tum diarrhæis.

161. Verum quidem est easdem apoplexias homines afficere quoque, quum tusses sœviunt, ac rheumatismi, ideoque eadem quoque conjici possent genitæ a cutanea suppressa perspiratione. At quoties tusses, affectionesque rheumaticas una cum bilis colluvie conjunctas observamus? STHOLLIUS inter alios tussim jam descripsit *stomachicam* (c), *biliosum* rheumatif-
mum, *biliosumque catharrum* (d). Cæterum videtur quidem frequentiores epidemicas futuras esse apoplexias, si eas efficeret una tantum perspiratio aut impedita, aut imminuta.

162. Plures quoque opinantur hujusmodi apoplexiā exoriri aliquando tum ex bile, quæ in cystide coagulata in calculos concrescat, tum ex calculis renū, atque vesicæ. Et revera

(c) Rat. Med. Part. I.

(d) Loc. cit. Part. II. Cap. XI.

si biliares calculi præter cardialgias, anhelationes mortales, aliosque morbos, invehunt spasmos perviolentos in omnes corporis partes, præcipue vero in occiput, ut adnotabat TISSOTIUS (e); cur ex iis gigni nequibit apoplexia hominibus præsertim, qui nervis sensiles sint valde, mobilesque?

Hisce de causis apoplecticus obiit celebris MALPIGHIIUS, uti refert BAGLIVIUS (f). Ille enim evomuit biliosa, alvoque dejecit; cordis palpitatione, calculis tum renum, tum vesicæ, postremo & podagra laboravit; subinde præcedentibus curis, animique passionibus apoplecticus evasit cum hemiplegia lateris dextri. Convalescebat: at post menses quatuor, rursus calculo vesicæ per dies octo excruciatu, apoplexia rursus corripitur, qua tandem vita deceffit.

163. Alia quoque extat *consensualis* apoplexia, quam facit causa infra diaphragma existens, quaque solent corripi senes præsertim debiles, frigidique. Hujusmodi causa est pituita

(e) Tratt. De' Nerv. Tom. II. Part. II. Cap. X. §. 41.

(f) Opera Omnia Dissert. De Observ. Practic.

quædam , quam primis viis fluctuantem coacer-
vare solet solidarum partium , & præcipue va-
forum hypochondriorum debilitas . Hic morbus
a nausea incipit fere semper , subinde in verti-
gines convertitur , definit tandem in apople-
xiam .

Literatos præsertim homines senescentes ,
qui motu abstinent , huic morbo esse obnoxios
adnotavit BOERRHAVIUS (g) . In ejus initio
levari videntur vomitu , calidisque potionibus .
Quum vero his de causis vasa relaxentur ma-
gis , magis augetur in iis pituitæ copia , quæ
tandem mortiferam gignit apoplexiā .

164. Nuper quoque SCHOENHEIDERUS in
primo volumine Actorum Societatis Medicæ
Hauniensis narrat de quodam apoplectico , qui
usu convaluit emeticorum : iis enim magnam
e stomacho crassioris muci copiam ejecit . Hanc
apoplexiæ speciem vocat Auctor *cardialgicam* ;
hoc est e ventriculo exorientem , qui magna
muci copia opprimebatur . Paralyfis numquam ,
ut ipse subdit , subsequitur hanc apoplexiā ,
quæ curatur emeticis .

(g) De Morb. Nervor. Tom. II. pag. 255.

165. Quid vero dicendum de hoc hemiplegiæ defectu, licet non illico moriatur æger? Numne putandum paralyticum abesse, quod morbi causa, sive materies non subtilis fit, sed densa imo, & crassa; ideoque comprimens potius, quam nervos irritans? Numne rarer saltus est hemiplegia, quum apoplexiæ causa in uno dominatur ventriculo? Numne tunc solum subsequitur hemiplegia, quum morbus unice sympatheticus evasit jam idiopathicus facta in cerebro congestione? Vix quidem per vomitum ejecitis tum cibis, tum magna pituitæ copia convaluit apoplecticus, cuius meminit SWIETENIUS, ut supra retulimus (n. 154.), nullam de ejus hemiplegia mentionem faciens.

166. Ego quoque nuper hæc observabam. Venerandus quidam Cœnobita jam a biennio octuagenarius vertigini haud raro obnoxius, pro sua tamen ætate satis vigens, per triduum, quadruplex offas crassiores, spongiosasque ad excessum edebat: subinde aphonus evasit de improviso; ab illo autem aberant tum quælibet sensatio incommoda, tum ad somnum proclivitas. At brevi latinum aliquod verbum, licet inconcinne pronunciat, mentis deordinatae in-

dubia proferens indicia. Stratus lecto facie rubebat modice, oculisque; naturalis erat respiratio, arteriæ pulsus sufficiens, sed nimis tardus; nullumque in ægro paralysis, sive ad vomitum inclinationis indicium. Monasterii Medicus jubet copiosam sanguinis emissionem, subinde cucurbitulas, quæ scarificarentur: die sequenti coxendicibus, & tertio die occipiti vesicatorium apponunt; at res in pejus ruebant. Hæc mihi referebant die morbi quarta, quæ fui consultus.

Ego vero observabam ægrum jam aliquantulum stertorose respirare, neque verba nostra, neque rudem vesicatoriorum perficationem sentire: arteriarum pulsus ad excessum tardabantur, oculi semiclaudebantur, multaque saliva fauces impediabantur, quin ulla corporis pars paralytica conficeretur. Remedium satis purgans præcepi, quod vix paullatim deglutiri potuit: post horas aliquot alvus copiose deonerasatur, æger pallet, deficit, ac morti proximus videtur. Spirituosis, ut ajunt, adjutus oculos reserat penitus, adstantes probe noscit, loquitur, convaletque.

167. In hoc quoque ægro paralysim nul-

lam, ac pro certo morbi causam ventriculo tantum insidentem deprehendimus, aut intestinis. Quamobrem, si harum observationum numerus augeri posset, paralysis defectus, præsertim si alia quoque adsint signa, haud inepte hanc præsertim apoplexiæ speciem forte innueret. Notatu de cætero dignus magis videtur hujusmodi hemiplegiæ defectus, quum illa imo soleat comitari, aut subsequi fere semper apoplexiam, nisi cito vita defungatur æger: *ex centrum apoplecticos*, inquit SCHOMBERGIUS (h) qui sanantur, *vix unus evadit a paralyse aut unius partis, aut lateris unius*. Ad distinguendam ergo apoplexiæ speciem, haud parvi momenti esse potest hemiplegiæ defectus.

168. Siquis autem ægros, de quibus hic loquimur, *caroticos* potius diceret, quam apoplecticos; multa, quæ haud rationi absonta responderi possent, omittam: id tantum subdam, quod nempe *carus* est apoplexia *minor* plurimorum magni nominis Auditorum; & quod utilius habeo morbum describere, quam ejus speciem subtilius sancire.

(h) Aphor. Practic. De Apoplexia.

169. Postremo non solum nervea videtur dicenda apoplexia, quam gignunt febres perniciose intermittentes, sed videtur etiam huc revocanda. Clariss. enim RAHNIUS (i) affirmat, plerumque nulla læsionis indicia protulisse cerebrum eorum, qui ex febri perniciose intermitente apoplectici obiere. SYDENHAMIUS vero, TORTIUS, atque WERLHOFIUS hoc dirum symptomata perturbationi viscerum hypochondriorum tribuunt, ac bilis corruptelæ: haic sententiam confirmant alii quoque Clariss. Viri, inter quos SENACUS, MONROUS, & MEDICUS, quibus bilis præsentia tam evacuationibus, quam cada verum sectionibus sese manifestavit (k).

170. Ast objicies forte: si qua bilis primis viis turgescens apoplexiā hanc efficeret; haud tolleretur a China-china, ut sæpe; neque ab Opio, ut aliquando ovidemus. Id autem respondendum puto, quod nempe ex successu horum remediorum probatur solum spasticam fuisse causam proximam istiusmodi apoplectici soporis; sed ex eo negare nequimus causam re-

L

(i) De miro Capitis, & Abdominis Consensu pag. 78.

(k) SELLE Rudimenta Pyretologiae Meth. Ord. IV.

motiorem biliosas fortes, ut innuebamus, esse potuisse.

171. Dignoscetur vero præfertim periodicam esse apoplexiā, si febres grassetur larvatae; si æger aliunde non sit proclivis ad apoplexiā; si que hæc post horas octo, aut duodecim ab ortu suo evanescat omnino. Res vero magis, magisque patebit si febris intermittentis adsint indicia, in quibus recenseri solet urina, quæ sub finem accessionis intense flava, mox jumentosa, demum lateritia fiat; quod tamen indicium haud raro deest in larvatis intermittentibus. Et ipsa omnino deest aliquando horripilatio: nuper enim hujusmodi larvatam febrim observabam, cujus accessiones nulla horripilatione, sed odontalgia molestissima incipiebant. Quamvis autem variimoda sit harum febrium aggressio; in eo cæterum illæ conveniunt, quod epidemice plerumque grassetur.

CAP. XIV.

*De Apoplexia Sympathica ex causis
pectoris incidentibus.*

172. **N**e minimi difficile est intelligere, spasmum, qui viscera pectoris, ejusque vasa dominetur, gignere apoplexiā posse. Facile enim deprehendimus sanguini e cerebro regredienti satis obstat spasmus, qui tum pulmones obstringat, tum vasa referentia uti jugulares, tum denique musculares fibras (quod facillimum est juxta WALHERUM (I), quae venæ cavæ superioris circumstant hiatum. Quo quidem regressu impedito nonne facile intelligimus extortam apoplexiā? Sed etiam cor, ac vasa crassiora, quorum musculares fibræ satis sensibiles sunt, atque irritabiles, in ægris convulsis patiuntur quammaxime; ac turbæ, quæ hinc exsurgunt, in cordis præcipue motibus, apoplexiā inducere possunt.

(I) Apud TISSOT loc. cit. Tom. II. Part. I. Cap. IX.
pag. 254.

173. Id autem accidere potest iis aliquando , qui asthmate torquentur convulsivo . In his tamen , si senes præsertim essent , oppositum sæpe , ut verum fatear , observavi ; sanguinem nempe in eorum cerebro deficere ; namque in ipsorum deliquiis phænomena syncopis , apoplexiæque *ex inanitione* deprehendi potius , quam nimiæ sanguinis copiæ cerebrum opprimentis . In juvenibus autem bis , ut videbatur observavi brevem asphyxiam , quum morbus ad gradum pervenerit maximum .

174. Alia quoque ratione vitiata materies , quæ pectori insidet , efficere potest aliquando apoplexiæ , si nempe aliquo modo in nervos cerebri translata ibi spasmodum cieat . Metaстаsim hujusmodi prodebant duo , quos asthma convulsivum vexabat diu : insperato evanescen- тibus morbi symptomatibus , per aliquod temporis solabantur ægri . At subinde post leves mox unius , mox alterius membra subsultus improviso sopore , atque lethali perempti sunt . Hoc idem summe dolens observavit in Matre experientissimus Medicus , suavissimusque amicus meus MEZERA . Diutino torquebatur Illa asthmate convulsivo cum aliqua muci excretio-

ne: abfuit tandem omnis anxietas; abfuit asthma, sed post aliquos menses videbatur convulsa, subinde vero moriebatur apoplectica.

Meminit BONETUS (m) Theologi cujusdam, qui apoplecticus obierat; secto ejus cada vere nihil morbosi in cerebro inveniebatur. In thorace tamen pulmones discolores, & ichore spumoso infarcti apparuerunt; hinc conjectatum fuit aliquam ichoris illius portionem infecisse succum nerveum, sique inventam fuisse apoplexiam. At jam dici potest portionem aliquam ichoris absorptam, & in nervos cerebri detentam effecisse morbum hujusmodi. Hac quidem de causa videntur plures phthysici mori repente, quæ apoplexia dici posset *metastatica nervosa*; cuius ecce exemplum.

Virgo quædam vigesimo altero ætatis anno laborabat phthysi: antequam ad summam deve nisset maciem, solitum illi defecit sputum, quod quidem mediocre a duobus mensibus ejicere præcipue mane solebat. Post dies aliquot, quin esset anxia, confundebatur mente, subinde evadebat amens omnino, ac de repente interibat.

(m) Sepulchr. Lib. I. Sect. II. Obs. 57.

175. Difficilius quidem est intellectu, quomodo causæ irritantes, sive prementes, quæ pectori hærent, paralyses quasdam aliquando, atque apoplexias gignant, quæ solis videntur tribui posse sympathiis, ut ajunt, nervosis. Hujus generis aliquatenus esse videntur paralyses illæ, & leves apoplexiæ, quæ illico exoriuntur sputis imminutis, sive omnino suppressis; quibus vero redeuntibus expedite evanescunt, atque omnino.

Huic quoque sympathiæ libens adscribo convulsiones, quas haud raro observamus in phthysi tuberculari; quum mane præfertim nequeunt miseri ægri sputa exhaustire: omnis autem convulsio quiescit statim atque semel expuunt, aut bis. Si enim a cerebro compresso ob impeditum sanguinis regressum; sive a metastasi materiæ de prima sede demigrantis orientur istiusmodi convulsiones, levesque apoplexiæ; non video quomodo tanta facilitate, tan-taque celeritate evanescere possent paucis eductis sputis, sive auctis aliquando.

176. Id mihi tamen persuassimum est, quod asserit celeber. CALDANIUS (n); plura

(n) Institut. Physiol. Cap. XIV. n. 191.

nempe morbosa phænomena, quæ perperam communicantibus nervis tribui solent, a sublata circuli æquabilitate fortasse oriti impeditaque communione; quod quidem sæpe evenire potest ob communicationem spinalium arteriarum cum cervicalibus, dorsalibus, lumbaribus, & sacris.

177. Hoc autem loci plures memorari possent paralyses, atque apoplexiæ, lenes quidem ut plurimum, sed aliquando & lethales, quas Antiqui observarunt, Recentioresque cum præcedente nervorum pectoris irritatione, seu pressione. Huc revocat ill. HAENIUS (o) etiam paralysim, qua super sic effatus est HIPPOCRATES (p): *si aortæ appellatæ valde inflamatæ sunt* (bini scilicet Trachæ rami), *ut ad latus assideant, hac corporis parte resolvuntur: hos autem Veteres ictos, aut sideratos vocabant.* Verum hæc sideratio ex sæva peripneumonia exorta, ac fere semper lethalis a cerebri potius compressione pendere videtur, quam a sola,

(o) Rat. Med. Part. III. Cap. II. pag. 108.

(p) Libr. Coac. Prænot. Sect. II. n. 3.

ut ajunt, sympathia (12). Alias vero plures adnotavit HIPPOCRATES (q) in tussientibus, & in anginosis paralyses, quæ solis quidem sympathiis aliquatenus saltem tribui posse videntur.

178. Illustr. HAENIUS duarum mulierum, virique paralysim, initiumque apoplexiæ obser-
vavit, quam vera conseqüebatur hemiplegia (r). Tres hujusmodi ægri vomica pulmonum labo-
rabant: paralyses autem eorum, initiumque apo-
plexiæ suppressioni sputorum succedebant; qui-
bus redeuntibus illæ statim evanescabant. Claris.
quoque STORCHIUS (s) vidit in pluribus ægris
paralysim, & apoplexiam sanari omnino, cri-
tica sequuta anacatharsī.

(12) „ Paralyfis in peripneumonia , inquit BOERRHAVIUS , „ dicitur omnium pessima : nonnulli hoc attribuunt nervis „ hic distributis , sed videtur fieri a sanguine , qui se non „ potest evacuare per venas jugulares ; hinc pender potius „ a nervis compressis , quam alio modo affectis “ . De
Morb. Nerv. Tom. II. pag. 284.

(q) Lib. De Morb. Popular. Sect. II. versic. 25 : De Morb. Po-
pular. Lib. IV. vers. 27. Et ibidem Lib. II. Sect. II.
vers. 105.

(r) Rat. Med. Part. III. Cap. II.

(s) Ann. Medic. I. Tom. I. pag. 126.

179. Celeb. FRANKIUS mei amicissimus veram observavit asphyxiam, quæ ex pure in pulmonibus coacto oriebatur: historiam narrabat Ipse mihi oris iis, heu paucis! quibus datum est cum illo colloqui. Rus vocabatur a quadam Matrona, quam phthysi affectam jam judicaverat expertissimus WERLOPHIUS. Sub vesperas adivit Ægram; suam tamen proferre opinionem recusavit, nisi prius eam reviseret mane sequenti, quum febris inclinaret. Tunc vero Ægræ inspexit oculos fulgentes, venas frontis aliquantum tumentes, faciemque quid penitus insolitum referentem. Quum autem & arteriarum pulsus durescerent, jussit venam contundi: expectabant Chirurgum, qui dimidio millianii distabat; interea vero Matrona de repente convellitur, & brachia contorquens prosternitur solo: oculos prodebat apertos, nec tamen obnubilatos, pupillam satis expansam, os spumas agens, inferioremque maxillam veluti prolabentem: evanuere pulsus, & respiratio. Dum Vir dolore furens angebatur, experientissimus FRANKIUS, humanissimusque jussit pannis tepentibus corpus fricare, aliaque jussit excitantia remedia, quibus obnitezatur ad vitam re-

vocare , quam quidem defunctam judicabant omnes , Mulierem .

Post horam cum dimidio reviviscebant arteriarum pulsus , spiritusque , stertorosus tamen , oppressusque excitabatur : suborta tussi quam diffici , ac velut suffocante , Matrona aliquantulum ex ore materiei purulentæ ejiciebat . Hinc Medicus , quam prius suspicabatur , vomicam in ægra pro certo asseruit . Has inter miserimas rerum circumstantias , exhibuit parva , sed iterata dose Ipecacuanham ; ex qua levis iterum , iterumque excitatus vomitus notabilem e pectore extrusit puris quantitatem : hinc bono fato levabatur ægra , quæ per annos aliquot vitam protraxit .

180. Fatetur HAENIUS (t) difficillimum explicatu , quomodo causa unice premens , aut vellicans quemdam in thorace nervum efficere possit apoplexiā : putat ergo satis esse ejus possibilitatem probare ; quod præstat tum proferens insolitos , terribilesque effectus , quos saepe parit in ulcere irritatus nervus ; tum memorans apoplexiæ speciem , quæ a sola appli-

(t) Loc. cit.

catione venenorum ad nervos stomachi exorta, mox evanescit s^epe, expulso veneno. Mihi vero satis est iterum afferere, paralyses hujusmodi, apoplexias, atque asphyxias ex aliqua, quas supra recensuimus, causarum oriri.

CAP. XV.

Prognosis.

181. **N**orunt Medici periculosissimum morbum esse veram apoplexiā: hæc enim aliquando vitam adimit repente, s^epe tribus diebus, aut septem ad summum. Hujusmodi morbus juxta suos gradus diversos, diversimode absolvitur: hinc scripsit HIPPOCRATES (u): *solvere apoplexiā vehementem quidem impossibile, debilem vero non facile.*

182. At magis periclitatur apoplecticus morbo correptus, nullis antegressis signis: ille vero e vita certo decedit, cui, uno latere paralytico, alterum convellitur maxime & cui pulsus sensim magnitudine crescat. Observa-

(u) Aphor. XLII. Sect. II.

tum est etiam apoplecticum semper mori (x), qui manum iterum, iterumque eidem capitis parti admoveat, licet haud gravia videantur reliqua morbi symptomata. Pessimum quoque est signum, si initia talis morbi primo a facie incipient. Qui per nares potulenta rejicit, qui stertit, aut spumas agit ex ore, aut frigidum ex corpore sudorem emittit, plumbeamque prodit faciem, indicia fere semper mortis profert. Signum plerumque mortis est quoque, si deductis palpebris pupilla valde dilatata appareat, admissaque luce nihil omnino contrahatur; ac pariter si urina, & fœces clam elabantur.

183. Perniciem accelerat febris si inflammatoria, licet illico superveniat; si autem nimis sara, aut valde exigua, inutilis est omnino. Præterea, qui etiam hoc morbo convalescunt, rursus in eundem facile recidunt. Inter apoplexias autem generatim sanguinea, atque serosa magis pertimescendæ sunt, quam nervea.

184. Et revera apoplexia convulsiva saepe, sublato spasmo, solvitur omnino; quin illum,

(x) QUARIN. Animadv. Practic. Cap. I.

aut faltem notabile reliquum sit sui indicium. Aliquando evanescit, quin ulla sensibilis fiat evacuatio; aliquando vero habita aliquā aut vomitus, aut sudoris, aut urinæ crisi peculiari, aut fluxu menstruo restituto. Haud raro definit in hemiplegiam, aut in paralysim sive perfectam, sive imperfectam alicujus tantum corporis partis. At contra spasmus majorem aliquando sanguinis quantitatem, uti diximus (n. 50. 80.) impetuque majori in cerebrum cogit: ipsius hinc vasa distracta, ac saepe etiam disrupta mortem afferunt repentinam. Imo vero spasmus idem occidere potest, quin ullam forte faciat in cerebro congestionem, aut disruptionem, uti multis patet observationibus; inter quas signanter hic recole, quas ex Celeberr. TISSOTIO excrispsī (n. 76.). (13)

185. Periculo quoque plena est ea apoplexia, quæ a venenis pendet, aut a quapiam alia substantia, quæ nervos lædat summopere; cuius generis sunt tum materies arthritica, tum vapor carbonum. Inter funestas apoplexias,

(13) Binos ægros apoplexia convulsiva correptos observavit Clar. PANZANIUS obiisse quinta morbi die, ut lego dum hæc typis consignantur.

bilioſa eſt recenſenda ; niſi mox idoneis oppugnetur remediis. Quæ demum ex acrimonia , vel inanitione exoritur , fere ſemper in mor tem definiſit .

186. Morbum autem levari dicunt , ſi febris maturius accedat , & valida quidem , ut ephemera eſt , at non inflammatoria . Utilita tem ferunt quoque ſuccedentes hæmorrhoides , urinæ multæ , ac Sudor copiosus , æquabilis , roridusque . Inter melioris notæ signa enumera rat CAELIUS (y) caloris reditum , ſpaſticos in partibus paralyticis ſubfultus , non ac prius moleſtam deglutitionem . Aliqua quoque effulget ſpes , ſi æger inclamatus palpebras , ac labia moveat ; ac pariter ſi liberior , & ordinata fiat respiratio . Salus tandem expectari potest , ſi poſt venæ - ſectionem , atque alia congrua au xilia intra viginti quatuor horas confequatur levamen , remittantque ſymptomata .

(y) **Acut.** Morb. Lib. III. n. 51.

CAP. XVI.

De Curatione Apoplexiæ Sanguineæ.

187. **Q**uum apoplexia generatim, si jam invaserit, & multum periculi, & multum damni inducat in ægrós; hinc nobis curandum vel maxime est, ut ab hoc morbo homines, quoad fieri potest, præservemus. Quod quidem ut assequamur, nobis diligentissime animadvertisendum, si ii, quibus Medici adfistimus, aut ex proprio corporis habitu, aut ex parentum vitio ad hunc inclinentur ominosum morbum.

188. His quidem hominibus indicare præstaret, quod illis imminet, periculum, ut in quibusdam atmosphæræ constitutionibus sibi caverent ab iis quammaxime, quæ sanguinem commovere, ac rarefacere habent, eumve in caput cogere; scilicet ne vinum, nisi parce, potent, ne horizontaliter jaceant nimis, aut lecto strati legant, aut his similibus vacent.

189. Ad ea pariter nobis diligentissime attendendum est symptomata (n. 17.) quæ solent apoplexiā sæpe præcedere, quæque ut-

plurimum negligi solent. Ea enim significant sæpius, humorum accensionem, copiam eorum cerebro auctam, nervorumque læsionem.

190. Interim quum inter causas, quæ ad sanguineam disponunt apoplexiā, maxima sit ad plethoram quædam facilitas; hinc hujusmodi ad generandum sanguinem facilitas præcipue oppugnanda est. Id autem arduum videtur; præcipue quum & adhuc causam latere credant, quæ tam facile ad excessum augeat sanguinis quantitatem. Præcipua tamen methodus, ac magis efficax, qua huic vitio obtemperare in eo videtur sita, ut hujus generis homines & corpus exerceant, & temperanter vivant.

191. Dum corpus exercent, dum parce vivunt, rationem tamen habeant oportet, tum consuetudini, tum ætati. Illud juvat corporis exercitium, quod perspirationem servat, & promovet: nocere contra potest, quo corpus ferveat ita, ut nimis humores rarefiant.

192. A cibis autem, & a potu multum se temperent, si tamen corpus vigeat, si que moderatam vitam agere soleant. At contra mediocri tantum utantur diæta, qui satis abunde comedere solent: sua enim jura habet con-

fuetudo. Præterea si quis se ad diætam inducat, quum vires corporis aut intemperantia, aut ætate fuerint attritæ; tunc diæta illi futura erit perniciei, præsertim nisi ea utatur gradatim.

193. Semper autem oportebit tum a cibis se abstinere nutrientibus nimis, ac nimis stimulantibus, tum a liquoribus nimis actuosis. Vino cum aqua, aut saltem valde modico vino uti. A somno tandem diutino, & signanter a pomericiano aufugiendum est, quibus solet facilime plethora augeri.

194. Quamplures pro certo habent, ut & communis fert opinio, plethoram evitari sanguinis emissione; quæ tamen iterata plethoram faciliorem reddit: majorem enim solidis inducit laxitatem, spatiumque copiosiori sanguini suppetit. Favet ergo præcipue plethoræ ad vires, illamque auget, quam *obesam* dicunt. Quapropter vena tantum secunda videtur, quum e nimia sanguinis quantitate imminere apoplexiam deprehendimus, tunc imo & multum sanguinis emittatur.

195. Curandum est etiam alvum leniter laxari purgantibus acescentibus: addit quoque

LAURENTIUS CRELLIUS (z), eos, qui caput aqua valde refrigerabant, apoplexiam effugisse, quæ jam imminere videbatur.

196. Adnotare libet hoc loci monitum Clariss. Medici FOTHERGILLII (a): monet nempe eos, qui ad apoplexiam sanguineam sua constitutio-
ne videntur proclives, ne unice caput vergen-
tes oculos intendant diu in objecta, quæ post
humeros jaceant: quid enim perniciei ex hac
violentia corporis positione exoriri possit, hac
paritate Auctor exponit: Extrema flexilis tubi
ex corio deprehende manibus, ad distantiam
pollicum octo; contrario manuum parvo motu
torqueatur tubus; vix ejus imminuitur cavitas:
si vero manus distent duobus tantum pollicibus
inter se, idem, ut supra, in partes oppositas
motus ita tubum complicat, ut ejus cavitas fer-
me evanescens nulli pene fluido permeabilis sit.
Haud alia quidem ratione fit, ut qui breves,
crassioresque sint collo, caput retrorsum inten-
dentes nimis placent jugulares ad superficiem
positas: hinc sua imminuta diametro minorem
sanguinis copiam revehunt ad cor; quum ab

(z) Bibliotheque Medico-Phisique Du Nord Tom. I. art. XII.

(a) Giornale Ven. per servire ec. Tom. III. pag. 433.

ipso adhuc multam ducant carotides, quæ centro illius motus proximæ vix aliquid incommodum ex capitis retroflexione patiuntur. Quapropter in hisce hominibus facile exoriuntur vertigines & subinde apoplexia.

Et sane, ut idem refert FOTHERGILLIUS, vir brevis collo transvehebatur Thamesim patula quadam cymba, inspiciens intente, quod ad se pertinebat olim, navigium: iter prosequens retrospiciebat etiam: de improviso evanuit mente, sua procubuit cymba velut apoplecticus; nec, nisi post aliquod temporis revixit iteratis adjutus artis subsidiis.

197. Quoniam autem apoplexia facile corripit studiis severioribus incumbentes, qui sœpe meditando, diuque non solum spasmum in nervos, uti diximus (n. 53. & 82.), sed etiam multum sanguinis in vasa encephali invehere solent; hinc TISSOTIUS (b), efficacem describit methodum, qua ab literatis hominibus morbus hujusmodi arceatur. Illi nempe, ait, qui ictis minitantibus sanguinis congestionibus obnoxii sunt, a studiis nimis gravibus se ab-

(b) Epist. var. argum. pag. 76.

stineant, & a sermocinatione diutina; vix, aut ne vix quidem caput tegant, placidaque sedentes fruantur quiete; a nimis tepentibus conclavebus aufugiant; potionis tum vini, tum cœffée recusent; tenuique utantur victu.

198. Quum vero ingruerit apoplexia, utrum sit ipsa sanguinea dignoscetur ex iis, quæ adnotavimus (n. 15. 18.). Dum ergo sanguineam eam esse comperiamus, æger lucidiori conclavi, ac temperato locandus est; ejus corpus aliquantum erectum sternendum, ac demum caput ejus omnino nudandum: imo vero CULLENIUS (c) ægrum monet exponendum esse aeri frigescenti, neque adstantibus stipandum.

199. Hisce peractis sanguinem mittere necesse est, & quidem abunde; habita tamen ratione tum ægri viribus, ætati, corporis habitudini, tum præcipue pulsuum magnitudini, vigorique. Haud me latet quidem in plethora a rarefactione, & expansione sanguinis, ut pote quæ massam non auget, copiosas venæfctiones inutiles videri. Ast in ægris, de quibus hic sermo, plethora quoque cerebri par-

tialis primario innuit semper venæ-sectionem. Hæc enim iterata, prout postulabit res, immi-nuet saltem velocitatem, impetumque, quo san-guis in caput fertur.

200. Hæc autem velocitatis, impetusque remissio in apoplexia, aliisque cerebri morbis maxime utilis censenda est. Hac una ratione fit, ut ægri, qui cerebri plethora, vel inflam-matione laborant, opprimantur, ac pene suffo-centur jacentes: sanguinis enim ad cerebrum affluentis velocitatem, impetumque ea auget corporis positio, quæ contra vel arcet, vel au-fert deliquia ex inanitione.

201. Nobis insuper sperandum est, ut ve-næ-sectiones imminuant non modo impetum, sed & quantitatem sanguinis, qui cerebrum premit. Neque enim derivationes, revulsio-nesque, quas Prisci docebant, sunt in dubium revocandæ.

202. Ut ergo impetum sanguinis, expan-sionemque cohibeamus, contundenda est primo vena brachii, quod resolutum haud sit paraly-si, si æger hemiplegia sit affectus. Quod si fluxus menstruus, sive lochialis, sive hæmor-rhoidalis adesset, aut ipse impeditus repente

fuisset ; tunc vena pedis secanda . Maximam quoque præstant utilitatem sectio jugularium , quæ tamen fiat sola digitæ applicatione , arteriotomia , cucurbitula in occipite profunde scarificata , hirudinesque tandem , quæ non solum temporibus , & pone aures , verum etiam anno applicentur .

203. Hisce temporibus Celeb. WALTHERUS (d) plusquam a venis brachii , pedisque probat emissionem sanguinis ab iis , quæ viciniores sunt cerebralibus internis ; hinc Ipse sectionem innuit primo jugularium , subinde facialis , frontalisque : postremo hortatur hirudines apponere venis , quæ ad angulos oculorum conspicuntur .

204. CALLISENIUS autem Clariss. (e) in morbis cerebri plerisque , ut apoplexia &c. ; arteriotomiæ , hirudinumque usui præfert sectionem artificialem sinuum duræ Matris . Observatio ne enim compertum est ex una parte cranium posse , ubi necessitas ferat , terebrari , exceptis ejus basi , ac parte frontalis inferiori ; & ex alia parte vulnus sinuum duræ matris haud ef-

(d) Nouveaux Memoires de L' Acad. de Scienc. Berlin.

1784.

(e) Act. Nov. Soc. Hauniens. Tom. I. pag. 37.

se iethale, ut ante hæc tempora putabatur. Me quidem haud latet homines facile improbaturos Medicum hujusmodi sectiones jubentem: vulgus enim curæ methodum ne ingeniosissimam quidem ullius æstimat; sed tantum ejus exitum, qui malus plerumque ex mala morbi natura his ægris metui debet. Ast, ut res scire, ac probe noscere; sic & judicium vulgi aspernari verum Medicum decet.

205. Quod ad sanguinis vero quantitatem exhaustiendam, æstimentur, ut innuebamus, prius ægri vires, ætas, sexus, & temperamentum. Neque enim athleticis quoque, uti cum LIEUTAUDIO præcipit illustr. QUARINIUS (f), tantum sanguinis detrahendum est, ut calor nativus solvendo morbo necessarius extinguitur.

206. Sed magni refert, aliquando saltem, ut ad venam hisce ægris secandam opportunum feligatur tempus: in hoc autem Auctores minus institere forte, quam par fuerit. Observamus enim haud raro venæ-sectionem in certa quadam morbi periodo satis juuisse, in alia contra nocuisse quam maxime.

(f) Animadvers. Practic. Cap. I.

207. Et revera; ingruente vix morbo syncopis potius phænomena , quam apoplexiæ prodire aliquando videntur , uti diximus (n. 19. 20.). Hoc autem momento non modo detrimentum , sed & mortem afferre venæ contusio posset ; quæ quidem maximæ esset utilitatis , imminutis valde , sive evanescentibus iis phænomenis , quæ ad syncopem pertinere æstimantur . Hæc vero inter phænomena recenseri debent , color faciei semiluteus , oris spumescientia , respirationis interceptio , arteriarumque pulsus depresso , languentes , deficienteſque . In his quidem rerum circumstantiis , emissio sanguinis , præcipue copiosa , magnum vehere potest detrimentum : vitalis enim sic retunditur energia , dum ipsa conatur vitam revocare , motumque circulatorium promovere , qui ex muscularum resolutione in vasis præcipue minimis immaniter retardatur . Neque sperandum in hac rerum conditione illam , quæ hisce vasis ineſt , contractilitatem posse ad locum venæ contusum , qui minus resistit , sanguinem urgendo , motum circulationis pene sufflaminatum iterum excitare .

208. Id quoque persuasum vellem , quod

ob nervorum compressionem minus sensibile, minusque irritabile apoplectici cor majori, ut agat, stimulo egeat, idest majori sanguinis quantitate. Quamobrem patet, venæ-sectionem, quæ fiat importuno temporis momento, apoplexia quoque sanguinea correptis nocere vel maxime posse. Hinc forte fit, aliquando saltem, ut apoplecticus licet plethoricus, vix vena contusa emoriatur, dum vulgus solet, Medico etiam absente, venæ-sectionem præcipere statim atque ingruat morbus.

209. Abstinendum est igitur a venæ-sectione, donec vires vitales videantur deficientes, exsolutæve: interea præstat unice uti cucurbitulis; præcipue occipite scarificatis, quæ habent ægrum expergefacere, quin vitalibus noceant viribus. Hinc olim ZACUTUS LUSITANUS unius ope cucurbitulæ, quæ bis occipite scarificabatur profunde juvenem *resoluto jam pulsu nt in horas moriturus* videretur, restituit: neque enim poterat aliis artis subsidiis adjuvari.

210. Jam vero massa sanguinis, uti expsuimus, imminuta, alvum laxare præstat clysmatibus, quæ tamen sūn minus mitissima, sal-

tem haud multum acria sint: nam quæ stimulant, possunt in imi ventris visceribus spasmos excitare, qui majorem sanguinis quantitatem ad caput vehant. Dolendum quidem est Medicos aliquos in apoplexia hujus speciei curanda abuti sæpenumero clysteribus acrioribus, & valde stimulantibus. Ad summum mihi videatur ægris quibusdam profuturum clysma ex decoctione cœffée, quam VOGELIUS (g) laudat. Cæterum, quæ irritant, ut plurimum nocent.

211. Verum ægri aliquando, aut imminente apoplexia, aut ipsa sæviente, evomunt; aliquando ad vomitum incitantur tantum. Hoc autem indicio adducti Medici quidam emetica propinant; & tristi quodam fato gravissimi aliqui Viri hujusmodi tutantur praxim. Emetica enim detrimentum semper, aliquando etiam mortem afferunt in apoplexia sanguinea, præsertim idiopathica.

Id constanter affirmant summi in arte vi-
ri. MORGAGNUS (h) namque, atque BURSE-

(g) Loc. cit. Tom. II. §. 563.

(h) Ep. Anat. Med. III. n. 4.

RIUS (i) hemiplegias leviores, mitioresque apoplexias, emeticorum usu, in graves, atque lethales desisse observarunt. Imo MORGAGNUS mala quoque suspicatur de vomitu apoplectici, qui lauta mensa exsurgens morbo correptus fuerit. III. HAENIUS quoque queritur maxime SYDENHAMIUM in hujusmodi morbo probare emeticorum usum, quem Ipse perniciosissimum esse pro certo habet (k).

212. Et revera vomitus spontanei, quos in his ægris observamus, haud equidem idiopathici, sed sympathici, utpote qui ex cerebri læsione exoriuntur, procul dubio dicendi sunt (n. 17.). Hinc jure ac merito subdit celebr. QUARINIUS (l), *pessime errare illos, qui ob solum materiæ biliostæ vomitum propinant emeticum, cum e plethora caput obturbante, nausea, & vomitus biliosus oriri possit.*

213. Videmus quoque morbos quosdam apoplexiæ affines nausea, vomituque primitus manifestari. Sic cum vomitu aliisque ventriculi symptomatibus erumpit morbus a TISSOTIO

(i) Loc. cit. Tom. III. §. 131. & §. 132.

(k) Rat. Med. Part. IV. Cap. V.

(l) Loc. cit. Cap. I.

descriptus (m), qui in eo situs est, ut vasa cerebri paullatim, ac lente obstructa fuerint: hi quidem ægri omnes in pejus ruerent emeticorum usu. CULLENIUS idem, qui draftica velut probat remedia (n) impostorum monet, tenui dose exhibenda, metuens ne ad vomitum incitent, quem ipse quoque putat pernicie plenum. Ast aliquando emeticum cuidam profuit apoplectico: idem autem laborabat ne apoplexia sanguinea?

214. Contra vero maximam utique afferre utilitatem videntur, quæ a capite humores revellunt remedia: hujusmodi sunt balnea tepida, in quæ crura, pedesque immittantur; membrorum ligaturæ, frictiones, sinapis, & vesicantia.

215. Verum in apoplexia sanguinea ab iis abstinentendum, quæ nimis sanguinem exagitant; hinc apoplecticis hisce renuunt aliqui summi in arte viri vesicantia exhibere. TISSOTIUS (o) vesicatoriis anteponendos opinatur sinapismos, si sermo sit de apoplexia sanguinea. SWIETE-

(m) Epist. var. argum. pag. 77.

(n) Loc. cit. Art. 1133.

(o) Epist. var. argument.

NIUS (p) monet valde caute apponenda esse apoplecticis vesicantia; præsertim vero in apoplexia sanguinea, nisi post iteratas sanguinis evacuationes. VOGELIUS Clariss. (q) affirmat apoplecticis *vescantia longe magis inimica, quam amica esse.* LENTINUS autem (r) generatim suggerit in apoplexia vescentium usum hisce verbis: *vescentium usum sua cuiusvis ægri constitutio determinet. Nec hæc enim indiscriminatim, nec statim ab initio adhibenda esse, non possum non monere.*

Hæc nimia indiscriminatim, subitoque vescentia adhibendi facilitas damnatur etiam quam maxime a Clariss. TRALLESIO (14). Si autem

(p) Aphor. 1025. & Aphor. 1034.

(q) Loc. cit. 9. 563.

(r) Apud MOLLIUM pag. 40.

(14) „ Quid, inquit TRALLESIUS, in communī praxi magis „ obvium est, quam vix viro apoplectico, subito, & in- „ discriminatim recurrere ad vesicatoria, eaque larga, & „ multa nuchæ, brachiis, suris apponere, ut nempe alto „ somno sopitus excitetur, aut partes insultu superato pa- „ ralyticæ remanentes validissimis stimulis ad motus suos „ deperditos iterum subeundos agitentur, incitentur, & „ ex intentione artificis cogantur? Non ne decebat antea „ dijudicare ægri temperiem, solidorum, & fluidorum in-

post morbi attentam disquisitionem apoplexia inveniatur sanguinea, tunc Auctor spectatissimus absolute improbat vesicatoria tamquam exitia-
(s) lia eademque vocat cum TISSOTIO reme-
dium *apoplexiferum*, potius quam *apoplexifu-
gum*.

216. Et enimvero quid primo agunt ves-
icatoria? nempe stimulis urgent partem, cui ap-
ponuntur; quæ quidem inflammatur, suaque
deinde textura evertitur. Nervi ejus loci iis-
dem stimulis percelluntur, eorumque turbæ to-
to corpore diffunduntur. Hisce peractis, re-
tunditur ne vesicantium vis? Observations in-
dubiæ docent, magis actuosa, magisque vola-
tiles cantharidum particulas totum corpus per-

(s) Uſus Vesicantium Salub. & Noxiſ in Morborum Me-
dela Sect. Posterior. pag. 23. & 31.

„ dolem, ætatem, vitæ genus, & inquirere sedulo in ve-
„ ram causam, subitaneam motuum voluntariorum, &
„ sensuum impotentiam inferentem, quæ semper quidem
„ in encephalo latitat, & pressu suo in cerebri medul-
„ lam, & nervos inde egredientes, tristes suos effectus
„ patrat, sed non semper eadem, & sibi similis est, adeo-
„ que etiam eadem remedia exposcere nequit? “ Uſus
Vesicant. Salub. & Nox. Sect. Priori. §. 1. pag. 22.

meare: earum stimulis vires vitales augeri; atque hinc metuendum quam maxime, ne in cerebrum cogatur major sanguinis quantitas, motuque majori percita.

217. Si vero in praesens ad mentem revoces nervorum irritamenta (23.) vires vitales nimis auctas (25.), nec non universalem liquidorum expansionem, solidorumque distensionem (37. 43.), quæ in vera apoplexia sanguinea fere deprehenduntur; facile intelliges quanta in hos ægros mala a vesicatoriis invehiqueant.

218. Hæc autem mala timenda sunt magis, si ægri solidæ partes plus æquo irritabiles sint, atque rigescentes. Hac posita temperie, quis ægro putaret adferre levamen, stimulus addens stimulis, vim vi? Non ne hac ratione fit, ut quæ febris aliquando juvare apoplecticum ex fero videtur, ea semper, aut ferme semper noceat correptis apoplexia sanguinea? Animadvertisit BAGLIVIUS (t) vesicatoria pulsus accelerare, atque contrahere; febrim, sitimque augere, atque hinc parere effectus omnino iis

(t) De Usu, & Abusu Vesicantium.

oppositos, quos ad curandam apoplexiā exquirere debemus. Sapienter ergo citatus LENTINUS monet, vesicantium usum ab ægri constitutione esse determinandum.

219. Extat quidem celeberrimus Medicus a stimulantibus alienus omnino, quum in apoplecticis imminui debent sanguinis tum quantitas, tum motus; qui tamen putat in apoplexia sanguinea vesicantia profutura, si potius capiti, quam aliis corporis partibus apponantur. Idem ipse est CULLENIUS (u), qui tunc vesicatorium, non ut remedium stimulans considerat, quodque alio revellere valeat sanguinem; sed illud capiti appositum reputat potens remedium ad illam tollendam dispositionem, quam ad hæmorrhagiam habent encephali vasa. Quidquid sit de hoc tanti Viri judicio, alibi (x) tamen ipse fatetur, vesicatoria nil unquam juvaminis attulisse correptis hemiplegia, quam recte opinatur a causis iisdem pendere, a quibus ipsa pendet apoplexia.

220. Quare ex dictis huc usque videtur inferendum vesicatoria, quoad apoplexiā san-

(u) Loc. cit. Tom. III. art. 1135 - 1136.

(x) Loc. cit. art. 1169.

guineam, remedium esse satis incertum plerumque; aliquando absolute perniciosum, præcipue quum ægri partes solidæ vigent nimis, satisque rigescunt. **C**anthonides enim, ut (n. 216.) dictum fuit, non modo in partes, quibus admoventur, sed in omnia viscera stimulos agunt suos, quum quam citissime insinuentur quocunque. Irritant ergo nervos, licet, ut fert aliorum opinio, diversa actione, qua alia stimulantia, id præstent.

221. Ergo ad eos obtinendos effectus, qui ad hanc apoplexiā curandam exquiri debent, accommodatores potius videntur fomentationes ad caput frigidæ, tepentes contra ad crura, pedesque, quibus olim utebatur AVICENNA. Scite ergo Clariss. CRELLIUS (y) apoplexiæ sanguineæ curationem fomentationibus frigidis tentandam esse credit; & mox Cel. quoque NICOLAJUS usum satis frigidæ tum internum, tum externum adversus apoplexiā commendat (z). Quum vero ex horum clariss. Virorum observationibus satis utilis constet in apo-

N

(y) Loc. cit.

(z) Bibliotheque Du Nord Tom. I. pag. 266.

plexia frigidæ usus , non ne confirmari videntur , quæ de motu sanguinis intestino differimus Cap. II. ?

222. Cæterum illud negari nequit , quod nempe certa quadam morbi periodo videntur ægro profutura remedia modice *tonica* , ac roborantia , licet aliquantulum exstimulantia . Si enim morbi imminuta vehementia æger vitam protrahat , tunc pulsuum deficit robur (n. 18.) , hominisque tota languescit compages . Post mortem vero pallidæ fatis conspiciuntur Meninges , ac flacidum cerebrum sæpius , cruentoque sero redundans : quæ quidem innuunt summam vaforum exhalantium , & absorbentium debilitationem . A roborantibus ideo remediis non semper est aufugiendum .

CAP. XVII.

*De Curatione Apoplexiæ, quam serosam dicunt,
aut lymphaticam.*

223. Plures utique Scriptores, ut vidi-
mus (n. 6.) eos improbant, qui apoplexiā in
sanguineam distinguunt, & in serosam: imo ve-
ro PORTALIUS, aliqui negant omnino prima-
rio serosæ existentiam. Quæ quum ita in con-
troversiam cadant, id saltem ostendunt, quod
nempe, certis deficientibus signis, serosa non
raro accipiatur pro sanguinea, ac vice versa.
Et revera; sectis cadaveribus, ea apoplexiā
haud raro patuit sanguinea, quam quidem se-
rosam afferebant Medici, attentis hujus speciei
indiciis.

224. Hanc veritatem confusioni genera-
dæ aptam confirmant observationes plurimorum
medico-anatomicæ; eæ præsertim, quas POR-
TALIUS profert, atque MORGAGNUS. Suis enim
docet PORTALIUS, faciei pallorem, pulsus exi-
guitatem, spumasque ex ore haud certa consti-
tuere apoplexiæ serosæ indicia. Observationi-
bus autem MORGAGNI deducitur, non semper

esse serosam, quæ apoplexia lente, ac gradatim hominem adoritur: plures enim sanguineas hoc modo corripuisse ostendit Auctor sapientissimus (a). E contra haud paucas recenset Idem (b) serosas, quæ de improviso erumpabant.

225. Sed neque fibræ mollities, neque ætas senilis satis indicant apoplexiā esse, ut ita dicam, exquisite serosam. Novi ego aliquos senes facie pallentes, fibra nihil rigidos, quibus ad sanguinem satis densum generandum maxima inerat facilitas.

226. Quapropter certi sæpe deficientibus signis, quibus serosam ab sanguinea distinguamus apoplexiā, magnis nitendum conatibus, ut qui fieri potest, earum exploremus naturam. Id autem præcipue tenendum, quod nempe serosæ indicia, non seorsim singula, aut pauca; sed pleraque, atque conjunctim sumpta sint perpendenda, ut curationis feligamus methodum.

227. Indicia tamen, quæ difficilius Medicum fallent, erunt ea, siquid videam, quæ possunt suppeditari vel ab integra corporis consti-

(a) Epist. Med. Anat. III. n. 11 - 20 - 24.

(b) Ep. Med. Anat. IV. n. 6 - 9 - 11 - 16 - 21 - 26 - 28.

tutione, vel ab iis, quæ præcesserunt: facilius contra eum fallent, quæ vel comitentur morbum, vel eum subsequantur. Quare si in ægro ea omnino deprehendatur corporis temperies, quam supra descripsimus (n. 45.); ea medendi methodo oportet uti, quam ad curandam apoplexiæ ferosam experientissimi præscribunt Medici.

228. Quæ quidem methodus in eo sita est, ut primo hujusmodi apoplecticis exhibeantur purgantia satis energica; quæ scilicet componantur ex senna, agarico, jalappa, manna, anglico sale, cremore tartari, atque ex his similibus. Emeticum quoque minus his metuendum, quam sit correptis apoplexia sanguinea: plures tamen & in ferosa hoc remedium improbant. Laudantur præterea acria clysmata, vesicatoria, setacea, cauteria: tum vero usus probatur, cautus tamen remediorum excitantium. Legimus quoque apud HAENIUM (c), apoplexiæ pituitosæ exemplum ope vaporis electrici sanatæ.

229. At quærunt Medici; utrum nec ne his in apoplexiis sanguinem mittere oporteat.

(c) Rat. Med. Part. II. pag. 205.

Maximi quidem momenti est quæstio : error enim hac in re summæ perniciei est sepænūmero. Plures opinabantur venæ-sectionem apoplecticis ex sero nocere quam maxime: innitebantur auctoritati CELSI, qui scripsit: *si omnia membra resoluta sunt, sanguinis detractio vel occidit, vel liberat* (d). Contra vero viri gravissimi, inter quos MORGAGNUS (e), atque BURSERIUS (f) putant & in serosa apoplexia venam secandam, dummodo prudens adsit suspicio cujusdam vasorum plenitudinis, rubeique sanguinis copiæ.

230. Quare ægri constitutio quam diligenter exquirenda est, uti supra innuimus; si que indiciis quibusdam apoplexiæ serosæ, indica velut conjungantur, quibus sanguinis certa quædam quantitas dignoscatur, tunc tantum sanguinis emittatur, quantum rerum circumstantiis sit accommodatum. Et revera spumas agebat ex ore, facie pallebat vel maxime, difficultem valde respirationem, & exiguos probebat pulsus apoplecticus, quem PORTALIUS iteratis ve-

(d) De Medic. lib. III. Cap. 27.

(e) Epist. An. Med. IV. n. 15.

(f) Loc. cit. §. 135.

næ-sectionibus sanavit; licet ab aliis Medicis serosa judicaretur ille apoplexia correptus. Ast ille athleticæ erat constitutionis, ut PORTALIUS fatetur: ex hac autem athletica constitutione inferri potuit apoplexiam fuisse sanguineam, aut saltem non *primario* serosam.

231. Arteriarum autem præcipue pulsus certam quamdam sanguinis quantitatem habent significare. Hic tamen mihi liceat junioribus Medicis adnotare, haud semper pulsuum elevationi, aut exiguitati vires vitales responde-re. Vires enim adsunt aliquando sub pulsu exiguo, ferme nullæ sub elevato: tu tamen arteriam digito preme; si ejus subinde pulsationes magis vigescant, vigorem, & sanguinem; si evanescant, debilitatem argue, sanguinisque inopiam, quas quum deprehendas, venæ-sectio-nem metue: vigentibus autem sub pressione pulsationibus tentanda est venæ contusio. Licet enim sint pulsus exigui, & alia absint apoplexiæ serosæ indicia, haud tamen æger sanguine inops potest semper conjectari.

232. Fatendum præterea est observationes docere apoplexiæ, quæ, ut ita dicam, pri-mario, & exquisite lymphatica sit, raro ho-

mines adoriri: ut plurimum enim sanguis quoque distrahit capitis vasa; ex hac autem distensione sanguinea oritur subinde lymphæ, aut feri e vasis eruptio. Hinc vena videtur secunda ut plurimum, nisi id vetet malus corporis habitus, ut sæpe jam dixi, qui paucum sanguinem innuat vasis contineri, eumque effœtum, solutumque.

233. Hac enim posita sanguinis inopia, ejusque mala dominante crassi, venæ-sectio ægro noceret quammaxime. Vasa enim sanguine ferme exinanita a sero turgescente premuntur; hinc motus sanguinis remoratur, qui quidem incitari deberet ad cerebrum sublevandum, vitamque servandam. In hoc rerum statu naturæ vires in sui origine opprimuntur a sero, quod vel in vasis exuberet, vel ex ipsis erumpat. Oportet ergo eas expedire, atque excitare clysteriis, purgantibusque, quæ satis agant; tum vero emeticis, vesicatoriis, aliisque remediis, unde alio derivetur serum, quo caput gravatur. Væ autem illi, cuius vena secaretur, quum ita esset affectus. Idem esset ac si curare velles hydropem Ascitem non aquas exhauiens, sed sanguinem.

234. Quæ quidem venæ-sectio majora inveheret mala iis, quos ex cacochymia leucophlegmatica apoplecticos descripsimus (n. 47.): horum autem valetudo ferme omnino desperanda est; ac his tantum poterit prophylactica adhiberi cura. Namque apoplecticorum hujusmodi natura hebescit omnino; ac veluti expirat: nil fere agit; solum pati videtur, novaque, ut ita dicam, anima indiget. Vires vix nullæ, vix nulla solidarum partium elasticitas, mucositas quædam lenta fluidorum, frigida, & iners, remediis igitur egent summa activitate præditis, quæque valeant rufus excitare solidorum oscillationes, vitalemque calorem restituere, qui jam deficiens comperitur omnino.

235. Monet propterea Medicos HIPPOCRATES, ne tangant quidem infirmos hosce: metuendum enim est, ne qui fato pereunt suo, medica arte pronuncientur extinti. Hinc præstat Domesticos hortari, ut & omnia, & validiora suppeditent remedia; nos tamen de morbi exitu velut desperantes conspiciant.

CAP. XVIII.

Ratio Curandi Apoplexiam Nerveam sympathicam, sive Consensualem, & primo quidem Biliofam, sive Saburralem.

236. **V**idimus, quam caute, prudenter, seduloque agendum sit, ut recte medeamur cor-
reptis apoplexia sive fanginea, sive serosa:
at magnis æque conatibus nobis contendendum
est, ut eam curare apposite possimus, quam
dicunt apoplexiam *nervosam*. Quoniam autem
hæc dividitur, ut diximus in *idiopathicam*, &
in *sympathicam*; hinc ad exquisitum examen
nobis revocandæ sunt tum indoles, sedesque
causarum, quæ nervos irritant, vel alia ra-
tione lœdunt; tum ægri, suorumque præ-
fertim nervorum constitutio. Ex sola enim
horum attentissima inquisitione elici potest, quid
remedii singulis causis, singulisque ægrotantibus
conveniat, quodque expeditat in varia earumdem
causarum complicatione.

237. Principio vidimus supra apoplexiā
haud raro gigni ex causis extra cerebrum exi-
stentibus, quæ in ipsum agunt consensualiter,

sive, ut dicunt, ex sympathia. Hujusmodi vero causæ quam sæpiſſime ſtomacho iſſident, ejusque viciniis; & inter eas frequentius ſævit acriſ quædam bilis, adeoque ſatis irritans, quæ ut vidimus (n. 153. 154.) apoplexiā facit.

238. Comperiemus autem hujusmodi bilem, aliamve morbosam materiam primis viis coacervari, ſi illa adſint indicia, quæ (n. 150. 152.) memoravimus, quæque ſunt a morboſis ægrī vitiis, ſive antecedentibus, ſive præſenti- bus defumenda (15). Verum ſupra ex Illuſtr.

(15) Quoniam apoplexiā vocamus biliosam, uti ſupra di- ximus, tum quæ ab una bile, tum quæ a ſaburra qua- cunque primis viis coacervata pendet; non erit utique ab re noſtra hoc loci diligentiori, ac fuſiori methodo (in juniorum faltem Medicorum gratiam) iterum recenſere indicia, quæ non ſolum bilem, ſed innuant ſaburram quamcunque primis viis iſſidere, quæque neceſſarium oſten- dunt ſive emeticorum, ſive purgantium uſum. Rem ita- que diligenter exploranti bilis, vel ſaburræ indicium da- bunt ſtomachus, os, caput, pectus, cor, iateſtina; ali- quando etiam totum corpus, uti adnotavit Clariss. PLAN- CHONUS (Le Naturisme pag. 140.).

Primo. Primas vias ſaburra gravari indicabit ſto- machus, qui vel alienus fit a cibis, vel eos aliquando ex- petat nimis; quique laboret oppressione quadam, nauſeis frequentibus, vomitu ſpontaneo, cardialgia, doloribus

QUARINIO adnotavimus haud semper ex solo stomachi consensu gigni apoplexiā, licet æger nauseis vexetur, vomituque bilioso. Ad diligentissimum ergo examen prius est revocan-

identidem veluti mordentibus, ructibusque nullius aliquando saporis, aliquando vero acidi, nidorosi, fœtidi, amari &c.

Secundo. Quod ad os spectat; hoc viis primis infidere saburram innuit, quum afficitur amaritie, fœtore, dulcedine quadam ingrata; quum saliva præter solitum redundat insipida, viscosaque; quum vaporem calidam emittit, odoresque inter respirandum, qui ex materiis cieri solent acribus, acidisque; quum tandem lingua viscositate quadam obducitur subfusca, vel flava; si vero albescente, saburram significabit præcipue pituitosam.

Tertio. Caput colluviem, sive saburram primis viis incidentem indicabit, si vertigine vexetur, aut post cibum ad somnum inclinetur. Qui enim in somnum maxime fertur post cibum, nisi valde plethoricus sit, saburra gravatur, quæ fere est frigida: qui contra a somnio alienus est, saburra calida solet laborare.

Quarto. Sua quoque gastricæ saburræ profert pectus indicia. Et primo quidem siquando difficultis adsit respiration, quæ tamen non sit continua, sed tantum horaria. Curandum tamen est, ut spiritus difficultas, quæ a quibusdam pectoris morbis pendet, recte ab ea distinguatur, quæ a gastrica saburra exoritur. Conjectabis a saburra exoriri, si respirandi difficultas instet per horas quinque, aut sex, deinde deficiat; si cibis sumptis augeatur sta-

dum, utrum illæ stomachi turbæ a læso cerebro pendeant; an a materie bilioſa, quæ certo primis viis inhæreat.

239. Quare si apoplexia corripiatur, qui prius vexaretur bilis, faburræve alterius gene-

tim; si eam comitetur stomachi veluti a pondere opprefſio; fique tandem abſit tuffis; aut ſiqua adſit, ea ſtoma- chi conjungatur oppressioni, quæ ægro ipſi indicat tuſſim e ſtomacho exoriri.

Quinto. Cor vero eamdem indicat faburram, quum ejus motus imminuatur, pulſusque lenti evadant, exigui- que: hinc minor ſanguinis quantitas in cerebrum fertur, & æger viribus deſtituitur, ac velut pondere quodam gra- vatur: ipſi etiam palpitat cor, ac fibi imminere fæpe deliquium ſuspicatur.

Sexto. Intestina ſua dabunt signa; quum nempe tur- bis, colicis, diarrhæis, dyſtenteriis laedantur. Addendus eſt quoque dolor, qui genibus, muſculisque crurum *ge- mellis* excitatur, ut observaverunt FERRENIUS, atque PLANCHONUS (Loc. cit.); & ego quoque adnotavi haud raro. Et enim vero; Matrona quædam nuper quæreba- tur per biduum de hoc dolore; tertia autem nocte ſu- ſequente, violenta corripiebatur diarrhæa, poſt quam do- lor evanuit omnino. Regali quodam Monasterio adeſt prætantissima Virgo, in cuius viſceribus abdominalibus ſolet haud raro accumulate atrobiliaris materies: inter alia hujus coacervatae materiei signa, quæ mihi obversantur, fere ſemper adeſt dolor, aut aliquando etiam quædam eorumdem muſculorum, crurum nempe, contractio vio-

ris coacervatæ effectibus, a nobis supra descrip-
tis, eorumque signa proderet; quique habitum
haberet icterodem, ac temperamentum satis sen-
sibile, atque irritabile; arguendum erit apople-
xiam esse consensualem.

240. Jam vero his in ægro compertis,
antea omnia vena contundatur illi, necesse est.
Fateor quidem haud magnam sanguinis quan-

lenta, ac satis dolorifera. TISSOTIUS quoque (De' Ner-
vi Tom. II. Part. II. Cap. X. §. 41.) hominem novit,
cui stupor quidam crurum, & quædam eorum gravitas
diarrhæam prænunciabant, qua ille vexari solebat.

Septimo. Tandem quoad totum corpus saburræ ga-
stricæ indicia sunt; rigores quidam, atque pallores non
permanentes, sed frequenter redeuntes; febres quædam
ephemeræ; pulsus irregularis, inæqualis, intermittens,
quem vocant *intestinalem*; ac tandem madores, five su-
dores nocturni absque causa manifesta, quos purgantium
usus tollit omnino, ut idem afferit HIPPOCRATES dicens:
Sudor multus a somno, citra causam manifestam, factus,
corpus uberiori alimento uti significat: si vero cibum non
capienti hoc fiat, evacuatione indigere significat. Aph.
IV. Sect. IV.

Medico exploranti utrum aliqua ex his multis ades-
sent in ægro, priusquam apoplexia corriperetur; licebit
conjectando inferre eum apoplecticum evasisse coacervata
primis viis saburra.

titatem inesse ut plurimum iis, qui sunt natura
bilioſi: neceſſaria tamen eſt venæ-ſectio, tum
quia bilioſa colluvies majorem ſanguinis copiam
ad caput congerit, (n. 155.) tum quia immi-
nuta ſanguinis maſſa tutius alia adhibentur re-
media. Clyſmata protinus oleofa præſcriban-
tur, & emollientia; ſubinde & ſtimulantia.

241. At poſtquam apoplecticis hujus ſpe-
ciei ſit ita proviſum; auſu majori obnitendum
eſt, bilioſam colluviem eliminare. Quare pur-
gantia ſunt ſtatiſ adhibenda; ſed plures in ar-
te ſummi Viri magis commendant, & jure qui-
dem, vomitum excitantia. MOLLIUS vero (g)
ejiciendam affirmat ſive vomitu, ſive fecetu bi-
lem: ſic putant Medici plures, HIPPOCRATES
præcipue, qui clyſma præſcribit (h), quod bi-
lem veheſenter ducat, & quæ vomitum, & al-
vum movent. Rem conſirmat MOLLIUS tum re-
ferens plures apoplecticos ex vitio hypochondrio-
rum convaluiſſe clyſmatum ope, atque emeti-
corum; tum quoddam ſubdens fragmentum ex
Dissertatione Clariss. RHANII, qui ita ſcri-

(g) Loc. cit. pag. 37.

(h) Lib. III. De Morb. Cap. 3.

bit (i), „ si optimos quosque Medicos consul-
 „ las, nullum facile invenies, qui vomitorio-
 „ rum, & purgantium usum in quibusdam apo-
 „ plexiis interdicat; licet pauci ex sordibus
 „ intestinalibus illorum remediorum indican-
 „ tia depromant, sed potius ad cerebri idio-
 „ pathicam affectionem, ex serosa nimirum,
 „ vel pituitosa colluvie, respiciant: non ad
 „ me pertinet, &c. sed id monemus,
 „ vomitoria, purgantia, clysteres, tunc sem-
 „ per, & egregie convenire, ubi certa signa
 „ adsunt vitiosorum, acrum in primis viis
 „ contentorum humorum, qui non minus ac
 „ venena, cruditates ex cibis, vermes, uti
 „ quoscunque capitis morbos, sic apoplecticos
 „ insultus excitare valent; neque tunc ad eos
 „ tantum casus adstringenda esse, in quibus
 „ sanguineæ congestionis ad caput signa de-
 „ sunt; sed etiam in iis locum habere, quibus
 „ facies rubet, extrema calent, totus corporis
 „ habitus viget; quum ipsum illum calorem,
 „ turgorem sæpiissime ex intestinali colluvie
 „ produci, & foveri videmus &c. “

(i) De miro caput inter, & viscera Abdominis commercio.

Hoc quidem confirmat STOLLIUS (k) scribens ; „ faciem prærubram , ac quasi minio „ pictam in biliosis frequentissime video . Ve- „ rum etsi intensa rubedine genæ micent , qua „ ad oris commissuram , & narium pinnas pro- „ currunt , ruborem pallor excipit ex flavo vi- „ rescens . Hunc oris habitum , præcipue si „ & splendor quidam oculorum , quasi lacry- „ mis innatantium accedit ; adeo pro signo „ genuinæ inflammationis non habui , ut eum „ inter potiora diagnostica redundantis intra „ præcordia bilis reposuerim “.

242. Si vero objiceretur , STOLLIUM hoc loci differere de iis tantum biliosis , qui acuta febre laborant ; responderem , eosdem ipsos aliquando evadere apoplecticos . Sed hæc eadem adesse signa etiam sine febre , tunc quum biliosa infidet primis viis colluvies horrendum in modum minitans , ideoque purgantia , atque emetica adhibenda esse , sequens ostendet historia .

Clariss. PLUDA amicissimus mei , Medicus de hac Civitate optime meritus , & morum sua-

O

(k) Rat. Med. Part. II. pag. 129.

vitate unicuique dilectus pridie Idus Augusti anni 1787, me duxit convisurum Adolescentem quemdam Germanum, quem Ipse curabat. Adolescentis, ut mihi prænarrabat, ætate annorum septemdecim, auricomus, forma, totiusque corporis constitutione satis commendabilis, solitus carnes edere quam avidissime, a pane vero, simplicioribusque cibis alienus, inventus est mane alto demersus sopore, ac cognitione orbus. Adstantium voce, stimulisque tentabatur frustra: oculos vix ille apertos obserbat rursum, quin illum daret cognitionis indicium. Jubente Medico secta est vena, clysteria, & excitantia quoque remedia suppeditabantur; at nihil levabatur. Convisentibus nobis ægrum sub vesperas, hæc comperiebantur: turgebat illi facies, rubebatque: fulgebant oculi rubentes, ac lacrymis madentes: pulsus debiles, exigui, humilesque aut nullam, aut ferme nullam prodabant febrim. Hæc nobis explorantibus observabatur animo anni tempus æstu magno fervens, in quo biliosæ grassabantur diarrhoeæ, atque dysenteriæ; hinc una pronunciavimus adolescentem sopore corruptum, quem biliosa fecerat primarum viarum colluvies. Quapropter

oblatum est ægro tartarum emeticum aqua solutum; cuius ope magnam viridantis bilis copiam evomuit; hinc ipsi restituta continuo mens, loquela, ratiocinium. Asserebat autem nihil eo usque incommodi se persensisse, ac nihil de eo usque actis sibi constare. Subinde vero aliquot clysteribus, tenuibusque purgantibus adjutus, post triduum omnino convaluit. Sic mihi licuit nova observatione confirmare, quæ ex RHANIO, & STOLLIO desumpta asserebam supra; ex biliosa nempe colluvie præcipue faciem rubere, oculosque; licet aliquando pulsus exigui dejectique sint; absit vero febris.

243. Biliosa igitur colluvie supradictis detecta indiciis; statim clysteria, purgantia adhibenda sunt, & præcipue vomitoria: materies hujusmodi morbosa omnino evacuanda, ac citato; *periculum enim est in mora*. Inter remedia unum est vomitorium, quod statim agat. Non ne curaremus extemplo a ventriculo, intestinisve venenum exturbare; quod illic nosceremus? Cunctabimur autem, si bilis inest, quæ ad instar agit veneni? Audeat ergo aliquid, qui morbi causam in vitiata bile detexit; & ab hisce ægris blandi nimis absint Medici.

Hac forte ductus ratione SENNERTUS (l) ipsam materiæ præparationem spernit, dum quæstionem solvit, quam ipsi proposuerat PETRUS SALIUS DIVERSUS: hic enim quærebat; an stante cruditate pharmacum exhibere liceat apoplectico? Respondet autem Ille: ut præparationi opera detur, morbi magnitudo, & præsens, quod summopere urget, periculum prohibet.

244. Extat quidem vulgatissimus HIPPOCRATIS (m) aphorismus; *Concocta purgare, atque movere &c.* At medicamentorum inopia ita Priscos coarctabat aliquando, ut ipsis liceret tantum morbos observare: nos contra novis instructi medicamentis possumus, & sæpe tuto, ipsis mederi. Præstat insuper ægrum curare quocunque modo, si principium aliquod venenatum, lethiferumque ejus minetur vitæ, utilis in apoplexia, de qua agimus. Subdam postremo, quædam generalia medicinæ præcepta haud raro esse restringenda; HIPPOCRATEM imo idem præstitisse, præcipue vero hoc super præcepto, ut patet aphor. 24.

(l) Lec. cit. Quæst. V.

(m) Aphor. XXII. Sect. I.

245. Sed quod vomitum generatim spe-
ctat, Vetustissimi quoque observarunt, bilem fre-
quentius, tutiusque evacuari per vomitum sole-
re. Id idem asserit HIPPOCRATES in libro de
Morbis: *quantum quidem in ventriculo, & ve-*
ficula inest bilis, quod quidem in ventriculo est,
aliquando deorsum exturbatur, plerumque vero
in primis diebus vomitur. Præferendum ergo
est vomitorium, quod aptum est ad obsequen-
dum naturæ, quæ in initio morborum ex vi-
tiata bile, eam solet vomitu spontaneo elimi-
nare. Quum vero temporis angustiis, urgen-
tique periculo prohibeamur inquirere utrum ma-
tura sit, an cruda biliosa colluvies (quæ qui-
dem cruda conjici debet, quum apoplexiā fa-
cit); & magis adhuc vomitorium adhiben-
dum est, quoniam habetur aptum ad evacuan-
dam bilem licet immaturam. *Subpurgandi sunt*
ventres, ait rem confirmans HIPPOCRATES (n),
in morbis ubi purganda matura fuerint: inferni
quidem ubi considisse videris. Signum habes si
non anxii fuerint, neque capite gravati, & cum
calores mitissimi, & cum post exacerbationes ces-
sarint. Superni vero in ipsis exacerbationibus.

(n) Lib. VII. De Morb. Popularibus.

246. Et enimvero haud raro vomitus spontaneus, ut supra adnotavimus, bilem initio morbi extrudit saepe, vehitque salutem. Si ergo naturae vires velut impeditae id nequeant praestare; cur ejusdem naturae auxiliatrix ars haud exhibebit remedium, quod vomitum excitet? Non ne prudentissimi viri, inter quos TISSOTIUS (o) vomitorium exhibent & epilepticis, quum morbi causam primis viis insidere detixerint; licet & in epilepsia satis sit metuendus quilibet ad cerebrum humorum affluxus?

247. Plura suppetunt exempla, ut exposuimus (n. 154.) apoplecticorum, qui post venæ sectionem vomitorii usu constanter valuere; quibus alia addi possunt exempla. Virgo quædam, quæ tum menstruorum defectu, tum aliis hypochondriorum vitiis laborabat, apoplexia corripiebatur: brevi in pristinam rediit salutem clysterum usu, atque vomitorii (p). Cel. NICOLAUS (q) historiam afferit senis cuiusdam sati vigentis, & cholericò temperamento prædicti, qui apoplecticus evasit: contusa vena, sum-

(o) Dell' Epilepsia Cap. XX.

(p) Commerc. Noric. an. 1739. pag. 366.

(q) Ex MOLL. loc. cit. pag. 38.

ptaque copiosa tartari emetici dosi , ingentem pituitosæ materiæ , ac bilis copiam evomuit , atque convaluit . Nova ejusdem morbi prænuntia post aliquot menses minabantur , sed repetitis vomitoriiſ imminentibus insultus arcebatur .

248. Tandem ventris infimi colluvies tripli modo apoplexiā , de qua hic agitur , gignere posse videtur , ut vidimus (n. 155.) . Primo quidem nil forte materiei morbosæ in cerebrum fertur ; ast ægrotante ventriculo ob quemdam inexplicabilem consensum ægrotat quoque encephalum . Secundo vero quum bilis colluvies copiosiorem sanguinem ad cerebrum propellit . Tertio tandem , quum aliqua abdominalis colluvie particula in cerebrum ipsum intruditur . Si primum dicas , cum nihil cerebro insit morbosī , tutissime vomitorio uti potes , emisso prius sanguine e vena : si alterum , aut tertium asseras , adhuc vomitorium esse adhibendum censeo , ut sublato fomite bilis , tum eam prohibeas cerebro augeri , suamque vim exerere funestissimam , tum sanguinem copiosiorem a cerebro arceas , quem actio bilis in præcordia illuc determinare posset congestiones forte effecturum .

249. Hoc ideo loci serio animadverendum est, vomitorium, quod cæteris remediis, huc usque anteferendum probavimus, absolute adhibendum esse antequam sympatheticus morbus fiat idiopathicus, hoc est antequam sanguis in vasis cerebri, ejusve involucrorum consistat congestus, aut in cerebro fiat materiei biliosæ metastasis. Quod enim vomitorium vitam servaret ante congestiones, atque metastasim, post eas forte mortem promoveret. Quapropter præstaret vel maxime Medicum dignoscere posse temporis punctum, quo congestio, sive metastasis in cerebro fiat. Quibus ergo indiciis harum tempus inquirere licebit? Rem quidem inquisitu difficilem primis præcipue earum inchoamentis.

250. Hæc tamen, quæ sequuntur, aliquod lumen videntur afferre posse: Primo nempe quum sanguinis congestiones cerebrum compriment, tunc arteriarum pulsus elatiores, ut plurimum, vividiores, atque tardiores evadunt; rubor faciei extensione augetur, & saturitate; oculique aliquam sæpe produnt mutationem.

Secundo autem, materie morbosa a ventriculo in cerebrum transvecta, veraque meta-

stasi facta , arteriarum pulsus , præcipue si notabilis sit metastasis , qui molles erant tota bille præcordiis insidente , durescunt satis , vibrati fiunt , angusti , rigidi , nihil omnino prementi digito cedentes ; minusque frequentes evadunt , imo aliquando naturalibus vix celeriores : idque forte ex eo , quod materies metastatica habet non solum comprimere , sed etiam valde irritare cerebrum , ejusque involucra . Verum ferre semper est perniciosa , atque lethalis hujusmodi ad caput facta metastasis , si adeo valida sit , ut supradicta prodat indicia : tunc serofo latice turgidissimos laterales cerebri ventriculos in extispiciis offenderunt Observatores .

251. Quapropter ex his omnibus ulterius constat , quam præstet uti vomitoriiis , priusquam sanguis congeratur in cerebrum , cerebrumque comprimatur ; imo vero priusquam aliæ fiant metastases , quæ certo perficientur , nisi subito eliminetur in morbis præcipue febrilibus abdominalis colluvies .

252. Jam vero inter vomitoria laudantur , quæ ex antimonio sunt parata . Minus enim accommodata videtur apoplexiæ hujus speciei ipecacuanhæ radix , quæ aut effœta est , aut

sordibus non raro stomachi involuta nullum, aut non pro dignitate præstat effectum. Illi ergo anteponendum est tartarum emeticum in aqua, quæ sit purissima, solutum. Id quoque adnotandum, quod hisce apoplecticis nocere possunt aquæ potiones, quæ sumpto emetico ad faciliorem vomitum reddendum satis abunde exhibentur: hisce enim copiosis potionibus stomachus tumefit nimis, distrahiturque; hoc autem semper perniciosum est in apoplexia. Ab ea ergo abstinendum erit methodo, quæ tamen generatim debet probari.

253. Purgantia quoque subsidium afferent, præcipue quum æger emetico usus fuerit, visque morbi aliquantum remiserit. Salia vero, manna, tamarindi, tartari tremor, hisque similia reliquis videntur anteferenda. Quum vero hisce in ægris spasmi abdominales facilius excitentur, ideo exhibenda sunt etiam, quæ sedantia sint, & antispasmodica: inter quæ seleuisse juvabit, quæ minus calida sint; & ea quoque clysteriis copulare præstabit.

254. Diximus tandem (n. 163.) senes, & senescentes, præcipue si vitam agant quietam, aliquando apoplexia consensuali corripi,

quaꝝ pendet a pituita primis viis coacervata. In hac quidem apoplexia a venæsectione abstineri præstat, aut saltem quam diligentissime omnia expendenda sunt, priusquam ad eam procedatur. Præstabit autem clysteres præscribere aliquantum stimulantes, purgantia; imo & emetica, siquidem materies deprehendatur mucosa, ut in ægro, quem SCHOENHEIDERO referebamus (n. 164.). Ibi quoque utilitatem vidimus maximam attulisse Cœnobitæ (n. 166.), tum purgantia ex manna, & cremore tartari, tum clysteres aliquantulum extimulantes.

CAP. XIX.

Ratio Curandi Apoplexiā a febri intermittenti exortam.

255. Quum bilis potentia in febribus intermittentibus alendis ab omni tempore cognita sit (r), quumque viri gravissimi affirment (n. 153. 169.) se ne minima quidem læsionis vestigia invenisse in cerebro eorum, qui ex pe-

(r) SELLE Rudimenta Pyretologiaz Meth. Ord. IV.

riodica febri apoplectici obiere, sed tantum bilis corruptæ copiam eorum præcordiis insidentem; obvium ideo est, curationem subinde hoc loci tradere illius apoplexiæ, quæ ex febri intermittentí exoritur aliquando. Ubi ergo ad ægrum apoplectica febre decubentem vocaremur, in ipso quidem paroxysmo non alia adhibenda sunt remedia, quam quæ præsens periculum possunt imminuere, ac felicem præcipue accessionis crisim promovere.

256. Exacto autem feliciter paroxysmo, sequentis accessionis metuenda est ferocia, imminentisque periculi certitudo; hinc tempus corticis peruviani usui opportunum frustra non est terendum. Ad summum si sanguinis copia adsit, atque turgor, venæsecchio instituenda; & si qua sursum turgescens primarum viarum colluvies emeticum postulet; emeticum lene, antimoniale est propinandum. Sed vix finita remedii actione ad largiorem corticis usum accedere non cunctabimur; ita ut duas pulveris drachmas quavis tertia, vel altera hora ægro præbeatur, ne ille, superveniente exacerbatione e vita decedat; & turpe illud Medico superficit unice effugium; quis hoc credidisset? ut

optime scripsit prudentissimus RHANIUS (s) .

257. Liceat ergo rursus hic instare , ne tempus teratur in morbis hujusmodi , sed ægris cito china - china , nec parca dose , exhibeatur . Medico enim cunctante , parvaque remedii quantitate morbus insidiis plenus , ac sæpe fatalis nequit compesci : non est curanda nimis alvi purgatio , neque est metuenda haud modica corticis quantitas . Me quidem pœnituit nunquam hac mala morbi detecta natura suppeditare notabilem corticis dosim : idque sub finem alterius paroxysmi , ut quo diutius fieri possit , remedium suam exerat actionem , qua vel futuram accessionem prohiberet omnino , vel faltem retunderet .

258. Ast hic mihi præbetur occasio aliquid referendi de ægris hujus generis duobus , quos bono fato inter cæteros curavi : alter enim præferebat peculiares morbi circumstantias , alter dum hæc scriberem meam in sui subsidium vocabat opem .

Primus erat FERDINANDUS Comes CALINUS , Ecclesiasticus generis nobilitate , morum

(s) Adversar. Medic. Practic. Vol. I. Cap. III.

pietate , scientiaque , cuius specimen tum verbis tradidit , tum typis vulgavit , præclarus . Hic autumnali tempore anno ætatis suæ sexagesimo septimo , dum rure vacaret , corripiebatur febre cum horripilationibus , quæ æstu superveniente invelhebat alternis diebus verum soporem apoplecticum , alternis verum delirium . Nam prima morbi die post frigus subsecuto calore æger optimus apoplectico tenebatur sopore ; qui tamen post horas octo circiter , febre declinante , solvebatur ita , ut Domestici morbum conjectarent omnino evanuisse .

At die sequenti (morbi secunda) redibat aliquo cum frigoris sensu febris , quæ , loco soporis apoplectici , delirium adferebat . Tunc ab Urbe advocatus rus sub vesperas perveni , & in ægrotante Viro tum febrim observabam jam desinentem , tum quæ metuenda comitabantur phænomena ; inter quæ aderat sanguis urinæ immixtus , & alia quidem putridæ dissolutionis indicia . Proximo diei tertię mane , cum primis viis videretur biliosa colluvies inesse , jussi remedium , quo satis alvus purgaretur . At purgantis actionem subsequebatur febris diei tertię , quæ rursus soporem apople-

cticum primo majorem invehebat. Peractis iis, quæ minus inepta videbantur ad præsentem accessionem compescendam, declinante febri, notabilem chinæ-chinæ quantitatem exhibui: hac non obstante renovabatur die quarta tum febris, tum delirium. Hac quoque vix declinante accessione æger optimus, me quidem suadente, doses corticis iterum, iterumque sumebat. Specificum ita devicit morbum, ut & quintam febrim cum sopore, & sextam cum delirio, aliasque futuras quascunque prohiberet omnino. Sed ad alteram procedamus observationem.

HYERONIMUS Comes NEGROBONUS ætatis annorum sexaginta, cui me totum devoverat gratus animus, libensque, erat Æger alter, Vir sanguine, moribus, officiis spectatissimus. Circa Kalendas Octobris anni 1787. eum adorriebatur febris absque ullo frigoris sensu; cuius naturam insidiis, periculisque plenam patefaciebant ea, quæ sequuntur phænomena. Febris nempe, cuius periodus erat horarum ad minus triginta duo, doloresque acutissimi, colicos nephriticos similantes, Ægrum lacescebant, cui passim videbantur deliquia imminere: comita-

bantur tum gravis ad somnum proclivitas, tum vaniloquium; quæ tamen omnia post horas triginta duo compescabantur.

Tunc emetico-cathartica potio ei propinabatur, qua fæces biliosas dejecit copiose: quæ tamen dejectione subsequentem nequiverunt febrim cohibere, quæ immo satis valens majora minabatur, mecum mœrentibus valde Proceribus Urbis, Civibusque. Inter unam tunc, alteramque accessionem, duobus aliis assentientibus experientissimis Medicis, tres cum dimidio uncias corticis sumpsit, quæ tantum potuere febris subingredientis imminuere symptomata. Postremo tandem iteratis Chinæ-Chinæ dosibus morbus omnino evanuit.

259. Sed accidit aliquando sive ob deglutitionis vim sublatam, sive ob vomitus pertinaciter perdurantes ægrum ingerere non posse sufficientem corticis quantitatem. Tunc optimo cum successu clysmata substituuntur ex China-China parata, atque per justa intervalla repetita. Quod si neque chinata clysmata, nec qualescunque corticis præparationes febri suffocandæ sufficerent; tunc juxta clariss. Virorum consilium Opii vires supererunt tentandæ.

260. Tali vero posita necessitate, tunc círciter ante novam accessionem hora, Opii sufficiens portio est porrígenda. Extant quidem, qui utilius existimant, semihorium post caloris initium Opium exhibere (t): hæc tamen methodus non videtur accommodata omni febri intermittenti, quæ sit apoplectica; quum saltem aliquando, dum ingruit febris, adoriatur & apoplecticus sopor.

Hinc quædam in tanti remedii administratione observandæ sunt leges: harum est præcipua; si nempe causa desit materialis, & unus character nervis impressus febrim efficiat. In febribus tamen intermittentibus, quas soporosas, sive apoplecticas dicunt, Opium, causa licet adhuc adsit materialis, est porrigendum, materialisque causa post febris suffocationem tollenda. Nimium enim est, quod instat periculum (16).

P

(t) MURRAY loc. cit. Tom. II. pag. 210.

(16) Super hac re legi meretur perutilis Dissertatio JOANNIS JACOB. SCHAERTLICH *De Uso Opii in Febribus intermittentibus.* Goettingæ 1783. & in suo Delectu Opusculetum Medicorum posita a Clariſs. & de nobis meritissimo FRANKIO.

CAP. XX.

*Ratio Curandi Apoplexiam ex hypochondriacis,
atque ex difficultate tum fluxus Menstrui,
tum hæmorrhoidalis, & etiam ex podagra
abdominalibus nervis infidente.*

261. Extat apoplexia, quæ, ut vidi-
mus (n. 131. 132.) ex spasmo viscerum ab-
dominalium exoritur. Illud etiam adnotavi-
mus, quod ab eorum viscerum, artuumque in-
feriorum spasmo sanguinis motus in iis parti-
bus præpeditur, aliorum avertitur, cerebrum-
que versus majori impetu determinatur. Qua-
re hujusmodi ingruente apoplexia venæ-sec-
tionem instituere oportet, ut & humores ad ce-
rebrum affuentes arceantur, & ut jam remo-
rantes alio deriventur. HOFFMANNUS quidem
pluribus in locis, præcipue vero in suis Con-
sultationibus, venæ-sectionem probat in ea apo-
plexia, quæ ut Ipse scribit, *viros hypochondria-
cos, fœminasque hystericas, sæpen numero infestare
solet* (u). Auctor idem, dum suum profert ju-

(u) Consult. Medic. Cas. XVI.

dicium super ægrum, qui casu decimo nono describitur, hæc ait: *morbum equidem non aliud esse iudico, quam leviorē apoplexiā passioni hypochondriaco-spasmodicæ supervenientem, cuius certe accessio hypochondriacis frequentior, quam a Medicis dijudicatur, deprehenditur.* Hic vero apoplexiæ genus tempestivis venæ-secutionibus, clysteriis, pediluviis, aliisque sanatur.

Præstantissimus quoque MORGAGNUS (x), bis jussit eadem die venam contundere Sacerdotis cuiusdam apoplexia correpti, qui ab aliquot annis convulsivas patiebatur hypochondriorum affectiones. Putabat quidem MORGAGNUS Sacerdotem periclitantem ex multi seri affluxu; sed tamen subdit: *constrictis insuper, ut saepe in hismodi convulsivis hypochondriorum affectionibus usuvenit, sanguiferis in ventre vasis, illa propterea, quæ ad cerebrum attinent, magis sanguine distendi crederem.* Sic in aliis quoque feci eodem exitu.

Contundenda igitur est hisce apoplecticis vena: in iis enim præsumenda est plethora sal-

(x) Epist. Anat. Med. IV. n. 15.

tem localis, partialisque vasorum, quæ ad cerebrum attinent; licet absint signa, quæ innuant totum vasorum systema sanguine redundare.

262. Emissa vero opportuna sanguinis quantitate, exhibenda subinde sunt remedia, quæ & compescere valeant hypochondriorum turbas, & alio avellere humores caput gravantes. Effugienda vero sunt omnia stimulantia, quæ his præcipue apoplecticis nocent quammaxime. E contra fomentationes, cruriluvia, clysmata emollientia quam aptissima sunt reputanda. Quod si suspicemur primis viis faburram inesse, quæ flatus pariat, aliasque turbas hypochondriacas augeat; purganda est leniter alvus, idque blandis remediis præstare juvabit.

263. Ast inter hypochondriasis symptomata frequentissimæ sunt hæmorrhoides; licet non raro hæmorrhoidibus sint obnoxii, qui nequam sunt hypochondriaci. Inter hos tamen, qui sanissimi, fortes, vegetique non sunt, spasticis abdominis turbis conflictantur, quotiescumque ex intervallo instat hæmorrhoidum fluxus, uti adnotavimus. His quoque ægris accommodata est methodus supra descripta. Curandum

tamen est, ut & fomentationum, vaporumque usu, imo vero & hirudinum ope hæmorrhoidales venæ deconserentur.

264. Si vero mulier apoplectica evadat ex eo, quod menstrua cum difficultate, ac dolore fluant; in primis emitatur sanguis necesse est, ut vasa uteri nimis distenta expediantur. Quum vero in hujusmodi apoplexia maximum ferant auxilium menstrua facilius, atque copiosius fluentia, uti & LORRYUM observasse vidimus (n. 140.); adhibenda ideo sunt, quæ ad hunc effectum aptiora videntur, remedia. Ex his tamen res pue stimulantia, præcipue si adsit nimia fibræ irritabilitas, nervorumque mobilitas, quæ fere semper hunc morbum quidem comitari solent. Tunc optimum præstabunt effectum fomentationes, semicupia, clysmata emollientia, sedantia, antispasmodica, atque similia.

265. Quum vero abdominales spasmi excitentur a materia podagrifica; quæ in nervis abdominalibus se se manifestet, ibique atona sœviat; tunc post pedis venæ-sectionem sedantia adhibenda sunt remedia. Hisce peractis præstat topicis remediis insidiosum fomitem ad extrebas ignobiliores partes invitare. Hinc adhi-

beantur fomentationes, pediluvia, epispastica, atque vesicatoria. Celeber HALLERUS labore solebat podagra: quam quidem, si quando vel infimum ventrem divexaret, vel aliam, quam nollet, partem, ad pedes revocabat pediluviorum ope, quæ ex sinapis decoctione parabat. Inter adjuvantia subtilissimi fomitis transmigrationem ex uno loco in alterum memoratur a præstantissimo MURRAYO (y) nixus signanter partis cujusdam intensior. Stimulata enim, siue debilitata a nixu pars ad suscipiendum virus alicubi latens aptior evadit. Valida ergo extremarum partium defricatio, atque distensio poterit maxime prodesse.

266. Si vero deglutitio impedita non sit, juvabit uno, eodemque tempore ad naturæ vires augendas ægro exhibere aliquantulum vini Canariensis, sive Burgundiensis, uti innuit LIGERUS (z). SYDENHAMUS quoque, atque MUSGRAVIUS energica vina commendant paullatim sumpta, præcipue quum podagricus fomes stomachi, ac intestinorum excitat turbas antequam

(y) De Materia Arthritica ad Verenda aberrante Disquisitio. Goettingæ 1785.

(z) Traité De la Goutte Part. III. Chapitr. XI.

extremitates occupet. In hujusmodi tamen apoplexia caute procedendum.

CAP. XXI.

Ratio Curandi Apoplexiā ex venenis per os sumptis, fungis, Opio, aliisque similibus.

267. **S**i quis corripiatur apoplexia, quæ a veneno per os sumpto exoriatur, difficile est peccariam, appositamque præscribere medendi rationem. Quapropter opportunum videtur, aliquot generales veluti regulas recensere, quas jam præclarus protulit CULLENIUS (a).

Primo ergo qui apoplecticus evadere videatur paullo, postquam venenum sumpserit, si spon vomit, arte quoque ejus vomitus promoveatur; si contra id non faciat sponte, Medicus cœt, ut arte statim e stomacho sumptum venenū extrudat. Qui vero veneni jam pridem impati actionem sero persentiat, ille aut nullam utilitatem ex vomitu, aut damnum quoque peipiet.

(a) Loc. t. Cap. De Apoplexia ex venenis.

Secundo . Admodum probabile est venenum jamdiu sumptum , quodque apoplexiā fecit , aut in cerebro humores aliquos congesſiſſe , aut motum humorū ſaltem imminuiſſe in cerebri vasis . Præſtabit ergo e jugularibus ſanguinem mittere , ſive brachialibus .

Tertio . Supposita in cerebro humorū motus imminutione , eorumve congeſtione , adi- benda erit ea medendi methodus , quæ tū congeſtiones tollat , tū humorib⁹ naturalib⁹ reſtituat motum . Hinc generatim acriora cſ- mata alvum exonerando adjumentum ferent

268. Verum , ſiquid ego video , ultro requiruntur : nihil enim imminutionis māis , nihil congeſtione , ut plurimum , metuerum eſt , quibusdam agentibus venenis , quæ veſan- guinem ita ſolvunt , ut hoc ipſo apoplexiā cum morte ferant , vel convulſiones excando necant . Hæc autem exitia augeri imo oſſent aliquando ea medendi ratione , quæ ad otum ſanguinis accelerandum , vel ad congeſtices au- ferendas iſtitueretur . Aſt in præſenti nequi- mus hac ſuper re ex professo diſſerere .

269. Interim noſtris in regionib⁹ ve- na , quæ frequentius mortis apoplecticapericu-

lum inferunt, sunt fungi, & Opium. Si ergo ab Opio nimia quantitate sumpto pendeat apoplexia, omnia adhibenda sunt, quæ ægrum a sopore excitare valent: vena secanda, si adhuc vigeat pulsus, frigidusque absit sudor, emetica energica sunt exhibenda, ut tartarum emeticum, & vitriolum album, præcipue si sensum amiserit ventriculus, suamque irritabilitatem.

270. Sed præstantissimus MURRAYUS (b) experimentis innixus memorabilem affirmat potentiam ad Opium debilitandum inesse Ipecacuanhæ; quæ vel sola potest exhiberi, vel aliis utiliter emeticis addi. Etenimvero Puella quædam unciam bibit tincturæ, in qua scrupulus Opii continebatur: at licet sopore, convulsioribus, & spasmis vexaretur, e periculo tamen evasit sumens iterum iterumque Ipecacuanham (c). At quantum ista sit potis vim infringere Opii, indubie patet ex pulvere DOWERI, in quo duo, vel plura continentur Opii grana, totidemque Ipecacuanhæ. Hujusmodi enim pulvis unice sudorem promovet, ut ex quotidianis præcipue constat Anglorum observationibus.

(b) Appar. Medicam. Tom. I. Ord. XIII. pag. 444.

(c) MURRAY Loc. cit. ex SMITH Dissert. de Spasmis.

Si vero pharynx , & œsophagus spasmo contrahantur , ut nihil deglutiri possit , tunc remedia per tubum metallicum demitti jubet BOERHAAVIUS . Quod si jamdudum Opium ab ægro sumptum fuerit , præstabit loco emeticorum maximam aquæ limonatæ , sive aceto mixtæ quantitatem propinare , & clysmata ex aqua , & aceto injicere . Quum vero insultu jam devicto , stupor maneat , tristitia , atque debilitas ; occurrere hisce oportet aqua frigida , sale absynthii , & sale quoque viperino parva dose propinato .

271. Par autem esse debet ratio medendi etiam iis , qui aliis narcoticis opprimantur . Stramonium enim , Bella Donna , Hyoscyamus tum in corpore viventis , tum in ejus cadavere eosdem , quos Opium , pariunt effectus . Agentibus enim venenis hujusmodi , totius corporis calor satis augetur , facies rubet , pelle exiliunt maculæ quædam , veluti echimoses , externus orbis palpebrarum præsertim nigrescit : saepe etiam ex oculis , ex naribus , ex auribus , atque ex ano exprimitur sanguis : pulsus vero pleni sunt , vividique ; oculi fulgentes , os spumas agens ; lenta respiratio , membra rigescencia , & aliquando convulsa : si vero ad sanitatem

tem redeant, incommidis capitibus torquentur. In eorum vero cadaveribus ea pariter obser-
vantur, quæ in cadaveribus ex mephiti, aut ex
Opio defunctorum.

272. Quum vero BOERHAAVIUS, cui sub-
scripserunt HALLERUS, TRALLESIUS, LUDWI-
GIUS (d), aliquique plures, multam Opium inter
& vinum affirmaverit analogiam; ideo (qui-
cunque cæterum sit hujusmodi analogiæ gra-
dus) præstare videtur curationem hoc loci tra-
dere apoplexiæ, quæ ex ebrietate gignitur ali-
qnando. Siquis ergo ex hac causa apople-
cticus fiat, primo æger pronus locetur, aut
ita saltem, ut facile evomere possit: imo ve-
ro si ventriculus turgescere videatur; tunc aut
guttur irritando, aut potionem ex oleo, &
aqua tepenti exhibendo, vomitum promovere
necessæ est. Maximam vero afferent utilitatem
clysmata, quæ & irritando alvum deonerent:
mergantur tandem aqua tepenti ebrii crura.
Si vero liceat, tentanda est venæ-sectio.

273. Si denique a fungis gignatur morbus,
emeticum statim exhibendum est, vomitumque
decoctione altheæ, oleoque magisque pro-

(d) MURRAY loc. cit. Tom. II. pag. 196.

movendum. Quum vero admodum difficile sit hoc in casu vomitum excitare, optimam propterea opem fert Nicotianæ decoctione clysteris ope injecta, utpote quæ adeo necessarium vomitum excitet. Hac decoctione ab imminente morte erepta fuit anno 1761. Princeps fœmina de CONTY, uti refert Clariss. POUTETUS (e), a fungis venenata: hoc enim tandem remedio vomitus excitatus est, postquam alia plura emetica frustra jam tentata fuerant.

CAP. XXII.

Ratio Curandi Apoplexiā, quam faciunt Vapores Mephitici.

274. Quum de venenis hic sermo sit, haud absconum erit methodum subinde tradere curandi eas apoplexias, quæ ex mephiticis exoriuntur vaporibus. Et primo quidem hujusmodi apoplecticos extrahamus oportet, sive a sepulchris, sive a cellis vinariis, sive ab aliis subterraneis locis, in quibus miseri moriebantur. At qua ratione id, sine alterius mortis periculo, præstare licebit?

(e) Memoires de L' Acad. Roy. de Medicin. an. 1776.

275. Notum est aerem loci subterranei, sive sepulchri purgari, & ad respirationem idoneum reddi ignis ope, quam quidem facilius suppeditat pulveris pyrii explosio. Contra vero aer, qui in cellis vinariis, similibusque locis, fermentescentibus onustus est vaporibus; purgatur, & ad respirationem aptatur, aquæ ope. Quare diversa methodo destruendæ sunt causæ diversæ, quæ mortem mortalibus minantur. Quæ quum ita se habeant, diversimode quoque mederi debemus hujusmodi apoplecti-
cis: quæ enim ratio curationis unum juvat vel maxime, eadem alteri omnino nocebit.

276. Jam vero hac apoplexia correpti sive a sepulchro, sive a cella vinaria, sive a con-
clavi vaporibus carbonum referto sublati, aeri-
que aperto expositi, statim methodo, quæ me-
lior inventa est, nobis tentanda est curatio.
Non enim miseri hujusmodi negligendi sunt,
licet a pluribus horis spiritu exinanita videan-
tur cadavera: haud veram indicant mortem
pulsus, respirationisque defectus, membrorum
rigor, & insensilitas; quemadmodum oculi vi-
ventis similes, membrorum flexibilitas, & ca-
lor haud semper vitam significant.

277. Statim ergo aqua frigida abluendus est æger: res esset periculo plena cum super cineres calescentes sternere, pannisque calefactis fovere, licet haec satis juvent aquis submersos. Eidem quoque noceres, si in ejus anum induceres fumum nicotianæ. Hujus enim vis narcotica haud parum damni invehet in ægrum, cuius irritabilitas, atque sensilitas sint imminutæ valde, & forte etiam extinctæ. Præterquamquod, fumus nicotianæ, quum multum aeris, dum injicitur secum ferat, nimis intestina distendit: hinc urget dia phragma pulmones versus, iisque figit ferme: quare tum auget suffocationem, tum eam, quæ nimis ibi dominatur, humorum rarefactionem. Acetum itaque aquæ immixtum, & injectum sati irritabit intestina, rarefactionem minuet, atque hinc maximo erit adjumento ægris hujusmodi.

278. Non me latet plerosque censere nicotianæ fumum minus officere aqua submersis: iisdem tamen, quos asphixia gradus extremus occupat, melius consulas, si ab hujusmodi remedio abstineas omnino; juxta recentiores observationes, quas apud Gallos PORTALIUS, apud Italos pluries instituit TESTA (f).

(f) BIANCHI loc. cit.

279. Est igitur curandum in primis, ut diximus supra, ut multum aquæ frigidæ in caput eorum infundatur, qui ex mephiticis exhalationibus, & signanter ex vaporibus carbonum apoplectici evasere: id enim satis, ac cito eos juvat. Sanguis eorum ad summum, ut constat, rarefactus aspersoribus hujusmodi densatur, & ad naturalem statum facilius restituuntur.

280. Nec minus nitendum, ut eorum cerebrum valde oppressum levetur, motusque sanguinis jam pene sufflaminatus augeatur: hinc venæ-sectio instituenda, signanter vero jugularium. Major autem sit, vel minor emissio sanguinis; iteretur etiam, prout rerum postulabunt circumstantiæ.

281. Verum sanguinis motus restituitur etiam, aptis in pulmones insufflationibus. Quo vero purior, majorique elasticitate donatus inducatur aer in hujusmodi apoplectici pulmones; eo magis, citiusque juvabit. Hinc minus aptus quidem censetur aer, quem homines expirant: at nihilominus fiat hæc insufflatio; quæ licet minus apta sit ad effectum, commodius tamen obtineri potest, citiusque. Felici eventu mu-

nerabatur pietas Chirurgi TOSSACHII (g): Ipse enim in os rustici cujusdam ex fumis apoplectici ore suo, tamquam Salvator, ut scribit SAUVAGESIUS, fortissime inspiravit, unde pectus ægri paullulum dilatatum, & cor pulsare cœpit. Hoc autem præcipue auxilio iterato post horam oscitavit, post alteram motum, sensusque recuperavit omnium anteactorum immemor. Sed in horum apoplecticorum pulmones induci potest aer quoque atmosphæricus: idque sive siphonis ope, sive idonei follis. Quod si ægri os sit præclusum; per nares idem aer invehi potest.

282. Opportunum quoque est hujusmodi ægromum corpus fricare: sic enim ad circumferentiam a centro moti revocantur humores. Extant quamplurima exempla apopleticorum hujusmodi, qui uno frictionum usu convaluerunt omnino (h). Præstat autem eosdem fricare manibus, sive pannis accepto intinctis: sic enim densantur rarefacti humores.

283. Remedium insuper censetur aptissimum *fluor alcalinus volatilis*. Hac vero me-

(g) Eff. d' Edimburg Tom. VI. Art. XXXVI. Tota hæc ipsa observatio videri potest etiam apud MARTINIUM Della Morte apparente degli Animali ec.

(h) MICHAEL ADOLPHUS Dissert. De Friction. apud BLANCHUM Loc. cit. & apud MARTINIUM Loc. cit.

thodo remedium hoc adhiberi solet: primo quidem duo veluti fusuli chartæ dicto liquore imbuti in nares inducuntur; deinde ejusdem spiritus guttæ decem, aut duodecim aqua immixtæ deglutiendæ exhibentur. Huic tamen remedio anteferunt alii celebrem, quam dicunt *Lucis* aquam; quæ ex spiritu salis ammoniaci, & ex oleo karabis componitur. Non impedita vero deglutitione, aquæ limonatæ potus est exhibendus.

284. Postremo observationibus iterum, iterumque institutis compertum est, plurimos hujus speciei apoplepticos convaluisse vapore electrico in eorum corpora invento. Hic quidem vapor, quum valde, ac cito agat in omnes corporis partes extimulando, imo vero immediate in cor ipsum, potest ejus rursum excitare maximam irritabilitatem, quæ vitæ fons, & origo censenda est. Observationes autem, quibus hujus remedii patet utilitas, videri possunt apud plures Auctores, apud celeb. præcipue BERTHOLONUM (i), & apud humanissimum BLANCHUM (k).

Q

(i) De L'electricité du Corps Humain Dans l'etat De Santé, et De Maladie Tom. I. pag. 517. et suiy. et Tom. II. pag. 91.

(k) Loc. cit.

*Ratio Medendi Apoplexiæ, quæ ex pectori
male affecto exoriatur.*

285. Expositum fuit (n. 172.) apoplexiām haud raro exoriri, quum spasmus pectoris viscera, eorumque vasa perīstringens viam præcludit sanguini e cerebro in cor regredienti. Tunc ergo nitendum est, ut spasmus auferatur: hoc autem in casu utilem, vel maxime futuram censeo sanguinis missionem ex jugularibus. Hæc enim, observante Celeber. HALLERO (I), non modo pulmonem levat, qui spasmo obstrictus solet sanguine opprimi; sed & sanguini in cor refluenti viam sternit, eique etiam quiescenti restituit motum. Si vero spasmus pectoris a materia irritante exoriatur in primis viis latente; tunc præmissa venæ-sectione irritans causa est evacuanda.

286. At vidimus quoque apoplexiām gigni, siqua pars, quæ pectori insideat, materiei vitiatae de prima sede demigret, & aliquo modo

(I) Memoires sur le mouvement du sang pag. 301. ac Element. Physiolog. Tom. III. Lib. VIII. Sect. IV.

in nervos cerebri transferatur. Quæ materies & solo pectore detenta, sympatheticam apoplexiam efficere potest aliquando, si nervos pectoris torqueat spasmo, qui cerebro communicetur. Apoplecticis hisce ea sunt exhibenda remedia, quæ juxta diversam causarum vellicantium, five prementium naturam, accommodatoria videantur. Siqua tamen methodo fieri possit, nitendum est fere semper, ut e pectore materies vi- tiata exturbetur.

CAP. XXIV.

*Ratio Medendi Apoplexiæ Nerveæ Idiopathicæ,
Et primo illi, quæ a summa præcipue nervorum sensibilitate, ac mobilitate exoritur.*

287. **Q**uid agendum, quum apoplexia est vere convulsiva, quumque exoritur a solis nervorum turbis, eorumque motuum irregularitate? Nos remedia feligenda docebunt morbi gradus, Ægri temperamentum, vires, ætas, sexus; maxime vero ejus major, vel minor sentiendi vis, mobilitas, irritabilitas, atque proctheticæ caufæ indoles, qua in ægro nervi male afficiantur.

Si morbus ergo ad summum pervenerit gradum, præstabit continuo aerem liberiorem redere, faciem frigida aspergere, nares aceto irrorare: si vero ægra sit hysterica, graveolentes diffundantur odores, clysteresque suppeditentur anti-spasmodici, quibus & Opium addatur, præsertim si causa adsit dolorifera, atque irritans. In ægris enim peculiari irritabilitate, ac sensilitate præditis ad deglutitionem restituendam clysmata Opio commixta laudantur valde (m). Si contra morbus haud maxime sœviat, præ oculis habere debemus pediluvia, fermentationes, venæ-sectiones; antispasmodica interna, inter quæ præcipue valerianæ infusum, vel quidquid tandem habet spasmum compescere, & sensilitatem nimiam moderari.

288. Verum (n. 90. 91. 92.) afferuimus prægnantes, parientesque mulieres, utpote spasmodis nervorum, ita & nerveæ satis obnoxias esse apoplexiæ. Nitendum ideo in primis est, ut causæ arceantur a mulieribus hisce tum physicæ, tum morales, quæ habent earum nervos urgere, atque adeo pericolosum morbum exci-

(m) MURRAY loc. cit. Tom. II. pag. 216.

tare: consultius enim est illum evitare. Avertantur ergo ab illis, quam fieri potest, animi commotiones, metus signanter mortis ex partu, qui illarum infensissimus nervis solet eas sæpe torquere.

Quod ad causas vero physicas, quæ plures esse possunt, hoc unum attingam; gravidas nempe mulieres plethoræ sæpe, ac phlogisticæ diathesi obnoxias esse, uti adnotavit TISSOTIUS (n), idemque ego quidem pluries observavi. Ergo causæ nervis infensæ nimis, quæque possunt peculiari vi apoplexiam promovere. Expediet itaque in prægnantibus plethoram compescere, phlogisticamque dispositionem: quod quidem illis haud parum afferet utilitatis partus tempore, ac puerperii.

289. At quoniam partus præsertim angustiæ, ac puerperii difficultates minantur eam, de qua agimus, apoplexiæ; idcirco inter ejus remedia præservativa Opium eminere videtur. Me quidem haud latet Opium ab aliquibus reprobari Clariss. Viris (o): ast in extremis præsertim partus nixibus, ac protinus expleto partu

(n) Tratt. De' Nervi Tom. II. Part. I. Cap. VIII.

(o) LEVRET L'Art Des Accouchem. pag. 138.

optimum videtur aliquando futurum . Tunc enim animus agitatur quammaxime , & corpus ; ideoque spasmus dominari solet semper metuendus . Quare viri experientissimi , ut spasmum vel averterent , vel compescerent , Opium suppeditarunt . Hos inter SWIETENIUS recentetur , qui sic loquitur : *candide fateor me semper adhibuisse opiate post partum , nec poenituit unquam , cum sancte testari possim , quod nunquam inde ullam noxam viderim* (p) .

290. Opium vero magis videtur adhibendum , si puerpera sit convulsionibus obnoxia , si que illis præcipue tempore graviditatis fuit conflictata . Neque hujus remedii vis calefaciens est metuenda : phlogistica enim dispositio , si qua adsit , retundi poterit apta venæ - sectione ; & Opium parva dosi iteratis vicibus propinatum vim præcipue exeret spasmos compescentem . Quod adeo verum est , ut viri præclarissimi Opium exhibeant & in morbis inflammatoriis omnino , dummodo adsit spasmus (q) .

291. Neque ab Opio est abstinendum si viribus ægræ deficiant , pulsusque arteriarum pro-

(p) Comm. Aphor. 1324.

(q) MURRAY loc. cit. pag. 202.

dant exiguos, sive evanescentes: cordis enim motum auget, pulsusque roborat, expanditque (r). Hoc idem cum plerisque affirmat TRALLESIUS (s) se observasse in iis quoque, quorum pulsus ob nimias evacuationes torpuit valde. Quid vero, si adsint hæmorrhagiæ, earumve metus? Videbimus alibi, Opium hæmorrhagias amovere, atque sedare.

292. Ex dictis huc usque colligitur in hoc morbo adhibenda esse remedia tantum sedativa, anodyna, antispasmodica; rejicienda autem esse stimulantia. Sed quod ad stimulantia; numne & vesicatoria semper vitanda sunt & omnino in spasmodica apoplexia? Licebit ne unquam ea ægris præcipere, qui natura sint, aut pro tempore sensiles satis, irritabilesque? Approbandum omnino videtur hoc generale principium, quod nempe abstinendum sit a stimulantibus, si de spasmodica, seu convulsiva agatur apoplexia. Ast in medicis generalia principia satis coarctantur: si enim intuitu primo videntur lumen nobis afferre, nos ipsos tamen dubitatione, atque obscuritate obrutos relinquunt, quum ad parti-

(r) MURRAY loc. cit. pag. 191.

(s) De Opio Sect. I. pag. 64. apud Murrayum loc. cit.

cularia discutienda descendimus. Videndum igitur est, quibus casibus possint, quibus nequeant aptari ea generalia principia, suique limites statuendi sunt. Quæ quidem omnia præstare unice possunt sedula observatio, atque experientia.

293. Quod vero ad rem pertinet nostram; negari quidem nequit, vesicatoriis inesse extimulantem vim, quæ sæpiissime maximos vehit spasmos, & irregulares in eos, qui sensiles valde sunt, atque irritabiles. Quapropter HOFFMANNUS (t) scripsit sequentia: *si corpus acutioris sensus est; si æger a levissima causa movetur, magnasque facile in corpore experitur mutationes, ætas juvenilis, habitus corporis strictior, & malilentus; morbus etiam in paroxysmo, & impetu constitutus, vel locus, cui vesicatorium apponi debet, admodum nervosus, longe major motuum exacerbatio cum præsentaneo damno inde expectanda; ea propter ab iis abstineri consultius est.*

294. Sed contra e plerisque constat observationibus (u) cantharides ipsas habere ali-

(t) *Dissertat. De Vesicator. usu 6. XIV.*

(u) *Vide inter cæteras. Prima Raccolta di Osservazioni Mediche pag. 113, e segg. del Dottissimo Dottor TARGIONI TOZZETTI.*

quando convulsivos morbos compescere, eosque sanare. Hinc perspicaciores quidam Medici sibi suadent, nervos cantharidum actione diversimode extimulari, quam ab aliis extimulantibus: ex qua diversa irritandi ratione salutares repertunt, quos in morbis convulsivis aliquando vident, effectus. Consiunt enim, cantharides nunquam stimulos excitare irregulares, atque tumultuarios in nervis, quos contra supponunt ab earum actione æquabiliter corroborari, aut saltem ab ipsa eam debilitatem, mollitiemque nervorum imminui, quæ est fomes turbarum, juxta Recentiores, atque irregularitatum, quas in nervorum systemate observamus.

295. Quidquid tamen de hac explicatione sentire velimus; haud equidem ex negligi possunt observationes, ex quibus deprehendimus, vesicantium actionem aliquando profuisse morbo convulsivo laborantibus. At quum pariter comprehendum sit, vesicatoria, ut supra innuimus, maximas turbas, irregularitates motuum periculo plenas, spasmosque satis perniciosos in iis sæpe promovere, qui neryis ægrotant; hinc difficile est statuere, quibus, & qua ratione apponendum sit vesicatorium correptis apoplexia, quum

vel omnino a nervis, vel saltem pendeat ex parte.

296. Præcipue tamen animadvertisendum videtur, quoad hos ægros, eam vesicatoriorum signanter attendendam esse actionem, quam exercunt in partes corporis solidas: spasmodicæ quidem apoplexiæ a solidis, non vero ab humoribus, ferme semper pendere videntur. Hinc juxta solidorum diversam constitutionem, diversos in his vesicantia gignent effectus. Quare si partes solidæ generatim rigescant nimis, distendantur, extimulentur; si nervi præcipue plusquam satis tenelli existant, nimiumque mobiles; a vesicatoriis abstinentendum est omnino.

297. Videtur vero, exhibitis primum cæteris tutioribus remediis, & vesicatoria apponi posse ægris, a quorum tum nervis abesse deprehendatur teneritudo illa summa, mobilitasque, tum ab aliis solidis illa nimia rigiditas, atque distentio, quas modo commemorabamus. Sperandum enim forte esset, quod aucto in nervis quibusdam motu ex vesicatoriis, in aliis autem eo imminuto, tunc irregularitas motuum auferatur, & quoddam veluti æquilibrium exsurgat inter diversas totius systematis partes;

sicque tollatur morbus. Novit iamdudum HIPPOCRATES, suborto in duobus membris dolore, stimuloque, alterum ab altero saepe compesci. Quod vero id observassent Medici aliqui, vesicatorium, ut puto, inter anti-spasmodica recensuerunt remedia (x).

298. Ex hac vero, quam dicam libenter *revulsionem nervosam*, intelligi potest, qua fiat ratione, ut spasmus in membro aliquo excitatus arte, in alio spasmum morbosum, ac perniciosum destruere possit. Neque aliter mihi videtur explicari posse, cur convaleant partes convulsæ, spasmoque locali lacefitæ, adhibitis tempestive extimulantibus. Si enim dolor colicus saeviat convulsivus, non ne evanescit, aliquando vesicatorio, quod ventri apponatur? Addendum est quoque sympathias (quidquid sit de ratione, qua eas explicare conantur) sati innuere salutares hujusmodi nerveas revulsiones dari posse. Ipse Cel. TRALLESIUS, licet saepe vesicantia improbet ægris, quibus ea probant alii celeberrimi Viri; non tamen in morbis nervorum ea rejicit omnino. In sexta enim

(x) Bibliothèque Méd. Phys. Du Nord Tom. I. pag. 31.

regularum, quas Ille ad usum vesicatorii rectum in morbis sancivit, ita se se exprimit: (y) *In morbis nervorum a sola ataxia spirituum, ad stylum SYDENHAMI, pendentium caute cum vesicantibus agendum.* Itaque procedendum caute commendat, ab ipsis tamen non absterret omnino.

299. Ego quidem fateor me quammaxime abhorrere a vesicatoriis, atque a stimulantibus quibuslibet, siquidem agatur de morbis a sola *ataxia spirituum*: sed quum rerum circumstan-
tiæ id ferre videbantur, aliquando adhibendum duxi hujusmodi remedium, quod & profuisse multum deprehendi. Memoranda præ cæteris videtur quædam D. PORTA, quæ sæpe horren-
dis artuum convulsionibus erat obnoxia, hysteri-
cisque suffocationibus ita validis, diutinisque,
ut mortem illi imminere sæpe putarent adstan-
tes. Die quadam vocatus eam inveni hysteri-
co caro, ut ajunt aliqui, detentam: initio qui-
dem exergiscebatur, sed momento temporis:
subinde per horas ferme viginti opprimebatur
omnino. Post omnimodam quietem aliqua sup-

(y) Loc. cit. Sect. Post. pag. 5.

peditabam artis auxilia; sed nihil illi proderat. Vesicatoria tandem præcepi, quæ cruri utriusque apponenterentur; eorum actione convaluit omnino, ac cito.

Quod quidem observavi terve, quaterve in quadam nobilissima Moniali, quæ carc hysterico adeo diutino obnoxia erat, ut plus semel eam metuerem apoplecticam futuram. Aliis Ipsa remediis nihil aliquando adjuta, vesicantium ope convalebat omnino. Liceat tamen hoc loci adnotare, quod nunquam capiti, sed partibus ab eo remotis semper apponenda vesicantia præcepi.

Ex hisce ergo satis constare videtur, non semper, & omnino in nervosa, ac vere convulsiva apoplexia a vesicantibus abstinentum; sed imo ex hoc remedio multum aliquando levaminis esse expectandum, dummodo idonee, atque tempestive adhibeatur.

*Curatio Apoplexiæ, quam peculiariter
diximus Sensorii Communis.*

300. **L**icet omnis unice nervea apoplexia possit ex spasmo, sive paralysi, sive quacunque alia insensibili *sensorii*, ut ajunt, *communis* lœsione inferri; hoc tamen loci dicimus cum BOERHAAVIO apoplexiæ præcipue *sensorii communis* (n. 84.), quæ ab animi commotionibus gignitur: quæ licet aliquando sanguinea quoque sit (n. 85.), aliquando biliosa (n. 150.), tamen haud raro invenitur simpliciter nervosa. At vñ illi, qui hujusmodi corripiatur apoplexiæ. Medicos semper terruerunt vel maxime morbi, quos animi motus, affectusque efficiunt: eos enim fere semper observarunt aut cito, aut sero in mortem desississe; aut saltem ex his difficultime, & raro homines convaluisse.

301. In apoplexiæ ab hac causa orta fatendum quidem est, omnia in corpore in tegra videri aliquando: re tamen vera principium illud extinguitur, quod sentit, movet, *impetum facit*. Id autem animadversione dignum; quod

nempe principium illud *impetum faciens* aliquando velut suffocant materiales causæ ; quum ex. gr. sanguis coacervatus cerebrum opprimit : sublata tamen ejusmodi compressione principium illud reviviscit, solitasque vires resumit ; quod quidem rarius observamus, si agat in illud immaterialis causa ; videlicet, ut supra diximus, animi motus, affectionesque. Tunc principium illud enervatum aut quam difficillime reficitur, aut extinguitur penitus ; interitusque certus subsequitur. Hinc optime scripsit BOERHAAVIUS : (z) *Patet ratio, quare Medici in aliis curationibus felices, hic deficiant; quia causa latet in hoc mobili sensorio communi, ita ut barum miseriарum saepe tantum testes esse possint.* Hoc fatebatur quoque HELMONTIUS dicens : *quando apoplexia oritur a superbia ideæ, hanc remedia Paracelsica non curant, nam malum est spirituale.*

302. In tanta nihilominus curationis difficultate illud animadvertendum puto, quod nempe violentæ animi commotiones, ut plurimum, in cordis viciniis, sicut vidimus, magnam co-

(z) *De Morb. Nerv.* Tom. II. pag. 224.

gunt sanguinis quantitatem: hinc venæ - sectio , si per circumstantias licebit , haud parvi subsidii aliquando esse poterit . Præterea apoplexico ex validis quibusdam animi perturbationibus juvamen afferre possunt frigidæ ablutiones ; habent enim compescere humorum rarefactionem , quæ hisce in casibus solet deprehendi .

CAP. XXVI.

Curatio Apoplexiæ , quæ ex dolore originem ducat .

303. **Q**uum dolor immanis cerebrum ita afficit , ut apoplexiā gignat , quæ statim haud mortifera sit ; curandum cū remediis excitantibus , præcipue aceti usu , ut æger velut exanimatus reviviscat . Continuo vero nitendum , ut doloris causa amoveatur .

304. Sed aliquando neque doloris causam Medicus detegere , nec potest removere . Tunc remediis uti oportet , quæ sin minus causam , doloris sensum saltem auferant . Si enim compressione validissima , aut sectione , aut quovis modo commercium auferatur inter partem do-

lentem, & cerebrum, permanente doloris causa, ejus sensus perit omnino. Aliquando vero nec præstat, nec potest sive doloris causam, sive commercium illud auferri : tunc reliquum est, ut nitamus facultatem cerebri sentientem narcoticorum usu sopire.

305. Expediet semper spasmodum cerebri, ut ajunt, priusquam exoriatur, arcere, Opium exhibendo, quum dolor sœvit valde ; idque præstabit, licet dolor inflammatorius esset. Hujusmodi vero remedium opportunissimum videtur in dolore intestinali sive convulsivus ille sit, si-
ve inflammatorius : in hoc tamen consultius erit Opium suppeditare post venæ - sectiones, clysteresque emollientes. Vidimus jam (n. 120.) passionem iliaca vehementem gignere aliquando spasticam apoplexiā : sed ad illam quidem passionem compescendam Opium præcipue requiriatur, a quacumque causa ea ortum habeat, maxime vero si simpliciter *spasmodica* sit, quam quidem observavit, & scitissime descripsit præstantissimus CALDANIUS (a). Experientia ali-

R

(a) Societ. Italic. Tom. IV. pag. 311.

quatenus hæc confirmat HAENIUS (b) asserens
in *Colica Piætonum ad præcavendam paralysin,*
Opio nihil præstantius dari, potentiusque, propter
dolorum sopimentum.

CAP. XXVII.

Curatio Apoplexiæ, quæ oritur ex exinanitione.

306. Ut recte apoplecticis hisce medear-
mur, exploranda est evacuationis species, quæ
apoplexiæ fecerit nervorum vires infirmando.
Hæc enim si ab hæmorrhagia efficiatur; tunc
curandum in primis est, ut hæmorrhagiam com-
pescamus, atque sistamus: subinde odoribus,
ac aliquo spiritu æger est excitandus; &, si fieri
potest, cibo, potu, somno, ac quiete reficien-
dus. Sed jam fere cito pereunt hujusmodi
apoplectici.

307. Si ergo narium est hæmorrhagia, ad-
ministranda sunt omnia, quæ hanc sistere so-
lent: sed puerperas præsertim, ut vidimus, hæc

(b) Rat. Med. Part. III. Cap. II. pag. 103.

âdoritur apoplexia. Tunc curandum statim est, ut præter alia auxilia, Obstetrix in ægræ pulmones insufflans cordis nitatur irritabilitatem revocare; eodemque vero tempore hæmorrhagiam quoque sistamus, necesse est. Clariss. SAX-TORPHIUS (c) novam docet methodum, qua cohibeantur post partum uteri hæmorrhagiæ: innuit nempe aquam aceto permixtam in utero injectandam. Hac quidem repetita injectione sanabantur ægræ, licet ex hæmorrhagia jam frigidæ, quibus arteriæ pulsus, spiritusque deficiebant: sanabantur quoque, quæ ex pervicaci sanguinis fluxu convellebantur, atque deliquiis premebantur. Illud quoque adnotari meretur, quod iis ægris potum prius gelidum suppeditaverant frustra, gelidasque fomentationes.

308. Verum non debet hoc loci prætermitti aliud potentissimum in hæmorrhagiis gravidatum, ac parturientium susteridis remedium; scilicet Opium, quod in hæmorrhagia nocet, quæ vel ab aucto sanguinis motu, & expansione, vel ab illius putrida dissolutione exoritur; sed juvat quam maxime in hæmorrhagia, quæ

(c) Giornale Veneto per servire alla Storia ec. Tom. I.
pag. 446.

vel a spasmo, vel a stimulo nascitur, vel con-
junctum dolorem habet: *In fluxu nimio men-
sum*, inquit MURRAYUS (d), *vel hæmorrhagia
post abortum*, quæ in connubio doloris dorsi, *vel
abdominis non inflammatorio incidit*, *¶ reverti-
tur aucta vehementia*, *quoties vel dolor redit*,
vel increscit, *Opium adstringentibus omnibus est
præferendum*; & paullo post subdit, Opio hæ-
morrhagias uteri feliciter sisti prope finem gra-
viditatis obortas, illasque etiam immodicas, &
periculo plenas, quæ partum statim subsequuntur.

309. Videtur insuper, & rationi consonum,
quod experientia confirmat; scilicet Opium
cum spiritu vitrioli conjunctum majorem adhuc
utilitatem afferre in gravidarum, ac parturien-
tium hæmorrhagiis (e). Opium enim turbas
compescit; spiritus autem vitrioli impedit, quo-
minus illud humores accendat, ac rarefaciat,
motumque augeat circulationis.

Quod ad gravidas vero mulieres, evidens
est ad fœtus educationem deveniendum esse, si
hæmorrhagia supradictis resistat artis subsidiis.

(d) Loc. cit. Tom. II. pag. 224.

(e) Giornale per servire alla Storia ec. Tom. II. pag. 309.

& MURRAY Tom. II. pag. 225.

310. Quod si apoplexia ortum habuit ab excessivis alvi evacuationibus; tunc nitendum in primis, ut earum impetus retundatur, & quidquid stomachum irritat, atque intestina, vel leniatur valde, vel removeatur: stimulo autem existente, optimum remedium in Opio inveniatur. Subinde naturæ vitibus subvenire oportet ope cordialium.

311. Si vero apoplexia oriatur vel ab inedia, vel a mœrore, vel a marasmo senili, vel a quibuslibet dissolventibus, & consumentibus morbis; tunc ægri crura, pedesque calidis fricentur pannis; ejusque olfactus satis validis odo-ribus excitetur. Siquid vero deglutire queat, vinum exhibeatur, quod satis energicum sit: suppeditentur inde nutrientia, & tonica, quæ tamen non sint irritantia. Nova hic medela, inquit celeber. TISSOTIUS (f), adhibenda. Crassis humorum, & copia restituenda; motus vitalis languens excitandus; roborantibus itaque, nu- trientibus, & sollicita evacuantium evitazione nititur curatio. At semper fere lethalis est hæc apoplexia, quæ præcavetur magis, quam fana-

(f) Epist. var. arg. pag. 88.

tur, quoniam ultimæ elaborationis liquidum deficiens non adeo cito restituitur, uti se exprimit de hac loquens apoplexia TRALLESIUS (g).

CAP. XXVIII.

Curatio Apoplexiæ, ex acrimonia.

312. **D**ifficillima semper curatu est hujus generis apoplexia, quum suas in ægrum explicuerit vires. Quare prophylætica potius methodo præcavendum est, ne qui acrimonia quamque ad hanc apoplexiæ inclinati sunt, ab ipsa corripiantur: hinc variis morbi causis, ut ajunt, proegumenis aptanda sunt tum remedia, tum ratio præcipue vivendi. *Fateor*, inquit SAUVAGESIUS (h), *illas principiorum diversitates in apoplexiæ actuali curanda parvi esse momenti ob lethalitatem hujus morbi; verum iterum dico ad prævertendam apoplexiæ causarum proegumenarum varietas est attendenda.*

313. Quum tamen in hisce apoplecticis materia quædam acris, calida, ac subtilissima vi-

(g) Loc. cit. Sect. Post. pag. 39.

(h) Nosolog. Class. VI. Ord. V.

deatur nervos occupare, ut inter cæteros adnotavit SENNERTUS (i), & quum solidas corporis partes satis tensas; fluidas vero sulphureis, subtilissimis, acribus scatentes particulis adnotet SCARDONA (k); prædiligenda hinc erunt remedia, quæ refrigerent, humectent, sedent; cuius generis sunt clysteria emollientia, hordei decoctiones, lactis serum, & naturalis aqua.

314. Nec tamen negligerem semper, quæ possent remedia a capite dimovere acrem materiem, quæ ibi satis vigens infideret. Ab ipsis imo vesicatoriis multum juvaminis sperandum est, si in nervos dominetur materies, sive exanthematica, sive podagrīa, sive rheumatica, aliave hujus generis. Incipiendum tamen est a venæ-sectione, si apoplexia adoriatur ægrum sub morbi arthritici, vel rheumatici initio; si vero morbo invadat progrediente, & ægri fractæ sint vires, a venæ-sectione abstinentum est; & vesicatoria, & balnea irritantia sunt usurpanda. TRALLESIUS idem (l) ægris hisce probat vesicatoria.

(i) Lib. III. Part. V. Sect. II. Cap. IV.

(k) Loc. cit. Aphor.

(l) Loc. cit. Sect. Poster. pag. 6. & Sect. Prior. pag. 269.

315. Verum quum acrimonia etiam biliosa fere semper in hæc corpora sicca dominetur, illa eliminanda erit, aliqua præmissa venæ - sectione, pthysannis cum tamarindis, cassia; aut manna largo potu exhibitis; acria enim purgantia observatum est nocuisse quam maxime.

CAP. XXIX.

Ratio curandi Paralysim, quæ Apoplexiam generatim consequitur.

316. Observamus quotidie, apoplexia vel ingruente, vel declinante varios excitari morbos; & præcipue quidem apoplectici solent evadere hemiplectici: vidi tamen bis hemiplegiam præcessisse per plures dies apoplexiā. Brachia in hoc morbo majorem quam crura semper produnt læsionem, difficilioremque admittunt curationem: pulsus vero in parte paralysi affecta mollior est fere, quam in sana; & aliquando ob arteriæ paralysim pene evanescens. Interdum partes paralyticæ molem suam servant; interdum evadunt aut œdematosæ, aut atrophicæ, aut gangrænosæ: unicuique vero pa-

tet, primi generis hemiplegiaco minus esse metuendum.

317. Id autem adnotandum observavi, quod apoplexia aliquando deficit, aut saltem desinit valde, superveniente post tempus aliquod hemiplegia; non secus, atque si crisis fieret. Sed hanc hemiplegiam, ut ita dicam, salutiferam adnotamus præcipue, quum apoplexiā efficerit materies quædam, quæ in nervos subtilis, mobilisque dominetur.

318. Præterea in hemiplegicis alia quoque diversa observantur symptomata, prout cerebri status differt, ægrorumque natura. Aliorum enim paralysim comitantur dolores capitis, vertigines, aurium tinnitus, hisque similia: aliqui vero hemiplegiaci ventriculo laborant, vesica urinaria, aliisque incommidis juxta diversorum nervorum læsionem: alii vix ullam patiuntur animi sensationem, alii contra vel summe tristes, vel præter solitum hilares.

319. Paralysis ex apoplexia difficillimæ est curationis; imo semper metuendum, ne ipsa denuo invadat apoplexia. Pervicacior autem est, quæ serofam, sive pituitosam consequitur apoplexiā, quam quæ sanguineam. Major ve-

ro spes est curationis quum hemiplegia subsequuta est apoplexiam biliosam ; & major adhuc si spasmodica fuit apoplexia , dummodo æger sit non valde senex .

320. Quum itaque sermo hic sit de ea tantum paralyfi , quæ apoplexiā consequitur ; constat qua medendi methodo apoplexiæ , eadem vires retundi hemiplegiæ : exoriuntur enim iisdem ex causis . At quum apoplexiæ symptomata , ea præcipue , quæ cerebri compressionem significant , defecere , quumque longo tempore debilitatus est æger ; methodus curationis aliquando videtur , saltem ex parte , immutanda .

321. Si ergo paralysim fecit apoplexia sanguinea , omnia arcenda sunt , quæ humores ad caput incitant , majorique impetu propellunt . Optima erunt remedia venæ - sectio , copiosa diluentia , ut serum lactis , decoctum graminis cum oxymelle , copiosus aquæ mellitæ potus , hisque similia . Si vero stricta sit alvus , optimam ferent opem pulpa Tamarindorum , tremor Tartari , enemata emollientia . Sed præ omnibus tenuissima sit diæta oportet ; nunquam vidi hemiplecticum voracem (& plerique extant immodice voraces) diu vitam protraxisse .

322. Quod si paralysis a serosa , vel pituitosa gignatur apoplexia ; tunc remedia suppeditanda sunt , quæ validius agant . Hæc autem remedia sunt sapo venetus , extracta saponacea herbarum , salsa perilla , guajacum , sassafras , purgantia , diuretica , quæ parca dose iterentur , vesicatoria , atque setacea . In hac paralysi usum quoque probant mercurii : inter mercurialia vero seligendus videtur mercurius dulcis summam habens vim tenuandi , & evacuandi . Majori autem detecta humorum viscositate Kermes minerale sæpe suppeditavi , nec pœnituit unquam .

Præterea solamen afferunt membrorum frictiones cum aromatibus , ac spiritus vini vapores , quibus partes paralyticæ nudæ exponantur : neque inutile remedium forte erit , si nempe æger membra paralytica in vinacea recentia demergat : intus enim penetrabit efficax ille gaz , quo illa redundant ; sicque vasa omnia , omnesque fibras excitabit . Diæta vero sit paullo largior ex juniorum animalium carnibus , omnesque abjiciantur cibi , qui serum generant .

323. Verum sedulo vitandum erit quidquid stimulet , si paralysim fecerit apoplexia sim-

pliciter spasmodica, quæ ab una nervorum scilicet mobilitate pendeat, nimiaque sensitatem. Exposuimus supra (n. 62.) clariss. adstante POMMIO, Marchionem quemdam ex hac hemiplegia convaluisse balneis unice domesticis, parvi pulli gallinacei jure, pluribusque aquæ communis clysteriis. At contra res in pejus rubeant, imminebatque rursus apoplexia, quum ipse remedium sumeret ex valeriana, cinnamo- mo, & cascarilla. Aufugiendum est ergo semper a stimulantibus.

Laudantur quidem hisce præsertim temporibus arnicæ folia, ejusque flores in paralyssi, aliisque spasticis morbis, ac convulsivis. Sed efficax hocce remedium prudenti satis eget administratione. Sensus enim formicationis in artubus, & ventriculi molestissimum ardorem experiebatur quædam ægra, quam ego observabam, post glutitum florum arnicæ infusum. Alii vero vomitum observerunt, anxietatem, dolores lancinantes, & subinde quasi ab igne electrico succussions (m).

324. Si vero paraly sis orta sit ab apoplexia, quam fecerint substantiæ narcoticæ; tunc

(m) MURRAY loc. cit. Tom. I. Ord. III. pag. 133.

imo exhibenda sunt, quæ stimulent, remedia. Quod si apoplexia fuerit ex metastasi materiei herpeticæ (n. 116.), vel rheumaticæ, vel arthriticæ, vel scabiosæ (n. 117.) ; tunc post balnea tepida, & copiosa diluentia optimus erit usus internus antimonii: addantur quoque decoctiones ex lignis sudoriferis, & tandem vesicatoria, jus viperinum, thermæ, electricatio.

325. Sed aliquantulum hic immorari præstat ad tria hæc singillatim perpendenda remedia, quæ tum diversas in Medicos opiniones, tum varios invehunt in ægros effectus. Eorum itaque unum est jus viperinum, alterum electricatio, alterum thermæ. Hæ autem, ut onines norunt, ægris suppeditant aquas potandas, balnea, stillicidia, & luta; quæ omnia aliquando quammaximam hemiplegiacis afferunt utilitatem. At valde caute procedendum est: in paralysi enim, quæ apoplexiæ excipit sanguineam, quum tunc vel plethora adsit, vel saltem ad caput humores facile vergant, semper periculosa admodum sunt balnea thermalia, sæpe noxia omnino.

326. Neque prodeste possunt in paralysi ex apoplexia biliosa, nisi prius ab omnibus for-

dibus primæ viæ fatis expurgatæ sint: nocent
imo indubie, si primis viis biliosa adhuc insi-
deat colluvies.

327. Quod si morbum fecerit materies vel
rheumatica, vel arthritica, vel retropulsa sca-
bies, vel intermittens male judicata febris (17)

(17) Forte suum extra locum binas hic subdo observationes,
quum tantum relatæ fuerint in præsens a suavissimo Ami-
co, doctissimoque Medico ALEXANDRO BONELLIO: utra-
que enim prodit apoplexiam cum paralysi ex febri perio-
dica male judicata.

Quidam molestabatur ab annis aliquot periodica febri,
quæ eum solebat quocunque anni tempore hanc raro ado-
riri, & cui sensim conungebatur acrimonia quædam pseu-
do-scorbutica. Plus tamen solito ægrum vexavit a ve-
re usque ad autumnum labentem anni 1787. per id tem-
poris vix ope chinæ-chinæ aliquando quiescebat febris,
licet adhuc absque ullo dubio intermittens. Accessionem
comitabantur dolor lumborum, capitisque, ejusque stupor,
aliuando horrificationes, semper vero excessivæ oscita-
tiones; nec æger sitiebat unquam. Declinabat febris, at-
que evanescerat nulla omnino crisi. Postrema febris,
quæ eum corripuit mense Novembri haud cessit soli chinæ-
chinæ, quæ tamen illam vicit cum tartaro emetico con-
juncta. Æger sine febri traducebat dies quinquaginta,
viribus tamen mentis, corporisque exhaustus; sed de
improviso, quin ullum febris indicium adesset, hemiple-
cticus evasit, subinde post horas paucas apoplecticus cum

tunc a balneis thermarum multum boni sperari potest.

328. Aquarum mineralium balnea utilitatem afferunt quoque hemiplegiacis ex apo-

stertore , faciei pallore , pulsu exiguo , tremore , stimulis que ad vomitum . Post dies decem decessit .

Vir quidam nobilis temperamento ad atrobilarem vergenti praeditus quoddam post rheuma corripiebatur febri duplii , ut ajant , tertiana ; quæ quidem remittebat saltem , saepe etiam intermittebat omnino . Sub meridiem adventabat febris , comitantibus dolore sincipitis , oscitationibus violentis , tussique molesta : declinabat illa redeuntibus oscitationibus , quin ulla fieret sudoris crisis , aut urinæ : clausa imo semper erat alvns , ac pellis satis arida . Lenia exhibebantur purgantia , ad quorum actionem febris semper magis invalescebat : china - china autem expeditata febrim per aliquot dies omnino suspendebat : hisce tamen apyrexiae diebus Æger mente languebat maxime , & corpore . Redibat febris , quæ ter Cortici de novo cessit . Post febrim postremam , quam cortex suffocavit , stupebat ægro lava coxendix , ac mens ecclipsabatur : innovata rursus febri , quæ chinæ - chinæ subinde contumax restitit semper , exoriebatur sensim levis apoplexia , & perfecta hemiplegia . Post vicissitudines varias de repente evanuit apoplexia , quum in lava nate apparuerisset gangræna : post paucas dies Æger moriebatur .

Evidem video somitem febris periodicæ in hisce ægris eorum acrimonios commixtum egisse . Fatendum tamen est , generalia nervorum symptomata , ac particularia

plexia serosa , atque pituitosa , dummodo illa frigida sint . Balnea enim , itemque potus aquarum mineralium , quæ calidæ essent , vires ægri magis attererent , magisque membra relaxarent , & quidem metuendum esset , ne tum cerebri , tum medullæ spinalis substantia serositatibus obrueretur .

329. Præterea ex stillicidiis , & lutis , apud nos ex Aponensibus præcipue , multum haurient utilitatis hemiplegia correpti . Particulæ enim tenuissimi salis , sulphurisque , quibus lumen scatet , facile poros paralytici membra permeantes materiam percellent fibris coactam , tenuabunt , dissipabuntque ; sicque fibræ amissam recuperabunt elasticitatem : thermale autem stillicidium non tantum viribus aget medicatis , sed pondere quoque , & calore .

330. Animadvertisendum tamen est , Balnea , luta , & Embrochationes magis , certiusque profutura in paralysi , cuius causa sedem habeat

subsequuta fuisse varias febris sine crisi accessiones : hæc autem , febri cessante , evanescebant . Fomes forte intermittentis febris extimulaverat , explicueratque naturalem acrimoniam ; hinc humorum depravatio . Ast actio fomitis febris periodicæ in his observationibus patet satis .

in tela cellulosa , qua omnia nervorum vasa obducuntur ; præcipue si nullum cerebro insit vitium , uti observavit inter alios BOERHAAVIUS , adnotavitque HALLERUS (n) . Paralyses enim post apoplexiam ferme nunquam sanabiles sunt , nisi cerebro in integrum restituto .

331. Attentissime ergo expendendus est æger , antequam balneo thermali , stillicidio , lutisque subjiciatur : inter cætera autem status præsertim cerebri expendatur necesse est . Qui enim saliva profluente inquinati conspiciuntur , qui pendulum labrum , immotos oculos , dubiosve , stupidosve , qui memoriam notabiliter produnt imminutam , qui tandem aut sensiles sine causa , aut , quum causa sensibilitatis ad- sit , indifferentes se se offerunt ; hi sunt omnino a thermis absterrendi ; nisi cerebrum eorum ad sufficientiam convaleat : quod si convaluerit satis , est quoque procedendum caute . Hisce sine ulla dubitatione addendi sunt illi , qui ex quibusdam organicis præcordiorum affectionibus apoplectici , sive hemiplectici evasere . Memo-

S

res semper esse oportet moniti celeber. TISSOTII (o) : *thermæ*, inquit, *paralyticis calore*, & *stimulo humores rarefaciunt*, *motum augent*; *sicque febrem*, & *plethora* *generant*; *metus est*, *ne insultum apoplecticum denuo excitent*. Monito tanti viri addi meretur quoque illud MEADII (p), qui ita se exprimit: *ipse quidem novi nonnullos, qui cum varia Medicorum delusi spe ad thermas nostras Bathonienses profecti essent, ex aqua calida egressi, mox iterum apoplexia correpti sunt, & perierunt.*

332. Cerebro tamen satis restituto non est spernenda saltem aliquando, partis paralyticæ topica curatio: sublatis enim, aut saltem imminutis membris movendi resistentiis, solabitur cerebrum; quoniam causa in eo motrix, seu *impetum faciens* facilius aget. Præterea si iteratis observationibus compertum est (q) nervis inesse peculiarem energiam, quæ non a cerebro, sed forte ab aliis causis, &

(o) Epist. cit. pag. 103.

(p) Monit. Med. Cap. II. Sect. II. pag. 39.

(q) MONRO' Observations on the Structure Nervous System ec.; In Diar. Venet. cit. Tom. III. pag. 14., & seqq.

præsertim a vasis potius ortum habet (18); eo magis rationi consonum erit, magisque utilitati consultum inquirere, summaque diligentia perpendere membrorum paralyticorum constitutionem, & qua ratione in vasis eorumdem moveantur humores, iisque topicam adhibere medelam.

333. At quid tandem de thermis dicendum est, quum hemiplegia spasmodicam conse-

(18) Celeberrimus hic Vir nervos circumvestiri putat a Piæ Matre, quæ ipsis plurimum substantiæ cinereæ suppeditat. Id autem sibi persuadet tum quia nervi produntur obscuriores, quam pura medullaris substantia; tum quia eo crassiores evadunt, quo ab origine sua magis dimoventur: accedit etiam, quod secto animalis viventis uno ex nervis præcipuis, pars, quæ ab origine sua sejungitur, adhuc vivat nutrita. Observat insuper, de more humores circumagi, inflammationem aliquando excitari, vulnera conglutinari, ossa quoque consolidari in membro, quod ex nervi sectione immotum torpet, & sine sensu: quibus innixus præstantissimus MONROUS rationibus affirmat, energiam illam nerveam, quæ ad actionem tenuijum vasorum requiritur, nervis suffici & a vasis Piæ Matris, quæ nervos circumvestit, & ab substantia cinerea, quam illa gignit. Hanc autem vim in nervos a vasis inductam confirmat pluribus observationibus: imo alia addit argumenta ex quibus infert, propriam quandam inesse nervis existentiam, atque energiam sine cerebri influxu.

quitur apoplexiā? Balneis tantum domesticis huc usque usus ego sum. In his enim paralyticis immanes turbæ quam facilime excitantur ex summa eorum irritabilitate, atque sensilitate: in eos dirus dominatur erethismus; ut probant subsultus, contractiones spasticæ, acutissimique dolores, quibus læsa eorum membra sæpe excruciantur. Id autem confirmatur magis, ex quo contactus vel levis, vel lenis sonitus, odoresqne vel mites, licet gratissimi, hujus classis ægros exagitant, divexantque. Quot ergo turbæ, & quantæ excitabuntur in iis tum ex efficaci stillicidii impulsu, tum ex validis salis, sulphurisque vaporibus, quos balnea, & luta thermalia circumquaque diffundunt? Namque ex his haud parum excutiuntur, & qui natura firmissimi sunt. Quapropter paralyticī hujusmodi blanda tantum methodo, imo lenissima curandi sunt.

334. Has quidem animadversiones plerique neglexere: hinc factum est, ut nonnulli opinantur opposita de usu thermarum. Quæ quidem opiniones oppositæ magis confirmabantur ex quo alii pejus, alii melius se haberent, qui a thermis redibant.

Verum quidem est, ægri corpus præparandum, ut thermas utiliter adeat. Hujus tamen præparationis defectus non est semper (ut a quodam summo viro) culpandus, si æger a thermis detrimentum capiat. Non enim unice quoad corporis præparationem, verum etiam quoad ægri affectiones, atque constitutionem interpretari debemus illud **HIPPOCRATIS**; quæ profuerunt, ob rectum usum profuerunt: quæ nocuerunt, ob id, quod non recte usurpata sint, nocuerunt.

335. His autem disquisitis de thermarum usu, aliqua addere oportet de jure viperino. Hemiplegia, aliaque paralysi correptis probant jus viperinum Medici plerique; quod tamen alii futile quiddam, & iners, alii contra nimis acre, irritans, calefaciensque existimant. BECCARIUS (r), ut aliquid certius statueret, summa cum diligentia, & sagacitate instituit experimenta, ex quibus deprehendit, viperis inesse succum quemdam mitissimum, gelatinosum, tenuissimum, imo & resolventem: nam sero sanguinis humani admixtus, expositusque eo calo-

(r) Instit. Scient. Bonon. Comment. Tom. II. Part. I. pag. 101.

ris gradui, quo serum in gelatinam cogi solet, hujus congelationem retardat: coagulato tandem hujusmodi sero, adhuc reliquum in eo invenitur quidpiam solutum, aqueumque. Neque ergo iners, neque inutile penitus est jus viperinum, quod contra aptum deprehenditur, & ad serum viscosum, lentamque lympham leniter dissolvendam, & ad vividam, ut ita dicam, nutritionem præstans.

Verum sicut energicæ viperarum particulae diversimode agunt juxta diversitatem ægrorum; ita nequeunt omnibus congruere. Observatum est enim, jus vipereum haud convenire ægris, qui vel diathesi phlogistica, vel febre lenta cum calore, vel nimia nervorum mobilitate, spasmodique vexentur; quibusque sit temperamentum irritabile satis, atque biliosum. Substantia viperarum validius, quam par est, ægros hujusmodi commoyet, ac calefacit, ut quotidie observamus; sed hac ipsa ratione innuitur utilis futura hemiplegeticis, quibus vires vitales, solidæque corporis partes languescant, lympha vero lenta sit, atque viscosa. Optimum ergo remedium erit in paralyssi tantum, quæ apoplexiæ serofæ, vel pitui-

tosæ , vel alicui metastaticæ succedat , uti adnotavimus supra .

336. At difficilis quidem est statuere , quibus suppeditanda , quibus deneganda sit electricatio ; remedium utique aliquibus paralyticis satis utile , aliquibus contra satis metuendum . Observationes eadem , licet multiplicentur in dies , nondum patefaciunt omnino , quibus remedium hujusmodi utilitatem , quibus nocumentum sit adlaturum .

Pro certo quidem constat , electricationem solidas corporis partes extimulare , fluidas dissolvere , pulsus accelerare , hæmorrhagias promovere , impetuque majori humores in caput impellere ; imo & convulsiones excitare , ac paralyses gignere aliquando . Quos quum effectus electricitatis observarent experientissimi Medici , inter quos TISSOTIUS celeberrimus , statuerunt , eos unice ægros electricandos esse , in quibus circulantium humorum acceleratio , eorumque rarefactio metui nequirent , aut spasmus nervorum .

337. Quæ quum ita sint , sin minus metuere omnino , saltem suspicari debemus ex hoc remedio iis damnum , qui ex apoplexia

sanguinea paralytici evasere; nec minus iis, qui, quum paralytici sint ex apoplexia quacunque, vel cerebrum produnt adhuc deordinatum satis, vel spasmum, contracturam, & immobiliter membra paralyssi affecti, aliorumque sensitatem.

338. Has vero veluti leges, quæ jure vindicantur sanctæ, haud satis scrupulose observant Medici plures, qui solent quotidie electrico uti vapore. Omnes quidem in hoc convenient, quod nempe electricatio vel aliquid damni, vel nihil utilitatis adferat iis, qui gravem adhuc produnt cerebri læsionem. At restituto sufficienter cerebro tentandam putant electricationem: affirmant enim, eas adesse methodos, quibus vel ægro satis efficax suppeditetur electricitas, quæ vehementer stimulet, atque dissolvat, vel mitis ejus actio aptetur, quæ leniter resolvat obstruta, rigentia laxet, irritata sedet. Videtur ideo aliquibus lenis tentanda electricatio etiam in hemiplegia, quæ veram subsequitur, vel præcedit apoplexiā sanguineam, restituto tamen satis cerebro. At magis audendum in paralyssi, quæ a pituitosa, vel serosa exorta sit apoplexia: vis enim efficax electricitatis habebit glu-

lus metallicus inhærens virgæ metallicæ, quam manu quis terræ communicans teneat. Quod si ægrum nimis sensilem notabili affiant molestia scintillæ; membrum paralysi affectum obducatur lamina plumbea, sive, ut libet MAUDUITIO clariss., panno laneo, qui carni adhæreat penitus: tunc super lamina, sive panno discurrat excitator, qui plures, lenesque scintillas exhaustiet, lenique velut calore fovebitur membrum. Auctor citatus pluries se usum perutiliter fuisse hac methodo affirmat (s).

345. Majores tandem vires exercet vapor electricus, qui ex phyala Leydensi dederunt, vel ex quadrato magico: tunc enim alios præter effectus, artus concutit, commovetque. Licet autem Medici haud sæpe usi sint hac methodo, constat tamen multiplici experientia, concussiones hujusmodi electricas, prudenter adhibitas, satis ægris plerisque profuisse. Perpenfa sedulo tum ægri, tum morbi natura, Medicus pro indigentia limitare potest locum, & efficaciam electricæ concussionis. Pars enim

(s) Memoir. sur les différentes Manières d' administrer l'électricité pag. 80.

corporis quælibet commoveri potest, intacto reliquo corpore: præterea, ut & per alias methodos, sic & per concussionem suppeditari electricitas potest ea mensura, quæ rerum prospectui apposita putetur.

346. Hoc quoque addendum puto pro iis, qui sunt mobiles, atque sensiles nimis: insideant ipsi telluri, & horum pars electriczanda vel sub conductore statuatur, vel sub catenula, quæ ab conductore pendeat: tunc electricitas in ipsos aget unice inter permeandum. Nam vapor in hos ægros immissus, ex ipsis continue in terram influet, quin ejus ulla fiat congeries. Hæc autem eadem electricatio augeri poterit, ac minui juxta diversam tum corporis distantiam ab conductore, tum vaporis mensuram, qui in conductorem devehatur.

347. Hæc autem omnia dicebamus de positiva electricatione; aliquid nunc addendum de negativa, cuius existentia multis evincitur observationibus, indubiisque. Dicimus hominem positive electricatum, quum ante in ipsum invecta est electricitas major, quam sua naturalis exigat constitutio: negative electricatum eum vocamus, cuius naturalis electricitas arte immi-

nuatur. Innuimus supra methodos eas, quibus positive quis potest electrizari; iisdem constat electrizari hominem posse negative; si negativa utamur machina. Adsunt enim multiformes tum positivæ, tum negativæ machinæ, ut videre est apud autores: sed & possumus machinam solitam adhibere, dummodo ab anelectricis eam machinæ partem sejungamus, quæ conductori vaporem suppeditat; eique parti conjugatur electrizandus negative, dum ab anelectricis, & ipse semotus sit.

348. Verum quidem est electricitatem quoque hujusmodi negativam agere in corpus humanum tanquam remedium aperiens, oscillationesque excitans; ideoque, siquid ego video, in paralysi apoplexiam sanguineam excipiente vel semper metuendam, vel saltem maxima cum cautione esse administrandam: de materiali enim se habet ad eosdem, saltem ex parte effectus præstandos, quod vapor quamvelocissime se movens in corpus influat, sive effluat ex ipso. Sed peculiares quoque electrizationis negativæ utilitates affirmant plures experientissimi Viri, quas ut exponamus, aliqua sunt prænotanda.

Et primo quidem, pars substantiæ corpus humanum componentis idioelectrica est; scilicet natura sua cohibet in se vaporem electricum, cuius particulæ particulis ejus substantiæ immiscentur, assimilanturque ita, ut difficilius sejungantur: hunc autem vaporem *fixum* dicunt. Pars vero substantiæ humanum corpus componentis anelectrica est: nempe ad instar vasis recipit vaporem electricum, qui in ipsam incurrat, eam rursus relicturus, si deficiente generali electricitatis æquilibrio, in aliud corpus aditum pateat: & hunc vaporem *liberum* vocant.

Quum ergo quis electricizatur positive, oneratur ipse novo vapore libero, cuius pars, ut plerique conjiciunt, assimilatur substantiis idioelectricis hominis; nec ab ipsis avolat, ut vapor liber, quum homo idem iterum conjungitur cum anelectricis corporibus. Contra, quum quis electricizatur negative, expoliatur ipse, saltem ex parte tum vapore libero, tum quoque portione aliqua vaporis fixi, ut asserit cum aliis BERTHOLONUS; quæ quidem portio fixi, ut portio liberi, haud redit in corpus humanum statim, atque communicet iterum cum anelectrici-

cis. Quare, inquiunt, præter communes utriusque electrizationis effectus; peculiaris effectus est positivæ augere, negativæ imminuere electricitatem corporis humani naturalem. At quidquid BERTHOLONUS conjectet, aliique, ut vim explicent electricitatis negativæ; me quidem illud præcipue commovet, quod in semetipso observabat LICHTEMBERGIUS (t); quod nempe ille Jesus electricizabatur positive per horas aliquot; at contra negative vix electricizatus angustiis vexabatur, vertiginibusque.

349. Quum itaque plures opinentur nimiam irritabilitatem, nimiamque sensilitatem, ac inde partium spasticam contracturam, atque convulsiones a nimia electricitate pendere; ideo contra hæc vitia affirmant summum esse remedium electrizationem negativam, quæ aptissima est ad nimiam electricitatem naturalem imminuendam. Afferunt enim (u) pluries se obseruasse eorum tantum mortuorum, qui dum vivерent, convulsionibus obnoxii erant, nervos excessive saturatos electricitate. Affirmant in-

(t) Bibliotheque Du Nord Tom. II. pag. 339.

(u) BERTHOLON De L' electricité du Corps Humain Tom. I.
pag. 335.

super hujusmodi electrizationis theoriam appri-
me cohærere experientiæ: quamplures enim spa-
smis, & convulsionibus affectos ad salutem in-
tegram negativa electrizatione restitutos fuisse
testantur. Et revera, inquiunt, in spasmodicis
morbis, atque convulsivis, saltem sæpius, cali-
da nocent remedia, & phlogistica; juvant con-
tra refrigerantia, & antiphlogistica: at quid
magis antiphlogisticum, quam negativa electri-
zatio, dum per hanc verus detrahitur humano
corpore electricus ignis? Negativa ergo electri-
zatio videtur satis profutura hemiplegicis ex
apoplexia convulsiva, qui spasticis contractioni-
bus, convulsionibus, atque immoda sensilitate
vexantur.

350. Ast erit utilior tum positiva, tum
negativa electrizatio, siquidem Medici utramque
juvent victu, vestitu, aliisque idoneis remediis
pro rerum exigentia.

Hæc erant, quæ veluti attingere putavi
super electricitate. Quumque in dies augeatur
utilitas, quam ex electricitate deprehendunt Me-
dici plerique clarissimi; id satis videtur cupien-
dum, quod hæc omnia generatim apud nos
probe noscantur. Sunt enim inter nos, ut olim

inter exterros, qui medicam electrizationem parvipendunt, ac velut inutilem experti sunt aliquando. Hisce tamen permotus nemo, ut auguror, efficax negligat remedium: si enim Medici, certa quadam constantia, suos compellant ægros ad Machinam electricam, &, quantum Medicum deceat, diligenter omnia perpendant, eo forte deveniemus, ut certius statui possit, quibus ægris, quibusque modis futura sit utilis, sive inutilis, sive nocens electrizatio: nostris hinc ægris quam maximum forte emolumentum, quod ab omnibus mecum cupiendum est.

NOI RIFORMATORI
DELLO STUDIO DI PADOVA.

Avendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Carlo Dom. Bandiera Inquisitor General del Santo Offizio di *Brescia* nel Libro intitolato: *DE APOPLEXIA PRÆSERTIM NERVEA COMMENTARIUS MS.* non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e Buoni Costumi, concediamo Licenza alli *Fratelli Pasini* Stampatori di *Brescia*, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 28. Settembre 1788.

(GIROLAMO ASCANIO GIUSTINIAN K. Rif.

(ZUANNE VALLARESSO Rif.

(FRANCESCO PESARO K. Proc. Rif.

Registrato in Libro a Carte 270. al Num. 2536.

Marcantonio Sanfermo Segr.

