Versuch einer medicinischen Ortbeschreibung der Stadt Regensburg / Nebst einer kurzen Uebersicht der Krankheiten, welche in den Jahren 1784, 1785, und 1786 daselbst geherrscht haben.

Contributors

Schaeffer, Jakob Christian Gottlieb von, 1752-1826.

Publication/Creation

Regensburg: Johann Leopold Montags Erben, 1787.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/b662mpz3


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org





65776/A

The Library of the Wellcome Institute for the History of Medicine

OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark SCHAEFFER, J.C.G.

To the Medical Pociety
of London from London a. 20. the Author. Apr. 1788.

D. Jakob Christian Gottlieb Schäffer,

ausübenden Arztes in Regensburg, Hochfürstl. Thurn und Taxischen Leibarztes und Hofraths

Versuch

einer medicinischen Ortbeschreibung

der

Stadt Regensburg.

Reb st


einer kurzen Uebersicht der Krankheiten, welche in den Jahren 1784, 1785, und 1786 daselbst geherrscht haben.

Differrer quoque pro natura locorum, genera Medicinae et aliud opus esse Romae, aliud in Aegypto, aliud in Gallia.

Celsus.



Regensburg, 1787. ben Johann Leopold Montags Erben.



Hippocrates

De Aeribus, Aquis & Locis.

Uni artem medicam recta investigatione consequi vult, is primum quidem anni tempora in confiderationem adhibere debet, quid horum quidque possit. Neque enim quicquam habent simile, sed cum inter se plurimum differunt, tum etiam propter varias, quae in eis contingunt mutationes. Deinde vero ventos, tum calidos, tum frigidos - Quinetiam aquarum facultates animo reputare oportet. Quemadmodum enim gustu et pondere ita et facultate singulae plurimum differunt. Quare si quis ad urbem fibi ignotam pervenerit, is eius situs curam habere debet, ut cognoscat, quomodo ad ventos aut solis exortum fit exposita. - Terra etiam ipsa inspicienda, nudane sit et aquis careat, an denfa et irrigua et an cavo loco sita sit et aestuoso, an vero sublimi et frigido. Hominum quoque victus ratio, quanam maxime dilectentur, inspicienda, an potui et cibis et otio dediti, an exercitationibus & laboribus gaudeant et an edaces sint et a potu sibi temperent. Et ex his singula reputare oportet. Haec enim praecipue quidem omnia, aut certe plurima probe qui agnoverit, cum ad urbem fibi ignotam pervenerit, eum neque morbi, regioni familiares, neque communium, quae sit natura latere poterit, ut neque in eorum curatione haesitare aut aberrare posit. Quae certo contingere solent, si quis istorum cognitionem non ante animo perceptam habuerit,

foreineng ki De gentere de principal de la constante de Durchlanding and the supposed by the continues. total popular after a part to the of the part SUCCESSION OF SUCCESSION CONTRACTOR AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION AD LES SANGLES COMES SINCE ON A THEORY OF THE PARTY OF THE P A ROLL OF THE PARTY OF THE PART pilest, and come and an in all the starting and Long scholard . chicken as included the Kindsto Witchestonic nation of the all synthetic and court in the property Land em sill become the water, end seens inch . in which were provided and the contract th

Durchlauchtigen Prinzen und Herren

herrn

Carl Alexander

Erbprinz von Thurn und Taxis 2c.

und

Friedrich

Prinz von Thurn und Taxis 1c.

unterthanigst gewidmet.

Durchlauchtige Prinken,

Gnadige Prinzen und Herrens

der Plat Court (Branch but aufgen Ergien things and comment the suggest of any ver vielation en a comme de la controllant e tigften Kieren Biners and en unsgezeichnes den Gregorifficie Chart, facilitation Quito und Preigebiefen ist - Kraanstusa into 300 nen gewiff bied, ist aleistant level daß Sie som aun alimine office mished and amin achin sichne wiede bound budischter, aldinisie gen! Infirmers in the paper bedien . The gebe mir voher die Leve ihnen hier einen Weifing son topical section of pullings mit der ehrfurchtsvollge Bitte, dies Unter, erechmen für einer Beweiß gelich zu lassen, wie had id das Glack (chape, sem Sof Speed Durch's 和 松

Durchlauchtige Prinzen, Gnädige Prinzen und Herren,

Der Ort Ihrer Geburt und ersten Erzie= hung, Durchlauchtige Prinzen, der zugleich der vieljährige Aufenthalt Ihres Durchlauch= tigsten Herrn Vaters und ein ausgezeichne= ter Gegenstand Seiner fürstlichen Huld und Freigebigkeit ift - Regensburg wird 36= nen gewiß nicht so gleichgultig senn, daß Sie nicht einige, obgleich größtentheils nur medicinische, Nachrichten davon Ihrer gnadi= gen Aufmerksamkeit würdigen sollten. Ich gebe mir daher die Ehre, Ihnen hier einen Bersuch von solchen Nachrichten vorzulegen mit der ehrfurchtsvollen Bitte, dies Unternehmen für einen Beweis gelten zu laffen, wie hoch ich das Glück schätze, dem Hof Ihres 214 Durch=

Durchlauchtigsten Herrn Vaters zu dienen und Sie, Durchlauchtige Prinzen, auf Ihzen bald anzutretenden Reisen nach Frankzeich, England, Italien — als Arzt begleisten zu dürfen. Ich beharre mit schuldigster Ehrfurcht

Durchlauchtige Prinzen

3hr manifement

charles was burief thebrigans with fact oic baris

Scheer den 24 Jul. Bar den grand der den den der

unterthanigster Schaffer.



Vorrede.

Ils zu Ende des 1783sten Jahrs eine gallichte Epidemie ben uns allgemein zu herrschen anfieng, zeichnete ich mir die verschiedenen Erscheinungen, unter welchen diese Krankheit sich außerte, ihren Gang und diesenigen Mittel auf, welche ihr mit Gedeihen entgegen gesetzt wurden. Diese fleis nen Beobachtungen theilte ich meinem alten afademischen Freund herrn D. Wittwer in Rurns berg mit, welcher sie in des Herrn Hofrath und Professor Baldinger neues Magazin für Alerste (Band 6. S. 429. und B. 7. S. 522.) einrücken ließ. Da ich in den folgenden Jahren den Gang und die allmählige Abanderung dieser gallichten Constitution in die gallicht : schleimichte bemerkte, und dieser Uebergang nicht nur die harts nachigften rheumatischen Beschwerden aller Urt verursachte, sondern auch den schnellern Ausbruch

majoris can middentile 21 5

der

der Lungenschwindsucht, des Wöchnerinnenfiebers und vieler andrer Krankheiten begunftigte, fo ord: nete ich, mit Gulfe meiner Tagebucher, alle in den leztern Jahren bier vorgekommenen Krankbeis ten, gab die Ungahl meiner iahrlich besuchten Kranfen sowohl überhaupt als der davon verstorbenen gewiffenhaft an; - Schickte bem Allen eine fleine Ortheschreibung meiner Baterftadt, der Lebensords nung und der gewöhnlichen Krankheiten ihrer Einwohner voraus - belegte folches mit Wetterbeobachtungen, mit den gewöhnlichen Berzeich: nifen der Getrauten, Gebohrnen und Geftorbenen, und mit einer furgen Uebersicht der Krankheiten iedes Monats seit zehen Jahren. Diesem fügte ich endlich ein troknes Mahmenverzeichnis der Thies re, Pflanzen und Mineralien ben, welche fich in unfrer Gegend vorfinden, und so entstand diefes Werfchen.

In Erzählung der Krankheiten sowohl als der dagegen angewandten Heilmethode war ich aufrichtig und getreu; ich verschwieg am wenigs sten meine fehlgeschlagenen Euren, an deren Stels le ich freilich, wenn ich Aufsehen machen wollte,

ADD GEETS

gar leicht solche Falle hatte auswählen und auf stellen fonnen, die mehr blendend, aber daben auch für die Kunst nicht aufklarender gewesen Für mich wenigstens ift der todtliche Ausgang einer Krankheit immer lehrreicher als zehn glückliche Euren. Diese werden bald vergeffen, weil ben ihnen der Arzt immer das Wes nigste, die Matur aber allezeit das Meifte bewirft; über iene aber denft man mehr nach, abftrabirt fich Borfichtigkeitsregeln, entdeckt bie und da fleine Fehler oder wenigstens einen Zwang, den man der Matur angethan, und nun im nachste vorkommenden Fall glücklich abandert, und so wird man durch Erfahrung immer weiser und Die Wahrheit, errare humanum eft, gilt sicher auch dem praktischen Arzt; aber auch der Troft, daß Erkantnis des Jehlers der erfte Schritt zur Besserung ift. -- Uebrigens erzähle ich nur getreulich das, was ich gesehen und gethan; unterrichten oder lehren kann ich nicht, weil meine Kenntniße zu beschränft dazu sind. Mein Wunsch aber ift ganz erfüllt, wenn dieser Auffat nur einen oder den andern angehenden Argt von iener Wahrheit, welche uns Zippokraces,

Sydenham, Zupham, Grane, Stoll und viele andre große Merite so nachbrücklich und laut gepredigt haben, überzeugen wird, daß nams lich auf das Studiren und Ausspähen der herrs schenden Constitution das vorzüglichste Augenmerk icdes Klinikers gerichtet fenn foll, fofern er anders die Heilkunde wissenschaflich, glücklich und nicht empirisch treiben will. Denn da die Constitutions : Krankheiten fich den Jahres: Krank, heiten immer zugesellen, so wird es dem Urst, der iene einmal kennt, leicht werden, die Urfathen der Zufalle bald zu ergrunden, eine paffen: de und sichere Heilmethode ausfindig zu machen und zu erklaren, warum nicht gleiche Snmpto: me zu verschiedenen Zeiten mit gleichen Beilmitteln gehoben werden konnen. Und hier liegt, wo ich nicht irre, ber Grund, warum der denkende Klinifer seine Beilmethode in einem Decennio of: ters umandern, ia oft gang entgegen geset einrich ten muß. Denn 3. B. ben einer gallichten Conftis tution wird er nur mit breche und abführenden; ben einer inflammatorischen aber mit Aberlassen, ers weichenden, und antiphlogistischen Mitteln glucklich senn. Der symptomatisch heilende Praktiker aber fum=

fümmert sich um die herrschende Constitution wer nig, bleibt seinem Compendio treu und fängt z. B. die Eur des Seitenstichs zu allen Zeiten mit Aderlassen an. Daß er aber auf diese Weise nicht immer der glücklichste oder wenigstens nicht der am schnellsten heilende Arzt senn könne, ist eine leuchtend und klar.

Moch hab ich mit Dank zu erwähnen, daß mir ben dem Mahmenverzeichnis der Bogel, Insecten und Minern vorzüglich die gutige Uns terstützung und das Maturalien : Rabinet meis nes verehrungswürdigen Oheims des herrn D. und Superint. Schäffer, und die Kenntniße und gefälligen Bemühungen des herrn Stadt. syndici Zarrer, der den Entomologen von dies fer Seite fattsam bekannt ift, treflich zu statten kamen. — Da mir seit vielen Jahren meine praktischen Geschäfte nicht mehr erlaubten, zu bos tanisiren, so muß ich meine Schwäche in dies fer auf Uebung und Gedachtnis beruhenden Kennts nis eingestehen. Ich gebe daher das Pflan= zenverzeichnis für nichts weniger als volls ståndig aus, sondern beschränke mich vorzüglich

Runn

nur

nur auf officinelle und solche Kräuter, welche ich in meinem Herbario eingetragen fand und von denen ich weiß, daß sie in unsere Gegend wild wachsen, oder in unsern Gärten gezogen werden. Aus manchem Zweisel und aus mancher kleinen Verlegenheit halfen mir die botanisschen Kenntnisse des Herrn Zoppe aus dem Hannöverischen, eines von Lenßerischen Schülers, der damals, als ich das Pflanzenverzeichnis in Ordnung brachte, in der hiesigen Elephanten-Aposthete servirte und dem ich für manchen Ventrag und gefällige Velehrung Dank zu sagen habe.

Endlich bitte ich um gefällige Nachsicht, wenn hie und da sich Drukkehler vorsinden sollten, weil ich im Begrif bin, Regensburg auf einige Monate zu verlassen und also die Correctur nicht selbst besorgen kann. Regensburg den 2 May 1787.

BROSECULAR SERVICE CONTRACTOR OF SERVICE SERVICES

gu lefen nytarion, tote en visione des bour gefürer Arten Albe Amedine zu Sie Camanion eine uspe here ansassal enen Kaulsbons Politica, de under und bes ger fürsteren Ablis Joh. Bapeift Kaulsbons Monadicus

ersErneuesten Nochricht, von Regensburg. 2. 1733.41



morad and Werfuch

einer medicinischen Ortbeschreibung der Stadt

Regensburg.

ie Stadt Regensburg ist wohl eine der altesten in Teutschland. Nicht nur ihre vers schiedenen geführten Nahmen *), sondern auch andere deuts

*) Sie foll nach und nach folgende Nahmen erhalten has ben, als Sermannshaimb; Bermanshaimb; Vo. reia; Ingrambshaimb; Tiberia, oder Augusta Tiberii; Quartana oder Colonia Quartanos rum; Tetrapolis, Metropolis Ripariorum; Regelspurg; Reginopyrga; Regnioburgum; Artobriga; Regina; Quadrata; Legnespurg und Regensburg. -Wer überhaupt mehrere Nachrichten von dem Alterthum, den verschiednen Schiffalen und andern Merkwurdigkeiten diefer Stadt au lefen municht, der fann vieles in der vom gefürs fteten Abt Unfelm ju St. Emmeram aufs neue bers ausgegebenen Ratisbona Politica, 4. 1729. und bes ges fürsteten Abts Joh. Baptist Ratisbona Monastica. 4. 1732 finden; ferner in des Joh Carl Paricius allerneueften Nachricht von Regensburg. 8. 1753.

deutliche Spuren eines hohen Alterthums seizen es außer allem Zweisel. Daß die Römer diese Stadt gekannt und Besahungen in und außer derselben gehabt haben, bestättigen theils der Nahme Castra Regina, nach welchem die Römer solche benannten, theils aber noch übrig gebliebene Steininschriften *) und die in unsern Tagen noch hin und wieder ges sunden werdende Münzen eines Augustus, Tie berius, Caligula, Viero **) und anderer mehr. —

*) Bu Zeiten des Herrn Weihbischofs Grasen von Warstenberg, der im Jahr 1714 starb, fanden sich in Regensburg vierzehn Steine, die die Könner gesett hatten. Wartenberg schrieb die Ausschriften mit eigner Hand ab, und ich sah dies M.S. ben dem kursürstl. geistl. Nath Herrn Roman Ziengiebl, ders maligen P. Prior im fürstl. Stift St. Emmeram.— Zwen dieser Steine sind heute noch in dieser Abten zu sehen. Der erste prismatisch gesormte im Kreuzsgang hat solgende Ausschrift:

I. O. M.

E PERPETUE SECURITATI ET MEMORIE DULCISSIME AURELIE P. ÆL. IUVIANUS CONIUGI INCOMPARAB.

Der Zweite

- - E DULCISSIME MEMORIE
FLORINE MARCELLINUS SIG. I. LEG. CONIUG.
INCOMPARABILI.

F. C.

**) Defter als an andern Pläzen finden sich dergleichen Münzen auf ienem dem Stift St. Emmeram zuges hörigen und nahe an der Stadt gelegenen großen Feld, die Emmeramer » Breite genannt. Wahr= scheinlich hatten die Römer daselbst ihre Begräbnise.

Im 1181 Jahr ernannte nach Aventins Meisnung, Friedrich der Erste, mit dem Bennamen Barbarossa dieselbe zu einer Reichsstadt; 1542 bekannte der Magistrat und die Bürgerschaft sich öffentlich zur Augspurgischen Confession und seit 1662 ist der fortwährende Reichstag hier.

Regensburg liegt biesseits und langft bes mittagigen Ufers der von Abend nach Morgen ftromenden Donau. Mittelft der fteinernen Brus de, welche 1135 zu bauen angefangen worden fenn foll, tann man auf die beiden, der Stadt geho: rige Infeln, ber Ober: und Unterworth ges nannt, fommen, und am Ende biefer Brucke liegt die Banerische Stadt am Sof. - Ihre geogras phische Lage ift benläufig 29° 36' Lange und 49° 2' Breite. — Langst ihren nach Norden gelegenen Ringmauern bin wird fie alfo von dem machtigen Donaufluß begranget und weiter gegen Rord : Beft und Rord : Dft ift fie mit nahen und meift anges bauten ober mit Solz bewachsenen, maßig hoben Bergen umgingelt. Gegen Often und Guben aber, ober dieffeits der Donau, wo Regensburg liegt, ift. offnes freies und ziemlich ebnes Land.

Die Beschaffenheit unster Jahreszeiten ist, wie überall, nicht ein Jahr wie das andere. Doch scheint der Himmel seit dren Jahren uns stiesvästerlicher zu behandeln, als ehedem. Der schreckens volle Eisgang in der Donau sowohl als in dem uns nahen Regenflish, im 1784 Jahr zu Ende des Februars, ist noch in unser aller traurigem

Andenken. - Der Winter von 178 war wegen bes anhaltend fallenden Schnees und ber außerors bentlich ftrengen Ralte merkwurdig und in ber Folge traurig. Ungablich viel Wild erhungerte und erfror. *) Die Erndte bes 1785sten Jahrs mar bes beständig regnichten Wetters wegen zum Theil gang vereitelt, theils hatte bas Getraide, und vors züglich bas Rorn, zuviel schleimicht mafferichtes Wefen, wodurch das Brod, befonders gleich in ben erften Monaten nach ber Erndte einen unans genehmen widerlichen Geschmad erhielt. - Der Winter 1785 war wohl nicht so gar streng als der poriabrige: bagegen aber hatten wir fast gar feis nen Commer, fondern falte und regenvolle Tage, (die Donau trat funfmal nach einander diefen Coms mer aus ihren Ufern) welche das Einbringen der im Ueberfluß gerathenen Feldfruchte wieder febr erschwerten; auch das viele Dbst war minder schmacks haft und aromatisch, als in warmern Commern.

Unfre Winter sind meist sehr gemäßigt. Der mittlere Stand des Reaum. Thermometers ist im Winter 13 bis 14 Grad unter dem Gefrierpunkt; erst gegen Ende des Christmonats fällt anhaltende Kälte und bleibender Schnee; im Februar haben wir

^{*)} Hauptsächlich galt dies die iungen Rehe, die Hasen und die Neb- oder Feldhüner. Leztere wurden durch diesen harten Winter ben uns völlig ausgerottet, so daß in den folgenden zwen Jahren gar keines in uns rer Gegend zu sehen war, und nur erst im lezt vergangenen Sommer wurde hie und da wieder eine Kitt derselben bemerkt.

wir schon mit unter Thanwetter und der März zeigt uns den holden Frühling in der Ferne. Zu Ende des Aprils stehen gewöhnlich die Bäume ben uns in voller Bluthe.

Unfre guten Sommer sind ziemlich heiß; der mittlere Stand unserer Thermometer in heißen Tasgen ist 24 bis 25 Grad.*) — Donnerwetter lassen sich wohl oft in unster Gegend hören, doch richten sie selten Schaden an. Die meisten kommen von Westen her, ziehen aber bald entweder über die Donau und die Nordwestlich liegenden Berge, oder gehen auf die andre Seite gegen Mitztag der Iser zu. — Auch Hagel oder Schloßen fallen in der Stadt sehr selten und geschieht es zusweilen, so sind sie zu klein, um Schaden zu thun.

Unfre Herbsttage sind meist schön und währen oft bis in den spätesten October hinein. Die in unsrer Nähe wachsende Bergtrauben sind, nicht eine mal, schon gleich in den ersten Tagen des Weinmonats reif und ausgezeitigt auf die volle Kelter getragen worden, um Bayerwein **) zu erhalten.

B2 Wir

*) S. die erste Benlage "Auszug aus den Wetterbeobsachtungen der Jahre 1783, 1784, 1785 und 1786."— Mit unermüdetem Eiser und Fleiß werden die Wetsterabänderungen unsere Gegend von Sr. Hochwürden Hrn. P. Placidus Seinrich, Prosessor im N. St. Emmeram, dem ich diesen Auszug zu verdanken habe, beobachtet und aufgezeichnet. Man sehe Ephemerid. Societat. Meteorologic. Manheim. 4.

**) Der Most dieser Trauben wird am meisten von den

Wir haben nicht zu viele Nebel; im Monat Movember finden sie sich am öftesten ein: selten verfinstern sie den ganzen Tag über unsre Utmos; phäre, sondern zerstreuen sich meist gegen Mittag.

Unfre gewöhnlichen Winde kommen von West und Nord, West und ben anhaltenden schönen Tagen von Ost, Sud, Ost und Sud, Ost; ganz von Osten aber sind die Winde ben uns äußerst selten.

Da alfo unfre Gegend durch abwechselnde Wins be oft durchstrichen wird, in unserer Rabe feine Campfe, wohl aber lebhaft fliegende Strome find, unfer Boden urbar und mit Feldfruchten und Baus men angebaut ift, fo kann unfre atmospharische Luft im Gangen genommen nicht anders als ges fund genannt werden; boch aber ift fie etwas fchwer, bick und feucht. Den Perfonen, die einen trote nen magern Korperbau, reigbare und gespannte Merven (um fchulgerecht zu fprechen) haben, behagt der hiefige Aufenthalt; fo wie schwammichten bickeren Rorpern und benen die gu relachirte Mers venfibern haben, unfre Luft, bis fie fich nach und nach baran gewöhnen, eben nicht anfangs gleich am besten anschlägt. Ueberhaupt werden Leute, wels che

Besissern der Weinberge selbst oder den Stadtwirthen aufgekauft und wenn er vergohren ist, ausgeschenkt. Der Landmann liebt diesen Wein; er hat zwar sehr viele Säure und Härte, besonders in den ersten Jahzren; er würde aber ungleich besser werden, wenn unser Weinstock mit der Sorgfalt und dem Fleiß, wie in den Weinlandern bearbeitet wurde.

che natürliche Anlage haben, fett zu werden, in Kurzem ben uns leibig, ob sie gleich kein Bier trinsten, und ihrer anderwärts geführten Lebensordnung ganz getreu bleiben. Auch Lungenschwindsüchtige, besonders wenn sie einmal das 36 Jahr erreicht haben, treiben ihr Leiden oft Jahre lang.

An reinem guten Quell und Flußwasser haben wir nie Mangel; fast jedes Haus hat seinen eigenen Ziehbrunnen und wenn hie und da solcher int einem Haus fehlt, so sindet sich gewiß in der Nähe einer auf ösentlicher Straße. Da wir alles Wassert uns zusließenden Duellen erhalten, so ist solches nicht durchaus von einer und derselben Güte. Denn die nördlichen tief an der Donau hinliegenden Brunz nen empfangen ihr Wasser meist von diesem Fluß; die höher liegenden sudwestlichen aber enthalten Quellwasser, das von denen ausser der Stadt Süd und West gelegenen zwo Brunnstuben in blegernen Röhren nach der Stadt geleitet wird.

Uederhaupt aber ist unser Wasser von vorzüge licher Güte: rein, hell, frisch, geschmacklos und nicht ranh. Es wird schnell siedend gemacht, erstaltet aber geschwind wieder. Hülsenfrüchte wersden bald in demselben weich gekocht; Stocke und andere Seesische, frisches und geräuchertes Fleisch u. s. w. durchwässert es bald: mit der Seise schäumt es leicht und lößt solche geschwind auf. Nur erst nach anhaltendem, oft iahrelangen Gebrauch sest sich in irdenen oder metallenen Gesäßen, in denen bes

ståndig stedendes oder laues Wasser erhalten wird, eine sehr dunne terrestrische Eruste an; mit dem Weinsteinol vermischt, trübt es sich nicht. Wahrsscheinlich hat die Milde unsers Wassers den grössten Antheil, daß unser Bier so vorzüglich gut und gesund ist und beide machen, daß unsre Einwohnen selten mit Steinbeschwerden geplagt werden.

3wo Stunden von Regensburg haben wir auch ein mineralisches Waffer, bas unter bem Rahmen bes Abacherbads bekannt ift. Es quillt folches von benen eine Biertelftunde von dem Marktflecken Abach fudweftlich gelegenen Bergen bervor und wird am Fuß berfelben in einem ziemlich schlecht permahrten Behalter aufgenommen. Bon da flieft es in bolgernen Robren nach einem einzelnen Saus in Abach, das Bad genannt. Die ben diefem Behalter liegende Blatter und Steine, über wels che das Waffer binflieft, find mit einer febr buns nen, weißgelblichten geschmaflosen Erde ober feinen Erufte überzogen, die auf glubende Roblen gewors fen, nicht ben geringften Schwefelgeftant verrath. Die Rohren, durch welche das Waffer geleitet wird, werden nie durch diefen erdichten Abfat vers ftopft. Das Waffer ift falt und gang helle, es gefriert im Winter nie; ben ber Quelle vorzuglich riecht und schmeft es ziemlich nach faulen Epern. Diefer Geruch und Geschmack aber verliert fich in Zeit von 48 Stunden, wenn es von der Quelle weg an einem britten Ort in ofnen oder schlecht verwahrten Gefäßen bingefest wird. Seine Saupts bestandtheile scheinen in einer flüchtigen sulphus ri:

rischen Saure, welche mit einer kalkarischen Erde leicht verbunden ist, zu bestehen. Denn

1) Mit dem Bitriol, der Salzfäure, dem Weineßig vermischt, blieb das Wasser helle und rein, und der faulichte Geruch verminderte sich merklich.

2) Mit dem sixen sowohl als flüchtigen Alkali wurde es trübe und warf sehr wenige weisse Erde zu Boden. Den schwefelleber Geruch verlohr diese Vermischung ganzlich und sogleich.

3) Es veränderte daffelbe weder den Gurcumen noch Gallapfel : Aufguß im geringsten.

4) Den Violensaft farbte es nicht gleich, sondern erst im Stehen nach und nach grun.

5) Das Quecksilber in Scheidewasser aufgelost, schlug es gelblicht nieder.

6) Gold und Silber in frisches stinkendes Wasser gelegt, ward das lette schwarz gefärbt, das Gold aber blieb unverändert.

Daß wirklich ein sehr Weniges flüchtiger Schwes felsaure den einen Bestandtheil dieses mineralisschen Wasser ausmache, beweiset der nach faulen Epern oder Schwefelleber stinkende Geruch, der sich aber, wie oben schon gesagt, an freier Luft bald verliert. Ferner das schwarze Anlaufen des Silbers im frischen stinkenden Wasser; denn gestuchloses färbt das Silber nicht, sondern läst es unverändert.

Der andere alkalische Bestandtheil ist in sehr unbeträchtlicher Menge in diesem mineralischen Was

fer enthalten, und besteht theils in Balk, theils in etwas Bitterfalz Erbe. Denn bren Pfund Waffer gaben ben gelinder Abdampfung geben Gran einer weißlicht gelben, ziemlich fauftischen, Feuchtigs feit an fich ziehenben alfalischen Erde, welche von ber Salgfaure gang aufgeloft wurde, bell und burch: fichtig war; mit Waffer verdunnt und ben gelins dem Feuer abgeraucht, teine Krnftallen, fondern eis nen dicflichten Bobenfat guruck lies. Die Bitriols faure braufte zwar heftig mit diefer Erde auf, gers feste fie aber nicht gang; das Aufgelofte murde mit Baffer verdunnt und ben schwachem Feuer abs gedampft. Es schoffen hierauf Arnstallen an, Die dem Gedligersalz vollkommen glichen. Das nicht Aufgelofte war Gelenit; benn felbft meder Bitriot noch Galgfaure wirkte mehr auf dies Refiduum.*) -

Getrunken wird dies Wasser von den Bades gasten sehr selten, sondern allein als Bad gebraucht. Es wird dazu allemal warm gemacht, woben es aber von ienem specifischen Geruch nichts verliert, und nach den einzelnen Zimmern der Badenden ges tragen. Gewöhnlich wird Vors und Nachmittag

ges

e) Meberhaupt verdiente nicht nur der Gang dieser Quels le genauer untersucht und vorzüglich die dasigen Gesbirge von einem geschikten Mineralogen bereist zu werden. Dann nur erst neulich wurde in dieser Gesgend, ienseits der Donau, ein Marmorbruch entdekt, und ohnweit Abach selbst soll ein phosphoreseirender grünlichter oder schmaragd und ametystsarbiger Gipssspat brechen, der mir aber bis izt so wenig als ein Bildschiefer, der sich daselbst vorsinden soll, zu Gessicht gekommen ist.

gebabet; man weilet ein bis zwen Stunden in ies bem Bab, legt fich bann auf bas Bett und ruht aus. Die gewöhnliche Curgeit mahrt vier Bos chen; fie fangt gemeiniglich im Monat Mai an und Dauert bis in ben fpaten September. Die meis ften Curgafte schwiken merklich mahrend bem Gebrauch der Baber Rachtszeit, und werden öfters darauf matt; doch ift diefer Schweiß, wenn ans bers fein Rieber damit verbunden ift, von gunftis ger Borbedeutung und erfprieglicher Gedeihung. -In rheumatischen Bufallen, chronischen Gliederreife fen, in Lahmungen, die nicht zu alt find; da wo Die Mustelfiber zu rigibe und ftarr ift; in leiche ten Sautkrantheiten, die Rrage zc. fand ich wenige ftens bis hieher noch immer die heilfamften Wirs Kungen. Gegen zu tief eingewurzelte Berhartuns gen ober Berftopfungen der abdominal Gingeweibe. aber ift dieses Wildbad viel zu ohnmächtig und schwach, als daß es Sulfe und Genesung schaffen Konnte. Gelbst deffen chemische Bestandtheile ers weisen schon die Unmöglichkeit einer solchen großen Forderung. *)

Die Gegend um Regensburg gegen Nord und Westen hin ist bergigt, die Aussicht also ziemlicht. B 5

1) Auland vom Wild : Badt Abbach. 1635. 8. 1 Bo: gen fark.

^{*)} Meber dieses Wildbad schrieben folgende Regensburgische Aerzte.

²⁾ Lehner kurze Beschreibung des Wildbads zu Abach. 1669. 12. 106 S.

³⁾ Dietrichs Histor. : Physik. Abhandl. vom Wildbad Regensh. 1754. 8.

begrangt; es beift folche die junge Pfalz oder, das Mordgan. Der Erdboden ift in diefem Land meift fandig, fteinig und felficht; daber auch um fo undankbarer und schwerer anzubauen, da noch oben drein an einigen Orten der arme Einwohner weder Kluße noch Quellwaffer hat und sich mit bloßen Regen und Enfternenwaffer behelfen muß. Geine Roft ift febr einfach; Erdapfel genieft er in gros fer Menge; fein Brod besteht meift aus Rorn; frisches Kleisch tommt außerft felten an ibn, Ges rauchertes aber ofter. Er führt uns Getraide, Solz, Roblen, Wildpret, grobe Gemufe, als Dors fen, Erdapfel u. f. w. zu. - Rach Dft und Gus Den zu aber liegt das fruchtbare gefegnete Baners Iand, defen Reldgrund meift fett, fchwer und leicht anzubauen ift. Dabin ift die Aussicht offen und Schon. Der banerische Landmann pflegt, überhaupt genommen, beffer als fein pfalgifcher Rachbar gu Ieben, ift robuster, munterer und arbeitet zwar nicht fo anhaltend, aber schneller von der Kauft meg. Much feine Pferde und fein horn und Maftvieh ift weit leibiger, muthvoller und fchoner. Wer nur einmal einen pfalzischen und banerischen Bauer ges feben bat, ber wird fie auf immer auseinander ten: nen, fo mertlich unterscheiben fie fich schon burch außerliches Unsehen, Betragen und Kleidung. *) Der

^{*)} Mir sagte einst ein hiesiger Stadtbauer, daß wenn er pfälzische Knechte oder Dirnen in Dienst bekäme, solche allezeit viele Wochen gebrauchten, bis sie die aus frischem Rind: oder Schweinsteisch (das aber nur an Sonn: und Fepertagen ausgetischt wird) guten Milch

Der banerische Bauer liefert uns, feines guten fruchtbaren Bodens wegen den groften Theil unfrer Lebensmitteln, die meiften Gattungen von Getrais De, Korn, Baigen, Gerfte und Saber. Butter, Schmalz, (ausgekochte und gereinigte Butter) Eper, iunge Buner, Rapaune, Tauben, Enten, Ganfe, Schafe, Spanfertel, (iunge Schweine, die von der faugenden Mutter tommen) Ralber, hornvieh *) und ungablich andre Bedurfnige als Schafwolle, Klache, Sanf, Strob, Seu u. f. w. erhalten wir von ihm und bas alles von vorzüglicher Gute und in Bergleich mit andern Orten um billige, wohls feile Preife. Un guter frugaler Sausmannstoft haben wir alfo Ueberfluß und felbst an ausgesuche ten feinen Speifen teinen Mangel. Der arbeits fame Bohm führet uns auffer gangen Beerden von Ganfen und Truthubnern und anderm gahmen Geflugel im fpaten Berbft fcwarzes und rothes Wilde pret, Feldhubner, Auerhabne, Fafanen zc. gu, und bereichert dadurch den einheimischen Borrath, das mit wir besto wohlfeiler taufen tonnen. - Auch an ben fogenannten feinern Gemufen, als Spinat, Spargel, Buckererbfen, Blumenkohl, den verschies

> Milch und Mehlspeisen bestehende Kost gewohnten z viele derselben lernten solche gar nie vertragen und giengen daher wieder zu pfälzischen Bauern und ihre einmal gewohnte Kost zurück.

Die besten Mastochsen werden in dem Wald — die Gegend, welche nord : ostl. an Bohmen zuliegt, ges zogen und uns zugetrieben. Mit unter, wie wohl nicht zu oft, kommen Schafe und Ochsen aus Uns Barn, und lezte zuweilen auch aus Pohlen zu uns.

Denften Gattungen von Salat und Burgelwerk has ben wir feinen Mangel, fonbern geniegen fie in ziemlicher Menge und fruhzeitig. Gehr gute Me-Ionen , die in unfrer Gegend reifen , tommen den Commer durch auf die Tafel der Wohlhabenden. Die ausgesuchteften Gattungen von frangofischem und anderm fchmachhaften Dbft werben in unfern Garten gezogen, als Abrikofen, Pfirfiche, Reines claude, Rirfchen, ic. Beurregris, Beurreblanche, Birgouleufe, Bergamotte, Eper: Glasbirn, zc. weif ter und rother Calville, Reinette, Rosmarin : Les Derapfel, Malveffer, Sammet : Tafetapfel, Bor: ftorfer zc. - Die Reller ber Reichen und unfrer Weinwirthe schliegen die vortreflichsten und tofte barften in und auslandische Weine in fich als als ten Rheinwein, Mosler, Marggrafter, Franken, Meder zc. Ungarische, Totaper; Champagner, Burgunder, Mufcat, Malaga; Epprischen ic. und uns zahlig andere Ligeurweine. - Die nabe Donau liefert uns folgende Kische: Altl, Barben, Bir= fteln, Botten, Brachsen, Brungreß, Sausen, (felten) Sechten, Buchen, Rarpfen, Lauben, Masen, oder Masling, Perschling, Rothaus gen, Schill, Schleve, Stor und Sterlet (febr felten) Rutten, Schaiden, Schied, Schraitzen, Waller, Weißfisch, Zindel — Karpfe, Bechte zc. und Rrebfen werden uns aus benen in der Pfalz ziemlich zahlreichen Teichen; Lachs und andere Forellen aber, Asche 2c. aus den benachbarten hell fliegenden Quellen und Flugen, aus der Las ber, Sils, Maab ic. herbengebracht. — Baringen, Stockfisch, Platteis, Lachse, Reunaugen

ober Pricken effen wir im Winter ben anhaltender Ralte frische Austern, Rheinfalm, Rabeliau zc.

2000

Regensburg liegt ber Lange nach ziemlich eben, Die Breite von Rorden nach Guden aber geht in etwas Wenigem bergan. Die Lange berfelben mag beilaufig 1800, die Breite gwischen 7 und 800 Schritte, ber Schritt zu britthalb Schuh gereche net, betragen. Es gablt ohngefahr 2000 Baufer. Die Strafen find ziemlich enge und nicht in ges raber Linie angelegt. Doch find die Gebaude nicht febr boch, die meiften nur von zwen, wenige von dren Geschofe und von Stein aufgeführt. Es tonnen alfo Die Winde leicht folche durchstreichen und die Luft erneuern. Die Straffen werden fo viel moglich auf öffentliche Roften gereiniget und im guten Pflas fter unterhalten. Im Winter von Michaelis bis Georgi find fie feit 1783 an den gangbarften Drs ten mit Laternen beleuchtet. Sicherheit, Ordnung und Polizen herrscht in diefer fleinen Stadt, mel che fo verschiedne und viele Gerichtsbehorden *) in

*) Außer dem Magistrat der A. Stadt Regensburg, der für öfentliche Sicherheit, Bequemlichkeit und Polizen sorget und seine Bürger und Schusverwandte richtet, behauptet sowohl die höchstansehnl. Kaiserl. Commission, als jede Gesandtschaft von der ersten bis zur lezten und das Reichserbmarschallamt, dann das Jochstift, die dren Reichsstifter St. Emmeram, Obers und Vieders Münster; die beiden Stifter zur alten Kapelle und St. Johann; die deutsche und Maltheser, Commende, und neun einzelne in der Stadt lies gende Klöster ihre Gerichtbarkeit; kurz wessen Brod und Schutz man geniest, von dem wird man gesrichtet.

fich schließt, dennoch weit beffer als an manchent unter eines Einzelnen Jurisdiction ftebenden Drt. Bon gewaltigen Dieberenen und Ginbruchen bort man außerft felten. Blutige Raufhandel fallen nicht leicht vor, und die vorzüglich guten Feuerans Stalten, *) die nicht leicht in einer anderen Stadt in der Ordnung und mit dem thatigen Gifer volls jogen werden, schuben uns feit vielen Jahren vor bedeutenden Feuersbrunften, und erfticken die Flamme gleich benm erften Ausbruch. Daber hat feit langer Beit Regensburg durch Feuer feine Bermuftungen mehr erlitten; wohl aber fteuerten im Rurgen die treflichen Unstalten und Lofchwertzeuge der Keuers: brunft 1762 ju Stadt am Sof und 1780 des funf Meilen von und entlegenen baperifchen Stabts chen Straubing, und ein Jahr barauf bes Dbers pfalzischen Marktflecken Regenstauf.

Die öfentlichen Begräbnißpläße der Protestansten sind ausser der Stadt, der eine liegt gen Wessten, der andere nach Süden. Auf beeden werden iährlich zwischen zwen bis drenhundert begraben; wur in den Jahren 1762, 770 und 772 **) beslief sich die Zahl über drenhundert. Zuweilen, jesdoch sehr selten, wird der Körper einer abelichen Standesperson in dem Borhof der Drenfaltigkeitsstiche, welche in der Stadt liegt, bengesezt. — Die Verstorbenen der Katholiken aber, deren Anzahl sich iährlich auf ohngesähr 400 belauft, wers den in denen in der Stadt liegenden Kirchhöfen zur

^{*)} G. Die 1781 Regensb. erneuerte Feuerordnung. 4.

^{**)} Wie aus ber zwoten Benlage zu erfeben ift.

jur Erbe bestättiget. Der Rirchhof ber obern Stadtpfarre St. Ruprecht ift im Stift Emmes ram; bie untere Stadtpfarre St. Ulrich hat des ren zwen, ben einen nachst der Domfirche, ben ans bern ohnweit ben Rapuzinern; in beede legtere wers ben auch die Berftorbenen gu Stadt am hof über Die Brucke ju und herein in die Stadt getragen, und die Burger im Dom, die Benfiger aber im Rirchhof ohnweit den Kapuzinern begraben. Außer bem hat iedes Stift und Rlofter noch feine eigne Begrabstatte nabe an feinen Wohnungen, wohin es die verftorbenen Ginwohner und feine Orbense bruder begrabt. Die bat man gwar, menigftens fo lang ich bente, offenbar nachtheilige Folgen von diefen Begrabnigen mitten unter ben Lebenden gehabt. Die beständig durchstreichende Winde, die feche Schuh tief und unausgemauerte Graber mos gen wohl bisher bas Gefahrvolle von uns abges wandt haben. In einigen dumpfichten Rirchen aber, wo überhaupt reine Luft felten gutommen fann, und in welchen man überdies die Todten in ausgemauerten Grabern langfam vermodern lagt, geschieht es gar oft, daß Perfonen von schwachs lichem Rervenbau frank und ohnmächtig werben-Freilich mare ju munschen, daß unfere Miteinwohs ner fich gemeinschaftlich entschließen mochten, ibre Berftorbenen gleichfalls auffer ber Stadt zu bes graben; ein Unternehmen, bas um fo leichter auss geführt werden tonnte, ba fie nur eins ober bas andre von ihren nabe an ber Stadt liegenden Fels bern bagu bestimmen burften. Bie verdient murs den sie sich badurch in den Annalen der Mensche heit

2000 =

heit machen, wenn sie durch diese löblichen Bors kehrungen, toddrohende Gefahren und Senchen, die einst unvermuthet und gar leicht ben anhaltenden heißen Tagen und windstillem Wetter eintreten könns ten, in Zeiten vorzubeugen suchten. *)

Auch unser Schlachthaus ist sehr schicklich angebracht; es liegt nach Norden und an dem User der Donau; noch nie hat es, sowohl seiner Lage als der darinnen herrschenden Reinlichkeit wes gen, Krankheiten verursacht.

Die Zahl der Einwohner von Regensburg bes läuft sich ohngefähr auf 20000. Denn ausser dem hochansehnlichen Reichstags : Personale, und vorzüglich dem Hochstagt und der Dienerschaft Sr. Zochfürstl. Durchlaucht von Thurn und Tazris 2c.; dem Zochstift und den dren Reichsstifztern, Emmeram, Ober: und Niedermünster sind in Regensburg noch zwei andre Stifter, die alte Kapelle und St. Johannes; serner die deutsche und Maltheser Commende, und neun Klöster **) enthalten. Die Zahl der Bürger magzwis

**) In Regensburg liegen zwen Frauenklöster, St. Clas

^{*)} Auch mit dem Begraben eilen unsre Miteinwohner oft zu geschwind; denn oft geschieht es, daß sie ihre Todten gleich nach 24 Stunden zur Erde bestättigen. Vor 3 oder 4 Tagen sollte keine Leiche, wenn sie and ders nicht deutliche Kennzeichen der Fäulnis äußert, begraben werden. Das zu schnelle Wegtragen der Verblichenen nach den Kapellen ist im Winter und ben kalten Tägen gleichfalls zu tadeln.

zwischen neun hundert und tausend inne stehen, und die Anzahl der Protestanten überhaupt sich auf 7 bis 8000 belaufen.

Eigentliche Manufakturen ober Kabriken *) find in Regensburg nicht, Runftler, Profefioniften und Sandwerker aber haben wir fast von allen Gattungen, als: Balln oder Pact , Binder, Barchet und Leinwandweber, Backer, Bierbrauer, Biers wirthe, Bilbhauer, Bleichmeifter, Blumenmacher, Bogner, Bortenmacher ober Posamentirer, Bos then, Brandweinbrenner, Buchbinder, Buchdrucker, Buchhandler, Brunnenmeister, Buchsenmacher, Buchs fenschifter, Burftenbinder, Cardetschenmacher, Corduaner, Drechsler, Gifenhandler, Schon : und Schwarg : Farber, Fechtmeifter, Feilenhauer, Fis fcher und Schifmeifter, Flaschner, Fragner, Garts ner, Galanteriehandler, Geflügelhandler, Beigen und Lautenmacher, Gehausmacher, Glafer, Glockens gießer, Goldarbeiter, Goldschlager, Goldschmiede, Gurts

ra, Clarisserinen und das h. Kreuz, Dominika, nerinnen; die sieben Mannsklöster sind, St. Jazkob, Benedictiner und meist gebohrne Schottlänzder, Dominicaner, Augustiner, Exiesuiten, (ben uns besorgen sie noch wie ehedem die Schule und den Unterricht der Jugend) Karmeliten, Minoristen und Capuziner.

*) Daß es aber ehedem welche hatte, bezeuget folgende Stelle aus den Statuten des h. Beda, der 738 starb: Ut nullus scarlatas aut Barraconos vel pretiosos Burellos (Kleiderstücke) qui Ratispone siunt, sive picta quolibet modo stramina habeat. Oper. S. Beranardi edit. Mabillonii T. I. pag. 343. in notis.

Gurtler, Guter : Befchauer, Guter : Beftatter, Sas fenbinder, Safner, Sammerfchmiede, Sarpudermas cher, Sebammen, Solzauswerfer, Solzhacker, Solze landschreiber, Solzmeffer, Solzreicher, Suf: und Waffenschmiede, Sutstaffierer, Raffeefieder, Ramms macher, Rarrnmanner, Cartenmacher, Rauf: und Sans delsleute, Kirschner, Knopfmacher, Korbmacher oder Zeuner, Roche, Kornmeffer, Krangelbindes rinnen, Rrauter, Rufner ober Binder, Rupfers schmiede, Rupferstecher und Wappenschneider, Lactirer, Land: und Lehnkutscher, Lebzelter ober Wachstergler, Leberer, Leinwanddrucker, Loberer, Maler, Mahlmuller, Mauerer, Megerschmiede, Megger ober Fleischhacker, Methfieder, Musikanten, Radler, *) Ragelfchmiede, Reiber ober Zeugschmiede, Reftler, Dbsthandlerinnen, Deller, Orgel: und In: ftrumentenmacher, Papiermacher, Parapluemacher, Pergamenter, Perudenmacher, Pflafterer, Porgels lanmaler, **) Rauchfangkehrer, Riemer, Ringels macher, Rothgerber, Gadler ober Beutler, Gag: muller, Saitenmacher, Salzaufleger, Salzhaber, Salzmaßler, Salztrager, Salzwicker, Sattler, Schachtelmacher, Schleifer, Schloßer, Schneis ber, Schreiner, Schroder, oder Auf: und Ablader, Echuh:

^{*)} Das hiefige Görische Haus soll einen besondern Kunst: grif, die Fischangeln zu harten, besitzen, und solche bis nach England versenden.

^{**)} Erst seit einigen Jahren haben sich zwo Familien hier niedergelassen, die besonders kleine Kasseebecher verschieden malen, brennen, poliren und deren viele 100000 Stücke das Jahr durch fertigen und über Wien nach der Türken verschieken.

ges

Schuhmacher, Schwerdfeger, Geifensieder ober Lichterzieher aus Inschlitt, Seidenweber, Seiler, Senften : ober Geffeltrager, Siebmacher, Spang: Ier oder Klemperer, Spigenmacherin und Filetar: beiterin, Sporer, Stadtbauern, Stedelschneider oder Leistenmacher, Steinmeten, Steinschneider; Stider und Stiderinnen, Startmacher, Stufatorer, Seiden : und Wollenstrumpfftricker und Wirker, Tangmeifter, Tapezirer, Tafchner, Tuchmacher, Tuchs fcheerer, Thurner, Trodler, Rlein : und Gros.Uhr: macher, Wachepofirer, Wagner, Wagenhuter, 2Bas genschmierer, Beinvifirer, Weinwirthe, Weisgers ber, Windenmacher, Wildprethandler, Wollkams mer, Streicher und Spinner, Wollwascher, *) Bengs macher, Ziegelmeifter, Ziegel : und Kalkbrenner, Bils lenschopper, Billenmeister, Bimmermeister, Binngief: fer, Buderbader, wogu auch die Ruchenbader mit ihren nur hier bekannten Strigeln, Rupfhaus ben 2c. gerechnet werden tonnen, Bubringerinnen von Magden.

9500

Die meisten dieser Gewerbe haben Gesellen oder Knechte oder Lehriungen. Alle diese Leute essen ben uns täglich zwenmal, meist warm, und das eben nicht schlecht. Einmal des Tags haben sie gewiß Fleisch, viele derselben auch zwenmal und Sonntags einen Braten. Braunes Bier ist der

*) Unfre Wollwascher haben einen besondern Vortheil, Baumwolle weiß zu waschen und schicken viele Cent-

ner derfelben auswärts; einige beziehen damit die benachbarten Jahrmarkte, ja felbst die Frankfurter

Meße.

gewöhnliche Trank und wird ben uns sehr gut ges braut und unglaublich viel verbraucht. *)

Der Bürger vom Mittelstande also lebt ben uns nicht schlecht; der größte Theil desselben ist wohl nicht reich, kann aber auch nicht arm ges nannt werden. In den theuern Jahren 1771 und 1772 die Teutschland allgemein drükten und wo alles Getraide zu erstaunend hohen Preisen stieg:

*) Heberhaupt ift die Confunction in Regensburg groß. Ich will nur ben den dren vornehmften Bedürfnigen, Bier, fleisch und Brod fiehen bleiben. Die Bahl Der burgerlich braunen Bierbrauer beläuft fich auf Diefe schenken ein Jahr in bas vier und zwanzig. andere gerechnet an Lager sowohl als Schenkbier 75000 Enmer, den Enmer ju 60 Ropfe oder 120 Geis Del, ober Rogel aus. Rechnen wir nun das Soche flift, Die dren übrigen Reichoftifter und Rlofter batt (denn alle Rlofter brauen und schenken Bier aus, Die Capusiner allein ausgenommen ; welcher offentlichen Schenk iedoch von der Stadt aus Bertragen und Raiferl. Erfenntnifen miderfprochen wird) fo merden 125000 Enmer nicht hinreichen, die jabrlich in Res gensburg allein (die benachbarten Bierbrauer ju Stadt am Sof nicht mitgerechnet) confumirt werden. Sierunter ift aber weder das Nachbier, Rovent genannt, welches arme Leute häufig trinken; noch auch das weiffe Berften : und Waizenbier begriffen. Lettes res wird nur allein von der Stadt gebraut, und Gna mer, Salbenmer ze. weis in dem Brauhaus, Rop= fel und Krugeweis aber in ben Birthe: und Schenkbaufern verfauft.

stieg: das Schaff Korn z. B. welches gewöhnlich C 3

Die burgerlichen Meiger fchlachteten 1782.

Ochsen, Rühe, Kalber, Hameln, Schweine, Schweine, Die von Gastgeb u. Wirthen geschlachtet worden.

Inschlitt

2695. 20. 4302. 5013. 1262. 3596. 212570 Pf-

Im Jahr 1783.

2680. 16. 3760. 5913. 866. 3999. 203800 Df.

Im Jahr 1784. NB. Es jogen R. R. Truppen burch.

2931. 16. 4168. 5340. 884. 3970. 223075 Pf.

Im Jahr 1785.

2776. 13. 4008. 5388. 707. 2943. 197436 Pf.

Im Jahr 1786.

2636. 25. 3300. 4658. 706. 3708. 183466 Df.

Ausser dieser großen Menge klein und groß gesschlachteten Viehs wird nicht nur in den Stiftern und vorzüglich zu St. Emmeram, das einen eignen Mezger hat, sehr viel Vieh geschlachtet und verzehrt, sondern auch ein großes Quantum Fleisch von den Mezgern zu Stadt am Sof und vom benachbarten Lande nach den Klöstern und andern nicht unter dent Magistrat stehenden Einwohnern geliesert.

Da ausser den bürgerlichen Bäckern, die Stifter und Klöster ihre eignen Pfister oder Bäcker haben und sast iede große Haushaltung von selbst gekauftem Korn ihr Sausbrod backen läßt, so kann um so weniger das Quantum des iährlich in Regensburg verbacknen Mehls genau bestimmt werden; jedoch wird die Consuntion am Getraid auf 10000 Schaff hiesiger Messeren gerechnet. — Neberhaupt ist unser Bier, Fleisch und Brod von vorzüglicher Güte; von

armten freilich viele Bürger; andre erhielten sich mit vieler Mühe; niemand aber ist aus Hunger gestorben, da täglich durch allgemeine Anstalt Brod, theils umsonst, theils in billigem Preis: Berhältnis öffentlich abgegeben wurde. — Das Bettelvolk ist seit diesen Jahren noch zahlreicher als es ehes dem schon war; die gröste Menge desselben aber macht das benachbarte Landvolk, die reisenden Sandwerksbursche, der verarmte Beysizer und die Schuzverwandte aus. Dieses ungestüme zahlreiche Bettelvolk, dessen gröster Theil seiner Jahr

lezterm haben wir verschiedne Gattungen, als Haussoder Schwarzbrod von Korn gebacken; Semmel, Eper, und Milchbrod, Iwiebacker von Waiken.— Für die Preise, das Maas und Gewicht dieser dren nothigsten Artikel zur Erhaltung des physikalischen Lebens sorgt ein eignes Amt, das Jansnericht genannt mit lobenswürdigem Eiser, und läßt die von Zeit zu Zeit gemachten Fleisch. Bier, und Brods Säze**) öffentlich bekannt machen.

Da die Consumtion in Regensburg so groß ist und die Stadt selbst, einige Morgen Aecker abgerechs net, keine eigne Besitzungen oder Ortschaften hat, sons dern alle diese Lebensbedürfnisse von Pfalz Sapern bezieht, so ist klar, daß nur allein dem angränzenden pfalzbaperischen Unterthan durch diesen Verschleiß der größte Vortheil und Nußen zuwachse.

- *) Ja bis auf 148 fl. als für welchen Preis die Stadt aus den Herzogl. Sächsischen Landen Getraid koms men solches aber nicht höher als nach dem Preis zu 60 fl. abbacken ließ.
- **) Siehe die Regensburgischen Frag- und Ungeig-Blatter.

Jahre, Gesundheit und Kräfte wegen, sich Brod mit Handarbeit erwerben konnte, scheint selbst durch das zu reichliche Allmosen, das ihm täglich von Stiftern, Rlöstern und andern Partikuliers gereicht wird, aufgemuntert zu werden, durch belästigendes Betteln allein sein Brod zu verdienen. *).

2000

Es läßt sich nichts bestimmtes von dem eigensthümlichen Charafter der Regensburger sagen, weil sie so sehr mit Ausländern vermischt sind, und sich äusserst selten bis zur dritten Generation mit ihren Landsmänninen begatten. **) Uebrigens haben sie sehr viel vom bayrischen National: Charafter: ehrlich, aufrichtig, ohne Komplimente, und kömmt es zum Wortwechsel oder gar zum Handgemeng — nachdrücklich grob. Zu ans haltende Arbeit und Anstrengung der Kräfte liebt E 4

- *) Gegen den Bettel hat die Stadt seit einigen Jahren mancherlen Vorschläge zu gemeinsamen Anstalten
 gemacht, auch zu dieser Absicht in ihrem Waisenhaus
 eine Wollspinneren errichtet, und denen allda arbeitenden Katholiken einen Gottesdienst gestattet (denn
 Toleranz mit ihren inn- und ausländischen Einwohnern ist ein Charakterzug der Regensburger): aber
 noch ist über den Plan, daß der Gassenbettel aufgehoben und das bestimmte Allmosen in einen gemeinfamen Seckel gebracht werden soll, eine Vereinigung
 nicht zu erreichen gewesen.
 - **) Die Einwohner des Ober. und Unterwörths wählen sich meist wieder Regensburgerinnen von ihrem Stand und haben daher ziemlich unverfälscht die Sitten und Sprache ihrer Großväter.

der Regensburger sowenig als sein naher Nachbar, der redliche Bayer; *) was er aber thut, greift er mit Muth an und die Arbeit geht ihm von der Hand.

*) Der banerische Landmann und Burger ift ben weiten nicht fo dumni und unaufgeflart, als viele Auslanber glauben. Gein Rorper ift fart und fraftvoll, Daber ift er auch in feinen Leidenschaften und Bes tragen haftig, berb, dreift und feck, ohne aber übereilt, bart und graufam gu fenn. Herr Micolai fchildert den Charafter der Banern mabr, wenn er fpricht: " die Bayern find rohe Rinder ber Da= , tur, unverwohnt, voll Trieb, voll Grafte, die nue " recht geleitet ju merden bedürfen. Ben einer fols den Nation gebeiht ber Saame ber Aufflarung , wohl noch beffer als ben einer vergartelten und " weichlichen, Die viel mehr finnliche Politur bat und , nicht an frenmuthiges Denfen gewohnt ift. Dur 地。 " muß einer Nation, wie die banerische ift, Luft ge-390 , schaft werden, damit der schwache Gaame der Auf= , flarung nicht erftice." - Er liebt feinen Candsberen und feine Serrichaft über alles und mit uns verfälschter Treue, ift ernfthaft, aufrichtig, arbeitfam, gaftfren und gegen Arme und Nothdurftige mitleidig und unterftust fie nach Rraften, gedenft aber der guten Sandlung, Die er einmal ausgenbt hat, nicht weiter mehr; er hat in feiner Sprache und feinem Betragen mohl viel plumpes und raubes, aber etwas gang originelles. Ein ehedem sich hier aufhaltender Englander, ber Die baperische Mation mit Aufmerkfamfeit beobachtete, fand, daß ber achte Baper viel Achnliches in feinem gwanglofen Betras gen mit bem englischen gemeinen Mann habe. feiner Lieblingsfenerlichkeiten ift bas Dferderennen: wird er uneinig und jum Born gereist, fo bart ober prügelt er fich mit feinem Gegner entweder mit

Hand. In Uebung der Religion ist er minder eifrig oder bigott als lezterer. Etwas früher Feners abend und ein Glas Bier mit einem Pfeischen Los back ergößen ihn. Die Sonns und Fenernachmitstage bringt er meist in Besuchung eines nahen Wirthshauses zu und theilt im Sommer dieses Vergnügen mit seiner Hauswirthin. Lose Leute sagen den Regensburgern nach, daß sie gern trins Fen; dasür zieht der bürgerliche Einwohner aber ein Glas Vier dem Kassee vor, und dieser ist zwar iedem Kinde bekannt, wird aber nicht so alls gemein und oft getrunken als in Sachsen und ans dern Gegenden. Auch Brandwein und Liquurs

in Minter fann fenter.

200

Many dan dan nigen E gill sie einde werell

ber Kaust oder einem Prügel auf Leben und Tod. -Schandlich aber ift es, daß diefe unverfalschte und biedere Treubergigfeit des Baners von feinen eignen Landsleuten oft misbraucht und ben den Auslandern fur Stupiditat angegeben wird, oder bag ihm wohl gar Sandlungen gur Laft gelegt werben, die er nie bes gieng. Go erschien erft neulich eine Sfartefe: Meues fter Serenprocef aus dem aufgeflärten beus tigen Jahrhundert : ober fo dumm liegt mein bayerisches Vaterland noch unter dem Joch der Monche und des Aberglaubens, in welcher der unverschämte Verfasser ein elendes Mährchen aufa tifcht, und um die Sache mahrscheinlich ju machen. mit plumper Dreiftigfeit Orte und Perfonen nennt, Deren Ramen nie exifirt haben. Der entfernte Auslander, und besonders ein oder der andre Journalist hascht diese Geschichte für Wahrheit auf benn wer follte fich traumen laffen, bag man fo bos haft calumniren konne — und verspottet oder bebauert wenigstens den armen Bayer.

werden hier, gegen viele andre Orte gerechnet, sparsam und mäßig genoßen.

So viel von dem Mittelstande. Der Begütterste bringt seine Abendstunden für sich und zuweilen in selbst gewählten Gesellschaften beym Spiel und einem Glas Wein hin. — Die Adelichen und die Ersten des Reichstags machen unter sich einen Zirkel aus, in welchen Unadeliche nur dann Zutritt erhalten, wenn ihr Charakter, z. B. Geschäftsträger eines Hofs, solches mit sich bringt. Sie geben unter sich prächtige Tafeln, Gesellschaften, Concerte und Spiele. — Der so genannte Leonische Adel ahmt diese Unterhaltungen nach und macht sür sich wieder Clubs — Im Winter kann ieder, der Lust hat, an den öffentlichen Ergößungen, als Bälle, Redouten zc. Antheil nehmen.

Ueberhaupt ift ber Umgang in Regensburg, ber aus fo manchfaltigen Gliebern besteht, eben nicht fteif, und ieder tann ungezwungen und nach feinem Geschmack leben. Die Berschiedenheit der Relis gion hat auf das Gefellschaftliche nicht ben geringe Wir leben und weben auf bas ften Ginfluß. Freundschaftlichste mit einander und man fieht es uns aufferhalb der Kirche nicht an, daß wir über Religionsgebrauche fo verschieden benten; ia mas das Schönste ift, fo fprechen wir nie ernftlich über Diefe Berfchiedenheit, noch weniger ganten wir und. Diefer ungezwungene, gefellige und abwechfelnbe Umgang macht auch, daß Fremde, die von großen volfreichen Stabten fommen, nach und nach Res genss

gensburg so lieb gewinnen, daß sie es ungerne wieder verlassen und selbst oft ihrem Geburtsorte vorziehen.

Alles was zum Lurus gerechnet wird, als gut Effen und Trinten , Rleider und Equipagenpracht fleigt ben uns, wie überall. Daber mag es auch tommen, daß die Ehen in etwas fparfamer wers ben als fonft. Sie find aber meift fehr fruchtbar und gefegnet; ich tenne Dutter, die zwolf und mehrmalen gebohren haben; funf bis fieben Rinder, in einer Che erzeugt, find gewöhnlich. Unerlaubte Schwangerschaften kommen mit unter auch ben une, wie überall, vor; von boshaften Berheimlichungen derfelben aber horen wir felten. Gines gefliegents lichen Kindermords *) erinnere ich mich feit vielen Jahren nicht, wenigstens ift er ungleich feltner und unerhörter ben uns, als der Selbstmord. — Die meiften Mutter, felbft die Bornehmen ftillen ihre Kinder. Die allgemeine Roft ber Rengebohrs nen die mit Bager erzogen werden, oder denen die Bruft nicht fattsame Rahrung giebt, besteht in Mehl mit Ruhmilch zu einem Dus, ober Bren gefocht. Schwächliche Magen verdauen diese Speife nicht,

*) Die Ursache dieser Seltenheit ist wohl in der sehr geringen Strase — an öffentliche Beschimpfungen wird gar nicht gedacht, — mit Grund aufzusuchen. Ein geschwächtes Mädchen zeigt der Obrigseit die Schwangerschaft an, und zahlt 6. fl.; kann es auch diese kleine Summe nicht erlegen, so wird es zwenz mal 24. Stunden in sehr leidlicher Verwahrung bes halten. bekommen baber Brechen , Bauchgrimmen , grune, magrichte, gehactte Stuble, verftopfte Gefrosdrus. fen , innerlich ftille Freisen und fterben an dem Jams mer. Starte Rinder aber befinden fich wohl daben. Mus Zwieback gekochter Bren wird ihnen nun von ein oder der andern Mutter mit ungleich begerm Gedeihen gereicht. Gind fie einmal über ein Jahr alt, ben eintgen geschieht es viel früher, so geben manche Mutter, oder die Barterinnen ins Geheim denfelben Morgens Raffee mit vieler Milch verfegt. Die meiften Kinder bes Mittelftandes und ber Tage werfer trinken Mittags und Rachts braun Bier, eis nige auch weißes ; die Rinder ber Bornehmen wers ben meift an Bager gewohnt. Der Unzug der Rins der ist nicht mehr so angstlich und zwangvoll als ches dem; bas meift unbedectte Saupt und die furgges fchnittnen Saare machen, dag der Grind ober Schorf, ben uns der Webekopf genannt, feltner als fonft porfallt. Die minder fteiffen Mieder , Sarnische von Kischbeinen und Steifleinwand mit Beug ober Tuch überzogen , - werden erft bem erwachfnen Madchen angezogen. Budlichte oder verwachsene Perfonen find baber ben uns nicht haufig. Spul und Madenwürmer beschweren fo wie bie Drusenverstopfungen des Gefroses unfre Kin: der oft ; die englische Rrantheit aber tommt im Gangen genommen , ben uns eben nicht fo baus fig vor, und befällt nur arme, ober folche Rinder, beren zu viele in ein undurchluftetes enges, uns gefundes Stubchen eingeschloßen find. Wer feine Rinder liebt und fie gefund und groß erziehen will, ber weise ihnen, wenn er fann, bas schonfte geraus migfte

fons

migfte Zimmer feines Saufes an. Denn ich fah Rinder von gefunden Eltern erzeugt, fart und frafs tig gebohren, in einer engen dumpfichten Rinders ftube erft in der zwanzigsten, drengigften Boche bas bin welfen , die , in ein gefundes mit frifcher Luft erfülltes Zimmer verfest, ohne alle Arznen von felbft wieder auflebten. - Das schreckliche Lafter ber Onanie Schleicht frenlich ben und auch im Berborgs nen; Junglinge treiben es mehr als Madchen. Els tern, Lehrer und Auffeber tonnen nie machfam ges nug auf diefe Beift und Gefundheit gerftobrende bofe Gewohnheit fenn. Doch herrscht diefes Las fter nicht fo allgemein ben unfern Junglingen und in unfern bobern Schulen, als an manchem ans bern Drt. - Auch die Luftseuche tennen wir, noch aber wutet diese furchterliche und den mensche lichen Korper entstellende Furie nicht fo offenbar und allgemein als wo große Garnisonen find. Rleine Galanterien , Trippergeschichtchen zc. fallen zwar ziemlich oft vor; die Meiften halten aber folches ges beim, oder consultiren ihren gefälligen Balbier, und wann ber nicht mehr Rath zu schaffen weis, dann trift die Reihe erft den Argt. - Doch mers ben ben une viele, befonders burgerliche Chen volls jogen , wo Junggefell und Jungfer in ftrengfter Bedeutung in der erften Sochzeitnacht fich einans ber den Gurtel lofen ; und da das Madchen meift fich verhenrathet, mann es schon einige zwanzig gablt und ber Mann oft gar fchon drengig, fo giebt bas eine ruftige und gefundheitsvolle Rachkommens Schaft. Unfre gefunden Dadden werden gewohns lich zwischen dem 15. und 17. Jahr leicht und ohne sonderliche Beschwerden flick und reif, und als Weis ber bleiben sie bis in das 48. Jahr oft fruchtbar; die schwächlichen aber bekommen die Reinigung frus her, meist aber sehr unordentlich und zuweilen mit Schmerzen; einige verlieren solche nach ein paar Mos nathen ganzlich, und bleiben einige Zeit bleich suchtig.

Auch der Armeund das elternlose Rind ift ben uns nicht vergegen. Für Katholische sowohl als Evangelische fteben in Regensburg zwen geraumige Waisenhauser, in welchen die Rinder nicht nur dienlich gute Roft und Kleidung, fondern auch den nothigen Unterricht fo lange erhalten, bis Alter und Rrafte es erlauben , Sandwerke zu lernen oder in Dienste zu geben. In dem geraumigen evanges lifche lutherischen Waifenhaus, das dermalen 41. Bais fen und Ziehkinder gablt, werden auch Zuchtlinge von benden Religionen in eignen dazu bestimmten Stuben auf einige Zeit gur Begerung aufgenommen. Ueber diefes Waifen und Arbeitshaus fowohl, als über die andern milben Stiftungen fur Urme ift vom Magistrat ein eignes Collegium niedergefest, mels ches das Allmosenamt beißt und für die Aufrechts haltung diefer mildthatigen Inftitute forgt. Denn außer vielen Legaten , die den Sausarmen gufliegen, verfieht diefes Umt auch feine arme frante Glaubenegenoßen mit Mergten , Argnenmittel und zuweis Ien auch mit Roft. Unter der Aufficht und rubms lichen Sorgfalt des namlichen Umtes fteben bas Seelenhaus; das Allumneum; welches berma: Ien zwolf Studenten nahrt; das Bruderhaus in welchem berarmte alte Burger verpflegt werden;

Das

das Blatterhaus und der Pfrundhof. Bende find fur Urme, Rrante, Silflose und Glende gleiche falls von evangelischer Religion bestimmt; im ersteu befinden fich dermalen 17. und im lezten 31. Perfo: nen benderlen Geschlechts, worunter zwen Wahns finnige find. Das Blatterhaus hat überdieß ein eignes Zimmer für franke handwerksbursche von eis nigen bestimmten Profegionen. Ferner gehort gu ben wohlthätigen Stiftungen das reiche Spital, welches in der Stadt liegt. Es nimmt und vers pflegt auf Zeitlebens gegen eine benm Eintritt ers legte Geldfumme nur Weibsperfonen; ihre Bahl ift bermalen acht. — Das Ratharinen Burs ger: Spital am Bug ber fteinernen Brude nimmt gleichfalls auf Zeitlebens eine bestimmte Zahl, namlich 30. evangelische und eben fo viele katholische Pfrunds ner von benderlen Gefchlecht fur eine benn Eintritt febr magig erlegte Summe ohngefahr 40. fl. und oft noch weniger auf, und verfieht fie mit Fener, Licht, zwenmaliger warmen Roft bes Tags u. f. m. Außer diefen 60. Inwohnern reicht diefe milde Stif: tung eben fo vielen nicht im Spitalwohnenden die so genannte troffne Pfrunde, welche nur in Bier und Brod besteht. - Die Ratholifen haben fur arme Dienftbothen , erfrantte ober reifende Sandwerks: bursche ihrer Religion ein Siech ober Krankens hans St. Joseph zu 20. bis 24. Betten, in wels ches diefe unentgeldlich aufgenommen und mit allent Rothigen verforgt werben. Ein Jahr in bas ans dre gerechnet, beläuft fich die Bahl der Aufgenoms menen in diefes Rrankenhaus, bem mein Dater nun schon

schon seit 37. Jahren als Arzt vorsteht, auf 60. bis 100. *)

Auch außer den katholischen Waisenkindern, des
ten 49. dermalen an der Zahl sind, welche wie die Evangelischen in ihrem Institut Kleider, Kost und nös thigen Unterricht erhalten, werden die meist auf den katholischen Kirchhösen oder Vorplätzen der Kirs chen ausgesezte kleine Kinder, das sich aber selten ereignet, bis ist zwar noch nicht in einem eignen Sindelhaus versorgt, wohl aber in gute Kost ges geben und die meisten in der Folge, so bald es ihr Alter erlaubt, in das Waisenhaus ausgenommen.

Regens:

*) Die eigentliche Stiftung beschränkt sich freylich nur auf katholische Dienstboten und Jandwerksbursche, die ben Evangelischen arbeiten. Da aber der Fond es erlaubt, so wird dieses milde Institut auf alle katholische, hilstose Kranke, sie senen alt oder jung, gehenrathet oder ledig, ausgedehnet. Aufgesnommen wurden in den Jahren

```
1770 - 67. Personen
                                         55. geft.
                                1778 --
                 gestorben 18
                                         64. -
                                1779 -
                                                  16
         80. die theuern
                           17
                                         64.
                                1780 -
                                                  14
                           23
                                         79.
                                                  14
          44.
1773
                           11
                                         75.
                                                  8
          46.
1774 -
                           5
                               1783 - 87. -
                                                  17
          60.
X775
                           13
                               1784 - 107. -
                                                  13
          75.
                           15
                                1785 - 102. -
                                                 19
          39.
                           IO
                               1786 - 123. -
                                                 23
```

Regensburg zählt dermalen fünfzehn ausübende Aerzte; *) acht bürgerliche Wundarzte fünf bürs gers

*) Ich füge hier das Nahmenverzeichnis derjenigen Aerzte in chronologischer Ordnung ben, welche von 1585. bis ist in Regensburg ihre Wissenschaft ausübten.

Johann von Oberndorf 1585. Zacharias Driis gel. Gebaftian Scheib. Martin Auland 1585. Johann Stephan Strobelberger 1599. Johann Rofa 1600. Georg Meindel 1602. Michael Bichtl Johann Freytag 1617. Johann Albert Steininger 1625. Andreas Ruland. Phylic. (febrieb qu erft vont Abacherbad 1630.) Johann Selwig 1634. Cafpar Meevius. Michael Schwanzhofer 1637. Johann Megger 1652. Gallus Etschenreuter 1654. Joh. Detr. Denckel 1658. Georg Chriftoph 21mman 1659. Beinrich Magnus Seigel 1660. Gottlieb freytag 30hann Daniel Geyger 1662. Johann Georg Mühl. Johann Daniel Geyer 1662. Johann Karl Wider 1663. Georg Adam Dummer. Johann Lehner 1663. Martin Chriftoph Megger 1664. Georg Deter Diererus 1669. Georg Weis 1671. Ambrofins Seigel 1681. Georg Eric. Thill 1682. Georg Chris ftoph Böller 1683. Johann Georg Beuttel 1687. Joh. Georg Jehbauer ftarb 1700. Chriftoph Daniel von Megger 1687. ftarb 1738. Georg Andreas Ugris cola. Phys. 1692. ftarb 1738. Joh. Georg Böller, Mhnf. 1702. Sigismund Cornel. Koch 1702. Bolfa. Math. Brunner 1705. Joh. Adam Borig 1706. Joh. Georg Nifolaus Dietrichs Phyf. 1707. ft.1737. Chrie ftoph Ludwig Böller Phof. 1709. Johann Leonhard Sechtel 1713. Joh. Christoph Spieß ; Geptimus Andreas Oppermann Phys. 1715. ft. 1775. Johann Mathias Suchs 1717. Johann Christoph Arzwiesee 1718. Joh. Jacob Straffircher. Joh. Christian Sabricius Phys. 1718. ft. 1742. Ambrof. Carl Bies ler Phnf. 1719. ft. 1748. Georg Friedr. Orth 1720.

50

* STATE

gerliche Apotheken *) und die fechste im Reichsstift and birgerittee stimmenerite

Beinrich Tillem. Stock 1724. Joh. Wilhelm Ugris cola 1731. Joh. Börig 1731. ft. 1747. Joh. Georg Pfenning Phys. 1732. ft. 1749. Ludwig Michael Dietriche Phyf. 1737. ft. 1769. Joh. Friedr. Beb. ling Phys. 1737. Joh. Michael Schwars 1737. ft. Christoph Friedr. Allkofer 1738. ft. Wolfgang Gis aismund Müller 1739. Joh. Christoph Suber 1740. ft. 1769. Joh. Gottlieb Schäffer Donfic. 1745. Dis chael Andreas Gros 1745. ft. Georg Albert von Selpert 1747. Phys. fuff. und Garnif. Med. ft. 1774, Soh. Christoph Illrich Oppermann 1747. ft. Eduard Million Co. Jafob Lupin 1750. ft. 1772. Beinrich Paul Oppermann 1755. ft. 1772. Joh. Beinrich Büttner 1755. ft. 1758. Chriftoph Theophil. Braufer Mhof. fuff. und Garnif. Med. 1756. ft. 1785. Joh. Albert Ripede Sochfürftl. Thurn und Taxischer Leibmed. 1757. ftarb 1782. Joh. Sigismund Stoll 1760. ft. 1772. Joh. Mathias Juchs 1762. ft. 1766. Joh. Christoph Sars rer Phys. suff. Garnis. Arst 1767. Elias Theodor Sefling 1770. Jaf. Christian Gottlieb Schäffer 1774. Joh. Jak. Aohlhaas 1774. 306. Ulrich Bottlieb Schäffer Sochfürfil. Wallerft. Leibargt Hofrath und Landphyf. (ift feit 10. Jahre abwefend, doch mit Beibehaltung des Burgerrechtes, Ranges und Stelle im Colleg. med. 1776.) Georg Jaf. Wies remberger 1779. ft. 1782. Thom. Knigge 1780. ft. 1786. Eduard Gottfr. Christoph Elsperger 1782. Andreas Theod. Bemeiner 1786. Der tieffebende Klinifer Sr. geheime Rath von Brever ift erfter Leibe arit Gr. Sochfürftl. Durchl. des Fürften von Thurn und Taris ze. ze. und Sr. Sofr. Winkhler der zwente. Außer legtern leben noch folgende fatholische Mergte ges genmartig hier: die herren D. Jollner, Bater und Sohn, und Sr. D. Chehr.

Die Rahmen unfrer Apothefen find jum Engel, jum 21dlev

St. Emeram. Gemeiniglich find bie zwen altesten burgerlichen Merzte Stadtphpfici und der dritte Gar: nisonsmedicus. Obschon überhaupt die Lage unfrer Stadt gesund und das benachbarte Land durchaus angebaut ift, ja felbft die in der Stadt an vielen Baufern angelegte Garten gur Berbegerung ber Luft nicht wenig bentragen, so fehlt es uns dennoch an Patienten nicht; doch find contagiose und vers wuftende epidemische Rrantheiten ben uns außerft felten. Im Jahr 1713. war die Peft, welche von Juden mit angesteckter Wolle hieher gebracht wurde, jum leztenmal in Regensburg. Diefer unfrer ges funden Lage haben wirs ju verdanken , daß wir auch feine eigenthumliche ober lofalen Krantheis ten haben. *) Ziemlich oft kommen ben uns Bleich und

Abler, zum Löwen, zum Mohren und zum Eles phanten. Alle zwen Jahre werden dieselben in Ges genwart der ad rem medicam wohlverordneten Hrn. Deputirten von den zween Physicis und den nachsols genden ältern zween Stadtärzten und zween Apothes kern auß genaueste visitirt und dem Magistrat hiers über schriftliche Nachricht überreichet.

Dier muß ich auch mit ein paar Worten der Art Krankheiten vorzubeugen, gedenken, welche ben uns Mode ist. — Der größte Theil der Einwohner Regenssburgs und der umliegenden Gegenden ist gewohnt — präservative neunt man das Ding — jährlich zwen, dren bis viermal zur Aber zu laßen und im Früh und Spätjahr ein abführendes Mittel zu nehmen. Beschonders allgemein herrscht dieser Misbrauch in den Klöstern. Die Purgirmittel müßen stark wirken, wenn sie anders Benfall erhalten wollen. Mit sieben

sind Wassersuchten, am häusigsten aber Leibs schäden vor; die Ursache mag wohl mit Recht in unsern etwas erschlassendem Clima und dem mastens den Biertrinken auszusuchen senn. Der weiße Slußist ben bürgerlichen gemeinen Beibern seltner, ben vornehmern aber ziemlich frequent; die goldne Aber beschwert nicht nur das männliche, sondern auch unser weibliches Geschlecht nicht selten; Krebssschäden der Brust sowohl als der Mutter sehen wir aber zum Glück unsere Weiber und alten Jungsern ganz

ober achtmaligem Effect ift man felten gufrieden; Dies ieniae Arinen aber, welche fünfzehn bis zwanziamal auf den Stuhl geben , und dren bis viermal dagu bres chen macht, wird vornehm und edel genannt. Acht bis eilf Grane vom achten felbft praparirten Salaps penharz mit einem Gran Brechweinftein verfest, dem man oftere noch ein Mufidepulver von Weinftein und Talappenmurgel por Schlafenlegen vorausschickt, ents fprechen diefer Erwartung ben unfern Biermagen. Dag Weintrinker und schwächliche Perfonen folche heftig angreiffende Mittel ohne fichtbare Gefahr nicht vertragen tonnen, verfteht fich von felbft. Daber muß der Argt ben fo verschieden lebenden Individuis aufferft forgfam mit den Purgirmitteln ju Berfe geben, wenn ihm anders feine Ehre und die Befundheit feiner Rranfen nahe geht. - Die popularen Arinenmittel, Die man bem erften Anfall jeder Krankheit entgegen fest, find ichweiß treibend : als das Marggrafen Pul= ver , praparirte Rrebsaugen , Weinftein , jumeilen auch Theriaf; wills damit nicht frommen, fo wird purgirt, Abergelagen, geschröpft - und wirds auch bars auf nicht beger, fo trift die Reihe erft den Argt. Rlugere lagen ihn frenlich gleich nach ber erften fruchtlofen Gabe eines Temperirpulvers rufen.

gang felten. - Den eigentlichen Scorbut fennen wir nicht, die intermittirenden Sieber find ben uns überhaupt feltner, als an vielen andern Orten; am fparfamften aber tamen fie in den dren Jahren 1784, 1785, und 1786. vor. Die Krane ift ben und wie überall bekaunt und Rindern und ges wifen Profefioniften vorzüglich eigen. Außer jener Katarrhalischen Epidemie 1782. denke ich mahrend ben zwolf Jahren , ba ich hier meine Wifenschaft übe, feine fo allgemeine; auch mein Vater, ber feit 41. Jahren glucklicher praktischer Argt in Regens: burg ift , erinnert fich feiner betrachtlichen. *) Die 1771. und 72. auch ben uns herrschende Kaulfieber tonnen nicht bieber gegablt werden , weil fie nur Kolgen bes Mangels und ber verderbten und gum Theil Schadlichen Roft maren. Rleinere Epidemien und Jahresfrantheiten haben wir, wie jeder ans Derer Ort. In derjenigen bestimmten regelmäßigen Ordnung folgen aber lettere ben und nicht aufeinander, in welcher, wie und Grant gufichert, folche ben ihm in London erscheinen. Indefen finde ich doch in meinen täglichen Disitenbuchern, in welche ich feit zehen Jahren nicht nur die Witterung jedes Lage, fondern auch die Krankheiten ber einzelen Patienten mit ein paar Buchftaben anzeichne und jum Schluß jedes Monats das Refultat der barin: innen

*) Viehkeuchen nähern sich außerst selten unsern Ges genden; mein Vater wenigstens erinnert sich keiner allgemeinen Epizotie; die unter den Schaafen 1753. ausgenommen und von meinem verehrungswürdigen Oheim im ersten Band seiner Abhandlungen von Insecten S. 1. 2c. beschriebene.

innen geherrschten und am öfteften vorgekommenen Brankheiten hinguschreibe, daß in Bergleichung vers fchiedner Jahre miteinander, fast die nehmliche berrs schende Krantheit in jedem gleichbenannten Monat der verfloßenen Jahre eingeschrieben steht. *) Go finde ich im Januar fast alle Jahre folgende Krants beiten angemerkt: Ratarrhalische Zufalle aller Urt, als huften , Bruft und afthmatifche Befchwerden; benen die zur Lungenschwindsucht große Unlage batten, ein wichtiger Monat, weil meift in bemfelben ber gute ober uble Ausgang diefer Krankheit int Boraus bestimmt werden fonnte. In einigen Jah: ren waren außerdem in diefem Monat noch rheus matische Zufalle, mit unter auch Tertianfieber, der Schlagfluß, die Lahmung und Blutfturzungen der Mutter angezeichnet. -

Im Februar sind nebst katarrhalischen die rheus matischen Beschwerden, als Jahn und Halsweh, entzündete angeschwollne Mandel te. die gewöhns lich und meist vorkommende Krankheiten. In einis gen Jahrgängen sinde ich auch intermittirende Fieber.

Der Monat Martins zeichnet sich nebst katarrs halischen Zufällen durch leichte Entzündungen, ars thritische Beschwerden, die Gicht, den Schlagsuß auß.

In den Monaten April und May waren nebst nachlaßenden katarrhalischen und rheumatischen Zus fällen, die Terkiansieber; mit unter auch Koliken anges

^{*)} Siehe die dritte Benlage.

angeschrieben. Um meisten starben im Dan die, welche schon lange an der Lungenschwindsucht Litten.

Der Junius zeichnet sich vorzüglich durch Die arrhoen und leichte Rolifen aus; mit unter kommen auch Halsweh vor; im Jahr 1780, waren viele Mervenkrankheiten, als Fallsucht, Lahmung, Schlag,te. angemerkt.

Im Julius finden fich außer rheumatischen ars thritischen Zufallen, am häufigsten Rolifen Diarrhoen und Cholera aufgezeichnet. — Als ich 1782. in Diesem Monat gerade in Bien war , fab ich im Drenfaltigkeit Spital, welchem der verdienstvolle Stoll damals vorstund , Ruhren und viele Quars tanfieber; in Regensburg fand ich ben meiner Rucks Kunft nur Tertianfieber aber feine Dyfenterien.

Der August zeichnet sich ben uns immer febr merklich und unversteckt durch gaftrische Krankheiten, als Rolifen , Diarrhoen und mit unter auch, wies wohl in der Stadt immer febr fparfam, mit Ruh: ren aus; auf ben uns benachbarten Ortschaften berrichen legtere fast jeden beifen Sommer ziemlich allgemein. In einigen Jahrgangen finde ich auch Podagra und die Gliedergicht hingeschrieben.

Meist herrschen im September Diarrhoen und zuweilen auch noch Ruhren fort, befonders wenn die Tage beiß find. Die Berbsttertianfieber melden sich entfernt, so wie die rheumatischen und

fatarr*

230/10/19

katarrhalischen Zufälle anfangen, sich wieder eine zufinden.

Im October sind in einigen Jahren noch gasts rische Krankheiten, als Durchfälle, Grimmen zc. aufs gezeichnet; in den meisten Jahrgängen aber stehen Rothlauf, arthritische, podagrische und katarrhalis sche Beschwerden; mit unter auch Tertiansieber.

Im November finde ich Rothlauf, Gallsuchsten, intermittirende Fieber aller Art, Gliederreißen, Halsweh, Schlag, früh: und unzeitige Geburten am öftesten angeschrieben.

Im December herrschen ben uns gemeiniglich katarrhalische, rheumatische Krankheiten aller Art, als Schnupfen, Husten, Stecken, falsche Lungens entzündungen, Gliederreißen u. s. w.

Die in meinen Jahrbüchern aufgezeichnete ans steckende und von der Witterung nicht abhängens de Krankheiten, als Pocken, Masern, das Scharslachsieber, der Keichhusten u. s. w. übergehe ich deßswegen mit Stillschweigen, weil ich hier nur einen kleinen Abris von unsern gewöhnlichen Jahresskrankheiten geben wollte. Alle diese einzelnen Witterungskrankheiten aber mussen der epidemis schen Constitution oder der Sebris stationar.*)

ges

^{*)} Variae funt annorum constitutiones, quae neque calori, neque frigori, non sicco humidove, ortum suum debent, sed ab occulta potius et inexplica-

gemäß behandelt werden; und geschieht bas nicht, fo trift gang ficher gu, mas der große Sydenham fagt: qua methodo, currenti anno, aegrotos liberaveris, eadem ipfa, anno iam vertente, e medio tolles. Go mar feit 1783 bis 1785 unfre Rebe ris stationer. gallichter Urt. Ber alfo auf biefe berrichende Conftitution in feiner Beilmethode nicht vorzüglich Rucksicht nahm, z. B. im Seitenstich gur Aber ließ, weil bas Symptom bes Geitens fiche, beschwerlicher Suften und mit Blut vermifche ter Auswurf ba war ; - im Gliederreißen jum Schwiten gab, weil Schweiß in rheumatischen Bus fallen oft Gulfe zu schaffen pflegt u. f. w. der fturge te feine Rranten in augenscheinliche Gefahr. Es herrschte aber die Unlage zu diefer Krankheit nicht in unfern Gegenden allein, fondern fie mar, foviel fich aus unten genannten *) ziemlich gleichzeitigen Schrift:

bili quadam alteratione in ipsis terrae visceribus pendent, unde aer eiusmodi effluviis contaminatus, quae humana corpora huic aut illi morbo addicunt, determinantque, stante scilicet praesatae constitutionis praedominio, quae, ex acto demum aliquot annorum curriculo, facestit atque alteri locum cedit. Unaquaeque harum constitutionum generalium propria ac peculiari sibi febris specie sunestatur, quae extra illam nusquam comparet, cuiusmodi febres idcirco stationariae nobis audiunt. cf. Sydenham Oper. Vnivers. 8. Lugd. Batav. 1741. p. 41.

^{*)} Haeberl de febribus annuis & in specie de febre aestiva anno 1783 in Nosocomio S. S. Trinitat. Vindobon. observat. descript. Monach. 8. 1784.

Schriftstellern folgern lagt, fast allgemein verbreis tet. Richt nur unvermischte, reine gallichte Krant, heiten hatten wir wahrend biefer breniahrigen Cons fitution, fondern auch zu allen übrigen Jahres: Rrantheiten, als falten Fiebern, fatarrhalischen und andern Bufallen gefellte fich überflußige, vers dorbene Galle und spielte überall die Sauptrolle. Schon in den Monaten Man, Junius und Julius Des 1783ften Jahres hatten wir meift gaftrifche Rrantheiten, Diarrhoen und hartnactige Ratarrhe, Deren Gis im Unterleib mar und die nur burch abführende und nachher durch gelind fartende Mits tel tonnten gehoben werden. Im Monat August und September d. 3. liegen fich die erften Gpus ren eines herrschenden Gallenfiebers bemerten. Die Patienten wurden fchnell mit Mattigkeiten befallen, ihr Ropf war mufte und eingenommen, und die Egs luft verloren, baben beforgten die Meiften noch ihre Allmablig fieng ber Leib an etwas ges spannter und schmerzhaftr zu werden, und gewohns lich erfolgte nun eine Diarrhoe mit vieler Erleiche terung. Unterftuste man biefen beilfamen Trieb der Ratur mit gelind abführenden Mitteln, fo ges nafen die Patienten fchnell; verkannte man aber Diefen wohlthatigen Wint und verftopfte mit gufams

Knaus Dist. Med. sistens Annotationes quasdam circa morbum annis 1783 et 1784. Stuttgardiae grassatum.

Born de febre gastrica putrida. Gotting. 4. 1784.

Schröder Historia febris biliosae pituitos. putridae.

8. ib.

Baldinger N. Magazin für Aerzte. sten Band, stes St. p. 426.

menziehenden, hißigen und schweißtreibenden - ben gewöhnlichen aber auch meiftens in der Folge Ges fabr bringenden fo genannten Sausmitteln - Diefe gedeihliche Ausführung, fo wurde der Leib bald empfindlich und schmerzhaft, es erfolgte ein befe tiges Rieber mit ftartem Durft und ofterem Trieb auf ben Stuhl zu geben, ben einem schmerzhaften 3mans ge. Run glaubte der gemeine Mann die rothe Rubr um fo gewiffer zu haben, ba bas, mas mit dem Stuhl abgieng, rothlich aussah, und mit dem heftigften Geftant verbunden war. Burde diefer außerft verdorbene gallichte Stoff durch ausführens De Mittel bald aus bem Korper gefchaft, fo mar auch die Ruhr weg und die Patienten erholten fich wieder. Da die Materie meift nach unten turgef cirte, fo waren Brechmittel felten nothig. Monat Detober, November und December beobach: teten wir neben diefer Rrankbeit viele Rothlaufe und podagrische Zufalle, die alle gallichter Urt mas ren, und eben fo fchnell ausführenden Mitteln wis chen. In dem folgenden 1784ften Jahr herrschte diese gallichte Constitution noch häufiger und befiel bald in geringern bald in hohern Graden und uns ter verschiedener Gestalt iedes Alter und gesellte sich gu ieder Rrantheit. Ben einigen gab es feine Ges genwart durch Kraftlosigkeit und Reissen in den Gliebern, heftige Augenschmerzen, einseitiges Ropfe weh u. d. gl. zu erkennen. Um erften und heftigs ften wurden dieienigen Theile angegriffen, die vors her schon einmal gelitten hatten : ben Einem floß Die langst geheilte Gonorrhoe aufs neue, ben eis nem Andern schwoll die eine Hoden an, und beide 60

wusten sich keiner neuen Ausschweifungen schuldig: welche die goldne Ader hatten, erlitten die heftige ften Rrengschmerzen - alle diefe Bufalle aber wie chen Brech : und Ausführungsmitteln. Wenige fies Ien ploglich in heftiges Frrereden ohne einen Augens blick gu fich gu fommen, bis ein Brechmittel ges reicht und hinlangliche Galle ausgeleert wurde. Ben Allen war das Weiffe im Auge gelb, und die Junge mit Schleim bald mehr bald weniger überzogen. In legterem Fall hatten die Kranken eben teinen Abscheu vor den Speifen ; fie fagten, fie tonnten wohl effen, mochten nur nicht. Wo aber der Mund bitter und Druden in der Berggrube mar, ba fand fich auch großer Edel, befonders vor Fleischspeifen, Ben Bielen erschien diefe Krankheit unter ber Larve eines bigigen Seitenstichs. Die Patienten wurden schnell mit einem heftigen Froit und barauf folgender Dige, mit etwas Irrereden befallen; fie athmeten fchwer, flagten über Ropfweh und einen, bald figirten, bald aber auch mandelbaren Schmers unter den furgen Ribben ober in ber Brufthoble felbft, bufteten mit vieler Befchwerde und warfen, befonders iungere Perfonen, Blut mit gelbem fuls gichten Schleim vermischt, aus. Diefe Ungeichen fowohl, als auch die begranzte dunkelrothe Ges fichtsfarbe (benn die Stirne und der Reif um die Augen waren meiftens gelb) und ber barte volle Puls verleiteten mich anfangs eine maßige Abers bfnung vorzunehmen. Ich that es aber in der Folge fobald nicht wieder. Denn dieienigen, wels chen Blut abgezapft worden war, erholten fich weit Langfamer als andre. Auch ben den scheinbarften Beis

Reichen ber Bollblutigkeit, ließ ich ber Aberlag ein brech : oder abführendes Mittel vorgeben, und leers te baffelbe viele Galle aus, fo war auch ben den meiften der volle Puls, die dunkle Rothe ber Bans gen ic. weg und die Aberlag unnothig. Bom Blut fonderte fich gleich nach dem Aberlagen die ges rinnbare Lymphe ab und überzog daffelbe mit einer bicken fo genannten entzundbaren Sant. Das Bluts wasset war gelblicht, ber Ruchen, wie gang begreifs lich, von feiner Confifteng. Conderbar mar es, daß Diefe Krankheit zwar das Blutlaffen nicht leicht uns geabnbet gulieg, bagegen aber die Ratur am funfe ten, fechsten, fiebenten und achten Tag oftere fritische Blutfluge aus der Rafe oder ben Samorrhoidalges fagen bewirkte und die monatliche Reinigung bes Schleunigte mit fichtbarer Begerung. Der harn war ben wenigen blag und gab Rrampfe zu erkennen ; bas erfte Brechmittel leerte auch ben diefen Perfos nen feine Galle aus; murde aber die Materie bes weglich gemacht, oder die Krampfe gehoben, fo brachen fie viele Galle. Ben ben Deiften mar ber Urin febr gallicht und boch gefarbt, wurde den zwenten, britten ober vierten Tag trube, und machte nachher einen Bodenfag. Je fruher fich diefer ben fonft gleichen Umftanden zeigte, besto schneller mar die Genesung. Der Schweiß war nie fritisch, er beschwerte nur und brach am meisten vor ben Auss leerungen aus; nach benfelben verlor er fich bon felbft. Einer meiner verehrungsmurbigften Colles gen, herr Geheimerath v. Breyer, ber mich am erften mit auf diefe berrschende Constitution aufs mertfam machte, beobachtete ben einigen feiner Rrans

2000

62

In der lezten Hälfte des 1784sten Jahrs herrschte diese Constitution ohne merkliche Abarstung, nur erschien sie meist unter der Gestalt der gewöhnlichen Jahreskrankheiten. So hatten wir in den Monaten Junius und Julius viele Tertianssieber; die wesentlich eben dieselbe herrschende Episdemie, nur aber unter einer andern Gestalt darsstellten. Denn oft schon ein einziges Brechmittel, wenn es viele Galle ausleerte, hob das Fieber; die

Morgen auswarfen. Den erften Reiz jum huften

aber empfanden die Meiften im Unterleib.

Die Rinde war baber meiftens gang unnothig, ba mit der Galle auch das Fieber meg mar. Jede Unwandlung beffelben anticipirte einige Stunden, und die Meiften wurden, nachdem das Fieber viers gehn Tage ausgefest hatte, wieder ruckfallig ; es blieb aber daffelbe nach ein paar Anfallen entweder von felbst aus, oder im abermal nothigen und ans gezeigten Kall bob ein gelindes Brechmittel daffelbe zum zwentenmal eben so geschwind und vollkommen. In den Monaten August und September zeigte fich Diefe Epidemie nicht nur als Tertianfieber, fons dern auch unter der Gestalt arthritischer Zufalle und befonders haufig der Diarrhoen, Roliffchmers gen und meiftentheils nur fcheinbarer Ruhren. Ues berhaupt aber war in diefen zwen Monaten, mo Die Galle gewöhnlich ben Rrantheiten die Saupts rolle fpielt, ihr Dafenn meniger verftedt. In dent legten diefer Monate hatte ich einen einzelen Krans ten am Faulfieber, bas im folgenden Jahr ofter vorkam, zu behandeln. Ich wurde den 22 Gept. ju biefem Patienten, ber ohngefahr einige zwanzig Rabre alt fenn mochte, gerufen. Er lag gang finns und sprachlos mit ftarren und halbgeofneten Mus gen da, hatte falte Sande und Fuße und der Puls: schlag war wegen Schnelle und Schwäche faum zu Die Umftebenden ergablten mir, bag er vor vierzehn Tagen von Wien (der Kranke war ein Schiffmann) zuruck gekommen fen und auf der Reife schon die Eflust gang verloren, über bittern Mund geklagt, auch Galle von frenen Stucken in den ers sten Tagen öfters ausgebrochen hatte. Innerlich habe man ihm, auffer einigen ohnmächtigen Tems

perirpulvern, weiter nichts als Bier, Wein und ans dre fogenannte bergftartende Mittel gegeben, bem ohngeachtet fen es mit ihm immer schlimmer ges worden; feit acht Tagen fen er gang bettlägerig und feit vier Tagen lage er fo ba, wie igt, wo man mit iebem Mugenblick auf feinen legten Athemgua harrte. In dem halb geöffneten Munde fab ich die bunkelbraune, trokne, zusammengezogne und in der Mitte gespaltne Junge; ber Loffelvoll Baffer. den ich ihm in den Mund gog, lief zur Salfte wieder heraus, das Uebrige behielt er fo lange, bis er es endlich unwillführlich mit etwas Suften und Mube nach und nach hinab schluckte. Um von meiner Seite ben diefem fcon aufs aufferfte ges tommenen Patienten Alles zu versuchen, und die betaubte Ratur aus biefem fürchterlichen tiefen Schlummer, wenn es moglich mare, zu weden, ließ ich fogleich zwen Blafenpflafter auf die Baben legen, und gab die Macht durch eine Mixtur aus Chinarinde, Rhabarbar, Weinstein und Meerzwies belfaft mit ein paar Gran Brechweinstein verfest. Um folgenden Morgen aber reichte ich ibm alle Stunden eine Dofe aus China, Rhabarbar und Beinftein zu gleichen Theilen, einen Gran Breche weinstein zu ieber Gabe gemifcht. Rachdem er vier Dofen genommen, erfolgten endlich zween Stuhlgange, beren Geftant die Umftebenden faft ohnmächtig machte. Die Racht hindurch nahm er obige Mixtur; am folgenden Tag aber wieder ein Paar der namlichen Pulver, die gleichfalls fein Ers brechen, auch wenig heftigere Ausleerungen bewirks ten. Gegend Abend tam er etwas ju fich und zeigte Em:

der

Empfindung benm Berband der Blafenpflafter , die nun zu eitern anfiengen. Der Puls erhob fich und gieng nicht mehr fo schnell; der Kranke fam mehr ju fich und flagte uber unfägliche Mattigfeiten. It gab ich ihm ein gefättigtes Chinadecoct mit der Schlangenwurgel verfest und oftere Bein , auf def: fen Gebrauch in den erften Tagen ein ftinkender Schweiß erfolgte. Die Egluft fand fich nun wies ber ein, der Schlaf war erquickend, die Rrafte nahs men zu und ber Patient verlies auf ein paar Stuns ben am neunten Lag, von meinem erften Befuch an gerechnet , das Bett. - hier war offenbar ber Rrante burch das im Unfang der Krantheit nicht gereichte Brechmittel, welches die Ratur fo laut fors berte, in diese aufferst bedenkliche Lage verfest wors ben , woraus ihm allein seine Jugend und farke Matur glucklich half.

Uebrigens herrschten in diesen zween Monaten besonders stark und allgemein Koliken. — Zwen junge Weiber glaubten im zwenten Monat schwans ger zu senn, als sie von einem figirten Schmerz in der Nabelgegend befallen wurden, und fürchteten einen Mißfall, da sich ben ihnen etwas Geblüt, doch ohne Kreutsschmerzen, zeigte. Ein abführendes Mittel hob ben einer, ben der andern aber ein geslindes Brechmittel die Schmerzen sowohl als den Plutsluß, und ben benden stellte sich die Keinigung nach ein paar Tagen ordentlich und ohne Beschwerde wieder ein. Hauptsächlich besiel in diesen und den dren übrigen Monaten dieses Jahrs Sechswöchnes rinnen am zwenten, dritten oder vierten Tag nach

SAMOL

ber Entbindung geringes Ropfweh, Edel vor Speis fen , Durft und große Abgeschlagenheit der Glieder, mit Buruchaltung der Lochien. Ginige Dofen Rhas barber mit Beinftein verfegt , führten viele Unreis nigkeiten und Galle ab, Ropffchmergen und Mattigs Feiten verschwanden nach diefen Ausleerungen, Die Wochenreinigung floß und die Egluft ftellte fich wies Der ein. Diejenigen aber , welche diefe Bufalle fur das fogenannte Milchfieber hielten, ihren Kranten schweißtreibende, antiphlogistische Mittel reichten, ja mobl gar, um einer Entzundung ber Mutter porzukommen , zur Aber ließen , fturzten die armen Wochnerinnen in sichtbare Lebensgefahr. Ein bef tiges anhaltendes Fieber mit Jerereden begleitet, unloschbarer Durft, bitterer Mund und Reigungen jum Erbrechen, unbeschreibliche Bergensangft beifche ten nun mit lauter Stimme Brechmittel, und nur durch diefe ben Zeiten eingeschlagene Beilart genas fen die armen Beiber, wiewohl oft febr langfam, wieder. — Der Monat November und December war Schwangern gleichfalls ungunftig. Denn ich fab in furger Zeit vier Frauen im britten Monat ber Schwangerschaft schnell abortiren ; ben einer funf ten erhielt ich mit Muhe die Frucht.

Diejenigen, welche von diefer gallichten Constitution angesteckt bald Hulfe suchten, wurden burch auflösende und bald nachher gegebene oft wiederholte Brech: und abführende Mittel in wenig Tagen wies der hergestellt. Einige konnten am zwenten, dritsten oder vierten Tag schon wieder ihre Geschäfte bestorgen. Andre aber, die das Reißen und die Kraft-

losigkeit der Glieder, die verlorne Eslust, schleimige Zunge zc. nicht eher achteten, als dis sie ein heftiges Fieber ergriff, erholten sich langsamer, erst nach acht oder vierzehn Tagen, und zuweilen noch spärter. Liessen sich die Wiedergenesende von gutmeisnenden, aber einfältigen Verwandten bereden früsher Fleisch zu essen, als sie selbst noch wahres Verslangen darnach hatten, so wurden sie meistens rücksfällig, und einige büsten durch diese unzeitige Nachsgiebig, und Sefälligkeit ihr Leben ein.

Die wirksamsten Mittel in dieser Krankheit was ren, der Brechweinstein, die Brechwurzel, das Tas marindenmark, die Manna, der Beinstein und die Mittelsalze. Die Litriolsaure wurde sehr selten, meistens aber die Citronen und Beinsteinsaure mit bester Birkung gereicht. Im sigirten sowohl als im wandelbaren Seitenstich wirkte das Blasenpslasser entweder allein, oder mit gleichen Theilen des zusammengesezten Diachplonpslasters versezt, auf die schmerzhafte Stelle gelegt, in einigen Stunden uns sehlbar. Es hob die Krämpse und den Schmerz; und nachdem diese gewichen waren, so ließ man die wunde Stelle sogleich wieder zuheilen.

Die Diat war ganz vegetabilisch und die Kransten waren mit solcher um so leichter zufrieden gestellt, als überhaupt die Eklust gering und ben den Meissten der Eckel, selbst vor Fleischsuppen, ungemein groß war.

Die Ursache dieser gallichten Fieber scheint dars E 2 innen

innen zu liegen, daß zu viel gallichter Stoff in uns fern Gaften erzeugt, oder aus denfelben entwickelt wurde und mit ihnen circulirte ; bieg bewiefen bie große Mattigfeit und das Reißen der Glieder, das gallichte Blutwaffer , das gelbgefarbte Beiffe im Muge, die gelben Ringe um diefelben und ben Dund; ber Barn, ber oftere wie ben Gelbfüchtigen aus: fab, der Auswurf, Schweiß ic. turg alle fo genannte Se und Excretionen. Wodurch aber fo viel galliche ter Borrath in unfern Korper gebracht, oder mas eigentlich unfre Merven fo widernaturlich gereigt habe, mehr Galle als gewohnlich aus unfern Gaf: ten abzusondern, mage ich nicht zu bestimmen. Der viele Schnee und strenge Winter bes 1784. Jahrs hatten ficher an diefer Epidemie feinen Untheil. Denn wir hatten fie fchon vorher und in Stutt= gardt, Wiener. *) herrschte folche im 83ften Jahr schon allgemein. Gollte wohl der in eben diesem Jahr allgemein gewesene so genannte Sobenrauch zu viele Reuertheilchen in die Atmosphare überhaupt und aus diefer in unfern Korper gebracht haben, und follten wohl diefe überflußigen Fenertheilchen zu viele Galle in unfern Rorper entwickeln und dergleichen Rieber bervor bringen tonnen ? In dem Fall mufte diese Epidemie, noch allgemeiner als sie wirklich war , und fudlich in Ralabrien , wo diefer Sobens rauch ausbrach, am beftigsten gewesen fenn. **) and the outers best of the country Run o

^{*)} G. die oben angeführte Streitschriften des D. Knaus Säberl ze.

^{**)} Dermalen ist es so viel als Gewisheit, daß der 1783.

Nun zum Schluß noch ein paar Krankengeschichten des gallichten Seitenstichs.

Eine Dienstmagd, sechs und zwanzig Jahre alt, wurde am ersten April dieses Jahrs nach vorherges gangenen, heftigen Frost und Hike, mit Seitensstechen beschwerlichem Athemziehen, und äußerstschmerzhaftem Husten, woben sie Blut auswarf, bes fallen. Da die Zunge unrein war und die Kranke über Bitterkeit des Mundes klagte, so gab ich ihr diesen Abend noch eine auslösende Mixtur aus dem E 3 Sauers

durch gang Europa verbreitete Sobenrauch feinen Urfprung von jenen fürchterlichen Erderschütterungen und Feuerausbrüchen im füdlichen Calabrien und Island nahm. Siedurch wurde natürlich fehr vies les Phlogiston in unfre Atmosphäre gebracht, und die haufigen Donnerwetter , welche wir in diefem Commer hatten , bewirfet. Jene Gewitter fomobil , als Die fie begleitende Platregen fchlugen viele Keuertheil= gen aus der Atmosphare auf unfern Erdboden nies der, belebten das Pflanzenreich und verursachten jes ne allgemeine Fruchtbarkeit Diefes Jahres. Atmosphäre fowohl, als durch die Nahrungsmittel fam mehr Ihlogiston in unfern Korper als gewohnlich, und wurde folches nicht bald aus demfelben geschaft, oder haufte fich die Galle, welche, wie bes Fannt ift, das meifte Brennbare enthält und aus un. fern Gaften ausscheibet, ju febr an, fo muften Krant, heiten aus Ueberfluß von Balle entstehen. ber ift es auch leicht zu begreiffen, marum Diefe gallichte Constitution in den Jahren 1783, 84. und 85. gu gleichen Zeiten , laut oben angeführter Schriftftel= . Ier, an verschiednen Orten und allgemein herrschen muste.

Cauerhonig mit vitriolischem Beinftein und am fols genden Tage Tamarinden, Gedligerfalz mit Breche hierauf brach fie eine Menge weinstein verfett. gaber Galle weg und abnlicher Unrath wurde burch Die ofters bewirkten Stuble abgeführt. Das Seis tenftechen unter der linken Bruft, der beschwerliche Suften , nebst dem blutigen Auswurf nahmen ab und die monathliche Reinigung fand fich um 8. Tage fruber als gewöhnlich ein. Den offnen Leib untere hielt ich mit Weinstein und Rhabarber. Um zwens ten Tag borte mit einem mal bie monatliche Reinis gung ju fliegen auf, bas Seitenstechen und ber bus ften mit blutigem Auswurf wurde aufs neue heftiger, Die Gefichtsfarbe ward dunkelroth, es tamen zuweis Ien einige Tropfen Blut aus der Rafe, die Patiens tin flagte über die heftigften Ropfichmergen und fieng an irre ju reben. Da ber Puls zugleich febr voll war, fo entschloß ich mich ben diefen Umftanden eine maßige Aderofnung am Kug vorzunehmen und ihr ein Blafenpflafter in ben Dacken zu legen. Inners lich gab ich den Mineralkermes und nachher eine Latwerge aus Tamarindenmark, Polnchreftfalz mit ber Rhabarber verfest. Das Irrereden und Geitens ftechen nahmen zwar gleich ab, die Rrante erholte fich aber febr langfam und erft in der vierten Woche tonnte fte das Bett verlagen. Diefe langfame Dies bergenefung schrieb ich der vorgenommenen Abers Folgenber Fall bestärfte lage gu. Muthmagnng.

Eine vollblütige Weibsperson, zwanzig Jahr alt, welche in gesunden Tagen öfters Rasenbluten und

und ihre monatliche Reinigung, ohne schwanger gu fenn, lange Zeit nicht mehr gehabt hatte, wurde von diefem Rieber den 22. April befallen. Da fie bittern Gefchmack im Mund und Druden in der Berge grube batte, fo gab ich ihr Manna mit Cremor Tart. folub. und Brechweinstein. Dief leerte gwar viele Galle aus, aber am dritten Tag flagte fie über heftiges Stechen unter ben furgen Ribben und über außerst beschwerlichen huften, woben fie Blut mit gelbem Schleim auswarf. Der Puls mar voll und hart, die Rafe blutete ihr ofters mit Er: leichterung und fie fieng an , fart zu phantafiren. Ich ließ ihr aber nicht zur Aber, fondern gab eine Dofe Brechwurgel mit vitriolischem Beinftein und ließ Blafenpflaster auf den leidenden Theil legen. Das Jerereden, Seitenstechen nebst bem Suften und blutigen Auswurf nahmen hierauf ab, der Puls wurde weich, der Urin brach fich am vierten Tag, am fechsten fam die Eglust wieder. Run gab ich ihr Weinsteinrahm mit Rhabarber und der Rinde. Um achten fonnte fie bas Bett verlagen und in viers Behn Tagen war fie vollkommen wieder hergestellt.

2000

Ein Madchen von neun Jahren wurde den 19. May mit heftigem Erbrechen, Husten und Stechen in der Seite befallen. Da sich die Zufälle der gale lichten Epidemie ben ihr äußerten, so behandelte ich sie auch so; und auf die schmerzhafte Seite legte ich ein Blasenpflaster mit eben so viel Diachylon vers mischt. Der Schmerz war in einigen Stunden weg, ich ließ die Blasenwunde zu heilen und das Mädchen

erholte sich schnell; denn am 26sten sah ich es schon wieder auf der Strafe.

Ein Mann von ohngefahr vierzig Jahren wurde am 12. April Rachts mit heftigem Suften und Geiten: ftechen überfallen. Er mufte bas Bett verlagen, um genug athmen gu tonnen. Da er bie übrigen Zeichen des Gallenfiebers hatte, fo murde ihm bald ein Brechmittel mit dem beften Erfolge gereicht. Das Uthmen murbe frener, und ber huften mit dem empfindlichen Stechen verlor fich. In der dritten Macht fanden fich die nehmlichen Beschwerden im vermehrtern Grade, ohne gegebene Urfache ein, nur mit dem Unterschiede, daß bas Stechen fich ist in der Gegend des Magens zeigte. Es murde fogleich, nachdem fich gegen Unbruch des Tages der ftechende Schmerz wieder mehr nach der Seite hingog, ein Blafenpflafter auf biefe leidende Stelle gelegt und mit Brech und abführenden Mitteln fortgefahren. Der Schmerg verlor fich hierauf mit dem Suften, woben aber der Patient nie Blut, fondern nur febr gaben, gelben und bittern Schleim auswarf. Die Egluft fand fich nach einigen Tagen wieder ein, Die Rrafte fehrten guruck , und der Rrante genas bald.

Einer Frau von fünf und dreißig Jahren, wels che die deutlichsten Kennzeichen dieses Fiebers mit außerst schmerzendem und in der Herzgrube figirten Stechen hatte, viel hustete, Blut auswarf, und sehr start irre sprach, wurde nach gegebenen auslees renden Mitteln, ein Blasenpflaster mit bestem Ers folg auf die leidende Stelle und ein zwentes auf die Waden gelegt. Das erste hob den Schmerz bald, und wurde sogleich wieder zugeheilt, das and dre aber so lange offen erhalten, bis das Phantasis ren gänzlich nachließ; und dieß geschah am achten Tasge, worauf sie sich schnell wieder erholte.

200

Che ich dieß Jahr gang verlage, fo theile ich noch die Krankengeschichte eines 76. jahrigen Sofbes Dienten mit, der nie an Steinschmerzen gelitten hatte, an einem rauben Tag diefes Christmonats aber schnell mit einem ganglichen Unvermogen den harn gu lafs fen befallen wurde. Der Grund diefer Berhaltung fchien in einer formlichen Lahmung der Urinblafe gut liegen und als gelegentliche Urfache dieses beschwers lichen Zufalls gab der Patient eine Berkaltung an, welche er sich den Albend vorher durch das lange Warten auf feine herrschaft zugezogen hatte. 3ch reichte ihm Unfangs die Riverische Potion und den Barentrauben Aufguß. Der Urin murde mittelft des Katheters abgezapft und auf das Kreugbein ein Blafenpflafter gelegt, in die Schaamtheile aber und bas Mittelfleisch die Kantharidentinctur und ber Sofmannische Lebensbalfam eingerieben. Auch wies derholte Brech und abführende Mittel, reigende Kliftire, taltes Wager, Eis zc. wurden vergeblich gebraucht; ber harn mufte, weil der Patient grof: fen Durft hatte, taglich fast zwenmal mit dem Ras theter weggelaffen werden , fo dag diefe Operation gegen 42mal mahrend der dren Wochen diefer Ischurie vorgenommen werden mufte. Endlich reichte ich ihm , da die Kantharidenpflaster und Tinctur

Tinctur gar keinen Reiß auf die Harnwege machten, dren Quentchen der Latwerge gegen die Wasserscheu *) auf zwenmal in einem Tag und ließ ihn, da er nach der ersten Gabe schon eis nen brennenden Schmerz und Trieb zum Harsnen empfand, leichte Mandelmilch nachtrinken. Bon diesem Tag sieng die Harnblase an, ihre nastürliche Reißbarkeit nach und nach wieder zu erhalsten; er urinirte Anfangs oft, wenig und dies mit Schmerzen, einige Tage aber nachher konnte er sein. Wasser so lange wie ehedem halten, und solches ohne Beschwerde abschlagen; kurz er lebt izt noch als Pensionist ohnerachtet seines hohen Alters rushig und gesund.

Nun zum Schluß dieses 1784sten Jahres noch eine kleine Uebersicht aller von mir beforgten Kransten. Es waren ihrer überhaupt 432. Ich bes greife aber unter dieser Summe nur dieienigen, welche ich täglich ihrer Krankheit wegen in ihren Wohnungen zu besuchen hatte und rechne also iene vom Lande oder aus der Stadt nicht dazu, welche auf meinem Zimmer Rath und Hülfe suchten, oder suchen ließen. Im Monat

Janua:

*) Die Formel dieser Latwerge ist:

Vermium Majal. cum melle adhaerent.

Mellis in quo Verm. Majal. asserv. å eine halbe Unie.

Theriac. Androm. eine Unie.

Pulv. rad. Serpentar. Virgin, seche Quint.

Camphor. imen Quint.

M. F. Electuarium.

des

Januarius	35	editon all
Februarins	23	
Martins	48	ns Georgia
April	29	
Man	38	
Junius	27	HER FIRST
Julius	17	pasaesb
August	47	
September	33	
October	- 39	
Movember	43	
December	53	ALL HAD
Summe	432	Kranke.

Jievon starben im

Jen. An der Brustwassersucht ein 50 ichr.
verh. Weib.

An den Kötheln ober Flecken ein 2 ich:
riges Kind

An dem Schlack eine 70 ichrige Frau
An eben der Krankheit ein 60 ichriger Bes
dienter

Jehr. An Entkräftung vom Alter ein 70
ichriges Beib

Mart. An dem Schleichsieber, das durch ein
ausserordentlich großes Osteosteatom *)

*) 1780 sah ich ben einer 46 ichrigen Jungfer diese namliche speckichte Beingeschwulst am linken und vordern

des rechten Suftbein verurfacht wurde,	
ein 18 iabriger Jungling	1
Um schleichenden Mervenfieber ein 69 iah:	199490
riger Bedienter	1
Un Verstopfung der Gefrosdrusen ein	The second second
ziähriges Kind	I
An symptomatischen Zuckungen ein 9	
Monat altes Kind	
	1
Am symptomat. innern Wasserkopf ein	
ziähriges Kind	I
The state of the s	5
April. Am gallichten Saulfieber ein 49 iah:	
riger Mann	I
Um Rindbetterinnenfieber eine 38 iah:	
rige Frau	1
The second of the second secon	-
The state of the s	2
May. An der Lungenschwindsucht eine 40	12
iahrige Frau; ferner eine 28 iahr. und	
eine 19 iährige Jungfer an eben der	
Krankheit.	3
The second materials are a second second	Mm
	-

dern Rand des Hüftbeins. Sie bemerkte diese Erschabenheit seit Jahr und Tage schon und verheimslichte es so lange die sie bettlägerig wurde. Endlich brach diese Geschwulft auf, gab eine sehr stinkende Jauche von sich, und öfters wurden ganze in Fäulznis übergegangene Stücke vom Wundarzt weggeschnitzten. Sie starb endlich ganz abgezehrt. Ben der Secztion fand man ben ihr, wie ben dem Jüngling den Knochen ausserordentlich auseinander und ausgetriesben, entstellt und weich; er war wie diekes zähes Fett oder Speck und an einigen Orten wie Knorpel zu schneiden.

	24
Um gallichten Faulfieber ein 60 iahriger	
Mann; ein 22 iahriges Mabchen; ein	
36 iahriger Mann	3
An Entkräftung vom Alter ein 79 ich	73
	34 7
riger Mann. in den allegenen Trenthi	I
An idiopathischen Zuckungen ein 3 iah:	
riges Kind. 2011II mog phillibalinis al	I
Un symptomatischen Zuckungen 2 halbs	184179
iahrige Kinder. Walled Manniegod in	2
22 labriace Wells and applied and a	10
Jun. Un der Lungenschwindsucht ein 47	E .
iahriges Weib.	1
Am gallichten Saulfieber ein 60 iahris	E SO
ger Mann.	
Sind one box officers burn Berry ! See Auffice	
An Angeographical dear Suchungen eine and	200
Aug. An der Lungenschwindsucht ein 50	with the
ichriger Soldat, befind angellagemi	L
Un symptomatischen Zuckungen ein Kind	
von 6 Wochen.	I
to the grade and bloom distant statement	2
Sept. Un der Bauchwassersucht eine 50	P. P. P.
iahrige Jungfer.	I
Un der Ruhr ein 4 ichriges Kind.	1
And in bim gangen i 78 sten Joho was ben	-
SOUTH THE PARTY OF	2
Oct. Am Schleichfieber von Abdominals	fice
Berstopfungen zwen 60 iahrige Frauen.	2
Un der Bauchwassersucht ein 60 iahriger	17711
Rutscher.	1
Am Stecken und endlicher Lungen:	50 to
ichwii	10:

schwindsucht ein 48 iahriger Braumei fter. Mov. An der Lungenschwindsucht ein 40 iabriger Junggefelle und ein 19 iabriger Jungling. 2 Un Entfraftung vom Alter ein 70 iab: riger Mann. I Um bosartigen gallichten Saulfieber ein 22 iahriges Beib. I Um Mutterfrebs ein 40 iahriges Bedien: ten Beib. P An symptomatischen Zuckungen ein 18 Monat altes Rind. 1 6 Dec. An symptomatischen Zuckungen ein 14 Tage altes Rind. Um gallichten Saulfieber eine 38 ichrige 40

1 7 8 5.

Auch in dem ganzen 1785sten Jahr war ben uns die allgemeine Constitution gallichter Art und fast ben ieder einzeln vorgekommenen Jahreskranks heit hatte Ueberfluß oder verderbte Galle den Haupts antheil. Im Jenner und Februar herrschte die Epidemie vorzüglich unter der Gestalt rheumatis scher Fieber, besonders des Hüftwehes; andre hat ten Salsschmerzen mit angeschwollenen Drufen und andern fatarrhalischen Bufallen, als Stechen bennt Einathmen, heftigem Suften u. f. w. Dieienige Urt von Suften, welche Sr. Soffmann unter dem Mahmen Tussis rheumat. Stomach, beschreibt, mar besonders baufig. Mit unter herrschten auch harts nactige Quartanfieber. Ben allen diefen verschieds nen Zufallen aber half nichts fo ficher und gewiß als gelinde Brechmittel. Eine ober die andre Gas be hob oft gleich alle Beschwernife, die, wie eben gefagt, ben Ginigen Rolifen, Gliederreißen, Dats tigkeiten, Suften, Ropfichmerzen u. f. w. verurfache ten; ben Allen aber, befonders im Fortgange der Krankheit, war verlorne Eglust und vorzüglich Edel vor Fleisch und Bier vorhanden. Unbedeus tend mar das Fieber ben denen, die bald Gulfe fuchten, fo dag viele mahrend diefer bren, vier ober funf Tage daurenden Unpaglichteit nie gezwungen wurden, fich ju Bette gu legen. Dbichon die Alle gemeinheit diefer gallichten Epidemie in etwas abs zunehmen schien, fo faben wir boch in den Monas ten Marg, April und Dan einige Patienten, ben welchen diese Krankbeit bald und schnell in ein Raulfieber übergieng. Die damit Befallenen flage ten einige Tage, bevor fie bettlagerig murden, uber Abgeschlagenheit, Entfraftung, verlorne Egluft, Eingenommenheit des Ropfes und Drucken in der Berge grube mit Abgang vieler und wiederholter Magene winde ohne Geruch und Geschmad. 2m britten ober funften Tag diefer Unpaglichkeit mandelte dem Kranten gegen Abend geringes Frofteln mit barauf folgender trotnen Dite an, welche die Rachte schlafe

_ 2000 80 los machten. Die verlorne Egluft gieng nun in mabren Edel vor Speifen uber, und einige Pas tienten brachen ist von freien Studen gaben Schleim und zuweilen auch Galle meg. Run faben fich bie Meiften erft nach Gulfe um. Gie hatten ein bleis ches erdfarbiges Unfeben, flagten über die auffer: ften Entfraftungen, fo daß fie vor Mattigfeit oft nicht fprechen konnten, hatten die heftigften und meift einseitige Kopfichmerzen, trube eingefallne Mus gen, welche das Belle ungern vertrugen, Reiffen und Ziehen bald in den Armen, bald in den Rufs fen, oder auch im Kreuz. Ihre Junge war im Afnfang ber Krantheit mit weiffem nachber mit bis dem, gabem und schwarzem Schleim überzogen, nach einigen Tagen aber murde fie trocken und fpros be, ohne daß die Rranten über Durft flagten. Go wie sie die Augen schloßen, kamen ihnen allerlen fürchterliche Bilber vor, die fie beangstigten und mit Bufammenfahren erweckten; befiel fie aber bens noch ein furger Schlummer, fo redeten fie irre. Einige hatten eine unüberwindliche Reigung gunt Weinen. Der Puls schlug in einer Minute nie weniger als achtzig, ben andern, befonders benen,: die in größrer Gefahr waren, wohl auch hundert und dreißigmal; ben allen aber war er flein, schwach und zusammengezogen; bob er sich aber und schlug

er frener und langfamer, fo fundigte dies einen

glucklichen Ausgang ber Krantheit an Der Urin

war ben einigen dunkel gefarbt, felten aber feste er

einen Bobenfat ab; ben andern mar er Citronens

gelb, fast wie ben Gefunden, nur etwas truber :

nie aber mar er, wie auch Schweiß und Sautausschlage

nicht,

nicht fritisch. Denn ich fah Kranke vom Unfang bis jum glucklichen Ausgang ihrer Krankheit helle gelben Urin laffen, andre aber, beren Barn ben Rartften Bodenfat machte, fterben. Gin Urin, ans fangs mit Bobenfat nachher hell, war, fo wie die gangliche Berhaltung beffelben und das Schluchzen von trauriger Vorbedeutung — Einen vornehmen Patienten, den ich mit meinem Bater gemeinschafts lich zu beforgen hatte, befiel einige Tage vor feit nem Ende ein anhaltendes Wachen, das fich mit einer achtundvierzigftundigen Schlaffucht und ende Rich mit dem Tod endigte, der am ein und zwanssigsten Tag ber Krankheit erfolgte. - Die Blutgefaße bes Gebirns ftrogten von Blut, fo wie ben Erhenkten, und in den benden vordern Sirnfame mern waren über funf Ungen Waffer enthalten. -Die Rerven waren ben einigen diefer Kranken auf ferst empfindlich, ben andern aber fur den ftarte ften Reiz gang todt; ia ich erinnere mich eines Rranten, dem ein Gran Mineraltermes, mit der Chinarinde und Rhabarbar verfest, Erbrechen und viele Stuhlgange mit Ohnmachten bewirkte; zwen Tage nachber aber bren Gran Brechweinstein weber Ueblichkeiten noch Leibesofnung erregten. Die Beilart mußte alfo nach allen Umftanden genau abgewogen werden; doch waren auch hier dies ienigen Mittel, welche in abnlichen Krantheiten ges reicht zu werden pflegen, die erfprieglichften und wirksamsten; als die Brechwurgel, Rhabarber, die Chinarinde, ber Balbrian, die Schlangenwurgel, Sallers faures Elixir, Rheinwein, Blafenpflafter, To mos

-Hiord

TOTAL DOCK MANAGEMENT

Moschus, Kampfer u. s. w. Hier folgen ein paar Krankengeschichten:

Total velocity west modes

Um 28ften Marg wurde ich zu einem Sofbes bienten gerufen, ber einige breißig Jahr alt mar. Er ergablte mir, bag er fcon feit ein paar Tas gen Mattigkeiten, verlorne Efluft und Reigungen junt Erbrechen bemerkt hatte, ist aber tonne er fich vor Entfraftung nicht mehr im Bette aufrichten und der Kopfichmer; fen gang unausstehlich. Gein Aussehen war blag, die Augen trube, die Bunge mit gabent weißlichtem Schleim überzogen, und als er mir feine gitternde Sand reichte, fand ich einen schnellen, schwachen und zusammengezogenen Puls. Go wie er die Augen schloß, kamen ihm allerlen Schreckbilder vor. Db er gleich ist teine Reiguns gen jum Erbrechen oder bitteres Aufftogen batte, fo gab ich ihm doch vier Gran Brechwurzel zu ies der Gabe von Chinarinde, Rhabarber und Weins ftein. Es erfolgten einige febr heftig ftintende Stuble, mit noch vermehrteren Entfraftungen. 3ch ließ ihn die Racht hindurch faturirtes Chinadecoct mit ber Schlangenwurzel, bem ich Chinaertract und Sallers faures Elixir benmifchte, nehmen, und zwen Blasenpflafter auf die Waden legen. Er fchlief Die gange Racht nicht; doch fagte er mir fruh, fein Ropfweh dunte ihm dennoch etwas erträglicher gu fenn. Ich verordnete ihm den Tag über alle bren Stunden zwen Raffeloffel voll von einer Latwerge, bie aus Chinarinde, Baldrian, Rhabarber, Wein: ftein und Deerzwiebelfaft bestand; die Rachte binburch aber mußte er bas gefattigte Chinadecoct forts

brauchen. Die Latwerge bewirkte täglich einige sehr stinkende Stühle, der Puls hob sich, die Ropfschmerzen nahmen ab, ein erquickender Schlaf ohne Phantasien fand sich mit der Eslust wieder ein und der Kranke erholte sich nach vierzehn Tagen vollskommen. Die Stellen, wo die Blasenpflaster las gen, wurden mit vieler Mühe nach und nach gänzslich zugeheilt.

Ein iunger Mensch von 22 Jahren ließ mich im Man zu sich bitten und erzählte mir, daß er schon feit vier Tagen fieberhafte Bufalle, verlorne Efluft und Reigung jum Erbrechen bemerkt, deg: wegen auch gleich im Unfang ein abführendes Mits tel gebraucht hatte, das ihm wohl viele Stuble, aber teine Befferung verschaft habe. Geine Ents fraftung war nun febr groß, er feufste beståndig und flagte ben tiefem Ginathmen einen Schmerz in ber Berggrube. Gein Anfeben mar bleich und erdfarbig, die Junge mit etwas Schleim bedeckt und der Pulsschlag klein und schnell. Ich reichte ihm eine Dofe Beinftein mit China und Rhabare ber, ber ich einen Gran Rermes benfegte. bewirkte diefe Gabe einmal gallichtes Erbrechen, und über acht Stuble, worauf allezeit Dhumachten erfolgten. Da er am folgenden Lag aufferft matt und fcwach war und bennoch über Bitterfeit des Mundes und Schmerzen im Unterleibe flagte, gab ich ihm einen Absud von Tamarinden, Rhabarber, China und Weinstein, bem ich anderthalb Gran Brechweinstein benmischen und fo alle Stunden eine Theeschalevoll nehmen ließ. Diese Gabe, am Dor:

Vormittag verbraucht, machte weder Ueblichkeit noch Stuhlgang, und baber wurde bas namliche Mittel ben Rachmittag hindurch noch einmal ges geben. Es blieb eben fo unwirkfam, oder fand vielmehr die Merven fo taub und unempfindlich, daß es auch ben wiederholter Unwendung nicht wirfen fonnte. Ein reigendes Kinftir gegen Abend gegeben hatte endlich einige fehr stinkende Leibes: öffnungen gemacht. Die Racht war unruhig und schlaflos. Mit Unbruch des Tages entstand mit einemmal ein heftiger Duften, ein mit Blut und gabem Schleim vermischter Auswurf und ein figirs tes unausstehliches Stechen unter der rechten Brufts marge. Ein auf ben leidenden Theil gelegtes Blas fenpflafter und innerlich Goldschwefel mit Rhabars ber verfest, minderten zwar auf einige Stunden ben Schmerz, beforderten den Auswurf und hiels ten ben Leib offen; aber am folgenden Tag tam bas Seitenstechen mit verdoppelter Wuth wieber, der Patient schrie ben iedem Athemang, und bat, um nicht erfticen zu muffen, um fchleunige Gulfe. Der Puls war zwar etwas voller, daben aber aufs ferst schnell; ich entschloß mich, wiewohl febr uns gern, zu einer Aberlag am rechten Urm. Ben ber funften Unge nahm zwar ber Schmerz merflich ab, der Puls aber fant zu gleicher Zeit fo, daß ich bie Aber gubinden bief. Wegen ber unbeschreiblichen Mattigfeiten und Beangstigungen, bes falten fles brichten Schweißes, welcher über den gangen Rors per ausbrach, ber verzogenen und unfennbaren Ges fichtszuge zc. gab ich alle zwo Stunden eine reichs liche Gabe aus ber Chinarinde, Bifam, Rampfer,

2000

Den.

und mineralischem Kermes Der Puls hob sich ges gen Abend wieder und sieng auch nach 24 Stunden, in denen diese Pulver fortgenommen wurden, an, wieder schnell zu gehen, der Husten kam wies der, der Auswurf war nicht mehr mit Blut vermischt, die taube Empfindung des Stechens in der rechten Seite verlor sich beym Gebrauch bitterer Extracte und gelind erösnender Mittel gänzlich und der Patient bekam erquickenden Schlaf, Kräfte, und in der dritten Woche seine Gesundheit vollkommen wieder.

Ein Madchen von achtzehn Jahren wurde in ber Salfte des Junius mit großen Mattigkeiten und unleidentlichen Ropfschmerzen befallen, wozu fich am dritten Tag der Rrantheit ein gallichtes Erbres chen mit vieler Erleichterung einfand. Ihr Urst fcheute fich diefen beilfamen Trieb der Ratur gu unterftußen, weil das Madchen zuweilen leichte Uns wandlungen von Buckungen oder konvulsivischen Bewegungen hatte, benen es besonders in der Rindheit unterworfen gewesen war. Da ich diefe Patientin erft am fechsten Tag ihrer Rrantheit fab, fie aufferft betaubt und bennahe gehorlos fand, der gange Rors per mit einer Gattung Friesel bedeckt, der Puls aufferst schwach und schnell, die Zunge trocken und durre war, große brennende Sige ohne Durft, bes ftandiges Frrereden, unanftandiges Entblogen der Schenkel und andere mehr bedenkliche Bufalle fich vorfanden, fo reichte ich ihr alle zwo Stunden eine Dofe Rhabarber, China und Weinstein, davon ies der allezeit dren Gran Brechwurzel zugemischt wurs

8 3

den. Sie brach nach der dritten Dose viele Galle weg; die erfolgten Stühle führten solche gleichfalls ab. Ein gesättigtes Chinadecoet mit der Baldrians wurzel verschaften nach und nach Kräfte und ers quickenden Schlaf. Obige Pulver, des Tags zwen oder dren genommen, führten vollends die Unreinigs keiten ab und machten Essust; Fieber und Aussschlag verschwanden und die Kranke genas acht Tage nachher ben dem Gebrauch des Mynsichtischen Elixits vollkommen.

Brregulare und oft fehr heftige Fieberanfalle nahmen nach einem gegebenen Brechmittel fogleich ben ordentlichen Gang eines Tertianfiebers, bas nach einigen Unfallen oft von felbst wieder auss blieb; Ruckfalle aber waren in Diesem Jahr noch baufiger als im vorigen. Ich fab Kranke, welche dren, vier und funfmal ruckfallig wurden. Dem ohngeachtet war der Gebrauch der Chinarinde eben fo felten nothig, als im vergangenen Jahr. -Dieienigen, welche schwache und reigbare Rerven hatten, litten ben biefer herrschenden Constitution porzuglich. Daber waren auch die fo genannten eigentlichen Mervenkrankheiten haufiger, als in ben vergangenen Jahren. Sonfterische Beibepersonen und Sprochondriften befturmten den Urgt mit noch mehreren und feltfameren Rlagen, als fie fonft obnes bin fchon zu thun und vorzubringen pflegen. 3ch fab in diefem Frubiahr ein junges Frauenzimmer, bas nie, auch nur entfernt, an Spfterie litt, fondern nur ein paar Tage über bittern Mund geflagt batte, Abends schnell und unvermuthet in heftige Mutters fchwach:

schwachheiten und Zuckungen fallen, welche, nach einem gegebenen Brechmittel, bas viele Galle ab: führte, bis iest wenigstens, ba fie nun verheirathet ift und schon einmal glucklich gebohren bat, nie wieder famen. - Ein feche und zwanzigiahriger Bediente, ben ich por vierzehn Tagen zum britten: mal feit diefen anderthalb Jahren an diefer gallichten Epidemie frank liegend besuchte, batte bef: tiges und unwillführliches Stoffen und Dehnen in ben Urmen und Fugen, bas aber nach erwunschter Wirkung eines Brechmittels verschwand.

Im Monat Julius herrschte Sydenhams Cho: lera allgemein, ob wir gleich meift falte Witterung hatten. Auch kamen gallichte Fieber haufig vor; diese erschienen ben den Meiften in gewöhnlicher Fornt und hielten ihren Gang; ben einigen aber zeigten fie fich unter einer verftecten Geftalt. Go erinnere ich mich eines tungen italienischen Operiften, welcher ehedem zuweilen leichte Unfalle von Jammer ges habt hatte, die aber allezeit schnell in feinem Bas terland durch eine Aberlaß gehoben wurden. Da er in diefem Monat mit einem Parornsmus bes fallen murde, fo gapfte ich tein Blut ab, fondern reichte ihm, ba man mir überdieß fagte, daß feine Efluft feit ein paar Tagen ungewöhnlich vermins dert ware, mit bestem Erfolg ein Brechmittel, das viele Galle wegschafte. - Ein ohngefahr 45 iah: riger Sofbedienter wurde mit einer Gattung Bers standesverwirrung befallen, dergleichen mir mah: rend diefer herrschenden Constitution ofter vorkam, und deren Urfache allein in zu vieler Galle aufzufus

8 4

fuchen war. Es verrichtete folder viele Tage feine Dienfte, fprach die meifte Zeit ordentlich und gus fammenhangend; flagte aber zuweilen voll Ernft mitten im Disfurs, daß er den Teufel febe, und Diefer ihn verfolge. Da er weniger Egluft als ehedem hatte, auch feine Junge unrein, der Pulsschlag schnell und zusammengezogen war, fo nahm ich ihn auf das Krankenzimmer und reichte ihm auflosende und nachher brech : und abführende Mits tel. Legtere mußten in unglaublich ftarter Dofe gegeben werden, bis fie wirften. Go betam er nach und nach in Zeit von vier Tagen einen Gerus pel Brechweinstein aus dem Untimonialglas bereis tet, dren Quentchen Brechwurgel und acht Loth tars tarifirten Weinstein und alles diefes machte ihm drenmaliges Erbrechen und acht Stuble, ob er gleich in gefunden Tagen von schwächlicher Leibesbeschafs fenheit mar. Die erfte irrige Idee verlor fich hiers auf, dafur aber borte er fich schimpfen und schimpfte mitten im Gefprach wieder mit lauter Stimme gus ruck; ober er fab im bof Galgen, Rad, Scheis terhaufen und henkerstnechte; ober es fam ihm vor, als rufe ihn fein herr, und da es ihm schien, als tame diefer Ton unter der Bettlade hervor, fo legte er fich auf den Boden und redete eifrig unter diefelbe bin. Auf wiederholte Ausleerungen aber verloren fich alle diefe verkehrten Borftellungen, feis ne Gesundheit tam nach wenigen Wochen volls tommen wieder und er thut igt, wie ehebem feine Dienste.

Ein Gelehrter, der mit unter am hypochons

brifchen Spleen litt , fühlte fich einige Tage mins ber aufgelegt, und um den Sppochonder gu verfcheus chen (benn bafur hielt er biefe Unpaglichkeit) ließ er sich eine Flasche Wein nach der andern reichen, betrant sich , schlief; ließ sich so bald er erwachte, wieder Wein geben, und fo brachte er einige Tage ju, bis endlich fein zu gefälliger Sauswirth mich ju ihm bat. Ich erschraf über diefe traurige Scene; ber Kranke erkannte mich zwar , doch bat er mich ftotternd und mit fcwerer Junge inftandigft nur noch um eine Bouteille Wein und bann mufte er ges wiß, daß er gleich gefund merden murbe. Ich ließ fogleich ein halb dugend Bouteillen mit Wafer und etwas Beinefig fullen , und mit gebranntent Bucker gelb gefarbt ihm als Wein vorfeten, dafur mufte er mir verfprechen , die vorgeschriebene Argnen, welche aus Brechweinftein und einem Mittelfalz bes fand , fleißig von dem Barter zu nehmen. Er brach sich hierauf einigemal heftig und hatte wieders holte Stuhlgange. Ich fand ihn am folgenden Morgen ziemlich heiter, bas heftige Berlangen nach Wein , begen er fich nach der Krantheit gar nicht ents finnen fonnte, war verschwunden, nur flagte er noch über bittern Mund und Mangel des Appetits. Wiederholte Ausführungen vollendeten bald vollkoms men die Cur.

Ein 46. jähriger Ehemann wurde nach und nach ganz rasend, und ob er gleich nach jedem Brechmits tel, das allemal viele Galle wegschafte, zu sich kam und einige Tage vernünftig blieb, so hielt doch diese Bekerung nie an. Er zehrte endlich nach und nach ab und ftarb ben vollkommnem Berftand, ber nur einige Stunden vor seinem Tod wieder gekehrt war.

Ein 42. jahriger Trompeter außerte feit vielen Wochen traurige Riedergeschlagenheit und feste fich gleichfalls die irrige Idee im Ropf, als wurde er als Ienthalben von Gerichtsdienern aufgesucht um bins gerichtet zu werden. Bon diefen Gedanten gequalt und verfolgt, gieng er nach einem eine Stunde von Regensburg an ber Donau liegenden Menerhof, verfezte fich mit feinem Degen zwo Stickwunden, fturgte fich in die Donau , schwam auf dem Rucken gegen 60. Schritte fort und murde endlich von bers zugeeilten Fifchern gerettet. Er erzählte mir, baß er fcon feit geraumer Beit bittern Dund, feinen Appetit, und Reigungen jum Erbrechen gehabt habe. Das Beife im Aug war gang gelb und nun ftellte fich von fregen Studen ein Brechen ein; wodurch viele dicke gabe Galle weggeschaft murde. Des ans haltenden Schluchzens sowohl als der Munden wes gen, welche zwar dem außern Unfeben nach febr uns bedeutend zu fenn schienen, aber jedoch in der linken Mabelgegend waren, wagte ich nicht, ein eigentlich Brechmittel gu geben, fondern ließ fleißig finftiren und reichte gelind abführende Arznegen. Der Krante wurde aber immer schwächer und farb endlich bren Wochen nach jener traurigen That. Rurg vor feis nem Tode war viel geronnenes schwarzes Blut durch ben Daftbarm von ihm gegangen. Ben ber Leis chenofnung fanden fich außerlich jene zwo, bem Uns fcheine nach, unbedeutende und faum einen Boll breite Stichwunden. Die eine war in regione epigaftr. eine

eine Queerhandbreit gerade über bem Rabel, und lief gegen biefen zu und zwischen der Saut und beit Bauchmuskeln bin, ohne aber in die Bauchhohle felbst zu dringen; die andre, dem außerlichen Unfeben nach schon geheilte Wunde, war linkerfeits, bren Queerfinger vom Rabel Schregaufwarts gu, in berjenigen Gegend, mo reg. epigastric. in umbilical. fich zu verlieren pflegt. Rach Abfonderung der Saut fand fich auf der namlichen linken Geite im Bellges webe und auf den Bauchmuskeln viel ausgetretenes und geronnenes Blut. Rach Durchsegung ber Bauchmusteln felbft, entbeckte man ben Rand des nach der Berwundung fogleich hervorgetretenen, und weil es nicht mehr zuruck gebracht werden konnte, abgeschnittenen Theils des Metes, welcher mit der Wunde gleichsam verwachsen war und mit Gewalt aus derfelben gezogen werden mufte. Der Stich gieng von diefer linken Seite neun Bolle wenigstens der Lange nach, aufwarts gegen die innere Flache ber Leber zu und verwundete diefelbe ohnweit bes Balfes der Gallenblafe. Daber fand fich bafelbft viel ausgetretenes, geronnenes Blut vor, und der verwundete Theil der Leber war brandicht und faul. -Schwer ift es zu erklaren, wie diefer Ungluckliche fo lange, nämlich ganzer bren Wochen nach einer fo außerft beträchtlichen Berwundung noch leben fonnte. Ueberzeugt aber bin ich, daß diefer fonst rechtschafne Mann nie Sand an fich felbst murde gelegt haben, wenn er sich früher nach Sulfe umgesehen hatte und Die laftige Galle ausgeführt worden mare. Denn gang gewiß ift fast ben jedem Gelbstmord die Saupts urfache in einer physikalisch korperlichen Krantheit aufs

aufzusuchen und unter hunderten legt kaum einer bloß aus Frevel, Berzweiflung, oder kalter Frens denker: Philosophie Hand an sich selbst. Wir lieben das Leben, ben sonst übriger körperlicher guter Ges sundheit zu sehr, als daß wir, gehe es uns auch noch so mühselig und kunmerlich, solches uns selbst nehmen sollten.

Ben einigen herrschte die gallichte Krankheit im Monat August unversteckt und in der gewöhnlichen Form; andre aber befiel fie unter der Geftalt ber Jahrestrantheiten, der Diarrhoen vorzuglich, und mit unter auch der Ruhren, die fur ein und den ans dern todtlich abliefen. Einige Bochnerinnen, murs ben gleich in ben erften Tagen nach ber Entbindung mit Edel , bitterm Mund , unreiner fchleimichten Bunge, Reigungen jum Erbrechen , fchmerzhaftem Unterleib, vermindertem oder gang gehemmtem Mus: fluß der Lochien zc. befallen , aber alle durch Rins ftire, Brechand ausführende Mittel geschwind und ficher geheilt. Gang gewiß mare diefe Rrantheit in das fogenannte Wochnerinnenfieber, welches ich weiter unten noch berühren werde , übergegans gen, wenn der Argt durch ben schmerzhaften Unters leib und verminderten Musfluß der Reinigung ges taufcht, mehr gefucht hatte, ber Entzundung vorzus beugen, als vorzüglich den unreinen Stoff schnell aus dem Rorper gu fchaffen. - Gr. geheime Rath Breyer, der damals fich an dem Hoflager ohnweit Regensburg befand, ergablte mir , daß in Zeit von Dren Tagen einige Perfonen zu ihm gekommen mas ren, die fruh gefund in die Feldarbeit giengen und

auf einmal mit einem rothlaufartigen Ausschlag mit großen schwarzlichen Blattern befallen worden waren: (es war eigentlich erysipelas pustulosum seu vesiculosum Culleni) welchen Zufall sie giftigen Rrautern gufchrieben, die ihrer Meinung nach an ihre Urme gekommen fenn mußten und biefen Mus; fchlag verurfacht hatten. Berlorne Efluft , bittrer Mund ze. erforderten ein Brechmittel und badurch wurden alle Beschwerden in wenigen Tagen gehoben. Suchte man aber blos mit außerlichen Mitteln dies fem ortlichen Ausschlag zu begegnen, fo gieng die Cur außerft langfam von ftatten, ja es pflegten gar Diefe Blasgen in bosartige Gefchwure auszuarten. Much in der Stadt fab ich einige Perfonen, welche flechtenartige Ausschlage, theils im Geficht, theils an andern Theilen des Korpers hatten, und zuweis Ien febr hartnackig und langwierig davon geplagt murden. - In diefem Monat todtete ich den Bands wurm; ber überhaupt bei uns feltner ift, mit dem aber eine 36. jahrige Frau schon feit vielen Jahren geplagt mar; auf folgende bekannte Urt. 3ch ließ fie Abends vier Ungen Butter mit Fleischbrube nehe men und ben folgenden Morgen bren Quentchen von der mannlichen Farrenfrautwurgel: zwo Stunden nachber nahm fie folgende Pillen:

Refin. Scammon. aa gr. XI.
G. Guttae gr. V.
M.

Rach eilf Uhr ließ ich sie noch zwo Unzen Ricis nusol auf zweymal in Fleischbrühe nehmen. Mit den ersten Stühlen giengen viele einzele Glieder

und mit unter große Stude des Burms ab; bas schmalzulaufende Ende aber , in welches sich ber Ropf zu verlieren pflegt, konnte ich nicht entbecken. Ich gab ihr daher den folgenden Morgen wieder zwen Quentchen Farrenkrautwurzel und folgende Pillen:

R. Mercur. dulc. Refin. Scammon. aa gr. XI. Semin. Santonic. G. Afae foetid. aa Drach. I. Guttae gr. v. delicert langians ton. Meten, så es mitenten disc

Co heftig auch biefe Arznen wirkte , fo tant bennoch nicht die geringfte Spur mehr vom Wurm jum Vorschein. Ich gab daher ben folgenden Tag auf drenmal ein halb Quentchen Sabadillfaas men, aber ohne vom Wurm was zu feben. Indefs fen ift fie feitdem von allen Befchwerben, welche bies fer Einwohner ihr fo viele Jahre verurfacht hatte, befrent, ihr Leib ift nicht mehr aufgetrieben und schmerzhaft, es nagt und bewegt fich nichts mehr in demfelben, fur; fie befindet fich febr wohl.

Einer andern 46. jahrigen Frau, ben welcher gleich: falls der öftere Abgang einzeler Glieder die Gegens wart dieses Wurms verrieth, gab ich Abends ein Quentchen und den folgenden Morgen eben fo viel Karrenfrautwurzel und ließ zwo Stunden nachher vier Loth Ricinusol auf brenmal-mit der Wirfung nehmen, daß ein sechs Boll langes immer schmaler julaufendes Stuck, bas febr eng und flein gegliebert war, abgieng. Den folgenden Tag gab ich ihr wies

der ein Purgir, das öfter als 15mal wirkte, aber nichts mehr vom Bandwurm abtrieb. Diese Fran war im dritten Monat, ohne daß sie es selbst vers muthete zum eilstenmal schwanger, gedar nachher glücklich und besindet sich in erwünschtesten Gesunds heitsumständen. Der Kopf des Wurms aber blieb zurück; denn vor kurzem zeigte sie mir ein eine halbe Elle langes, ungleich breiteres, gegliedertes Stück als das war, welches vor 3. Jahren abgetrieben wors den ist. Das Castorol scheint also auch kein unsehle bares Mittel gegen diesen Wurm zu senn.

Sehr merkwurdig und Gefahrvoll maren biejes nigen Krankheiten, welche in den Monaten Seps tember und October ziemlich oft vorkamen, und die man bosartige gallichte Faulfieber ober den faulichten Synochum nennen konnte. Junge Leute wurden vorzüglich damit befallen; abgeschlagene, matte Glieder und verlohrne Efluft fundigten die Rrantheit entfernt an, bald aber gefellten fich Fies ber und Durchfall dazu. Um fiebenden Tag auf: ferte fich heftiges Irrereden und der Durchfall nahm in etwas ab. Wurden nun diefe Patienten gleich in den erften zwen oder dren Tagen hinlanglich mit ausführenden und befonders Brechmitteln behans belt, fo daß fie fich vier bis fechemal wenigstens übergeben muften; fo mar auch meift die gange Krankheit gehoben. Burbe aber Diefer gunftige Zeitpunct verfaumt, oder reichte man wohl gar, den Durchfall zu ftopfen, hitige, schweißtreibende und Mohnmits tel, so gieng die Krankheit schnell in jenes bosartige Fieber über, gegen welches die Spekakuahne, die Rinde

Minde, mineralische Caure, Blaseupflafter ja Dos fcus, Wolferley u. f. w. außerft felten etwas vermoche ten: der Rranke lag finnlos mit Friefel und Petes chien bedeckt ba, und ftarb oft am 24. oft am 36. Tag feiner Krankheit. Der Erfte ben ich im Gept. an diefem bosartigen Fieber am 28ften Tag der Rrantheit verlor mar ein 17. jahriger Meggerssohn. Merkwurdig war hieben bas Unfteckende diefes Kies bers. Denn fur; nach ienes Tod wurde nicht nur feine jungere Schwester , fondern auch ein ruftiger 24. jahriger Menfch bamit befallen, ber als Meggers knecht in diesem Saus diente und den Rranken oft beben und legen geholfen hatte. Legterer begab fich gu feinen Eltern, die eine fleine halbe Stunde von hier auf dem Land wohnten, wo ich ihn ofters bes Erft nach bren Wochen war bas Gefahr volle diefer Krankheit vorüber; und nun erkrankte Die altere Schwester, welche, ihren Bruder mah: rend feiner Krantheit fleißig gewartet hatte. 3ch reichte ihr fogleich zu vieler Erleichterung Breche mittel; da aber die jungern zwen Gefchwifter, ein 16. jahriger Jungling und ein 13. Jahr altes Madchen von der nehmlichen Krankheit befallen wurden, fo vergaß fie über die Wartung derfelben fich felbst und verschob das zu wiederholende Brechmittel von einem Tag auf den andern. Rachdem auch biefe zwen nach und nach der Gefahr glucklich entgangen waren, fo murbe iene gang bettlagerig und ftarb aller angewandten Dube ohnerachtet als Opfer schwesterlicher Treue und Liebe am 36. Tag des Ruckfalls im zwanzigsten Jahre. — Der gangliche Berlauf biefer vier Kranken von einer Familie (benn

HHE

nur Bater und Mutter blieben verschont) faste die vollen dren Monate October, November und Dezember in sich. — Außer den gewöhnlichen Jahe restrankheiten als Koliken, Diarrhoen zc. hatten wir, im October vorzüglich, viele rheumatische gale lichte Zufälle; und hier konnte man die ersten Spurren des allmähligen Uebergangs unsere bisherigen Epidemte in die schleimicht: gallichte Constitution, die das ganze 1786ste Jahrüber allgemein herrschte, bemerken.

Auch in dem Monat Movember hatte ich wies ber einen Wahnsinnigen zu behandeln. Es fam Diefe Kranheit von der Galle ber, und nachdem diefe ausgeleert mar , murbe mein Patient eben der fanfte muthige, friedfertige Mann wieder, ber er immer gewesen mar , fprach nun nichts weiter mehr von Menschenmorden und erinnerte fich nicht, diese irris gen Gedanken und Reden jemals gehabt zu haben. -Um häufigsten kamen rheumatische Bufalle, und bie und ba die Blattern vor. - 3ch vergaß im vergans genen Monat die Gefchichte einer innern Berblutung zu erzählen, an der ich ein 36. jahriges Weib verfor. Ich wurde namlich den 25. Octob. Abends gum erftenmal zu ihr gerufen : fie fagte mir, bag fie vor einem Jahr von einem Rind, das noch lebe, aber von ihr nicht gestillt worden ware, glucklich ents bunden worden fen, und ist wieder ihre Reinigung erwarte, die fie vor vier Bochen richtig gehabt hatte. Sie flagte über die außerfte Mattigfeit, die fich feit Mittag mit jeder Stunde vermehre, hatte todtenblaf fes Aussehen und schwachen gitternden Buls. 3ch 98

gab die Riverische Potion mit Rhabarbertinctur und Zimmetfaft, fo viel ich mich erinnere, und als Thee, Des liffentraut mit romifchen Chamillenblumen. aber hatte ich fie verlagen, fo verschied fie. weder gefallen, noch durch je eine andre außere Ges waltthatigfeit verlegt worden war , fo fonnte ich mir Diefen fo fchnellen Tod nur durch eine innerliche Bers blutung im Unterleib erflaren, bergleichen mir vor neun Jahren schon einmal vorgekommen war. Da ich bie Erlaubnig, ben Leichnam in Gile ju ofnen, erhalten hats te,fo war nach Durchfegung ber Saute und ber Bauchs musteln die Soble des Unterleibs gang mit Blut ans gefüllt und bamit die Gedarme bebeckt. ches weggeschaft wurde, fand man alle abdominal Eingeweide naturlich und gefund, nur blager als ges wöhnlich. Die Mutter war leer , flein und nicht bes Un dem linken Eperftock entbeckte man eis fruchtet. nen fugillirten dunkelrothen Fleck, eines Rreubers groß. Db hier der Urfprung diefer Berblutung ges wefen fenn mag, mage ich um fo weniger zu bes stimmen, da weder Ort noch Zeit (es geschah diefe Section Rachts auf dem Rirchhof) erlaubten, ber Quelle genauer nachzuspuren. Bielleicht geschah Diefe Berblutung durch eine widernaturliche Erweis terung eines ober des andern fleinen Gefages, bas nach der Mutter ober den Eperftocken zu geht und aller barauf verwandten Dube ohnerachtet, doch nie ans scheinlich ober sichtbar hatte bargethan werden tons nen. Wenigstens mar im folgenden Fall, diefe wis bernaturliche Erofnung ober Zerreißung gleichfalls nicht zu entbeden. - Ein 20. jahriger Jungling, der die Sandlung noch nicht gar ausgelernt batte,

mard

ward im Monat September 1776. mit einem drens tagigen Rieber befallen, bas nach und nach glucklich gehoben wurde. Er fieng, wiewohl noch ziemlich matt, wieder an, im Laden Dienfte gu thun. Den 9. October legte er fich gefund gu Bette, fcblief gut ein, erwachte aber nach einigen Stunden und mufte unaufhörlich auf ben Stuhl geben, woben er außerst matt murbe. Als ich fruh nach funf Uhr zu ihm tam , fand ich die Bande falt , bent Pulsschlag flein und schwach, der Kranke flagte über feine Schmerzen, war aber todtenblag und auf das außerfte entfraftet. 3ch erschrack nicht wenig, als ich die Excremente untersuchen wollte und den gans gen Racht: Topf, der wehl 12. Maag faste, mit Blut voll angefüllet fab. Ich gab ihm fauerliche Getrante, und verordnete Alaunmolten und gufams menziehende Kluftire. Er ftarb aber noch ehe die Mittel bereitet waren , und hatte einige Secunden por feinem Ende jenes convulfivische Mundauffperren, das fich ben Menschen und Thieren, die an eis ner Berblutung fterben, außert. Alle Gingeweibe Diefes jungen Menschen, waren gefund und naturs lich, nur blager als gewöhnlich beschaffen. Der gange Darmkanal vom Jeiuno bis zum Maftdarm fah blaurothlicht ber und enthielt meift geronnen Blut. Go febr ichs mir auch angelegen fenn ließ, ben mahren Urfprung diefer tobtlichen Berblutung zu entbecken , konnte ich folchen doch nicht auss findig machen.

Außer rheumatisch, catarrhalischen und gallichs ten Krankheiten herrschten im December mit unter S 2

auch falfche Peripneumonien, Tertianfieber, und bors juglich heftig ber Reichhuften. Much ben angebens ben Lungenschwindfüchtigen feste Diefer Monat febr gu. Gegen das Ende beffelben verlohr ich auffer ienem Dadden, von bem ich im October fprach, noch einen 45iabrigen Landmann, ber aber erft ant 14 Tage ber Krankheit um ernftliche Gulfe umges feben batte, an eben biefem bosartigen gallichten Kaulfieber. — Ueberhaupt war, meiner Einsicht nach, diefe Epidemie von der voriährigen — wes nigstens bis im Monat October d. J. nicht fonders lich verschieden, auffer daß der bittre Dund und Die Meigungen jum Erbrechen, befonders vom Geps tember bes vergangenen Jahrs an gerechnet, alls gemeiner wurden, und ein oft noch fo geringes Brechmittel schnell wirkte und Gallausführend mar; befonders galt diefes von cholerischen und fanguinis fchen Perfonen; die phlegmatischen und melancholis Schen machten eine Ausnahme; da hingegen im vers gangenen Jahr die Kranten erft nach vorhergenome menen auflofenden Argnenen Bitterfeit bemertten und Brechmittel bann erft mit Bortheil und Bes beiben gereicht werden fonnten ; bafur aber bemerts ten wir auch in diefem Jahr mehr Bosartigkeit Diefes Riebers, befonders wenn, wie oft fcon ers innert worden, im Unfang bas Brechmittel verfaumt. wurde. Um unfehlbares Brechen zu bewirken, feste ich allemal die Spekakuanha dem Brechweinstein ben, weil legterer allein gegeben, gar oft blos unter fich durchschlug und die Kranken febr entfraftete. -Much schien gegen das Ende biefes Jahrs vorzug: lich bas Drufenspftem mehr zu leiden, als im ver-

975

gangenen. Denn Drufengeschwulfte waren allgemeis ner und eine fchnelle Berfchwindung derfelben meif fagte meift einen traurigen Ausgang der Krantheit. Beilfame Rrifen erfolgten in diefem Jahr, fo wie im vergangenen, nur nach gallichten Ausleerungen und weder Schweiß noch Urin, weder Sautaus: Schlage noch Blutausleerungen, fie mochten nun durch Runft ober Ratur bewirkt worden fenn, waren fritisch und beilten allein nie: nur ein von freien Studen ober durch Runft erfolgtes Brechen Schafte fichtbare Linderung und Genefung. Daber waren auch die namlichen oben ichon angezeigten Argneimittel immer noch die wirksamften; nur ges gen das Ende diefes Jahrs, da die Schleimichte. bilibse Constitution sich entfernt anmeldete, mußte mit auflofenden Mitteln mehr angehalten werden und nicht Brechen allein, fondern nervenftartende Argnenen vollendeten die Cur. Ueberhaupt mar der Sang unfrer Rrantheiten, wie wir bald feben wers ben, im folgenden Jahr langfam. Dadurch aber, daß fie fo wenig als die voriahrige Epidemie das Aberlaffen, felbft auch in benienigen Monaten nicht ungeahndet vertrug, in welchen eine inflammatoris fche Constitution noch zu berrichen pflegt, scheint fe fich besonders auszuzeichnen. Ein wiederholter Beweis bes Rachtheils, den Aberlaffen anrichteten fen folgende Rrankengeschichte : Ein Mann, funfe zig Jahre alt, ließ mich am achten Man zu fich rufen, flagte über aufferfte Mattigfeit, bittern Mund, schlaflose Rachte, heftiges Ropfweh und hatte febr fieberhaften und etwas vollen Puls. Brechmeins stein mit Manna u. f. w. führten sowohl von oben G 3 als

200

als unten viele Galle mit Erleichterung ab, und bet bald vollkommen ju genesen scheinende Kranke flage te nur noch über. Schlaflosigkeit und Ropfweh. Da er die gewohnte Zeit jum Aberlaffen im Frubiabr übergangen hatte, fo bat er mich auf bas bringende fte, folches vornehmen ju laffen, mit dem Benfag, er wiffe gewiß, bag er dann gleich gefund merden murs de. 3ch konnte ihm diefes Berlangen um fo leichter gewähren, da der Puls wirklich etwas voll und hart und die Bitterfeit bes Mundes vergangen war, auch Die Efluft fich wieder einfand. Gieben Ungen abs gezogenes Blut batten eine bicke, gabe, fogenannte inflammatorische Saut, wie ich fie noch nie gefes ben, und am folgenden Tag, als am vierten ber Rrantheit, versicherte mich der Patient fruh, recht wohl geschlafen zu haben und sich gang gut zu bes Abende fant ber Pule mit einemmal, Er: rereden fand fich ein, ber Krante verlor den Ges brauch feiner Sinne, Blafenpflafter, China, Dofch u. f. w. waren ju ohnmachtig, bem Tod, ber ben andern Abend erfolgte, bas Biel abzulaufen.

Ob diese traurige schnelle Wendung allein dem vorgenommenen Aderlaßen zuzuschreiben sen, will ich unentschieden lassen; doch machte der Fall, daß ich allem Aderlaßen in dieser Krankheit, noch abs geneigter wurde, als ich es schon war, und folgens de Krankengeschichte, wo ich, ben äußerst scheinbas rer Vollblütigkeit, mit dem besten Erfolg dennoch nicht Ader ließ, bestärkte mich hierinnen.

Ein etliche funfzig Jahre alter Italiener wurs

De am Igten Day mit fartem Fieber, ziemlich vollem harten Puls, heftigem Ropfschmerz und Seis tenstechen mit blutigem Auswurf befallen. Da die Bunge unrein und schleimicht war, so gab ich ihm alle halbe Stunden eine Schaale voll einer Auflofung von Manna und Polnchreftfalz mit ein paar Gran Brechweinstein verfest. Er brach fich hierauf eis nigemal und hatte oftere febr ftinkende Stuhlgans ge. Das Seitenstechen aber blieb auch nach ber Wirkung eines auf die leidende Stelle gelegten Blas fenpflasters, immer gleich start. Go dunkelroth auch feine Wangen glubten, fo voll und ftark auch ber Puls und fo heftig ber Kopfichmerg mar, und obgleich wiederholt einige Tropfen Blut aus ber Rafe, wies wohl ohne Erleichterung floßen, fo hielten-mich doch Die gelben Ringe um die Mugen und den Dund, ber mit Galle überladene und dunkel gefarbte feus rige Urin und hauptfachlich das traurige Undenken der furzvorber erzählten Krankengeschichte von dem Aberlagen ab. Ben bem fernern Gebrauch gelind abführender Mittel verlor fich Ropfweh und Geis tenftechen nach und nach, den febr befrigen Durft Stillte gefattigtes Graswurgelbecoct mit Bitriolfaure verfest, das Irrereden nahm ab, der Puls fiel und am fiebenden Tag erfolgte ein ftarkender Schlaf, welcher Rrafte und Efluft brachte. Ein Chinades coct mit bittern Extracten gab dem Rranten in furgem feine vollkommene Gefundheit wieder.

Ehe ich dieß Jahr ganz verlasse, so schalte ich hier noch die traurige Geschichte einer fünf und zwanzig iährigen Frau ein. Es reiste dieselbe den zwen:

zwenten December fruh gefund und im achten Dos nat ihrer zwoten Schwangerschaft von bier nach Rurnberg in einem wohl verwahrten Postwas Che fie noch die erfte Station erreichte, giengen ihr abwechselnde Uebelkeiten gu, die auf Rechnung bes Fahrens und des leeren Magens ges Schrieben wurden. Da aber nach abermal einges nommenem Fruhftud diefe Schwachheiten mehr gu, als abnahmen, fo entschloß fie fich mit ihrem Mann jurud zu bleiben. Um auszuruhen, wollte fie fich auf das nahe ftebende Bett begeben, fiel aber mit aller Macht auf ben Boben und mußte ans Bett geführt und hineingelegt werben. Gie fieng an einzuschlafen; gegen vier Uhr Abends aber brachen plogliche Convulsionen aus, die bis an ihr Ende in einem fortwährten. Ich wurde in ber Racht noch eilig zu ihr gerufen und fand fie, als ich fruh um zwen Uhr ankam in diefer gefahrvollen Lage. fühlte fogleich zu ihr, und fah, daß die Mutteroffs nung febr flein, die Bafferblafe noch nicht geplage war und bas Rind mit dem Ropf naturlich gur Ges burt fand. Da fie feit einigen Monaten nicht mehr zur Aber gelaffen, fo ließ ich ihr auf bem Fuß eine Aber ofnen. Das Blut aber floß nur Trops fenweis, und faum fam eine Unge in allem beraus; Die Convulfionen, das Rocheln und die tiefe Bes taubung hielten gleich ftart an, ber Puls fant und fie verschied eine fleine Stund nach meiner Uns Da die Bauchmusteln und die Mutter ges borig durchschnitten waren, so jog ich ein ziemlich fartes Madchen heraus, bas aber nur noch fchwas che Spuren bes Lebens verrieth, die bald gang vers fdwans

2000

wie

ichwanden. — Die Barmutter war naturlich bes schaffen auch ließ sich im Unterleib die Urfache dies fes schnellen Todes nicht entdecken. Den Ropf gu öffnen batte ich weder Zeit, Gelegenheit, noch auch Erlaubnis. - Glucklicher mar der Ausgang ben abnlichen Budungen im folgenden Fall. Gin obne gefebr 24 iabriges Frauenzimmer aus bem Elfag, welches erft bren viertel Jahre verhenrathet war, wurde ben 13 Jenner 1784 Rachts um neun Uhr schnell mit Convulsionen befallen. 2118 ich nach Mitternacht zu ihr fam, fagte mir ihr Dann, bag fie zwar febr reigbare Merven habe, nie aber folche Unfalle gehabt batte, fondern mahrend ihrer gans gen Schwangerschaft, die in dren Bochen erft, ib: rer Rechnung nach aus fen, immer gefund gewesen ware. Gegen Abend habe fie etwas Ropfweh geklagt und fich beswegen ju Bette gelegt; um neun Uhr fen der erfte Parornsmus erschienen; dies mare schon ber vierte und feit bem fen fie feinen Augenblick mehr zu fich gekommen. Ich fublte fogleich zu ihr und fand die Mutterofnung flein und gegen bas Beiligbein ju; wahrend den Buckungen aber fich mehr anspannen und offnen. Der Ropf des Rins bes ftund naturlich gur Geburt. Da der Puls febr voll und gespannt gieng, so ließ ich eine Aber ant Urm ofnen und befprach mich hierauf mit unfernt gefchickten und erfahrnen Geburtshelfer und Stadts wundarzt herrn Staud, wegen eines Accouchement force. Da er mir aber einige abnliche und gludlich ausgegangene Kalle, die ihm in feiner viels tahrigen Praxis vorgekommen find, ergablte; ber Ropf des Kindes fehr hoch stand und der Muttermund, 6 5

2000

wie fcon gefagt, unbedeutend geofnet mar, fo fas hen wir zu und ich rieth ein Klnftir aus Chamil Ien Abfud mit vier Gran Mohnfaft ju fegen, bas nachher wiederholt murde. Die Convulfionen fas men nach ber Aberlag alle Stunden wieder und nach Wirkung des Kluftire festen fie vier Stunden aus, doch war ein widernaturlicher tiefer Schlaf mit Rocheln und volliges Unbewuftfenn anhaltend. Um gehn Uhr Bormittag wurde ihr auf dem Rug gur Aber gelaffen und als ich fie Rachmittag um Zwen wieder fah, fagte mir die Bebamme, bag fo eben die Baffer mahrend heftigen Convulfionen ges brochen waren und der Ropf tief unten im Beden ftande. Die Geburt murbe nun mit ber Bange fchnell beendiget. Die Convulfionen blieben zwar aus, iedoch schlief die Kranke anhaltend fort und erst nach zween Tagen fam fie mehrmalen, wiewohl nur ims mer auf einige Augenblicke ju fich, fchloß aber fos gleich wieder die Augen und schien fort zu schlum: mern. Rach und nach blieb fie langer wach, fam mehr zu fich und flagte, ale fie wieder reden fonns te über Abgeschlagenheit ber Glieder und vorzüglich uber große Schmergen ihrer verwundeten und ans geschwollenen Bunge, in die fie fich in den erftern Parornsmen fürchterlich gebiffen hatte. Gie erholte fich aber allmählig vollkommen und im Monat Dan verließ fie Regensburg gefund mit ihrem Jungen, ben fie in ben erften Augenblicken ihres Bewuft: fenns nicht gleich fur ihr Rind erkennen wollte, bis ich ihr endlich fagte, fie mochte ihren Leib befüh: Ien und fich überzeugen, daß fie nun nicht mehr Schwanger, fondern von diefem Rind entbunden mor:

worden fen. Gie that es, war anfangs gang ver: wundert darüber, daß ihr großer Leib weg mar, und lachelte das Rind freundlich an. Ihr Gedachtnis blieb lange Zeit schwach und hatte am meisten Meufferst merkwurdig ift die gangliche gelitten. Berlofchung und Bertilgung aller Bilder und Ges genftande, die ihr einige Wochen vor ihrer Ents bindung vorgekommen waren. Gie hielt fich g. B. ebe fie bieber tam, einige Zeit in Augsburg auf, und faufte dafelbft verschiedene Gerathschaft. Jest tonnte fie fich aber gar nicht entfinnen, iemals an Diesem Ort gewesen zu fenn, und als ihr die von ihr felbst gekauften Waaren meift in die Sand fies fen, fo fragte fie ihren Mann, wie fie bagu gefom: men ware; furg, fie konnte fich schlechterdings nicht erinnern, daß fie diefe Stude alle felbft in den Ges wolbern Augsburgs ausgehandelt und eingekauft habe. Auch der Gasthof, in welchem fie bier gu erft abgetreten und einige Tage geblieben mar, fo wie alle Dieienigen Perfonen, die fie bafelbft bes fucht und gesprochen, oder mit ihr gespeift hats ten u. f. w. waren ihr fremd, und es war ihr uns möglich fich zu erinnern, diefelben vorher fchon ein: mal gefeben und gesprochen zu haben.

Dieses Jahr über hatte ich zusammen 625 Kranke nach und nach zu besuchen und zu berathen. Rämlich im

> Februarius 49 Februarius 57 Martius 72 April 59

2	00 500	11111
Man	77	
Junius	28	43000
Julius	48	AL STREET
August	50	The Dings
September	50	The Marie
Detober	51	
Movember	44	
December	40	1000 00
Summe	625	Rrante.

Bon diesen starben 36. Als im

Won diesen starben 36. Als im	344
Jan. Am Schlagfluß ein 66 ichriger hands werksmann.	1
Action represents the property and the second standings	T
Sebr. Um gallichten Saulfieber ein 18 Mo:	St. Vi
nat altes Kind.	I
the Trib Manager to a trib the property of the contract of the	I
Mart. Un der Lungenschwindsucht ein 26	2000
iähriges Mädchen.	1
Am Stickfluß ein neun Monate altes Kind.	W.
An symptomatischen Gichtern ein 10 Wochen altes Kind.	I
	3
Upril. Un eben biefen Buckungen ein iahs	3
riges Kind.	1
Um gallichten Saulfieber eine 50 iahrige	400
Frau.	I
An eben dieser Krankheit ein 44 iahriger	
Mann.	1

An einem eingeklemmten Bruch ein 65 iahriger Mann.	1
May. An dem gallichten Saulfieber ein 48	4
iahriger Mann.	1
Un eben dieser Krankheit ein 57 iahriger Ordensgeistlicher.	I
Un der nämlichen Krankheit ein 50 iahriger Mann.	1
Um Schlagfluß ein 55 iahriger Portier.	1
Ander Brust: und Bauchwassersucht als	
Folge einer Berstopfung der abdominal	
Eingeweide ein 66 ichriger Ordensgeist	
Um Blutsturz ein 60 iähriger lungensüch:	3
tiger Bediente.	1
T The state of the	-6
Jun. Un eben biefer Rrantheit ein 56 iah:	M. Commission
riger Tapezirer.	1
Un der Abzehrung eine 36 ichrige Dame.	1
Un der Entfraftung ein 80iahriger Greis.	T
THE WAS ASSESSED TO SHEET AND A PARTY OF THE	3
Jul. Am gallichten Saulfieber eine 59 iah:	
rige Frau.	I
Un eben dieser Krankheit ein 60 iahriger	1127
Mann.	_1
	2
Aug. An der Lungenschwindsucht eine 30 ichrige Frau.	1

Un Entfraftung und folgendem Mervens	迪
schlag eine 59iahrige Frau.	
Un der Wassersucht ein 60 iahriger Fischer.	
Am gallichten Saulsieber ein 65 ichriger	ari
Mann.	
An symptomatischen Zuckungen 3 Wo:	
chenkinder.	
a bee manufacture of the district description and a	10 7
Sept. An der Ruhr ein 14 iahriger Schneis	
derlehriunge.	1
Am bösartigen gallichten Saulsieber ein	2
17 iahriger Mezger.	1
Cincatal and the repulsion Comments	2
Oct. Am gallichten Saulfieber ein 56 iah!	
riger Ordensgeistlicher.	2 1
Un einer innern Verblutung eine 36 iahe	
rige Frau.	1
Call The State State Charles of the Philips	- 2
Nov. An symptomatischen Zuckungen ein	
25 Wochen altes Kind.	2
The second secon	-
Dec. An Convulsionen eine 25 Jahre alte	
Frau im achten Monat der Schwangers	
fchaft.	
Un der Lungenschwindsucht ein 20 iah:	238
riger Jungling.	I
Un eben diefer Krankheit eine 48 iahr. Frau.	I
An dem gallichten Saulfieber ein 20 iahris	
ges Madchen.	I
	4
Gunna Gunna	

I 7 8 6.

Ueberhaupts hatten wir auch in diesem Jahr viele gaftrifche Rrantheiten, Die theils von gabem Dichtem Schleim, theils aber von überflußiger, vers borbener Galle allein ihren Urfprung nahmen. Legs tere außerten fich durch die gewöhnlichen Zeichen, als bittern Mund, verlorne Egluft ic. und durch ein gegebenes Brechmittel wurde viele Galle megges schaft; bennoch war die Sauptconstitution diefes Jahrs Schleimicht : gallicht , die sich besonders durch rheumatische und fatarrhalische Beschwerden allgemein außerte. Denn nie hatten wohl bie Mergte fo viele Suften , Lungenschwindsuchten , Glieders fchmergen und andre hartnactige rheumatische Bufalle gu behandelu, als in diefem Jahr. Gelbft viele ins termittirende Fieber verfteckten fich unter diefe Maste und der periodische und schnell eintretende Parorns: mus gab fein Dafenn bald durch einfeitiges Ropfs weh, balb durch heftige Ohren, Jahn ober Augens fchmergen zu erkennen, welche nach einigen Stunden vollkommen wieder verschwanden. Scharfe verdors bene Galle war zwar ben den meiften diefer Rrants heiten mit im Spiel, doch war fie nicht in der Menge ba, auch fehrte felbst nach Wegbringung derfelben die Gesundheit nicht fo schnell wieder, als in der vorhergegangenen gallichten Constitution. Es war überhaupt ber Gang unfrer Rrantheiten langfamer , als in ben zwen vorigen Jahren , und wir hatten mehr mit Auflofung und Wegschaffung gaber, fchleimichter Gafte (benn mit dem Stuhl gieng mahrend diefer schleimichten Constitution uns glaub:

glaublich viel Gluten Spontan. wie es Boerhaad nannte, oder Rampfe Infarctus ab:) und nache her mit Mervenftartung ber gefchwachten und lange leibenden Organe zu thun, als nur blos auf Galle ausführende Mittel gu feben. Ein ober bas andre gegebene Brechmittel allein, bob die Krantheiten bies fes Jahrs außerst felten : nur dem anhaltenben Gebrauch bitterer Extracte, bem Ummoniat und Guajakgumi , mit bem Arabischem verfest , bent hurhamischen Brechwein, der Rinde, der Baldrians wurgel, ber Urnifa, ben Blafenpflaftern u. f. w. hatten Die Kranten ihre langfame Wiedergenefung ju verbans War aber bie und da ein Eingeweide verftopft ober Schadhaft, fo erholten fich biefe Patienten aller Eraftigften Arznenmittel ohnerachtet nie, fondern ihre Rrantheit endigte fich mit einer Abzehrung ober Baf fersucht. — Der allmählige Uebergang ber galliche ten Constitution in diefe zeigte fich fcon entfernt in ben legten bren Monaten des verflogenen Jahres; Die Urfache diefes Uebergangs aber richtig und ges nau zu erklaren mage ich nicht, fondern überlaffe folches tiefer febenben Pathologen. Mir genügt, bas, was ich diefes Jahr über mit ruhiger Mufmertfamfeit am Rrantenbette fab , bier turg gu er? gablen.

Januarius.

Wir sahen in diesem Monat viele Koliken, die mit Erbrechen und Abweichen Kinder sowohl als Erwachsene plößlich befielen. Sehr wenige Galle gieng durch dieses freywillige von selbst entstandne

Brechen fort, daher war auch felten ein formliches Brechmittel erforderlich, fondern Manna mit Mits telfalzen zc. führten viele Unreinigkeiten ab und bos ben Schmerz und Durchfall in dren bis vier Las gen. - In der Stadt sowohl als auf dem benach: barten Lande herrschten noch immer hie und da jene bosartige gallichte Faulfieber, deren Ausgang meift da todtlich war, wo der Argt zu fpat gerufen und im Anfang der Krankheit gleich Brechmittel gu reis chen verfaumt wurde. Gine befondre Gattung eis nes nicht erleichternden Schweißes, der nur die untern Gliedmagen vom Rabel angerechnet befiel, und ein gelindes herumirrendes Reigen in den Artis culationen und befonders in den Ruffohlen und Bal-Ien fundigte den fichern Ausbruch langwiriger rheus matischer Schmerzen, die in Diefem Jahr ziemlich haufig vorkamen , von ferne an. - Gegen bas Ende diefes Monats besuchte ich dren junge Weiber, welche schnell mit Blutfturzungen aus der Mutter befallen murben; die eine davon mar gum erftenmal im vierten Monat schwanger und abortirte vierzehn Tage nachher mit einem noch eine gute halbe Stunde lebenden und fich bewegenden Rind; die andern zwen aber waren nicht schwanger. - Es berrschten mit unter theils mahre, theils falsche Pocken, an bem Reichhuften erkrankte Rinder hatte ich biefes gange Jahr uber, ben December ausgenommen, ju bes fuchen.

Es sieng diese Krankheit schon in den lezten Mos naten des vergangenen Jahrs an und währte bis ges gen das Ende dieses mit fast gleicher Wuth fort, so daß daß man auf allen Straßen die armen Kinder husten hörte; auch starben deren viele besonders solche dars an, welche schwächlich waren und Anlage zur englis schen Krankheit hatten, oder gerade mit dem Zahns geschäfte umgiengen. Man konnte ben dieser Epis demie drey verschiedne Stadien deutlich bemerken; das erste war das Katarrhalische, das zweyte das Convulsivische (wodurch dieser Husten von allen andern sich unterscheidet) und das dritte das Stadium des Nachhustens.

Die erste Periode währte ohngefehr vierzehn Tage, und war von einem andern Katarrhalhusten, mit dem Kinder so oft befallen werden, nicht wohl zu unterscheiden; aber mit vieler Wahrscheinlichkeit konnte man den Keichhusten vermuthen, weil diese Periode der convulsivischen immer während dieser Epidemie vorher gieng und die Krankheit nie gleich mit der zwoten ansieng.

ploklich wurden die Kinder, und zwar im Unsfang des zwenten Stadiums, besonders in der Nacht, in der Folge aber nach genommener Speise oder Trank vom Husten befallen; sie richteten im Schlaf sich geschwind auf, husteten schnell und lang anhaltend aus, athmeten dann tief, fürchterlich tonend und mit vieler Beschwerde ein, husteten eben so schnell wieder aus und so wurde der Paroxysmus ansfangs eine halbe, nachher eine und mehrere Minusten lang, während dem die Kinder alle kurz vorher genoßene Nahrung wegbrachen, aufgedunsen, roth und blau wurden; (das aufgeblähte Gesicht blieb ih)

nen auch außer ben Anfallen) vielen fturgte bas Blut aus Rafe und Mund, fie fielen Athemlos zu Boden, wenn fie fich nicht felbst fest hielten oder gehalten wurden, und einige, boch nur wenige, erftickten gar. Ben einigen fundigte fich der nahe Anfall durch befe tiges ober wiederholtes Rieffen an : alle aber ems pfanden oft einige Minuten lang vorher ieden Das rornsmus und suchten Bulfe. Das Fieber, welches fonft ben dem Reichhuften, fo wie der abwechfelnde gute und schlimme Tag einen wefentlichen Charafter biefer Rrantheit ausmachen, war ben unfrer Epis demie fo gelind, daß fie nur dann bemerkt wurden, wann ber huften unrichtig behandelt wurde, oder schwächliche und rachitische Kinder befiel. Diefe gwote Periode ift die Gefahrvollfte und mahrte bren, vier Wochen und oft noch langer. In derfels ben ftarben nicht nur viele Kinder unmittelbar ; fons bern es wurden auch durch die heftigkeit diefes bu: ftens manche Blutgefaße gerrigen, worauf nach und nach Lungenschwindsucht und Zahnfieber folgten, oder Bruche veranlaffet, u. f. w. Im Anfang dies fes Stadiums war ber huften meiftens troten und ohne Auswurf, oder es murde mit Dube flugiger weißer Rot aufgebracht , nach Berlauf von viers zehn Tagen aber — fruber ober auch fpater wurde ein dick gekochter, gruner, meift aber gelber Schleim ausgeworfen und diefer fundigte den alls mabligen Uebergang in die britte Periode an.

Diese war nun dadurch kennbar, taß die Kins der sich seltner erbrachen, nicht mehr so lange nach einander aushusteten und der unangenehme ganz eigne Ton im Einathmen, der durch die spastische Verens gerung der Glottis hervorgebracht wird, immer selts ner gehört wurde und daß nach jedem Anfall des Husstens leichter Auswurf eines mäßig zähen Schleims erfolgte, der allmählig weiß wurde. Die Anfalle kamen überhaupt seltner, kaum vier oder sechsmal in Zeit von 24. Stunden, des Nachts fast gar nicht mehr, auch sparsamer nach dem Eßen, und hörten endlich nach und nach ganz auf.

Der Reichhuften scheint, wie die Pocken contas giofer Urt zu fenn , hat alfo fein fpecifisches anftes tendes Gift, das nur diejenigen Rerven, welche biefes Miasma nie empfunden haben, reigt, in Uns ruhe fest und nach und nach fo bestimmt disponirt, daß gerade die namliche Krankheit erzeugt mird. Daber befallt diefer Suften , fo wie die Pocken, wohl außerst felten den Menschen zwenmal. Denn wenn der huften ben einigen Kindern acht ober viers zehn Tage ausblieb , und fie bann wieder mit der als ten Beftigkeit anfiel , fo mar die Rrantheit entwes ber noch nicht gang gehoben oder vielleicht gar nur in Unordnung gebracht. Es fcheint auch , als fen ber urfprungliche Gig bes Reichhuftens nicht im Magen , fondern in der Lunge aufzusuchen ; iener leibet erft in ber Folge mit. Denn bas erfte fatars rhalische Stadium; die leichte und schnelle Art der Unfteckung, wenn gefunde, noch nie auf biefe Beife gereigte Lungen die von Ungeftecten aus: gehauchte Luft einathmen ; der Suften felbft und das specifische, fürchterlich tonende beschwerliche Einathmen, im zwenten Stadio, bas wie gefagt,

von der Berengerung ber Glottis tommt; die leichte Entstehung des Parorysmus nach Lachen, Reden, befonders nach Egen; der erfte Reit zum Suften, ben Kinder in der Trochea anzugeben pflegen; ber ausgeworfene Schleim felbst; die Entzundung und Bereiterung ber Lungen in geofneten Leichen zc. zc. fprechen mit vieler Bahrscheinlichkeit dafur , daß Die Lungen und das Zwergfell hier die vorzüglichst leidenden Theile find. Dag Brech: Schleimansfuh: rende und auf den Magen nachdrucklich wirkende Mittel diefen Suften am ficherften beilen, beweift fo wenig, den wirklichen Git diefer Rrankheit in dies fem Eingeweibe, als die Lungenschwindfucht zuerst im Magen entfteht, weil Brech: und bittre Rervens mittel diefe Rrantheit gleich in ihrer erften Entftes hung oft glucklich beilen. Ueberhaupt scheinen die großen sympathischen Rerven, nervi intercostales, die wie Weifard fagt , ein paar rechte Kerls von Merven find , in diefer Krantheit ben meiften Reit zu empfinden und die Sauptrolle zu fpielen.

Meine Heilmethode während dieser Epidemie war ohngefähr folgende. Ich gab einige Tage eine Bersmischung von G. Guajac. G. Arabic. lenit. Tartar. zu gleichen Theilen bepläusig ein Quentchen, und seste derselben noch ein oder zwen Gran Brechweinstein ben. Diese abgetheilten Pulver reichte ich des Tags einigemal so, daß sie ein bis zwenmal durchschlugen, oder gelindes Erbrechen machten. Nach Berlaufzweher oder drener Tage gab ich ein förmlich absührtendes Mittel, meistens einige Gran Jalappenharz. Wenn die Kinder sehr röchelten und nicht brachen,

fo reichte ich ihnen ein Brechmittel. Auf diefe Weife ließ ich ohngefahr vierzehn Tage, bis der Schleim Dick und gefarbt wurde, abwechfelnd die auflofenden Pulver und dazwischen das abführende Mittel nehs men. hierauf gab ich die Kantharidentinctur, Uns fangs zu einem halben Scrupel mit eben fo viel Laus banum in bren Ungen Bager bes Tage viermat; als lezeit von einem Thee: Lofelchen bis zu einem ober zween Eglofelvoll - ie nach bem verschiednen 211. ter und ber Leibesbeschaffenheit ber Rinder; und ftieg nach und nach bis zu einer halben Drachma ober zween Scrupel der Rantharidentinctur. War das Rind febr schwächlich oder hatte es ein merkliches Fieber, fo wurde ftatt Brunnenwager bas Chinabecoct mit bem Extract berfelben gegeben. Da ich mit biefem Mittel meift in dren oder vier Wochen bas gefahrs volle Stadium wo nicht ganglich hob, boch febr merklich milderte; die Kinder auch diefe Arznen, zumalen wenn fie mit Domerangen, ober einem ans bern Gaft verfest murde, gerne nahmen, fo machte ich in diefer Epidemie weder mit Afand, Bibergeil, Schierling zc. zc. Berfuche. Dicht nur die englischen Schriftsteller machten mich auf die Kantharidentins ctur aufmerkfam, fondern auch die vortrefliche Wirs tung berfelben, welche ich im Anfang bes 1785ften Jahrs an einer 56. iabrigen Frau beobachtete. Es hatte diefelbe gegen eine abnliche Gattung von convuls fivifchem huften, mit bem fie fich ganger eilf Monate Schleppte, außer ungahlig wiederholten Brecheund abs führenden Mitteln, Afand, Mofchus, Rampfer, Schierling, u. f. w. vergeblich genommen. hatte fie aber acht Tage nacheinander , Anfangs sehn,

zehn, nachher zwanzig bis vier und zwanzig Tropfen täglich von der Spanischensliegentinctur genommen, so wich ihr Husten zuschends und verlor sich endlich ganz. Weder sie noch eines der vielen Kinder, des nen ich dies Mittel täglich, oft und anhaltend reichte, hatten iemals Beschwerden im Uriniren.

Februar und Marz.

Im Monat Februar kamen zwar mit unter Rrantheiten vor, beren Urfprung in zu vieler Galle aufzusuchen, und benen mit Brechmitteln allein gu begegnen war; die meiften Kranken aber litten an rheumatischen und fatarrhalischen Beschwerben, welche Constitution im Mary noch allgemeiner und herrschender wurde, in welchem Monate ich nur einen Kranken hatte, ben dem sich die gallichte Krankheit fo unverandert als in den dren vorhergegangenen Jahren außerte , und den auch Brechweinstein mit Ipekakuanha schnell wieder heilte. - Gehr viele Rlagen horte man alfo uber hartnactige Suften, Reife, raube Balfe, Gliederreigen, Rreuge und Buft: schmerzen. Die und da erschienen auch langwierige hautausschlage, besonders im Gesicht, und Roth: laufe. Selbst die Kraße war haufiger als sie sonst ben uns ift. Der Schlagfluß befiel wenige, das Podagra aber viele und felbst folche, welche lange schon von dieser Krankheit verschont geblieben mas Reichhuften und Pocken festen noch immer den armen Rindern heftig gu. Die bedenklichen und Ges fahrdrohenden Fieber, die nicht nur in diefen Do: naten, fondern bas gange Jahr burch bie und ba pors

vorkamen, hatten viel Aehnliches mit dem bösartisgen Nervensieber der Englander, im Grund aber konnte man sie zum Geschlecht der Faulsieber*) recht nen. Denn wenn auch ein zu seiner Zeit gegebenes Brechmittel viele Galle ausleerte, so war dennoch wenige anhaltende Verminderung der bedenklichen Zufälle zu bemerken; ia oft nahmen große Entkräftung, betäubtes stilles Wesen, matte trübe Augen, Irrereden, schneller zitternder Puls u. s. w. so mächtig über Hand, daß man um die so sehr gesunkene Kräfte der Ratur zu unterstüßen, seine Zuslucht, nebst gelind abführenden Mitteln, zu Nerven stärkenden wirksamen Arzuegen als der Rinde, Arnika, der Schlangenwurzel, der Baldrianwurzel, den Wein

*) Nichts erschwert einem angehenden ausübenden Argt unfre Runft fo febr, ich rede aus eigner Erfahrung, als diefe gablreichen Abtheilungen und Benennungen Der Kieber, beren Namen meift nur von ein oder dem andern Somptom entlehnt werden. Ungleich mehr wurde unfre Wigenschaft und ber Unfanger gewinnen, wenn wir die Arankheiten nicht fo wohl nach ihren Mirfungen ober einzelen Somptomen, Die ben jebem Individuo oft fo verschieden erscheinen, als vielmehr nach ihren Urfachen benennten. Saft alle Fieber laf: fen fich unter folgende Abtheilungen , ihre Ruangen und Bermischungen abgerechnet, bringen : Inflam. matorifche Sieber, gallichte Sieber, Saulfieber, Schleimfieber, woju bie fatarrhalischen und rheus matischen ju gablen find, Musschlagfieber als Doten, Masern ze. und Wechselfieber. Das Zehrfieber ift wie das Nervenfieber allemal somptomatisch und letteres meift (wenigstens in unfrer Diesiabrigen Constitution) von Schleim und Faulfieber aufamms gefest.

mans

und Senfmolten, ia zum Wein felbft und Blafenpflas ftern ic. nehmen mufte. Man hatte oft viele 200: chen zu thun, bis man nur den Kranken von aller Gefahr frensprechen tonnte und bann hatte noch ber oft außerst ausgezehrte Wiedergenesende febr lange Zeit nothig, bis er nach und nach mahre Efluft und Krafte befam. Ruckfalle waren gar nicht uns gewöhnlich aber meift todtlich. Die Stellen, wo Die Blafenpflafter lagen, eiterten nach glucklich übers standner Krankheit oft viele Wochen noch, ob man fcon alle Dube und Fleiß fie zu beilen anwandte. Micht burch bas Erbrechen allein , wie ben der gals lichten Constitution, fondern durch oftere, von Runft ober Matur bewirkte Stuhlgange erfolgten gludliche Rrifen. Raft gar nie erleichterten mit unter auss brechende Schweiße die Krankheit, und eben fo fels ten geschaben beilfame Abfalle durch den Barn.

Im Monat Marg hatte ich zween Braumeis fter, die an einerlen Befchwerden litten, gu befors gen und beede farben in der Folge. Da die Rrants heiten folcher Manner, die ich auch ehedem schon einigemal zu behandeln hatte, immer viele und auf: fallende Alehnlichkeit miteinander haben, fo ift, dent ich, die Urfache berfelben in ihrem Gewerbe felbft und in der Lebensart und den Diatsfehlern gu fus chen, die bei demfelben begangen werden. Deift widmen fich ftarte, robufte Junglinge in der Blubte ihrer Jahre Diefem Geschafte, bas Rrafte und Ges fundheit im vollem Maag erfordert. Bon Michaes lis nur allein bis Ende Aprils wird ben uns und in Bayern Bier für das gange Jahr gebrauet und in 5 5

mancher Pfanne, diefe Bintermonate über wochente lich wohr dren bis funf und fechsmal gefotten teder Gud giebt 36. bis 40. Ennier Bier. In Diefer ranben und veranderlichen Jahreswitterung muß ber Braufnecht den Tag über Sol; fpalten, das Brangefchirr reinigen , jum Sieden vorbereis ten, Gerfte und Dal; tragen, bas iunge Bier in Die naben Reller bringen u. f. w. Die Rachte, in welchen nur allein Bier gefotten wird , bringt er gros ftentheils fchlaflos ben dem erhigten Regel, ben dams pfenden Maischbottigen und in duftenden Malgtens nen gu. Alle Diefe fchwere Arbeiten verrichtet er leicht gekleidet und mit blofen Fugen in Pantoffeln. Der Jugend und harten Arbeit gemäß egen biefe Leute ftark und trinken des guten Biers nicht wes nig - acht Bouteillen, oft noch mehr in 24. Stuns ben - baben egen fie faure, gefalzene und gunt Durft reizende Speifen , Ras u. f. w. Go lange fie iung find und fleißig arbeiten , bleiben fie meift ges fund, werben fie aber alt, oder felbft herren , mo fie bann minder arbeiten , ober nur nachfeben, und fchranten fie das lender! nun gur Gewohnheit gewordene unordentliche Egen und Trinken nicht gleich ein , fo entstehen schnell Berftopfungen ber Eingeweide, befonders der Leber, ihre Fage fcmels Ien zu erft an, oder fie bekommen bogartige Gefchwure an denfelben; ihr außerliches Aussehen wird gelb und aufgedunfen; die Egluft verliert fich , furger Athem ben der geringften Bewegung, beschwerliches huften mit gabem Muswurf, fchlaflose Rachte, fins den fich ein und fie fterben langfam entweder Luns genschwindsuchtig ober an der Wagersucht, als Folge

Folge der verstopften Eingeweide; einige wenige auch am Schlagfluß.

April.

Merkwurdig find die Rolifen, (ben einigen 2Bes nigen auch mahre Cholera) welche, fast mochte ich fagen, epidemisch zwischen den 9 bis 15 diefes Monats die gesundeften Leute fchnell und unvermus thet befielen. Ich zählte in diefen wenigen Tagen fieben Kranke, welche einerlen Bufalle erlitten. Ben' ben meiften erfolgte bren bis viermaliges Erbres chen, und häufige Stuhlgange; Diefe hatten bie Kolikschmerzen im geringern Grade, als wo ber Leib verstopft war. — Ich felbst, der nie an Ros lifen litt, murbe ben 10. Diefes eine halbe Stunde por Mitternacht, nachdem ich mich gefund zu Bette gelegt und mir nicht die geringste Gunde in Rucks ficht der nicht naturlichen Dinge vorzuwerfen hatte, schnell und unerwartet mit etwas Schmers gen im Unterleib, Uebelfeiten zc. mitten aus bent beften Schlaf erwett und mit vielem Burgen und wiederholten Erbrechen befallen, woben nur etwas Schleim und der nachgetrunkene Thee mit fehr wes niger Galle abgieng. hierauf erfolgten einige Ausleerungen burch ben Stuhl und gegen bren Uhr fruh war die gange Krankheit vorüber. Den nams lichen Morgen nahm ich noch ein gelindes abfühs rendes Mittel, schlief die folgende Macht recht gut und verrichtete den 12 fruh wieder meine Rrantens besuche, wiewohl mit etwas merklicher Entfraftung -Ben einigen mabrte diefe Krantheit etwas langer, ben

ben andern gieng sie eben fo geschwind vorben, wie ben mir; wenige wurden nach einigen Tagen wieder rudfallig. - Auffer bem hatten wir in diesem Monat gleichfalls Salsweh, Ratarrhe und besonders viele rheumatische Zufalle, als die bef: tigften Schmerzen im Geficht, in den Urmen, Schens Keln, Suften u. f. m. zu behandeln, gegen welche gelind auflosende und abführende Mittel, befonders Das Gnajathar; und zuweilen bas Einreiben ber Cirillischen Galbe mit großem Bortheil gebraucht wurde. - Die Pocken waren feltner, ber Reich: huften aber mutete gleich ftart fort. In diefem Monat hatte ich das traurige Geschaft täglich nicht weniger als neun Lungenschwindsuchtige zu besus chen, die in der Folge alle nach und nach ftarben, wie folches aus der Todtenlifte erhellet. 3men das von waren in vorher gegangenen Jahren Blutfpeier, ben den übrigen fpann fich die Krankheit im Uns terleib an. Gie hatten meift eine fchleimichte weiffe Bunge, verlorne Egluft, einen ftarten Suften, def fen Reig in und oft unter ber Berggrube entstand und der Rachtszeit befonders heftig und peinigend war. Der maßige sparfame Auswurf bestand ans fange in einem weiffen, gaben, geruchlofen Schleim; nach und nach aber wurde folder gelb, endlich grun und roch faul. Der Reig gum Suften war nun nicht mehr im Unterleib, fondern in der Bruft und in ben Luftrohren, bas Fieber mar ftart, bie Remiffionen in Frubstunden furg; fchlaflose und mit entfraftenden Schweißen verbundene Rachte vers urfachten die aufferfte Abmagerung; allmählig gus nehmende Geschwulft der untern Extremitaten, Durche falle,

falle, Frrereden, feltner und endlich ganglich aufborender Auswurf fundigten die volle Diederlage ber Maturtrafte an. Der Gang Diefer Krantheit war wie gewohnlich langfam und mahrte oft bren, funf und fieben Monate, auch zuweilen noch lans ger. Doch ftarben ein paar meiner Patienten schnell an der eilenden Lungensucht. Ein 45 iabriger Frifeur, ber ehedem ichon das Blutfpucken gehabt hatte, flagte nur vierzehn Tage vor feinent Tod alle iene Befchwerden, die biefer Krantheit eigen find, das Fieber war noch fehr maßig, ber huften erträglich und der Auswurf meift weiß, die Rachtschweiße felten, die Kräfte noch ziemlich, so daß er dren Tage vor feinem Ende wiewohl muh: felig athmend, frifiren gieng. Mit einemmal bes fielen ibn, nachdem er Tags vorher mit fast zu gros fem Appetit gegegen hatte, gegen Abend die große ten Mattigkeiten mit beschwerlichstem Athembolen, er warf einigemal Blut aus, ber Pulsschlag wurs be immer schwächer und bald barauf war er eine Leiche. Es wurde mir nicht gestattet feinen Rors per zu ofnen. - Kaft an den namlichen Bufallen verlor ich eine 36 iabrige fonft diche Frau in der vierten Woche von ihrem Uebelbefinden an gereche net. Sie hatte ehebem feltnes und unbedeutendes Blutfpeien und beklagte fich ist uber große Mats tigkeiten, die fie im Bett zu bleiben nothigten, bes schwerlichen Suften mit eiterrichtem Auswurf, verlorne Efluft und entfraftende Rachtschweiße. Das Fieber war fehr maßig. Ich gab ihr wie dem erft erwähnten Rranten wiederholt ein gelindes Brech: mittel aus der Ipekakuanha, und nachher das ise lans

landische Moos. Gie fühlte fich auf den Gebrauch Diefer Mittel merklich beffer, bekam aber unvermus thet Blutfpenen und befonders gieng viel Blut mit aufferst ffinkendem Stuhl ab und turg barauf vers fchied fie gang abgezehrt. Daß in diefen beeden Fallen, vorzüglich in legterem, nebft ben Lungen, auch die abdominal Eingeweide fehlerhaft gemefen fenn mogen, ift mobl nicht zu zweifeln. - Ben den Meiften der diesiahrigen Lungenschwindfuchtis gen fieng die Krankheit, wie schon gefagt, im Uns terleib an. - Ein 45iabriger Rutscher hatte nie vorher Blutfpenen, fondern flagte über ganglichen Mangel bes Appetits, bittern Mund, Reig gum Suften in der Berggrube ic. 2118 er auflofende, gelinde Brech : und abführende Mittel nahm, die viele Galle und Schleim megfchaften, gieng es auf einige Zeit wieder gut. Rach Berlauf einiger Wos chen aber befielen ihn die namlichen Beschwerden und zugleich ein unausstehlich ftinkenbes Aufftogen, bas ihm und den Umftehenden unerträglich mar. Die Brechmittel aus der Ruhrwurgel führten abers mal viele Galle ab, huften und Auswurf aber mabrten fort, doch war der Gestant nicht mehr fo beftig. Der Patient murbe nun bes Debicinirens überdrußig, lernte aber, wie wohl zu fpat, einfes ben, daß ohne Argneymittel feine Umftande fich mit iedem Tag verschlimmerten. Er wurde baber in bas katholische Krankenhaus aufgenommen. Das Rieber war nun gegen Abend allezeit heftiger, ber Suften qualend, er warf vielen gelbgrunen ftintens ben Eiter aus; nach dren Wochen aber bekam er unvermuthet Blutfpenen und dies hielt bren Tage

hat

an, wahrend welchen er gewiß feche Pfund, theils hellrothes, theils fcmar; geronnenes Blut aushus ftete und hierauf verschied er fanft ben fast volliger Geiftesgegenwart und in der fiebenzehnten Woche von seiner ersten Unpäglichkeit an gerechnet. Ben Eroffnnng feines Leichnams, ber- ben weitem nicht fo, wie gewöhnlich ben Lungenschwindsuchtigen abgezehrt mar (benn er hatte bas Stadium ber Rachte schweiße und Durchfälle nicht erlebt) fand ich die Eingeweibe des Unterleibs gang naturlich beschafs fen; die Lungenflugel aber waren mit dem Ribbens fell verwachsen, ber rechte mehr als der linke; auch fab der erfte dem aufferlichen Unfeben nach gang widernaturlich und dunkelroth aus und enthielt nach tiefen Ginschnitten gange Stucke geronnen Blut. Die Substanz des linken Lungenflügels war naturlich beschaffen. Merkwurdig aber ift es, bag in den Lungen nicht die geringfte Spur von ienem gelbs grunen ftinkenden Giter, der ben allen langfant fterbenden Lungenschwindsuchtigen gefunden wirb, und von dem der Rranke dren Wochen lang tage lich einen Chotoladebecher wenigstens bis dren Tas ge vor feinem Ende auswarf, zu entbecken mar.

In eben diesem Jahr verlohr ich ein 36 iahris
ges verhenrathetes Frauenzimmer und einen 27 Jah;
re alten Cavalier an eben dieser Sucht; ben bens
den meldete sich die Krankheit viele Wochen vorher
gleichfalls im Unterleib zu erst an, sie hatten nams
lich verlorne Eklust, bittern Mund zc. und ben beis
den wurde auf diesen Wink nicht eher geachtet, als
bis das Uebel sich ganz nach den Lungen gezogen

hatte, und bem heftigen Behrfieber, Rachtschweißen zc. nicht mehr zu fteuern mar. Bende hatten befonbers heftige Schmerzen in den Fugen und gang eis gene Gattungen von Phantafien. Das Frauengims mer ergablte mir einft, daß ihr lebhaft getraumet habe, fie hatte ihre Fuge, (die nun aufferft abges magert, aber nicht geschwollen waren) nach Muns chen geschickt und andre gefunde bafur erhalten. Die Umftehenden verficherten mich, bag bie Rrante mit ofnen Augen die gange Racht über mit ihren Rugen zu thun gehabt und von Abnehmen und Uns fegen, Ein : und Auspacken berfelben wirklich gefpros chen habe, deffen fie fich machend aber, des blogen Traumes ausgenommen, nicht mehr erinnern tonns te. - Den namlichen Morgen ergablte mir ber Cavalier in allem Ernft und als die großte Renigs teit, daß er nun ein paar neue und gute Fuge, mit benen er bald auszugehen gedenke, erhalten habe, fein dritter Fuß aber fen noch fcwach. Diefer konnte in den legten Wochen Traume von dem mas er wirklich den Tag über gefehen und gehort hatte, nicht mehr unterscheiden und amufirte baber ofter Die Umftebenden in dem er die ungereimteften Traus me als volle Wahrheit und umgekehrt wirkliche Bes gebenheiten als Eraume ergablte. Er ftarb ben langfamen Tod ber Lungenschwindfüchtigen, aufferft abgezehrt und mit febr gefchwollnen unteren Extres mitaten im funften Monat vom Unfang ber Rrants beit an gerechnet, schmeichelte fich fast bis an fein Ende mit der fugen hofnnng, daß feine Rrantheit nur eine Gicht fen, die feiner Familie eigen mare, und der huften mit eiterichtem Auswurf nichts gie

fas

fagen habe. — Mit dem Frauenzimmer gieng es etwas schneller, sie starb schon im dritten Monat der Krankheit. Die lezten dren Nächte redete sie beständig mit ofnen Augen irre, wuste auch am Morgen nichts von allem, was sie gesprochen, oder angeordnet hatte. Noch eine Stunde vor ihrem Tod bat sie ihr Stubenmädchen sehr ernstlich, sich doch die Nase abbeisen zu lassen. Und da die Wärterin ihr diese kleine Gesälligkeit nicht gestatztete, so legte sie ihr Kopskissen auf die andre Seite und entschlief.

Ein 43 iabriger Mann, ber feit geraumer Beit taglich Giter aufhustete, stinkenden Athem und ans bre untrugliche Zeichen verderbter Lungen hatte, auch meift alle Krubiahre an diefer Krantheit zu fterben bedroht murbe, bekam in biefem Monat heftiges Fieber, vermehrten eiterichten Auswurf, Rachts schweiße, Durchfalle u. f. w. Er hielt fich an feine gewöhnlichen Mittel, und da diefe nicht halfen, ließ er mich rufen. Ich erstaunte über feinen aufferst abgemagerten Rorper, über die große Geschwulft der Ruge, versicherte feine Chefrau, bag er diefen Uns fall nicht überstehen werde, und gab ihm, um den qualenden Suften und Durft nur in etwas zu minbern, eine Gelatine aus islandischem Moos mit Metonienfaft und etwas Bitriolfaure verfegt. ich ibn einige Tage darauf wieder fab, betheuerte er mir mit hippotratischem Geficht, talten Sanden und fterbender Stimme, daß fein fo geschickter, schnell heilender Argt in der Welt fen, als ich; denn er befande sich wieder fehr wohl, huste nicht mebr

mehr und wolle bald aufsteigen und ausgehen. Ich war natürlich ganz schamroth über diese unverdiens ten Lobeserhebungen, bat die Umstehenden, sogleich nach seinem Beichtvater zu schicken und kündigte ihnen das nahe Ende an, das eine kleine Stunde darauf erfolgte.

Bon einem vornehmen Lungenschwindsüchtigen erzählte mir erst neulich der Herr G. R. v. Brener, daß er ihn mit vieler Mühe bereden konnte, seine zeitlichen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, weil er nicht glauben wollte, dem Grab so nahe zu senn. Er gab endlich nach, suhr aber den nämelichen Tag spazieren, und als Abends mein verzehrungswürdigster Freund ihn besuchen wollte, hieß es, er sen ausgesahren. Bald darauf kam er nach Hause, stieg ziemlich kräftig die Treppe hinauf und sagte: früh mit allem Heiligen versehen werden und Nachmittag spazieren sahren, da kann man ia doch wohl der Gesahr noch nicht so nahe senn, nicht wahr? — Eine kleine Stunde darauf war er eine Leiche.

Ein Maior, der an der nämlichen Krankheit schon lange litt, und des Zuhausebleibens überdrüßsig wurde, ließ sich ankleiden, und sein Pferd satzteln, um spazieren zu reiten, weil er den Sis der Krankheit nicht in den Lungen, sondern allein im Magen aufsuchte. Ehe er aber noch die Treppe hinab kam, besiel ihn ein Bluthusten und er starb gestiselt und gespornt.

So verschieden ist der Tod der Lungenschwinds süchtigen.

Da diese Krankheit ben und in diesem Jahr baufiger als gewöhnlich vortam, fo hatte ich Geles genheit, die bekannten Mittel dagegen zu versuchen, aber leider! teinen meiner Rranten bamit gu beis len. Mur da war ich gludlich, wo die Siechens ben fich gleich um Gulfe umfaben, das Fieber mas fig war und die Krankheit fich noch nicht gang auf die Lungen gelagert hatte. Go erinnere ich mich eis nes 22 iabrigen Dadochens, bas gang fo gebildet ift, wie man Leute, die zur Lungenschwindsucht nas turliche Unlage haben, zu schildern pflegt, hager, langhalsicht, schmalbruftig zc. und das zu Anfang diefes Monats mit huften, schlaflosen Rachten, Morgenschweißen, verlorner Egluft, ausgebliebener Reinigung u. f. w. befallen wurde. Ich reichte ibr fogleich die Spekakuanha in fleinen Gaben, um nur zwen oder drenmaliges Erbrechen zu bewirken und in den Zwischenzeiten das islandische Moos, ben Baldrian mit der Dungen und andern Conferven zc. Rach feche Bochen fab ich diese Person an Kraf: ten und Leibesftarte zu nehmen, alle gefahrdrobens de Zufalle verschwinden und bis ist wenigstens ges nießt fie einer guten Gefundheit - Fast auf die namliche Beife rettete ich auch zwo Frauen, deren eine im zwenten, die andre aber im fiebenden Dos nat schwanger war. Gie hatten merkliches Fieber, beschwerlichen Suften mit eiterichtem Auswurf, ers mattende Rachtschweiße und fielen sehr vom Fleisch. Ich reichte ihnen, da der Reiz zum huften gleich: falls 7 2

falls aus dem Unterleib fam, die namlichen Arge Der legtern aber gab ich, weil fie fo fchwer brach, feltner brech : fondern mehr abführende Mits tel, und bende wurden glucklich noch vor ihrer Miederkunft von diefen bedenklichen Bufallen bes frenet, nahmen an Leibesftarte wieder ju und find mit gefunden Rindern entbunden worden. - Eine dritte 28 iabrige Frau aber von fchwacher Leibes: constitution, welche im vorhergegangenen Berbft ein hartnactiges Tertianfieber überftand, woben fie febr vom Kleisch fam, Rachtschweiße hatte u. f. w. wur: be in diesem Monat mit huften und bem Schleiche fieber befallen, that fich aber darum nicht zeitig um Gulfe um, weil fie alle Urgnenmittel verabscheus te. Da fie endlich fo abgekraftet mar, daß fie gu Bette bleiben mußte, und ich, ohne ihr Borwiffen, fie zu befuchen gebeten wurde, fo betheuerte fie mir ben der erften Biffte, "lieber gu fterben als viel einzunehmen." Da fie zugleich im funften Monat schwanger war, fo stellte ich ihr die große Gefahr por, der fie fich und ihre Leibesfrucht aussete, wenn fie nicht gehorchen wurde. Gie blieb aber ihrem Borfat ziemlich treu; auffer einer wiederholt ges gebenen Dofe ber Ruhrwurgel mit ihrem gewohns lichen Theeaufguß, den fie fur unverfalfcht trank und der ihr Erbrechen mit merklicher Erleichterung machte, pflegte fie die ubrigen Mittel fatt gu nehe men, wegzuschutten und glaubte badurch mich am feinsten zu tauschen, wenn fie mir die leeren Urge nengefage vorzeigte. Sie betrog fich felbft aber am meiften; benn im fiebenden Monat ihrer Schwans gerschaft ftarb fie lungenschwindfüchtig und hatte

pier

vier Wochen vor ihrem Ende nicht das geringste Ges
fühl mehr von ihrem Kind.

Die vorzüglichsten Mittel, welche ich dies Jahr gegen diefe vermuftende Rrantheit reichte, waren ein alle zween ober bren Tage gegebenes Brech: mittel, befonders die Tpekakuanha in der Babe, daß sie zwen bis drenmal Brechen machte; in den Zwischenzeiten gab ich islandisches Moos, die Baldrianwurgel, die bittere Polygala, das arabische Gummi, und zuweilen mit unter nicht higende Dagens mittel, als die Rinde, die Pfeffermunge 2c. mit ets was Gennenblatter ober Rhabarber verfegt, um täglich einigemal offnen Leib zu erhalten. Wo aber einmal Anoten in den Lungen fich erzeugt hatten und in Entzundung und Bereiterung übergegangen waren, das Fieber merklich mar, zc. da schadete der Gebrauch der Rinde offenbar. Diefe Beilmethode half nur da, wo ber Rrantheit gleich im Unfang begegnet wurde; war aber, wie fchon gefagt, diefe erste Periode vernachläßigt worden, (und meist wur: de auf fie nicht geachtet, weil man die Rrantheit für einen bald vorübergebenden Ratarrh oder Das genhuften hielt) fo waren nicht nur diefe Arznenen unwirksam; sondern es wurden auch frische Rraus terfafte, Erdbbeeren, Gurtenfaft, Buttermilch, Gels terwaffer mit Ziegenmilch, das mafferichte Mpr: rhenextract, felbst einmal das Untibektikum Poteri in einem befperaten Fall, und viele andre Mittel, das Bergpechol ausgenommen, das ich nie zu reis chen wagte, vergeblich gebraucht. Um nur etwas gu thun, mufte fich der Argt, der die Dhumacht feis ner

ner Runft in diefer einmal fo weit gekommenen Krantheit tennt, mit der elenden symptomatischen Cur allein abgeben; bier ben ungeftumen Suften und die schlaflosen Rachte lindern, dort die Schweiße und Durchfalle maßigen und fo taglich die alten Rlagen in vermindertem oder vermehrtem Grad ans boren und feine Kranken auf Gulfe vergeblich bars ren feben, bis endlich der oft fo jogernde Tod den Rranken und Argt aus aller Berlegenheit fegte -Gegen den peinigenden Suften und Durft gab ich mit gutem Erfolg meinen Rranten eine Gattung Gelatina vom eingekochtem islandifchen Doos mit Mekonienfaft oder mit arabifchem Gummifchleim, zuweilen auch mit Bitriolfaure verfegt. -- Dpiate fchienen immer bas Ende ber Rrantheit zu befchleus nigen. Und wenn es mahr ift, was Reid *) mit bochfter Wahrscheinlichkeit behauptet, daß namlich bas Schleichfieber, die Rachtschweiße und Durch: falle von dem im Rorper guruckbleibenden Phlogis fton berrubren, weil folches durch die mit Eiterfnos ten angefüllte Lungen nun nicht mehr ausgehaucht werden tonne, fo ift es begreiflich, daß ein fo viele Reuertheilchen in fich schliegendes Mittel, als der Mohnfaft ift, unmöglich gedeihen tonne.

Man.

Ungemein häufig kamen in den Monaten April und May die durch das ganze Jahr durch herrschende halbs

*) An Essay on the Nature and cure, of the Phthisis Pulmonalis. By Thomas Reid London 1785-Chap. v. p. 102.

halbseitige Kopf: Ohren: und Zahnschmerzen vor; lege tere hinterließen gemeiniglich Zahnfleischgeschwure. Wer schadhafte, hoble Bahne hatte, leitete Diefe rheumatische Beschwerden davon ber , und ließ sich folche, wiewohl ohne erfolgende Linderung beraus gieben. Gelbst Rinder blieben nicht verschont. Ben einigen floß aus den Ohren oder Rafenlochern eine stinkende eiterichte Materie ofters mit Blut vers mifcht, und dann lieg das Fieber und ber heftige Schmerz nach. -- Gehr viele litten an herumzies hendem Gliederreißen, einige mit, andre ohne merts lichem Fieber. - Lungenschwindsuchtige ftarben in diefem Monat haufig ; auch hatte ich am Schlug des Mans eine 35. iahrige Frau, die schon einige Rinber getragen hatte, und fie immer felbft ftillte, an den Wochnerinnenfieber zu behandeln, die ich aber nicht retten konnte. Ich wurde den achten Tag nach der Entbindung, welche ganz naturlich und leicht, wie man mir fagte, vor fich gegangen mar, ju ibr gerufen; fie flagte uber Schmerz im Unterleib und heftiges und bis jum Ersticken beschwerliches Uth. men, welche Beschwerden fie mit einemmal nach eis nem furg vorber gegangenen Merger befallen hatten. Da die Junge in etwas unrein und gelblicht mar, fo reichte ich ihr fogleich die Riverische Mixtur mit ets was Spiegglaswein verfest und den folgenden Mors gen einige Grane ber Spekakuanha, worauf fie mit fichtbarer Erleichterung viele Galle wegbrach, leiche ter athmete, und die darauf folgende Racht erwunscht guruck legte. Allein am dritten Tag ber Rrantheit verschlimmerten sich schnell alle Zufalle; der Leib trat merklich auf und war meteorisitt, die Stuble rochen 3 4

rochen aashaft, der Puls gieng matt, gitternd und fchnell; die Krante außerte das feinfte Gefühl und Gehor bis an ihr Ende, fprach aber nichts mehr, fondern phantafirte mit offnen und etwas ftarren 2lus gen, woben fie alle Umftebende zu fennen fchien, und anlächelte. - Go schlummerte fie ben vierten Tag der Krantheit ein. Da mir die Erofnung der Leiche nicht gestattet murde, fo erfete ich folches mit einem andern abnlichen Fall den ich vor funf Jahren beob. achtet habe. Ich wurde namlich als zwenter Argt bei einer vier Tage vorher glucklich entbundenen Wochnerin, welche gleichfalls fcon mehrere Rinder getragen, nie aber felbft gestillt hatte, ju Rath ges zogen. Gie flagte uber bestandige Reigungen gum Erbrechen , schmerzhaften angespannten Unterleib und hatte fchnellen fehr fieberhaften Buls. gewöhnlicher Sauptarzt erklarte Diefe Bufalle aus unterdruckter Wochenreinigung und befurchtete eine nabe Entzundung ber Mutter. Da aber ben Uns tersuchung und ziemlich nachdrucklicher Berührung des Muttermunds fie feine Schmergen zu erkennen gab, auch die benm Touchiren gebrauchten Finger mit Blut befleckt maren, fo murde diefe Krantheit für das Wochnerinnen Fieber gehalten und dem ges maß behandelt. Der Unterleib verlor bald alle Ems pfindung, und trat febr auf; die Patientin phantas firte zuweilen mit offnen Augen und ftarb am ache ten Tag nach der Entbindung. Der schwarz blaue Unterleib schwoll die Racht durch fo zusehends auf, daß er fruh um funf Uhr, wo die Leichenofnung vor fich gieng, aufzuplagen drohte. Bahrend ber Ges ction flogen mehr als gehn Pfund grunes ftintendes

Wager

Waßer aus dem Mund der Leiche. Das Neh war ben diesem dicken und schwammichten Körper fast ganz verzehrt, alle Gedarme widernatürlich ausgestrieben, aneinander gekleistert, dunkelblau und sphäseilös, hie und da klebte eiterichte dichte Materie an denselben an, welche einige für den wahren Milchessaft halten, der Engländer Julme aber für das aufgelöste Netz achtet, und daher den Sitz dieser Krankheit in demselben aufsucht. Der Uterus fand sich tief unten im Becken, schon sehr zusammen geszogen — ohngesehr einer kleinen Melone groß — und sowohl dem äußerlichen Ansehen nach, als auch ben Erössnung innerlich ganz natürlich und gesund beschaffen.

In feinem Jahr fah ich bas Wochnerinnenfieber fo oft , als in diefem. Denn außer dem oben ers wahnten Kall hatte ich noch dren arme Wochnerins nen mit andern Merzten gemeinschaftlich zu beforgen, wir retteten aber - jur Steuer ber Bahrheit mes nigstens fen es gefagt - nicht Gine. Go traurig fich enden fab ich diese Krantheit gulegt im Monat October. b. J. bei einem etlich vierzig Jahre alten schwächlichen Weibe, das schon gehn Rinder getras gen und alle gestillt hatte. Ihre legte Entbindung gieng zwar naturlich iedoch etwas langfam von ftats Den dritten Tag nach berfelben verlies fie das Bett vollkommen und verrichtete alle ihre fons stigen beschwerlichen Sausgeschäfte; fie murde aber schon am Abend diefes Tages mit großen Leibschmers gen, ftarkem Fieber, heftigem Durft und Reiguns gen zum Erbrechen befallen. Ihre Junge mar weiß und

und schleimicht, ber Unterleib angespannt und benm Befühlen außerst empfindlich. Ich gab ihr fogleich eine Auflofung von Manna und einem Mittelfalz in Chamillenwaßer, ber ich einige Quentchen Spiege glaswein benmischte, ließ ihr Rinftire fegen, und Stucke von Flanell, die in einem lauwarmen Abfind erweichender Rranter getaucht maren wiederholt über den Leib legen. Gie brach hierauf febr viele Galle weg, der Schmer; im Unterleib nahm merklich ab, und die Fortsegung der Rinftire bewirkten auch viele gallichte febr ftinkende Ctublgange, welche mittelft einiger Glafer Bittermaßer immer unterhalten murs Die Lochien flogen magig und fie hatte immer Milch in den Bruften. Ich glaubte nun meine Krante außer aller Gefahr und auf dem fichern Weg ber Wiedergenefung, als nach einigen Tagen der Leib abermal schmerzhaft und aufgetrieben wurde , frens williges und nicht erleichterndes Brechen erfolgte und die Kranke eine Stunde vor ihrem Tod, der am hellen Mittag und ehe Argneymittel gereicht wers ben fonnten, eintrat, uber Finfternis im Zimmer flagte. *) Auch fab ich, mit einem andern Arzte dies fes Rieber im Februar diefes Jahrs ichon vor der Ent:

*) Dieses lezte Symptom scheint dem in Gangran übers gehenden Darmkanal vorzüglich eigen zu seyn. Denn ein 24. iahriger Mann vom Lande, der die heftigsten Leibschmerzen, mit unaushörlichem Erbrechen hatte, das sich mit dem Miserere endigte und von einem bis auf den lezten Augenblick verheimlichten Leibschaden herrührste, den sein Landaskulap auch nicht entdeckte — fragte zwo Stunden vor seinem Tod und am hellen Tag, ob es schon Nacht ware, und verlangte Lichter, weil ihm alles sinster zu seyn schien.

Entbindung entstehen; die Geburt gieng den gebns ten Tag ber Krantheit naturlich vor fich, bas Rind war todt, die Bochnerin aber ftarb ohnerachtet vies ler angewandten und vorzüglich gelind wirkenden Brechmittel gehn Tage nach der Entbindung und hatte alle iene bedenkliche Bufalle in den legten Tagen, als einen meteorifirten Leib, febr feines Gebor, Phans tafiren mit offnen Augen u. f. w. deren wir oben schon erwähnt haben. — Bu einer vierten wurde ich erft gerufen, als fie fchon fprach : und finnlos in ben legten Bugen lag, und nichts mehr schlucken konnte. Diese verschied am nachsten Morgen, gab aber noch Empfindung benm Berühren bes Unterleibs und hauptfachlich des linken febr geschwollenen Schens tels zu ertennen. - Diefe vier Beiber ftarben zwar an einerlen Rrantheit , traten aber febr vers Schieden von der legten Lebensfcene ab. Die Gine schlummerte lacheind und beiter wiewohl immer ftill phantafirend ein; die Undre gab fast bis an ihr En: be Sinnen und Beiftes Gegenwart zu erfennen; die Dritte entschlief ploglich und die Bierte ftarb fopo: ros. - Obgleich ich vollkommen der Meinung meines Freundes Wittwer und andrer neuerer Mergte *) bin, " daß biefes Fieber nie das namliche so fen,

*) Der große Klinifer Stoll sagt von diesem Fieber: male semper uteri, eius appendicum, intestinorum, mesenterii, omenti, peritonei, inslammationem statui pro huius sebris caussa; neque ubique aut saburralem aut putridam esse: atque universim non esse specificam sebrim puerperarum, sed eandem cum regnante, modificatam solum a puerperio. Aphorism. de cognosc. et cur. sebribus. p. 287.

, fen , und bag es immer fich nach Berfchiedenheit , der herrschenden Conftitution und der individuels , len lage der Wochnerinnen verschieden bilden wers , de und verschieden behandelt werden muge, " fo daß es nach Berschiedenheit der gelegentlichen Urfas chen , nach Berschiedenheit ber Temperamente , des Alters, der Diatfehler, Leidenschaften zc. zcc. mehr oder weniger entzundlich, gallicht, faulicht, bosartig, mehr oder weniger vermischt fen; fo scheint bennoch Diefe Rrantheit wohl außerft felten inflammatorisch; allermeist aber gastrifch und ihr ursprunglicher Git im Darmfanal, ber in ieber Schwangerschaft burch den anhaltenden Druck leibet, aufzusuchen zu fenn. *) Diefes Preffen verurfacht langeres Berweilen ber Ercremente in den Intestinen; Unbaufung lymphatis fcher verdickter Feuchtigkeiten, Schwach: ober viels mehr Betaubung der Rerven des Darmfanals, die dann erft wieder anfangen reigbar und empfindlich ju werden , wenn die Unreinigkeiten turgefciren. Auf diefe Beife liefe fich der ganze Gang der Kranks heit, die Symptome, die Beile und befonders die Vorbeugungsmittel und endlich das was in den Leis chenofnungen gefunden wird, ziemlich erklaren. Pras disponirende Urfache mare also ortliche Schwäche der Merven des Darmkanals; die gelegenheitliche aber Born, Merger, Diatfehler, herrschende gaftris fche

*) Daß dieser mechanische Druck anhaltend senn müße, um diese Schwäche im Darmkanal, und diese Kranksheit heit hervorzubringen, beweisen einigermaßen die Mißsfälle von 3. 4. und 5. Monaten, die nie, so Gefahrvoll sie auch zuweilen sind, dieses Fieber bewirken.

fche Krankheiten *) und alles was Fieber erzeugen und unterhalten fan. Bis hieher konnte ich ben als Ien meinen Kranken zwo Perioden unterscheiden: nämlich die Periode der Turgesceng und die der Saulnis ober Absterbung der Intestinalnerven. Jene verrathen ein bitterer unreiner Mund , Reis gungen jum Erbrechen, und ein maßig gespanns ter, fcmerghafter Unterleib tc. Sier helfen meift schleunig gegebene Brechmittel, wenn anders ber Arst gleich gerufen, und die Krankheit nicht für das blofe Milchfieber gehalten wird ; grangt aber diefe Periode zu nahe an die zwote, oder ift fie gar schon in folche übergegangen, ift endlich der Uns terleib meteorifirt, und benm Beruhren unempfinds lich, find die Weiber gegen ihre Rinder und Freunde falt und gleichgultig, ober fangen fie gar ichon an, mit unter irre zu reben , dann ift meift alle Bulfs leistung vergebens. Ich erinnere mich nie ben Krauen, die ich vor oder gleich nach ihrer Entbins dung als Urgt zu beforgen hatte, das Bochnerinens fieber gefeben zu haben; der Grund mag wohl bare in liegen , weil ich gewohnt bin ben Schwanger: schaften nicht so wohl auf Aderlagen, als vielmehr auf ofnen Leib zu feben, fleißig vor Schlafenles gen Beinftein ober Limonadenpulver nehmen zu lafs fen und gegen das Ende berfelben ein ober zwenmal gelind

^{*)} Unfre diesiährige schleimichts gallichte Constitustion scheint besonders geschickt zur Erzeugung dieser Krankheit gewesen zu senn. Denn außer meinen vier Weibern weis ich noch einige, welche von andern Merzten behandelt wurden und an dem Kindbetterins nensieber in diesem Jahr starben.

gelind abführende Mittel , befonders Bitterfal; ju reichen. Auf diese Beise wird nicht nur der Darms fanal der grobften Unreinigfeiten entledigt , fondern die Merven begelben werden burch biefe gelind erofs nende Mittel gereigt, angespornt und immer in einer gewißen Thatigfeit erhalten. Rach ber Entbindung febe ich wieder nicht sowohl auf den Flug der Los chien, als immer auf den Stuhlgang. Daber laffe ich gleich den erften oder zwenten Tag nach ber Diedertunft ein Rinftier fegen, und nun tommt es barauf an, ob die Mutter ihr Rind felbft ftillt ober Im erften Fall pflege ich dem Rind, außer dem gewöhnlichen abführenden Gaft meder Trank noch Speife zu reichen, fondern rathe baffelbe ofters an die Bruft gu legen : ber Mutter erlaube ich, mit unter eine Schaale dunne Kleischbrube zu nehmen, wenn fie anders dazu Belieben bat. Tritt die Milch ein und trinkt bas Rind tuchtig, fo erhalt bie Gaus gende auch nahrhaftere Roft , besonders gute Gup: pen, Saber ober Gerftenschleim, getochten Reis u. f. w. Berlagt fie nun auch bas Bett gang, welches meift ben achten oder neunten Tag nach der Entbins bung gefchieht (benn nach Berlauf ber erften bren oder vier Tage, fo bald namlich bas Milchfieber vorüber ift , febe ich febr gerne , wenn meine Entbuns denen eine oder zwo Stunden taglich außer bem Bett zubringen) fo fann fie, wenn fie mag, etwas Benis ges von weichgefochtem leicht zu verdauendem Fleisch genießen, und ein Glas Bier, befonders braunes Lezteres behagt auch bem Rind gut, bagu trinfen. denn es giebt fraftige Milch. Wenn eine Gelbfts ftillende alle zwey oder bren Tage feine Leibesofnung bat,

hat, fo rathe ich eine Rinftir. - Dieienigen Dut. ter aber, welche theils aus Weichlichkeit, theils aus physikalischen Urfachen (hiezu rechne ich auch schlechte Milch besonders ben Bornehmen) ihre Kinder nicht felbft fangen wollen oder tonnen, mugen ftrenge, wenigs ftens acht tägige Fasten halten ; ihr Getrant ift Wager, mit unter febr magre, verdunnte Fleifche fuppe, Chamillenthee; ben vierten Lag gefocht Dbft und Gemufe; nebft dem erhalten fie oftere Rinftire, und täglich eine oder zwo Gaben vom Doppelfalz, damit fie immer ofnen Leib haben. Ein paar Tage nach glucklich überstandenem Milchfieber, das ben Befolgung diefer Borfchrift allezeit unbedeutend und schnell vorübergehend ift, heiße ich fie gleichfalls bas Bett auf einige Stunden verlaffen , welches fie nun täglich langere Zeit entbehren mußen; und ift der achte oder neunte Tag nach der Entbindung vorüber, fo helfen die meiften meiner Wochnerinnen ihre Sauss geschäfte nach und nach wieder beforgen. Um diese Beit reiche ich benen, die es bedurfen ein Quentchen StablischePolnchrestpillen auf dren oder viermal. -Meugern fich aber ben Schwangern oder Wochnerinnen Deutliche und leicht zu erkennende Unzeigen überflußis ger ober turgescirender Galle, so gebe ich, ohne bie geringste Rudficht auf das wievielfte Monat ber Schwangerschaft, oder auf den Tag nach der Entbins dung zu nehmen, fogleich ein gelindes Brechmittel, und nie hatte ich noch Urfache, diese Methode zu bes Diefer einfachen und ungefunftelten Bes handlung hab ich es allein ju verbanten, bag meine Schwangern ihre Kinder meift glucklich austragen, und ihre Wochen Gefahrlos jurud legen. Siedurch beugte

beugte ich oft schon dem Kindbetterinnenfieber vor; wenigstens entstand dieses ben keiner von meinen 28. in diesem Jahr gehabten und gleich nach der Geburt berathenen Wöchnerinnen.

Einigemal fab ich auch iene Gefchwulft ber uns tern Gliedmaßen, die White u. a. als eine befondere Krantheit der Entbundenen beschreiben, und Die frangofische Schriftsteller für Mildversezuns gen halten. Der Jerthum der legteren ift um fo verzeiblicher, weil diefe Krantheit, wenigstens fo oft ich fie fah, nur Beiber befiel, die nicht felbft Eine berfelben bekam diefe aufferft fchmerge hafte, nicht rothe Geschulft neun Tage nach einer acht monatlichen Schwangerschaft, wo ich das todte Rind eines heftigen Blutfturges wegen, welcher von der am Muttermund halb noch festsigenden und balb icon abgesonderten Machgeburt entstand, megnehmen mußte. Das Fieber mar ftart, die Ges schwulft groß und am linken Schenkel. Gelind abs führende Mittelfalze, Kluftire und aufferlich warme Umfchlage in einen Abfud erweichender Krauter ges taucht, nebst dem Einreiben bes volatilischen Linis mente fchaften große Linderung und baldige Beilung.

Junius.

Noch machten die Lungenschwindsüchtigen den Aerzten viele und meist vergebliche Bemühungen. Ob ich schon in diesem und dem vorhergegangenen Monat fünf Patienten an dieser Krankheit verlor, so wurden deren Stellen leider! durch neue Can:

Didaten wieder erfest. Ueberdieg herrschte noch ims mer viel Ueberfluß an Schleim und Galle in unfern Rorpern. Die haufig vorkommenden rheumatischen Bufalle waren von der Beschaffenheit, daß schweiß: treibende Mittel am wenigsten; blos abführende wenig; bieienigen aber am meiften halfen, welche Brechen erregten, wenn fie auch nicht allezeit Galle weaschaften. Schon die Erschütterung ober ber Edel ben das Bredmittel verurfachte, mar ben Einigen von gedeihlicher Folge, fo daß alle Schmers gen nach bem eignen Ausbruck einiger Rranten wie weggestrichen ober weggeblasen maren; boch tamen diefelben ben ben Deiften unvermuthet und mit heftigkeit wieder. - Undre befiel gallichtes frenwilliges Erbrechen mit Durchfallen und Rolits fchmergen begleitet, befonders gegen bas Ende bies fes Monats, auch tamen Tertianfieber, die fogar Rinder nicht verschonten, mit unter vor. Reichhuften plagte die legtgenannten am heftigften ; Die Pocken feltner. In diesem Monat hatte ich wieder einige Rrante an ienem bosartigen galliche ten Faulfieber, das ich oben schon berührte, gu bes bandeln. Dieienigen, welchen nicht gleich im Unfang ein Brechmittel gereicht murde, ftarben meift, wie schon gesagt, an dieser Krankheit. - Auch fab ich im Anfang dieses Monats den von Werlhof und Bebrens unter dem Nahmen morbus haemorrhagicus maculosus *) beschriebenen Blutfluß, bec

^{*)} Werlhofii Opera medica Edit. Wichmann. 1775. p. 539. not. 65. et 615.

in diefen Jahren auch von andern Mergten *) bes obachtet murde, an einem zwolfiahrigen febr fchmache lichen Madchen, welches die Reinigung noch nicht hatte. Ich wurde den dritten Tag der Krankbeit ju ihr gerufen und die Mutter ergablte mir, daß die Patientin feit einigen Tagen fich über große Mattigfeiten beflagt habe ; hierauf mare ein Das fenbluten entstanden: sie habe zwar feit zwen Jah: ren allemal um diefe Zeit bergleichen gehabt, nie aber mit ber heftigkeit als diesmal, wo ihr bas Blut nun zwolf Stunden schon, ohne auszuseten, gur Rafe und jum Mund herausfturgte; feit zwen Tagen mare fie uber ben gangen Rorper, das Ges ficht ausgenommen, wo nur febr wenige Fleden gu feben waren, wie schwarzes Tuch geworden. - 3st da ich fie fah, mar fie vom Sals bis auf die Rufs foblen mit schwarzen nicht erhabenen Rlecken, wels che den Klobestichen am meisten glichen, nur daß diefe roth find, iene aber schwarz waren, fo febr bedeckt, daß nirgend zwo Linien breit weiffe naturliche Saut ju feben war. Die Kranke war durch den Bluts verluft fo aufferft entfraftet, daß fie nur über Mats tigfeit flagte und mit Mube einige Worte bervors ftammeln tonnte. Doch wurde fie nie ohnmachtig; ihr Puls war gitternd, flein und schwach. gab ihr eine fauerliche Mirtur, aus Beinftein zc. und jum Getrant Limonade, oder Baffer mit Beins effig und leichte tuble Fleischsuppe ; über den Kopf pros

^{*)} Acta Societatis Medicae Havniensis Vol. II. 1779. p. 140. cet.

Acta Regiae Societatis Medicae Havniensis Vol. I. p. 184. 1783.

bronete ich Umschlage an, in faltes Waffer, mit Gals peter und Beinegig verfest, getaucht; in die blus tenden Rafenlocher ließ ich Schwamm legen und empfahl Rube. Gie brachte auch diese Macht ziems lich gut ju. Alls fie aber am folgenden Morgen ben ihr lastigen Schwamm aus den Rasenlochern nahm, floß aufs neue von fruh 7 bis Abends um 9 Uhr hellrothes mafferichtes Blut aus der Rafe und dem Mund. Der Puls war nun nicht mehr zu fublen, die Extremitaten und der gange Rorper falt, und ich erwartete mit ben Umftebenden ben naben Tod. Inzwischen fuhr ich mit den kalten Umschlagen fort, ließ das Gesicht und die Bruft mit Baffer und Beinegig mafchen, reichte fleißig bunne Fleischbrube und Limonade. Die Rrante wurde, ohnerachtet ihres fehr betrachtlichen Blutvers luftes (benn felbst mit bem Stuhl gieng fcmarg : ges ronnenes Blut ab, mit bem harn aber nie) bens noch nicht ohnmachtig, sondern blieb immer ben Berftand. Der Blutfluß feste nun 36 Stunden aus, fam hernach wieder, aber nicht mehr fo hef: tig und anhaltend. Die schwarzblauen Flecken fiens gen den fechften Tag, vom Unfang der Rrantheit ges rechnet, an, immer hellrother und fleiner zu werden und nach und nach ohne Sautabschuppung gang zu vers schwinden. Der Blutfluß blieb aus, das Dadchen erholte fich allmählig, befam große Egluft, ruhigen erquickenden Schlaf, und befindet fich igt, als ich dieß schreibe, wieder vollkommen wohl, nur ift ihre Gesichtsfarbe bleich. — Merkwurdig ift es, daß das Rafenbluten schon zwen Jahre nacheinander im Monat Junius allemal fam, nie aber fo heftig ober

£ 2

mit ienen Blutfleden begleitet war, als biefmal, und daß diefer Blutausfluß fich allezeit durch große Mats tigfeiten einige Tage vorher, aber ohne merfliches Fies ber, als nahe ankundigte. - Ich wage nicht, die Ente ftebung biefer Fleden zu erflaren, oder zu entscheiden, ob fie in einer besondern Atonie und Schwäche ber Sautgefage und berfelben Rerven, oder in fcorbutifch aufgeloftem Blut aufzusuchen fen. Legteres ift um fo unmahrscheinlicher, weil der eigentliche Scorbut ben und eine gang unbefannte Rrantheit ift und nur allein in bem Gehirn einiger unfrer chirurgis fchen Medicaftern herrscht, die überall fcorbutifche Safte traumen und antiscorbutisch furiren. -Die groben Stahlianer, wenn es deren noch gas be, murben diefe Erscheinung der gutigen fur bas Bohl des Rorpers forgenden Geele gufchreiben, wels che ben wenigen Ueberreft des Bluts nach ber Saut hinfluchtet, damit die Samorrhagie nicht tobtlich, und der nur noch glimmende Lebensfunke burch dies fes in Sicherheit gebrachte Blut wieder angefacht und unterhalten werbe. - Eben diefe fchwarz blauen Flecken fah ich an den Sanden, Fugen und Schenkeln, wiewohl in weit geringerer Ungahl und gerftreut im Monat November b. J. ben einem 13 iabrigen Frauenzimmer vor dem Ausbruch der Po-Die Krantheit fieng fich mit Mattigfeit, gros fer Abgeschlagenheit ber Glieder, verlorner Egluft, Rreuß : und Lendenschmergen an. Die Eltern glaubs ten alfo, es rubre biefe Unpaglichkeit von ber Bemubung der Matur, die Reinigung gu before bern ber. Da die Patientin aber noch nicht ges blattert hatte, und Blatterfrante in dem namlis chen

then Hause waren, so vermuthete ich auch hier ders gleichen: rieth Klystire zu setzen und reinigte den Darmkanal mittelst gelind aussührender Mittel. Den dritten Tag der Krankheit konnte ich im Ges sicht noch nichts von der Eruption entdecken, hoste aber, da alle Zufälle (iene schwarzblauen Flecken auss genommen) so gelind waren, wenige und gutartige Pocken. Ich betrog mich aber in meiner Prognos se.*) Als ich am vierten Tag der Krankheit im

*) Jeh bin überhaupt fein Freund vom Prognosticis ren und wo ich eine Prognose stellen muß, so versebe ich fie mit einer wächsernen Mafe, ober verclaufus lire sie wohl. Denn mit nichts fann auch ber altefte, glucklichfte, tieffebenfte Kliniker fich fo febr fcha= ben, als mit einer Borausfage, welche nicht gutrift. Wie leicht kann ein nicht ausgespähtes, zu tief ver= fectt liegendes Uebel, ein Ungefahr ic. die richtigfte, auf oft wiederholte Erfahrung gegrundete Prognose perrucken, und alles schreit dann über den armen, gang unschuldigen Arst und felbft Collegen schreien gumeis Ien mit. Ich rathe daher meinen iungen Umtsbrus bern, welche das in cathedra omnes morbos fanamus noch so im frischen Andenken haben, auf das freundschaftlichste, ia ausserft behutsam und vorsiche tig mit dem Prognofticiren ju fenn, wenn fie anders in ihrer Wiffenschaft glücklich fortschreiten und nicht nachtheilig und schief beurtheilet werden wollen. Denn über eine einzelne fehlgeschlagene Prognose werden 99 vorher richtig jugetroffene vergeffen. - Dan fordert überhaupt von unster Kunft mehr, als ie menschliche Biffenschaft ju leiften vermag Der Arst foll nicht nur alle Rrankheiten beilen, fondern er foll fie auch Schnell und angenehm beilen konnen. Das Unmog= liche und Absurde dieser Forderung will der Aufges flartefte nicht einsehen, am wenigsten aber ber Rrans Ein Abvocat wird mit Recht gelobt, wenn er

Gesicht wieder keine, wohl aber an den Armen und Füßen hie und da eine einzelne Blatter neben ienen der Haut gleichen dunkelblauen Flecken, ohne Verminderung des Fieders und der Unruhe entdeckte, so wurde ich auf diesen irrigen Sang der Krankheit aufmerksam und ahndete ein trauriges Ende. Da am fünften Tag die wenigen Pocken sich nicht hos ben, die Mattigkeiten aber immer mehr zunahmen,

fo

einen ungegrundeten Proceg von der Sand weift und ihn gar nicht annimmt, indem er voraus fieht, ihn ju verlieren. Bon bem Argt aber wird verlangt, alle Rrankheiten und forperliche Unfalle, fie fenen auch noch fo miglich und besverat, auf sichern Erfolg ans gunehmen und ju beilen. Dag nicht alle Processe gewonnen werden fonnen, fieht auch der Blobfinnige ein; aber die Unmöglichkeit, alle Krankheiten zu beis Ien, will niemand jugestehen, und berienige, welcher es auch einfieht, tadelt dennoch ben einer unglücklis chen Cur wenigftens im Stillen die Beilmethobe bes Mrites durch das Urtheil, daß er das was er angewandt hat, nicht hatte anwenden und mas er nicht gebraucht hat, hatte brauchen follen. Undant ift nur ju oft unfer Lohn! Und mas verderben nicht pfuschernde Sande am Rrankenbette ober wenigftens gleich im Anfang ieder Krankheit. Da ift gewöhnlich ieder Rath millfommen und wird mit Begierde befolgt, er fen auch noch so schädlich und absurd, und komme von Leuten, welche von der Argneywissenschaft fo mes nig verfteben, als ich vom loblichen Schneiderhand: werf oder der Uhrmacherfunft. Die gange Belt mur-De Mitleiden mit meinem Verftand haben, wenn ich Diefe Leute lehren wollte, wie fie Rleider gufchneiden oder Uhren machen follen; oder wenn ich wohl gar vom Uhrmacher forderte mir funftig meine Rleider au machen und ben Schneidermeiffer nothigen wollte, meine Uhren ju repariren.

fo reichte ich ben Spiefglaswein mit Minderers: geift und Sollunderwaffer. Die Racht bom Funf: ten auf den Sechsten mar febr unruhig, die Rrante phantafirte mit unter, und flagte über Salsweh und Reigungen jum Erbrechen. Da auch ist die fparfam vertheilten Pocken fich noch nicht mehr fula Ien wollten, die schwarzblauen Flecken aber weder ab noch zunahmen, so reichte ich diesen Bormittag noch einen Gran Brechweinstein mit zwen Gran Rampfer in vier Dofen abgetheilt. 3wo Gaben machten einmal gallichtes mit vielem gaben Schleim vermischtes Brechen: der Sals murde hierauf leich: ter, auch verschwand der den Abend vorher sich figis rende Schmerz in der Berggrube, den fie die Racht burch gefühlt hatte : es erfolgte nach ein paar Stunden gelinder Schweiß, die Pocken hoben fich, zugleich aber brach auch der vorher kaum ficht: bare Friefel ober vielmehr petechienartige Aus: schlag befonders an der Stirn und auf der Bruft aus. Ich reichte ein febr faturirtes Decoct ber Minde mit Bitriolfaure; mit legtrer verfegte ich auch ihr Getrant und lies auf die Waben Genfts teig schlagen. Demohngeachtet aber intermittirte gegen Abend der finkende Duls zuweilen, die Rrans te phantafirte mit ofnen Augen, buftete mit unter Blut auf, warf fich beständig berum, schmagte uns aufhörlich, fab in ber Einbildung allerlen meift langst schon gehabte Bilder, befonders ihre vor fieben Jahren schon verstorbene Mutter, hielt endlich die fie pflegende Stiefmutter fur iene, ftellte Fragen über ihre lange Abmefenheit und über iene Welt an Diefelbe, bis fie endlich gegen Morgen in Bugen grif

griff und am siebenden Tag der Krankheit verschied. Als ich nach Berlauf vieler Stunden ihren todten Körper untersuchte, fand ich ihn, ob er schon in kalter Luft war, noch ganz warm; die einzelnen Poschen an den Händen und auf der Brust standen ers hoben und gut; die schwarzblauen Flecken waren gleichfalls noch eben so sichtbar, als einige Tage vorher, nur der petechienartige Ausschlag war mins der merklich zu sehen, als am Leben. — Die iuns gern Geschwister dieses Mädchens wurden gleich nach dem Tod desselben mit den natürlichen Pocken befallen, überstanden aber solche sehr leicht und ohne das geringste bedenkliche Symptom.

Julius.

Gegen das Ende bes vergangenen und im Uns fang diefes Monats fah ich viele Kranke, welche fchnell mit ben beftigften Kolikschmerzen befallen wurden, die aber nach einigen wiederholt gegebenen Brechmitteln fich nach und nach legten; nur binters liegen fie in den erften Tagen fo viel Empfindlichkeit im Darmfanal, bag die gelindeften Cpeifen, bas Fahren, ober farte Auftreten im Geben Schmerzen verurfachten. Die Meiften brachen ungemein viele Galle mit fichtbarer Erleichterung weg. Auch hatte ich einen einzelen 24. tabrigen Mann ben fiebenben Tag feiner Rrantheit zum erftenmal zu befuchen, ber am falfchen Seitenstich barnieber lag. Ein anges zeigtes und fogleich gegebenes Brechmittel bob Geis tenftechen, Phantafien und blutigen Auswurf; bas Fieber nahm ab und der Kranke erholte fich schnell. -Der

Der Reichhuften und die Pocken wahrten noch ims mer fort. Intermittirende Bieber erschienen bie und ba; am meiften aber berrichten in diefem und den folgenden Monaten diefes Jahrs mit gleicher Wuth und heftigfeit Arthritisch : rheumatische Bus falle. Der Grad und die Daner diefer Rrantheit fowohl, als die Theile, welche mit dem Schmerg befallen murden, waren verschieden. Einige hatten nur halbseitige Ropf und Zahnschmerzen, Augens entzundungen, Bieben und Reigen in den Gliebern, verlorne Egluft , bittern Mund , gelbe Gefichts: farbe ic. ben diefen war die Krantheit, fo bald die Galle eliminirt war, schnell vorüber. Undre aber, besonders solche welche in dem mannlichen Alter weiter fortgeruckt maren und schwache Rerven bats ten , bekamen eine langwierige rheumatische Glieders gicht, rheumatismus arthriticus, wogn fich oft eine außerst hartnatige weiße Geschwulft in dem Anie ober in einer andern Articulation gefellte, mit der fie fich viele Monate lang schleppen muften. Sauptfach: lich traf dieg folche Personen, welche lange Zeit, oft Jahre lang vorher schon rheumatische Unruhen in ihren Korpern empfanden , und fluchtige fchnell vorübergehende Schmerzen bald in diefem bald in ies nem Glied bemerkten. Raum war nun ein Diatss fehler, Ertaltung ic. (legte ereignete fich diefes naß: falten Commers wegen am ofteften,) geschehen, fo gefellte fich bald ein Fieber bagu, die Schmerzen wurden lebhafter und anhaltender, wandelten nun Glied vor Glied, oder bald diefe bald iene Dusteln durch, hinterließen Geschwulft und Auftreibung der leidenden Articulation; es erfolgten unruhige schlafe

lose

lofe Rachte und unordentliche Exacerbationen, well che alle 3. ober 4. Wochen fich einfanden , und die Rrantheit nur verlangerten. Rurg ber Gang ber Rrantheit war außerst langwierig und empfindlich: ia ben einigen , wo ein organischer Fehler ber Gins geweide verftect lag, endigte fich biefe Rrantheit mit der Abzehrung *) und bem Tob. Gelbft diefe Gliedergicht fchien ben einigen , wenigstens in den erften Tagen ihrer Unwandlung, viel vom Unters leib abzuhangen, benn von vorzüglich guter Wirfung war ein mitunter gegebenes Brechmittel. Wenn auch daffelbe wenig Schleim und Galle abführte, fo machte boch die Erschütterung beffelben fichtbare Linderung aller Schmerzen in den leidenden Gliede Mancher Krante, ber fich weder regen noch bewegen konnte, mar einige Stunden nach bem ges gebenen Brechmittel im Stand fich felbft zu helfen, feine Glieder zu bewegen, und fuhlte teine Schmers gen. Diefe guten Zwischenzeiten aber mabrten nicht lange; auch galt bieg nur im Unfang ber Rrantbeit, in der Kolge maren Brechmittel mehr schablich als Der zogernde Gang biefer Rrantheit nuslich. liege fich allenfalls durch großen Borrath von Schleim und durch die schlaffen und gegen Reit minder fuhle baren Rerven erklaren. Go erinnre ich mich eines belicaten Frangofen ber an biefer Krantheit barnies berlag und dem ein Gran Brechweinstein in gefunden Tagen

^{*)} Daher last sich begreiffen, warum wir in diesem Jahr so viele Lungenschwindsüchtige hatten; viele hatten zwar natürliche Anlage zu dieser Krankheit; keine Constitution aber begünstigte den schnellen Uebergang zum völligen Ausbruch derselben, mehr, als die dießiahrige.

Tagen sechs bis siebenmaliges Erbrechen , und ist swenmal fo viel mit dren Loth Manna verfest, nur Edel aber weber Stuble noch Brechen verurfachte. Ben einem Undern erfolgten auf zwen Scrupel 3pes fatuanha mit einem Gran Brechweinftein verfest auf einmal genommen, erft nach dren Stunden zween Bomitus. Bier bis feche Gran Goldschwefel pro Dof. des Tage bren bis viermal gegeben , erregten ben diesem Patienten nicht einmal Eckel, geschweige benn Erbrechen oder Stuhlgange. - Der harn war ben den meisten Anfangs gallicht und dunkels gefarbt, nur nach ieder Exacerbation feste er einige Tage, aber ohne alle Linderung der Bufalle, einen rothlichen Bodenfag ab; in der Folge der Rrantheit wurde er helle und citronenfarbig. Ein gelblichter truber Urin, den die Rranken nur zuweilen ließen und in welchem Schleimflocken schwammen war fris tisch und machte - wenigstens auf einige Tage -Die leidenden Gliedmaßen beweglich und schmerzens fren. - Ueberhaupt erforderte diese beschwerliche Rrantheit von Geiten des Patienten und des Urge tes Geduld, und nebft Brechmitteln, die aber nur im Unfang der Rrantheit wiederholt werden durften, wirksam auflosende und fraftige Mervenmittel, uns ermudet fortgenommen, als : bittre Extracte und vors züglich die des Afonite und des Bitterfuges, einen Aufguß von bittern Rrautern, die antimonial Geis fe, das Guaiatharg, den Rermes, Goldschwefel, das Doverische Pulver, die Baldrianwurgel mit der Rinde und Mittelfalzen verfegt, das Ralomel, ben Sublimat mit Mohnfaft zc. Meugerlich murs den funftliche Schwefel: und Donaubader, das bes nachs

156

nachbarte Abacherbad, Dampfbaber, die Elektrizistät, die Blasenpflaster, Wachstaffet oder Wachs: Leinwand, das Einreiben der Civillischen Salbe *) das

*) Besonders wirksam fand ich einigemal in diesem Jahr das den Tag über zwenmalige Einreiben dieser Salbe in schmerzhaftem und saltem Hüftweh und Aniegeschwulssten. Ich ließ solche entweder in der Fußsohle oder am leidenden Theil ein oder zwenmal des Tags alleszeit einer großen Haselnuß groß langsam einreiben, und innerlich gab ich folgende Pillen dazu:

R. Calomel gr. XII. Opii puri gr. IV.

Conserv. Fumar. q. s. ut f. 1. a. Pil.

n. XII. S. Alle Abend ein ober zwen Stuck zu nehmen. Ben zwen iungen Mannern schien die Urfache Diefes heftigen Schmerzens, der weder Geben noch Auftres ten vertrug, tief im Rnochen felbft oder deffen Beinhaut ju figen und venerischen Ursprungs ju fenn ; wes nigftens hatten fie einige Monate vorher bosartige Gonorrhoen; ben gwo andern Derfonen aber, die gleiche falls das Suftweh hatten, war sicher nichts veneris fches mit im Spiel, und bennoch schaften Diefe Mittel nicht nur Linderung der Schmergen , fondern auch Benefung. Doch maren diese Mittel nicht unfehlbar : denn einigen halfen weder diefelben noch die oben genanns ten nach der Reibe durchgebrauchten Argnenen, fondern Die Zeit und warme Tage und Baber verschaften ihnen nach und nach wieder ben frenen Gebrauch ihrer Glieds maffen. Demohngeachtet munschte ich Diese vortheilhafte Wirkung der Cirillischen Salbe vor einigen Jahr ren schon gefannt ju haben; vielleicht murde ich mit ihrer Sulfe das Leben eines jungen R. Preugischen Offiziers gerettet haben, der gleichfalls die beftigften Schmergen in einem Rnie, das febr gefchwollen mar, und

bas Geigenharz mit Weingeist u. s. w. zu Hulfe ges nommen. Und dem allen ohnerachtet hatte mancher Kranke

> in bem Unterfuß berfelben Geite hatte , und mo gleiche falls etwas Benerisches mit ju Schulden fam. Ein Quackfalber legte ihm ein weiches Pflafter auf Die Geschwulft der leidenden Theile , worauf aber der Schmerz bis zur Raferen flieg. Mun fuchte er ben erfahrnen Wundarzten vorzüglich Bulfe. Geine Krants beit murde fur die weiße Geschwulft ber Gelenfe White Swelling of the Joints, die der Englander Beniam. Bell beschreibt, gehalten und als diese mir Ginreiben ber Neavolitanischen Galbe behandelt. Gelbft Schmus der, ber biefes Kranken wegen schriftlich zu Rath ge= waen murde, achtete fie eben nicht für gefährlich und und erzählte in feiner Ruckantwort ein paar Ralle. die er erst fürzlich behandelt und glücklich geheilt habe-Er hielt fie nicht für venerisch, fondern erflarte diefe Geschwulft von ertravasirter Lompha oder Gerum. Die Urfache Diefer Austretung leitete er von beftiger Unftrengung ber ,' als vom Gpringen anhaltendem Dangen, Rechten, Fallen auf bas Rnie ze. und rieth Dampfbaber Morgens und Albends eine Riertelfing De ju gebrauchen. Man folte namlich Effig mit mohlriechenden Rrautern , als Rosmarin , Lavendul 2canseten, auf glubendes Gifen oder gehiste Riefelfteine giegen und den Dampf an bas frante Glied binleiten. Innerlich empfahl er Rampfer und Goldschwefel mit Salveter und alle acht Tage ein gelindes Larans. Ohnerachtet aber Dieser getreu befolgten Methode zehrte unfer Rranke immer mehr ab, fein Bug fchwoll febr an und schmerzte. Zwen Tage vor bem Tod schwols Ien anch besonders Gesicht und Sals emphysemas tifch an. - Der Uftragulus bes leidenden Fufes war gang caribs; in dem Aniegelenk fowohl als gwis fchen ben Rugmuskeln fand fich bicke falfartige gelba weißliche Materie vor

Kranke den ganzen Herbst und Winter über mit dies ser Unpäßlichkeit zu kampfen und erwartete mit Uns geduld das folgende Jahr, um nach dienlichen Bas dern reisen und dort seine Sesundheit vollkommen wieder erhalten zu können.

Außer diefer langwierigen und ben gangen Rors per burchziehenden Gliederfrantheit fam auch eine mehr figirte Gicht vor, welche nur einzelne Theile und befonders die Urme mit Schmergen in fo bos bem Grad befiel , daß die armen Patienten in Buckungen verfielen , (befonders fab ich dieg ben zwen iungen Weibern) und eine Lahmung der Arme nach überstandenem Schmerz und Fieber erfolgte. Diefe partiale Labmung der obern Gliedmaßen fam mir in diefem Jahr und ber legten Salfte bes vers floffenen, fechemal vor. Ginen 48. iabrigen Mann und eine eben fo alte Frau ausgenommen, waren Die übrigen Patienten innge Leute gwischen 20. bis 36. Jahren. Gine Weibsperfon hatte nur im reche ten Urm die heftigsten Schmerzen und biefer murde auch nach überstandenem Fieber auf einige Monate Diefe Lahmung außerte fich ben einigen schnell, ben andern aber nach und nach: sie hatten wenig Fieber und Schmerg mehr, dafur aber ems pfanden fie, bag ihnen mit iedem Tag die Urme und Sande schwerer und fraftlofer wurden, bis fie diefels ben endlich gar nicht mehr willtuhrlich bewegen fonnten. Allen blieb die Empfindung oder bas oft nur zu unangenehme Gefühl ben ber geringften Dus: tel Bewegung diefer Theile. Der Gis diefer Lah: mung war alfo in ber Unthatigfeit ber gur Bewegung Dies

bienenden Musteln diefer Gliedmagen aufzusuchen. und die volle Wiedergenesung diefer Theile erforderte Geduld; daber schlichen viele Monate dabin, bis Die armen Rranten felbst effen, sich antleiden, fchreis ben und die willfuhrlichen Bewegungen nach und nach machen lernten. Der langfame Bang der Wiedergenefung erforderte anhaltende und wirksame Meußerlich murden gegen diefe Armlaba Arznenen. mung Blafenpflafter, Die Kantharidentinctur, bas fluchtige Liniment, Genfteig, funftliche auch gemeine Donaubader, das Tropfbad, der hofmannische Les bensbalfam mit Baffer verdunnt, die Cirillische Salbe, das Eleftriffren u. f w. gebraucht. Legteres that (es verfteht fich, wenn der Korper vorher gang gereiniget, und fein Fieber mehr da mar) nur ben menigen die ermunschte Wirfung, ob schon der Pas tient foldbes lange brauchte, und gang ifolirt, oder bas leidende Glied mit einem ifolirten Conducteur wiederholt überfahren murde. Innerlich murden nebst öfteren gelinden Brechmitteln die oben schon ans gezeigten Rervenmittel gereicht.

Die dritte Gattung der Arthritis die in diesemt Jahr, und besonders gegen das Ende desselben oft vorkam, war die gewöhnliche Sliederkrankheit. Es währte solche gemeiniglich dren bis fünf Wochen, selfen länger, und befiel iunge vollblütige Männer. Die Kranken hatten heftiges Fieber, vollen Puls 2c. klagten über die empfindlichsten Schmerzen in den Sliedern, die bald von den Armen nach den Schensteln oder Füßen und von diesen wieder nach ienen oder in die Schultern zogen und die Leidenden so fols

terten , baf fie wie Statuen ausgestreckt , ohne alle eigenmachtige Bewegung viele Stunden lang liegen Wenn der Schmerg , ben einige fo befchries ben, als wenn ein Mustel von dem andern abgefons bert und geriffen murde, bis zum bochften Grad flieg und manche begwegen laut fchrien und weinten, bann lies er allmählig nach und ber gequalte Theil schwoll Die Meiften hatten in den erften Tagen ber Rrantheit große Reigungen jum Schlaf; fo wie fie aber die Augen fchloffen , famen ihnen allerlen Bils ber bor, fie fuhren ploglich und mit bem heftigften, aber fchnell vorübergebenden Schmerz auf, als hats ten fie, wie einige fich ausdruckten, ben empfindliche ften electrischen Schlag erhalten, fo daß fie ben Schlaf möglichst zu verscheuchen suchten. *) Sie fchwisten alle febr ftart, aber ohne die mindefte Ers leichterung und der Durft war bennoch mäßig. Die Bunge war in ben erften Tagen weiß, wenig mit Schleim beladen , murde aber in der Folge unreiner; Die Rranten flagten über heftigen , zuweilen auch bits tern Mund , verlorne Egluft und fühlten Abscheu por Fleisch und Bier. Wenn fie einige Tage ben Brechwein mit bem Guaiafharg und andern auflos fenden Mitteln gebraucht hatten, fo fand fich gefalge ner, bittrer Mund ein. Run forderte bie Matur ein

*) Diese höchst unangenehmen elektrischen Stösse erlitten auch iene Patienten, welche die langwierige Glieders gicht hatten und sie fanden sich allemal Morgens am meisten vor, wenn der Kranke einschlummern wollte. Je seltner und minder heftig diese elektrischen Einströmungen in die leidenden Theile geschahen, desto näher war die allmählige Genesung.

ein Brechmittel und es schafte daffelbe viele Galle und Schleim mit großer Erleichterung fort. wandelbare Gliederschmerz und das Fieber nahmen hierauf ben einigen mit iedem Tag mehr ab, die Eg= luft und ein rubiger Schlaf tamen wieder; ein paar wiederholte Abführungen und nachher das Mynficht. pber bas Whytt. Elixir reinigten und ftarften ben geschwächten Korper vollends. Ben vielen aber war diek nur eine Remission; nach ein paar Tagen fiens gen die Schmerzen aufe neue an, die Glieder gu burchziehen, die Rächte wurden wieder eben fo fchlafe los, der Puls fieberhaft ic. und es mufte die Beilart von Bornen wieber angefangen werben. Schafte bas Erbrechen abermal viel Galle und Schleim weg, fo erfolgte entweder wieder eine Remiffion ober bie gangliche allmählige Wiedergenesung. *)

August.

Intermittirende Fieber waren in diesem Monat nicht selten und einmal kam mir das Schlaffieber ben einem 60. iährigen Mann vor, das ich aber durch die bekannten Mittel, nämlich starke Dosen der Rinde, schnell hob. — Durchfälle und Koliken von galliche

*) Charafteristische Auszeichnungen der diesiährigen Glie, derkrankheiten vor den gewöhnlichen waren iene elektrisschen Stöße; die äußerst große und schnelle Abmages rung der Kranken überhaupt, und vorzüglich der leisdenden Gliedmaßen; ben einigen die weißen Geschwulsten; und wieder ben andern die Lähmungen, welche aber nach und nach gänzlich gehoben wurden.

tem Stoff erzeugt, die felbft Rinder befielen , waren febr allgemein, auch fielen bie und ba Cholerae por; überhaupt blieben unfre Rrantheiten immer gaftrifch. Einigemal fab ich das heftigste Kopfweb, welches fich auf ein Brechmittel legte; rheumatische Bufalle herrschten noch allgemein. Ich hatte in diesem Mos nat ein armes iunges Taglobnerweib zu beforgen, welche des Morgens gefund mit ihrem Mann auf das Kelb zum Schneiben gegangen mar, aber bas felbst mit einemmal anfieng allerlen wahnsinniges Beng zu treiben, mit ber Gichel in ber Luft berums hieb, oder gegen die Mitschnitter gufuhr, und das ber, um fich und andern nicht zu schaden, nach Saus gebracht murde. Diefe Perfon mar vor dren Bos chen mit ihrem britten Rind, das fie felbft ftillte, entbunden worden, und ist ba ich fie jum erstenmal fab, gang finneund fprachlos, hatte Rieber und uns reine Junge. Ich reichte ihr wiederholte Brechmits tel und auf diefe tam nicht nur Bewustfenn und Berftand, fondern auch nach und nach die Gefunde beit wieder. — Roch immer qualte ber Reichbuften Die Rinder. Gutartige Poden herrschten auch mit unter.

In diesem Monat verlor ich einen 54 iahrigen unverhenratheten Mann an dem Brand der Fuß: zehen, welchen Port *) am ersten, wo ich nicht irre, beschrieben und ein specifisches Mittel dagegen anempsohlen hat. Der Kranke war seiner Prosess sion ein Bäckenmeister und hatte sich vor einigen Monas

^{*)} The Chirurgical Works of Percivall Pott Vol. III. p. 331. Lond. 8. 1783.

Monaten burch bas Ausschneiben eines Suhneraugs die erfte Empfindung an der zwenten innern Bebe jugezogen. Er achtete aber nicht eher barauf, als bis Schmerz und Entzundung ibn antries ben, nach Gulfe umzusehen. Da fein Landbader ihm diese nicht leiften fonnte, fo reifte er bieber. Alls ich im Monat Junius den franken Buß jumt erstenmal fab, war bietenige Bebe, an welcher bas llebel sich zu erst geaussert hatte, schon abges fallen und die benachbarte große Zehe flein, gleiche fam ausgetrofnet, aber dennoch empfindlich, die Epidermis berfelben war gang fchwarg, fonderte fich bfters vollig ab und die darunter liegende Saut fah buntel : blau : roth ber. Auch diefe Zehe fiel bald ab. Um schmerzhaftesten war die Buffohle. Mittelft der Sonde entdeckte man da wo die Beben abgefallen waren einige Eitergange und caribfe Anochenende. Die Jauche, welche herausfloß, roch aashaft. Ich gab nach Potts Rath Opium; in die Wunde wur: be Chinapulver gestreut, und lauwarme Umschlage von der Rinde und einigen aromatischen Rrautern über ben Ruß gelegt; öfters wurde er auch, wiewohl ohne befondere Linderung ber Schmergen in lauwars me Milch gefest. Es fiel aber eine Bebe nach ber andern ab, ber Schmerz breitete fich aus, und flieg ben Bug immer weiter hinauf, ein schleichendes Behrs fieber gefellte fich bagu und ber Krante ftarb. -Da ich vor dren Jahren einen eben so alten ledis gen Sofbedienten an der namlichen Rrantheit vers loren hatte, fo gab ich diefem Patienten und ben Ums ftehenden ben meiner erften Bifite gleich wenige Dofs nung jur Wiebergenefung. Der Bediente glaubte durch

durch das jungfte Ragelabschneiden und weil er ofters auf Reifen feine Fuße gefroren habe, fich dies fen blauen empfindlichen Fleck mitten auf ber gwos ten Behe (von der großen Behe an gerechnet) gue gezogen zu haben. Auch ihn behandelte ich nach Portscher Borschrift; es gieng aber eine Zehe nach der andern in Brand *) uber, der Schmerg jog fich immer bober binauf, ber Rrante wurde taglich Schwächer und nach Berlauf einiger Monate ftarb er gang abgezehrt. - Die meiften Beine bes Tare fus und Metatarfus waren caribs, der gange Rug war unterholt und wir entdeckten ben der Leichens öfnung ungablige Gange, bis gegen ben Baben bin , in welchen aufferst ftinkenbe Jauche enthalten war. Die naben Musteln fowohl als die Beins haut waren gang entstellt und verderbt. - Beebe Krante hatten nie arthritische ober podagrische Bus falle,

*) In unfrer Gegend hat man vor keiner Rrankheit fo viele Furcht und jugleich fo hoben Respect, als vor bem fogenannten Brand. Wenn man den Umftebenben fagt, daß der verftorbene Rrante verftopfte Gin= geweide, die Lungensucht, Baffersucht, den Schlag ze. gehabt habe, fo ift bas ihnen ben weitem nicht fo verfigndlich als wenn es beift : der Brand ift dagu gekommen. Bas fie fich eigentlich ben biefem Bort benfen, ift frenlich nicht ju ergrunden, genug aber es ift befriedigend fur fie; bem Utgt wird gewiß nichts jur Laft gelegt, wenn er fich hinter dies Bollwerf verfteden mag; benn fur ben Brand ift Fein Mittel, besonders wenn er laufend wird. Ga felbst die rothblauen Todtenflecken, welche ben als Ien Werblichenen hauptfachlich am Rucken Borfchein fommen, werden ben uns Brandflecken genannt.

fälle, wohl aber ein so genanntes kupferichtes Gessicht. Ob durch das Absehen der Zehen oder des Fußes gleich im Anfang der Krankheit diesem ganz eignen Brand sicher und glücklich hätte gewehrt werden können, überlasse ich dem Ausspruch erfahrener und competenter Wundarzte.

Geptember.

Auch in diesem Monat herrschten Diarrhoen und Rolifen, befonders unter Erwachsenen ziemlich allgemein; ben einigen waren fie mabre Cholerae; denn wenn die überflußige Galle fowohl über als unter fich von ber Ratur schnell ausgestoßen wurs de, fo befanden fich die Kranke wieder gut. Gints ge nachgegebene Dofen von Beinftein mit Rhabars ber bewirkten die gange Eur. — Ueberdieß hats ten wir einige verlarvte intermittirende Rieber, mels che sich besonders unter halbseitige Ropf, oder ans bre rheumatische Schmerzen verftedten, einige Stuns den ben Rranten febr zufegten und dann ganglich verschwanden, zur bestimmten Zeit aber wieder fas men. Das Periodische verrieth fie, und eine ober die andre Unge Rinde in reichlicher Gabe gereicht, entfernte diefelben gefchwind und ficher. - Auffers dem kamen viele rheumatische Krankheiten vor, als Bahn . Buft . Dhrenschmergen, Gliederreißen u. f. m. Das Podagra befuchte feine Bekannten. — Die gallichtschleimichten Krankbeiten waren ziemlich ges mein, und wie immer von verschiedenen Ruancen und Dauer, ben einigen maren fie unbedeutend und schnell vorüber gebend; andern aber, wo die Galle nicht 2 3

nicht geschwind ausgeführt wurde, oder ber Schleim zu zähe war, sezten sie hartnäckiger zu. — Gegen das Ende siengen Husten und Katarrhe zu herrschen an — Der Keichhusten war noch immer allgemein und epidemisch unter den Kindern; auch sielen wahere und falsche Pocken und zuweilen Schwämmchen vor. —

In biefem Monat ftarb ein innges Weib an ber Auszehrung, welche von einer ungewöhnlich großen Berhartung des linken Enerftocks entftanden war. Ich theile bier die Geschichte ber Krantbeit und Section mit. Es war die Patientin 29 Jahre alt, hatte ichon dren Rinder getragen und glaubte mit bem vierten fcmanger ju fenn. 2118 aber neun Monate vorüber maren, ber Leib immer großer wurde und die Geburt bennoch nicht erfolgen wolls te, fo ließ fie unfern erfahrnen Beburtshelfer Berrn Staud rufen; diefer fublte gu ihr und fand baff fte nicht schwanger fen. Rach einiger Zeit murbe ich zu ihr gebeten. Ich bemerkte einen ungewohne lich großen angespannten Leib, der bis über bie Bergerube fich ausdehnte, und benm Berühren merts lich fluctuirte. Sande, Ruge und bas Geficht ber Kranten waren febr abgemagert; ber Puls gieng flein und schnell. Ich gab ihr gelind abführende Mittel und als ich nach feche Wochen wieder ges rufen murbe, fant ich die Geschwulft noch größer und ben Mabel einer Birne groß berausgetrieben, Diefer brach ben 22 Gept. in der Racht von felbe auf, wie ich ihr porber gefagt hatte, und ce flofe fen mehr als fechzig Pfund gelbes trubes stinken. Des

bes Waffer, wie durch einen Springbrunnen aus demfelben. Der Leib war nun als ich ihn den fols genden Morgen fab, in Bergleich mit ber vorherigen Große, merklich zusammen gefallen, doch immer uns naturlich hart und aufgetrieben und hatte nun ges rade das Aussehen einer neun Monate fchmans gern Mutter. Im Nabel entdette ich iene einzelne Defnung, aus welcher das Waffer gefloßen war und durch welche ich eine gewohnliche Sonde ohne Mube giemlich tief in ben Unterleib bineinbringen fonnte. Zween Tage nachher fand ich die Frau aufferst matt und entfraftet, fie batte falte Banbe, einen gitterns den aussehenden Pulsschlag und den folgenden Abend verschied fie. Als ich den 26 Gept. vor der Leis chenofnung mit herrn Staud den Unterleib befuhls te, waren bie und da durch die Integumenta merks liche Ungleichheiten und Berhartungen zu greiffen. Da die rechte Geite an bemienigen Drt, wo man ben Bauchflich vorzunehmen pflegt, mit der Langets te burchstochen wurde, flogen wenigstens breißig Pfund gelbgrunes, mit gangen Studen Giter vers mischtes, stinkendes Waffer heraus. Rach dent hierauf die Bauchmusteln burchschnitten und gus ruckgeschlagen waren, tam ein großer Rorper gum Borfchein, der die gange Bauchhohle anfullte, große Gnros und Anfractus hatte und den wir anfangs für die Gedarme hielten, welche widernaturlich bie und da verhartet und mit einander verwachsen mas ren. Die Symptomen der Krantheit widerfpras chen aber diefer Bermuthung. Denn die Rrante hatte fast täglich ofnen Leib und nie Schmerzen ben der Berdauung oder dem Stuhlgang. Als ich

250

die Gebärmutter tief im Becken aufsuchen und bes hutsam herausnehmen ließ, siel diese zwölf Pfund schwere Masse in dem Augenblick, als das linke breite Mutterband entzwen geschnitten wurde, zu Boden. Wir überzeugten uns nun bald, daß der linke Eperstock zu dieser entstellten und ungewöhns lich großen Form angewachsen war, und da wir ihn besonders untersuchten, entdeckten wir in demselben hie und da Eitersäcke, an andern Orten knorpelarstige Verhärtungen und Fett oder Talkmassen. Alle übrigen Eingeweide des Unterkeibs lagen nun in ihrer natürlichen Beschaffenheit vor uns; die Bärzmutter selbst war gesund und nicht größer, als sie ben Jungsern zu senn pflegt.

October.

Rrankheiten, welche von Unverdaulichkeit und überflußiger Galle und Schleim herrührten, waren noch immer gemein; doch halfen abführende Mittel ficher und schnell. — Gehr haufig tam bas Podas gra und die rheumatischen Beschwerden vor; lege tere waren febr hartnackig und langfam. Denn wenn auch schon das Fieber bennahe gang vorüber war, Egluft und Schlaf wiederkehrten, wiewohl legtrer oft lange unterbrochen und furg mar, fo gieng es boch mit der ganglichen Wiedergenefung aufferft langweilig ber und Perfonen, welche fchwache Luns gen ober verderbte abdominal Eingeweibe hatten, erholten fich, wie schon gefagt, nie wieder, fondern ftarben an dem schleichenden Zehrfieber oder maffers füchtig. — In diesem Monat hatte ich bren Pas tiens

tienten gu beforgen, welche von frenen Studen, ohne fich der geringften Liebesausschweifung bewuft zu fenn, Berhartungen und Entzundungen der Inguinaldrufen erlitten, die nach und nach in Bereiterung ubers giengen. Ginen diefer Rranten verlor ich schnell und unverhoft am Ende biefes Monats an einem Sticks fluß im 46 Jahr feines Alters. Er flagte mir feche Bochen vorher eine fchmerzhafte Berhartung der Drufen in den beiden Weichen. Ich gab ihm anfangs innerlich die fraftigften auflofenden, brech und abführende, und aufferlich zertheilende Mittel. Da aber legtere nur die rechte, und nicht auch die linte Inguinaldrufe aufzulofen im Stande maren, und Diefe in Bereiterung übergieng, fo murben erweis chende und zeitigende Argnenen gemablt. Gie brach auf, es floß vieler mafferichter Giter heraus, und ber Schaden murde als ein Gefchwur behandelt. Die Schmergen ließen hierauf nach, der Rrante ers bolte fich, af, schlief gut, turg alles schien fich gur baldigen Beilung anzuschicken. Den 22. October aber wurde er Rachts mit etwas Stecken und Rafs feln auf der Bruft befallen, das er nie vorber ers litten hatte, woben er ziemlich vielen weißgelbliche ten gaben Schleim auswarf. Rach ein paar Tas gen fanden fich Rrampfe, befonders in den Sans ben und Fugen ein, fo dag er biefe Gliedmaffen nur mit vieler Dube bewegen, auch die Sande nicht zumachen konnte; turg hierauf aufferte fich der Rinnladenzwang, fo daß er den Mund faum gu öfnen vermochte, und daher schwer sprach und mit Mube trant. Diefe fpaftischen Bewegungen machs ten mich außerst aufmerksam und da der Patient

- 2000

an das Aberlaffen gewohnt, fein Puls voll und ge: fpannt, nicht aber fieberhaft war, fo ließ ich ihm fieben Ungen Blut, vom Urm abgapfen, baben ein Alnstir fegen und innerlich das Guajatharz mit dem arabifchen Gummi und etwas Mohnfaft reichen. Da diefe Krampfe nach vier Tagen wieder erschies men, fo rieth ich Blafenpflafter auf beede Urme gu Der Kranke wollte noch eine Macht abwars ten, er ließ mich aber gegen Morgen um bren Uhr schnell rufen, und bat mich schwer athmend und ins ftandigft, geschwind Luft zu verschaffen, sonft mußte er fterben. Leider! hatte er recht. Denn faum mar er verfeben *), und ehe noch die Blafenpflafter und eine saturirte Mixtur des Amoniakgummi mit Burham. Bein ankamen, fo murbe er immer ftiller, athmete leichter und entschlief in meiner Gegenwart. Die Leichenöfnung geftattete man mir nicht. - Uebers haupt waren Bruftbeschwerden, Afthmata, gemein ; ich verlor in diefem Monat zween 70 ichrige Greife an dem Stickflug. - Die Tertianfieber wurden felts ner; einen vieriahrigen Jungen hatte ich an diefer Rrantheit zu behandeln. - Die Blattern, ber Reich : und fatarrhalische Suften fetten ben Rindern febr gu.

Movember.

Da die meisten Tage dieses Monats ziemlich kalt und trocken waren, so äußerte sich auch hie und da

^{*)} Katholischen gefährlichen Kranken Beichte hören, das Abendmahl reichen und die lezte Gelung geben, heist man in unsrer Gegend versehen, providiren.

da die falfche Lungenentzundung, welche fonft meift erft im December ben uns erscheint. Die Patiens ten flagten über mehr ober weniger heftigen figirs ten Schmerz in der Bruft, über Suften mit dicem gaben, zuweilen auch mit Blutftriemen gefarbtent Auswurf, und hatten fartes Fieber. Gelinde Brech: mittel und Blafenpflafter auf die leidende Stelle ges legt halfen am ichnellften. Da die Witterung gegen das Ende dieses Monats feucht und neblicht mar, fo wurden die Lungen frener, die Extremitaten aber litten mehr. Denn wir hatten nicht nur in diefem, fondern auch in bem folgenden gangen Monat uns gemein viele rheumatische Zufalle aller Art, als Dhe ren: Augen: Sals : halbfeitige Ropfschmerzen, Glies berreiffen, die herumirrende Gicht u. f.w. Alle diefe Beschwerden waren meift langwierig und wichen auch ben wirksamsten Arzneymitteln langfam. — Auffer Diefer am häufigsten vorgekommenen Rrantheit, faben wir hie und ba Gelbsuchten, sowohl ben Rindern als Erwachsenen, katarrhalische und afthmatische Bus falle, das Rothlauf und mit unter Unwandlungen vom Schlagfluß. - Der Reichhuften wurde feltener, bafur aber fiengen die Pocken an, wieder allgemeiner zu werden. - Rrankheiten, welche von überflußiger Galle allein herkamen, und unvermischt maren, faben wir felten; überhaupt aber blieben Kinder nichts weniger als verschont von diefer berrs Schenden Constitution, ia einige ftarben fogar an bent formlichen gallichten Faulfieber. Ich erinnere mich einiger folcher Rinder, welche ich mabrend diefer breniahrigen Constitution an diesem Fieber verlor ; da ich aber nur von zwenen die Korper öfnete, fo tann

fann ich auch nur von diefen die Krankheitsgeschichte erzählen. Der erfte Kranke mar ein Junge von zwen Jahren und eben fo vielen Monaten. ich ihn den 28 Jul. zum erstenmal fab, klagte er über Bauchweh und verlorne Efluft. Die Mutter ergablte mir, bag er feit bren Bochen nicht mehr fo munter und lebhaft, als er ehebem gewesen, fons bern traurig und niebergeschlagen fen, auf ber Straf: fe und auf ben Spaziergangen ungern lief, und sich lieber tragen laffe. Ich gab ihm fogleich, da ich bie Pocken *) vermuthete, ein gelind abführens des und gleich barauf ein Brechmittel. Alle er aber dren Tage und bren Rachte in einem fortschlief und dennoch die Blattern nicht gum Borfchein tamen, fo argwohnte ich eine Bafferfucht in den Sirnbobs len.

*) Da die Docken mahrend diefer Epidemie ben uns herrschten und die erften Symptome berfelben mit benen der gallicht : schleimichten Krankheit fast bie namlichen maren, fo mußte man mit der Prognofe nicht ju voreilig fenn. Die Rinder flagten über Mattiafeiten und Reigen in den Gliedern, verlorne Efis luft, hatten trube Mugen, Reigungen gum Erbrechen, und brachen fich auch zuweilen, rochen aus dem Mund tc. 3ch gab ihnen, um ein oder der andern Diefer benden Rrankheiten Schieklich ju begegnen, Beinftein mit Baffer, dem ich Surbam. Spiegglaswein benfeste, oder gerade ju Brechweinftein, in ih= rem Alter angemeffenen Dofen. Gie brachen hierauf viele Galle und Schleim meg, und war dief allein die Urfache ihrer Unpaglichkeit, fo mar fie hiemit ben ben Allermeiften, einige Wenige ausgenommen, glucklich gehoben ; ftacken aber bie Docken bahinter, fo famen fie auf das Brechen defto leichter jum Borfchein, und bielten ihren gewöhnlichen meift gefahrlofen Bang.

len. Ich verordnete daher gehn Gran Ralomel mit einem Gran Brechweinstein in feche Theile abgetheilt innerhalb 24 Stunden zu nehmen. (Denn mein Saupte augenmert war einmal auf einen innern Baffertopf gerichtet.) Er brach hierauf einigemal viele Galle weg und fieng an zu machen und munterer zu wers den; indeffen mabrte diefe gute Aussicht nicht lange. Es entftand nun ein anhaltendes Erbrechen, theils von gruner Galle, theils von alle bem, was er gu fich nahm, er schlief wieder anhaltend fort, das Brethen weckte ibn, bierauf schlummerte er abermal ein, und fo trieb er es, wiederholter Rinftire, Genfo umschläge, ber River. Potion zc. ohnerachtet, gans ger zwen Tage, bis endlich Sande und Ruge falt wurden, schwache Convulsionen eintraten und er fanft entschlief. -- Die Gefage bes Gehirns mas ren febr ausgedehnt und ftrojten vom Blut; in ben hirnhohlen war rothliches, und ungleich mehr Waffer, als im naturlichen Buftande, enthalten. Das Det war febr bunn und des Fettes beraubt; die Gedarme faben blauroth und brandicht ber, fie mas ren bie und ba febr verengert, boch fand fich feine innere Berfchlingung ober Einklemmung vor. Der Magen war zwar naturlich aber größer, als er fonft ben Rindern von diefem Alter gu fenn pflegt und in feinem Ein: und Ausgang war nichts wibernas turliches zu entdecken. Die übrigen Eingeweide des Unterleibs waren naturlich beschaffen, nur die Gallenblafe hatte eine gang ungewohnliche Große, und bildete bren Gnros von gruner Galle ftrogend. --Diefes Rind mar in allem nur bren Bochen uns paßlich, bettlägerig aber acht Tage. Ich halte die Krant,

Rrankheit, der entzündeten Gedärme und anhaltend weggebrochner Galle wegen, nicht sowohl für einen innern Wassertopf, der nur symptomatisch wie ben iener erwachsenen Person pag. 81. sich dazu ges sellte, sondern vielmehr für das nämliche bösartige gallichte Fieber, welches unter Erwachsenen in diesen dren Jahren so oft vorsiel. Der folgende Fall bes stättiget diese Mennung, wo ich zwar nicht Kalomel gab, aber demohngeachtet nicht glücklicher war.

Ein Madchen von vierthalb Jahren überstand im Junius b. J. die Pocken leicht und gut, wiewohl fie beren ziemlich viele hatte und begwegen auch funf Tage blind mar. Es angerte fich zwar nach ben Blattern ein Sell am Auge, bas iebe Selle fchwer vertrug, und Entjundung und Triefen bes leidens ben Muges ju Kolgen hatte ; Blafenpflafter aber und wiederholt gegebene abführende Mittel nebst schicklis chen topischen Arznenen hoben nach und nach diefen Rebler. Ein Bierteliahr nach überftandenen Pocken wurde das Kind trauriger als gewohnlich, hatte große Mattigfeiten und Bittern ber Gliedmagen , wurde endlich mit Fieber und anhaltendem Brechen befals len, fo bag es bas Bett nicht mehr verlaffen konnte. Alls ich ben 20. Cept. gu biefem Dabben gerufen wurde, ben Pule flein und fchnell, und die Bunge uns rein fand, gab ich nach einem voraus gefchickten Rinftir, ben Brechweinstein in fleinen Dofen. Es wirfte berfelbe einigemal über fich : bas Rind wurde matt und fiel in einen fanften Schlaf mit merklicher Mus: bunftung begleitet , worauf einige febr erträgliche Tage erfolgten. Ohnerachtet aber gelind abführende Mits

dens

Mittel und Klustire fort gebraucht wurden, fo fand fich bennoch wieder bas Erbrechen mit anhaltender Reigung jum Schlafen ein. 3ch bachte zwar abers mal an einen innern Waffertopf; ba mir aber bie eben vorher ergablte Geschichte noch in zu frischem Undenken war, fo hielt ich die Krankheit fur gallichts faulartig und gab nebft fparfamen Brechmitteln und wiederholten Abführungen und Kluftiren in den 3mis schenzeiten und befonders die Rachmittage und Rachte durch einen Abfud der Rinde, der Schlangenwurzel mit Tamarinden verfest und dem himbeerenfaft verfuft. In die Berggrube legte ich ein Blafenpflas Die fleine Krante aber wurde mit iedem Tag fchmacher, und an der gangen linken Seite gelahmt; mit ber rechten machte fie anhaltende Bewegungen, schlief die lezten zween Tage mit halbgeschloßnen und von Eiter triefenden Augen , gab aber bennoch Beichen eines schwachen Bewustfenns, ohne mehr fprechen ju tonnen, und verschied endlich ben eilf: ten Tag der Krankheit, von der Zeit an gerechnet, wo fie nicht mehr aus dem Bett fam. Ben Eroffnung ih: res fehr abgemagerten Korpers fand man im Kopf die Blutgefäße febr ausgedehnt und ftrogend, in den hirnkamern gegen bren Ungen Waffer; die Gubftang des Gehirns felbst war da, wo die Sehenerven aus den Thalamis entfteben, gang eitericht. Die Lung gen waren zufammen gefallen und ffierhoe. In Unterleib faben befonders die dunnen Gedarme ent: gundet und brandicht ber. Mertwurdig fanden wie die widernaturliche Berengerung eines Theils des Grimmdarms, ohnweit der linken Diere, der fo enge und flein war, daß mit Dube ber fleine Finger in 176

denselben gebracht werden konnte; der übrige Theil des Darms war natürlich beschaffen und hie und da fanden sich kleine sgleichsam versteinerte Kugeln von Unrath in demselben. Die Leber sah ziemlich gessund aus, die Gallenblase aber war sehr groß und mit grüner Galle angefüllt. —

Auch in diefem Fall war der ursprungliche Sig der Krankheit im Unterleib aufzusuchen; und die Ropfs waffersucht erft morbus secundarius. - Die mis bernaturliche Berengerung des Grimmbarms mag wohl den geringften Untheil an dem Erbrechen ges habt haben; benn außer dem dag er oftere fo verengert hie und da nach dem Tod gefunden wird, ohne dies fes Symptom erregt gu haben, fo mufte in meinem Kall, wenn er Urfache bes Brechens gewesen mare, derienige Theil, wo die Berengerung anfieng, gewiß am meiften brandicht gewefen fenn. Es waren aber nur die dunnen Gedarme blau und gangranos, die dicken aber nicht. Ich erklarte mir alfo diese abers mal tobtliche Rrankheit fur bas in diefem Jahr ben und oft vorgekommene gallichte Faulfieber und nahm mir ernftlich bor, in der Folge benen damit befalles nen Kindern teine abführende Mittel, fo lange bas Brechen wahrt , ju geben , fondern legters immer mit fleinen Gaben von Brecharznenen gu unterhalten, und übrigens die gange Rrantheit wie ben Erwachfes nen gu behandeln. Gin Borfat, ben ich nachher ofters mit bestem Erfolg ausführte.

December.

In diesem Monat sahen wir leichte Halsentzuns

bungen; - hie und ba fielen ben betagten Beis bern Blutfturzungen theils aus der Dafe theils aus Der Mutter vor; iungere murden in diefem und ben zwen vorhergegangenen Monaten von einer fruhzeis tigen Geburt und Diffallen bedroht, einige auch das mit betroffen. - Dentliche Anzeigen eines nahe bes porstehenden Schlagfluffes, und selbst auch leichte Unwandlungen beffelben tamen ebenfalls vor; am häufigsten aber waren Unverdaulichkeiten und Uebers flug von gallicht: schleimichtem Stoff, so wohl unter Rindern als Erwachsenen im Gang. - Mit unter faben wir auch gallichte Faulfieber. - Ungemein großen Ginfluß hatte unfre herrschende Constitution auf Fremde ober durchreifende : Go erinnere ich mich in diefem und den verfloffenen Jahren mancher Berrschaft und ihrer Domestiken, welche nach 10. ober 14. tagigem Aufenthalt in Regensburg mit bits term Mund, verlorner Egluft, fchleimichter , unreis ner Junge, Reißen in Gliedern zc. fchnell befallen wurden und dem gemäß behandelt werden muften. Eine iunge gefunde Rammeriungfer, welche mit ih: rer herrschaft von Bien hieher fam, wurde im vorigen Jahr, nach einem Aufenthalt von einigen Wos chen, mit diefen Bufallen beschwert, woben fich auch einige bofterische Bewegungen außerten, Die fie vors ber nie gehabt hatte. Breche und abführende Mits tel machten fie schnell gefund, und das blieb fie auch Die Sommer und Berbftmonate uber, die fie mit ih: rer herrschaft in Bohmen und Wien zubrachte. Raum mar fie im anfangenden Winter diefes Jahrs wieder hier angekommen, so bemerkte sie mit ihrer iungern, noch nie bier gewesenen Schwester alle iene Beschwer:

= 20°C =

Beschwerden wieder und bat mich, ber Rranfheit porgutommen und fie in der Geburt gu erfticken, für fich und ihre Schwester um ausleerende Mittel, wels che ben benben viele Galle und Schleim megfchaften, und ihnen wohl zu statten famen. - 3ch erinnere mich noch fehr vieler ahnlichen Falle, wo Fremde im Unfang ihres hiefigen Aufenthalts fchnell mit biefer herrschenden Constitutionsfrantheit *) befallen murs

ben.

*) Es mar aber diefe dreniahrige Conflitution nicht nur in Rucklicht der Symptome, fondern vorzuglich auch Unsehung der Beilmittel merklich verschies Denn im erften Sahr hatten wir mit bicker jas her Galle allein ju thun, die nicht durch fogleich ges gebene Brechmittel aus dem Korper geschaft werden fonnte, sondern vorher aufgeloft, beweglich und jum Ausführen vorbereitet werden mufte. - In dem folgenden 178sten Jahre mar die Galle turgedeirend; baber find auflosende Mittel meift unnothig gemesen, man burfte mit Brechen gleich ben Unfang machen, und beilte allein und fchnell bamit. - In dem drits ten Jahr aber halfen Brechmittel, nur in ben menis aen Kallen, wo bewegte Galle allein die Urfache der Arankheit mar. Ben den Meiften aber pflegte bicke Galle mit gabem Schleint vergefellschafter und mit ben Gaften inniger vermischt ju fenn. Die Urfache mochte vielleicht in einer allgemeinen Dervenerschlaffung aufzusuchen senn, welche die diesiahrige anhaltende naffalte Witterung, und ber feuchte Commer vorzuge lich hervorbrachte. Daber geschah es, daß wir mebr fogenannte Nervenfieber faben,rheumatische arthritische Bufalle nicht nur fehr häufig , fondern auch außerft lanawierig und hartnackig waren; und daher laft fichs auch erflaren, warum nur erschütternde Brechmittel, und die fraftigft auflosendfte Mittel mit Mervenargs nenen verfest, Die allmablige Eur vollendeten.

ben. - Den Reichhuften horte ich in diefem Mo: nat nicht mehr; dafur aber fiengen die Pocten an, wieder herrschender zu werden. - In eben diefent Monat fab ich recht herrliche Wirkung von dem Ges brauch bes Magensafts, ben Carminati iungft aufs neue empfahl, im aufgebrochnen Rrebs an der Bruft. Gine 52. iabrige Frau fchleppte fich feit eis nigen Jahren bamit und brauchte allerlen Sausmit: tel gegen diefen Stirrhum: endlich brach er auf und fie fab fich genothigt, ernftlich nach Gulfe zu feben. Weder das Gulardische Blen : Extract , noch der Mohrenbren , Schierling u. f. w. linderten ihre Schmergen oder verbefferten ben Geftant, der ber: vorquellenden Jauche; kaum aber brauchte fie einige Tage ben Dagenfaft von Dchfen, fo empfand fie merkliche Verminderung der Schmerzen fowohl als des Geftantes, und fo wie fie nur einen Tag denfels ben nicht auflegte, vergrößerte sich die Empfindlich: feit. Giner meiner Collegen , herr D. Sarrer machte in diefem Fruhiahr ben einer ohngefehr 40. iahrigen Beibsperson, welcher bes unausstehlis chen Geftants wegen, ben ihr Bruftfrebe verurfach. te, niemand mehr fich nabern wollte, die nehmliche Berfuche mit eben dem erwunschten Erfolg. Ginem 46. iahrigen Weib, welche feit vielen Jahren ofne und febr fcmerghafte Schaben an bem einen Rug, und bagegen schon manches Pflafter und mans che Salbe und Umschlag vergeblich gebraucht hatte, rieth ich ihn gleichfalls mit fichtbarem gutem Ers folg an.

200

Zum Schluß will ich noch von ein paar Kranken, die M2 ich

ich schon seit Jahr und Tag zu behandeln habe, kurze Rechenschaft ablegen. Der eine ist ein zwanzig ich riger Jüngling, der sich durch die Selbstbesteckung das Kinfallende oder die Epilepsie zuzog. Eiz ner meiner verehrungswürdigsten Herren Collegen, und ich ließen ihn die sogenannten Spezifica nach der Reihe durchbrauchen: als die Zinkblumen, das Gallium, Pomeranzenblätter, die Belladona ze. Der Anfall sezte wohl vier, zuweilen auch acht Wozchen aus, kam aber immer wieder. Die lezte Arzenen, welche ich ihm in den Monaten Man und Juzning d. J. reichte, war folgende Latwerge, die er dren bis viermal verbrauchte:

Rad. Valerian. Drach. 1.

Rad. Valerian. Drach. 3.

Rhei Drach. 1½.

Extract. Centaur. min. Drach. 2.

Conserv. Rosar. Unc. 1.

Syr. Fumar. q. s. ut f. 1. a. Electuar. S. taglich 3mal allezeit zween Raffeeloffel z. n.

Seit dieser Zeit hatte er zwar keinen epileptischen Anfall mehr, ich zweiste aber sehr, ob diese Wirstung dem Sabadillsaamen zuzuschreiben sen, und ob nicht vielmehr die Besserung vornehmlich auf die Unterlassung und Meidung ienes entkräftenden Lassters und auf den Gebrauch der bittern und Nersvenmittel, die in dieser Latwerge enthalten sind, ers folgt sen. Denn wir trügen uns, in langwierigen Krankheiten vorzüglich, unzähligemal, wenn wir dem leztgebrauchten Mittel allein die Heilung zuschreis ben. Der Fall aber ereignet sich leider nur zu oft.

Daher hören wir von allen Seiten so viele trostlose Spezifica anrühmen, die wir oft nach der Reihe vergeblich durchbrauchen: mit einemmal tritt Mutzter Natur ein, und der Kranke — genest.

Der Mann einer 24. iahrigen Frau, die zwen Rinder getragen hatte , ergablte mir diefes Fruhiahr, daß fein Beib feit einem vor ein paar Jahren gehabten Diffall fo entfraftet und fchmach fen, daß fie das Zimmer nicht verlaffen konne, nie aber Mervenzufalle erlitten habe, fondern übrigens ben guter Gefundheit fen. Ich fand die Frau zwar auf: gedunfen, übrigens aber ziemlich beleibt und von gesunder Gesichtsfarbe. Als ich sie gehen hieß, war sie nicht im Stande, zwenmal bas Zimmer auf und abzugehen , fo matt maren ihre Glieber. fie übrigens weder Schmerz noch Fieber hatte, alle Cerund Excretionen naturlich von ftatten giengen, die monatliche Reinigung alle bren Wochen langftens fam und 8, 10. und 14. Tage in einem fort anhielt, fo erklarte ich mir biefe Kraftlofigfeit aus einer gu geschwächten Muscularfiber und rieth Gifen, Rinde, bittre Extracte, Bewegung und falte Bader. der naffalte Commer die Anwendung der legteren zwen Mittel nicht erlaubte, fo fuhr ich lange Zeit mit den übrigen Argneyen fort. Endlich murde die Patientin und ich des Medicinirens ohne Erfolg überdrußig : ich empfahl ihr dienliche trokne Roft, Bewegung im Zimmer und fruhes Auffteigen - und versprach mir von troknen kalten Wintertagen und ihrer fonft gefunden Leibesconstitution, erwunschte Wirking. Ich fand sie auch zu Ende dieses Jahrs

ungleich beffer und fo ben Rraften, daß fie nun wies ber Treppen fteigen und auf der Straffe geben tons te; die Reinigung fam nun alle vier Bochen und flog maßig, tur; fie war auf ben Weg ber Befferung. -Eine todtliche Sinfalligfeit, asthenia, fab ich vor einis gen Jahren an einem 35. iahrigen Capucinerbruder. Es murde derfelbe ploglich ben fonft übriger guter Gefundheit, (benn er af, trant und schlief gut, hatte weder Schmerzen noch Fieber,) mit einer folchen Schwäche und Rraftlofigfeit befallen , daß er mit Sanden und Fuffen die Treppe hinauf flettern mus fte, ba er mit mir aus dem Rlofterfpeifefaal, mo ich ihn antraf, in feine Belle geben wollte. feine Bunge rein, und fein bosartiges Rieber ober Ausschlag hier mit im Spiel war , fo leitete ich biefe außerste Mustelentfraftung von Rervenschwache ber und reichte ein faturirtes Chinadecoct mit Bimmets waffer, und mit unter Wein. Allein mein Rranter wurde mit iedem Tag fchwacher, fein Puls gieng ims mer langfamer und fleiner, er fonte vor Mattigfeit faum mehr ein Glied bewegen oder fprechen, und fo fclief er ohnerachtet zwener Blafenpflafter, an bem funften Tagder Krankheit, ben volltommnen Geiftess fraften, vor Mudigfeit auf immer ein. Db ich diefe Krantheit recht beurtheilt, oder gar verkannt habe, überlaffe ich dem competenten Ausspruch und der gutigen Belehrung mehr erfahrner Kliniker , als ich bin.

Dieses Jahr hindurch hatte ich in allem 807. Kranke zu besuchen. Nehmlich im Monat

Januarins 40.	Julius 75.
Februarius 58.	August 71.
Martius 68.	September 72.
April 64.	October 54.
May 71.	November 76.
Junius 94.	December 64.
the and Cauchattan De M.	Summa 807. Kranke.
Und zwar	
The state of the s	leimichten Constitutions,
	alle gallichte, rheumatische
	, Rolifen, Diarrhoen zc.
das gallichte Faulfiel	ber 2c. zähle. 458
2) Un intermittirenden 1	und larvirten kalten Fies
bern: nemlich am bi	centágigen 9; am viertágis
gen 2; am täglicher	15. 16
3) Um Reichhusten.	57
4) Un den natürlichen Po	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
5) Un den kunstlichen ode	MALE AND A STATE OF THE PARTY O
6) Un den falschen Pocker	the control of the co
7) Am Podagra und Glie	
8) Am Rothlauf.	8
	inal Eingeweiden und Fols
	delbsuchten, Wassersuchten
Auszehrungen.	22
	Schlag 3, und Stickflus
fen 3.	8
	aus der Nase 2; aus der
Mutter 3, Blutspeie	
12) Un Steinbeschwerder	
13) Um Beinfras 2. bei neuniährigen Junger	
37)	4 14) Am

	Um Rrebs an der Bruft 1; Um Wochnerinnenfieber.	in der Mutter 1. 2
16)	Sechswochnerinnen.	28
17)	Wirkliche und drohende Miffe	álle, (Faußcouchen.)
	A Roy and and a ros.	10
	Chlorosen 3, weiße Fluß 3.	6
20)	Lungenschwindsüchtige und	Candibaten d. R.
		20
Supil.	tide e febleforie drent . Condition	Summa 731.

Der Rest meiner diesiährigen gehabten Patiensten befaste theils Kinder, welche an beschwerlichem Zahnen, Koliken, und Freisen aus Erkältung oder Ueberfütterung, Schwämmchen, Wehenköpfen, Würsmern ze. litten; theils Erwachsene, deren Unpäslichsteit nur Kräße, Schnuppen, Katarrhe, leichte Halssund Augenentzündungen, Hämorrhoidalbeschwerden zc. waren oder in bösartigen Geschwüren, Leibschäden, Beinbrüchen und ähnlichen Krankheiten bestanden, die mehr chirurgischer als medicinischer Hülse bes dürftig waren und ben denen der Arzt nur ab und zuzurathen pslegt.

Sievon farben 56. Ramlich im

Jan. Am gallichten Saulsieber ein 6 ichrisges Mädchen.

An eben dieser Krankheit ein 34 ichriger
Mann, zu welchem ich erst den 15ten Tag
der Krankheit gerufen wurde.

In dem Zehrsieber ein 40 Jahre alter
Maniacus.

An symptomatischen Convulsionen ein halbiähriges Kind.	1
The deciding the state of the s	4
Febr. Um gallichten Saulfieber ein 32 iah, riger Schneider.	I
Am Stickfluß ein 54 ichriges Weib.	I
Un derfelben Krankheit ein 58 iahr. Mann.	I
An der Wassersucht als Folge verdorbes	-
ner abdominal Eingeweide eine 49 iahrige	
Beibsperson.	I
Am Reichhusten ein halbiähriges schwaches	
Kind.	I
The set School black to Fall And School Section 1	5
Mart. Un Entfraftung ein 74 ichriger Be-	
biente. de grount and billemade und gerde beile	I
Um Schlagfluß ein 67 iahriges Weib, bas	
feit vier Jahren schon an der rechten Seite	
gelähmt war.	I
Um Reichhusten nach furz vorher glucklich	
überstandenen Pocken ein halbiahr. Kind.	1
Am gallichten Saulfieber ein 10 iahriger	
Junge.	1
the blace and the residence for the first	_
E TO SUSTINE STATE OF THE SECOND STATE OF THE	4
April. An symptomatischen zuckungen ein	
Sechswochen Kind.	I
Am schleichenden Zehrsieber von verstopf:	
ten Gekrößdrusen ein 24 Jahre alter Hand	
lungsdiener.	I
Au cinem (chieff breath begins fine moute age	2
May. Am Reichhusten ein ichriges Kind.	I

	Un der Lungenschwindsucht ein 45 iabs	
Í	riger Friseur.	
	Un der namlichen Krantheit eine 29iahr. Frau.	
	Un eben derfelben Rrantheit ein 43 iahr. Mann	
4	Un der Brustwassersucht als Folge ver:	
X.	ftopfter abdominal Eingeweide ein 51 iah:	1
	riger ehedem podagrischer Schauspieler.	1
	Un eben der Krankheit ein 50 Jahre alter	
	Braumeister.	1
E		-
~	Jun. Um Wochnerinnenfieber eine 35 iabs	1000
-	rige Frau.	
	Un der Lungenschwindsucht eine 36 iah:	BARRA
	rige Frau.	199
	Un eben ber Krankheit, wovon gleichfalls	1
	der Anfang sich im Unterleib zuerst ans	
	spann, eine 60 iahrige Frau.	
	Un der Bruftwaffersucht als Folge von abs	
	bominal : Berhartungen ein 48 iahriger	
	Raufmann.	1
	An Entfraftung vom Alter ein 70 iahris	4
	ger Franciscaner.	7
	Um bosartigen gallichten Saulfieber ein	
	26 iahriger R. Preußischer Refrut.	1
	Un eben der Krantheit ein 56 iahriger Fuhrs	dit
	fnecht.	I
	Un der namlichen Krankheit ein 28 tahriger	
	verhenratheter Uhrmacher.	1
	Un einem schnell geborstenen Lungeneiter:	BR 83
	sack ein 26 iahriges Madchen.	
	fuct till 20 impriges wenotyen.	VIII.
		9
443	G W	111.

Jul. An der Lungenschwindsucht eine 49	27.27
iahrige Frau.	. 1
Un derselben Krankheit eine 28 iahr. Frau.	I
Un der Abzehrung, als Folge des harns	
fluffes Diabetes eine 44 ichrige Bedien:	T.
ten Frau.	I
Um Stickfluß ein 75 iahriger pension. Bes	
diente.	I
An der Brustwassersucht als Folge ver:	
ftopfter Eingeweide eine 48 iahrige Frau.	1
Codynosperints spice, and a second second contract	-
Mug. An der Lungenschwindsucht ein 40	5
ichriger Rutscher.	TOTA
	•
Um gallichten Saulsieber ein britthalb ichriger Knabe.	AR .
Um Reichhuften ein 12 Wochen altes Rind.	I
	1
Un dem Brand der Zehen ein 54 iahris	13
ger Backenmeister.	
THE SECTION WHEN SECTIONS WINDOWS	4
Sept. An bosartigen Schwämmchen und	
darauf erfolgter Suffocation ein halbtah:	75 7 7 7 7
riges Kind.	I
Un der Lungenschwindsucht eine 34 iah:	
rige Frau.	1
Un eben der Rrantheit ein 26iahriger Officier.	
An dem schleichenden Zehrsieber als Fols	
ge eines verharteten und ungemein groß	
angeschwollenen Eperstocks, eine 29 iahr	
rige Schuhmachers Frau.	1
Um Reichhusten ein zweniähriges Kind.	1
	5
Øc.	tob.
	STATE OF THE PARTY

riges Mädchen. Am Blutsturz eine lange Zeit schon luns genschwindsüchtige Frau, 52 Jahre alt.	1
图1000000000000000000000000000000000000	
genschwindsüchtige Frau, 52 Jahre alt.	
	I
Am Schlagfluß ein 77 ichriger Bediente.	I
21m Reichhuften mit verstopften Gefrose	
drusen ein 21 Wochen altes Kind.	1
Um Stickfluß schnell ein 46 iahr. Mann.	I
Un eben derselben Krankheit die noch in	1
Lethargum übergieng, zwen 75 iahrige	
Schneidermeister.	2
The same of the sa	7
Nov. Am gallichten Faulsteber ein 43 iah:	-
riger Uhrmacher.	I
Un der Brustwassersucht als Folge ver:	
dorbener abdominal Eingeweide ein 35	
iahriger Schuster.	I
Un Petechien und Friesel mit Pocken ein	
13 iagriges Madchen.	I
	-
Dec. An symptomatischen Zuckungen ein	3
6 Wochen altes Kind.	-
o zovijen unes kino.	-
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
Un der Brustwassersucht als Folge von abe	
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	I
An der Brustwassersucht als Folge von abs dominal Verstopfungen eine 53iahr. Frau.	1 2
An der Brustwassersucht als Folge von abs dominal Verstopfungen eine 53iahr. Frau.	1 2

Nahmen: Verzeichnis

ber

Thiere,

welche

fich in unfrer Gegend vorfinden.

(1) (2) 图·其中是一个自己对自己的 Bully alten tall contention decide A SECURE TO SECURE THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO Stabinen, Bergelebuis 0 3 3 3 1 1 1 1 3 interest that the group of fich in unsteer Gegent vorfinden. DELANCE TO THE WILLIAM OF THE

MAMMALIA, AVES, AMPHIBIA, PISCES

Secundum Systema Linnaei ed. 13.

INSECTA

Secundum

Species Insectorum

Fabricii.

INSECTA GLOSSATA

Secundum

Systematisches Verzeichniß der Schmetterlinge der Wiener Gegend.

INFUSORIA, HELMINTHICA, TESTACEA

Secundum

Vermium terrestrium et sluviatilium seu animalium infusoriorum, Helminthico-rum et Testaceorum historiam

Mülleri.

AVES, AMPHRISIA, PISCES

Serundum Syficma. Linnari ed. 13.

INSECTA

Secundum

Species Infestorum

Fabritis.

INSECTA GLOSSATA

Securiden

Softenkaissche Wegener Erden und Anger der Leiener Gegene.

INPUSORIA, HELIMINITHICA,

Secondum.

Vermium terrefrica ei fluviatilian feu arimalium infuferiorum, Helminthico-

Benüzte Bucher.

- Bergstr. Momenclatur und Beschreibung der Insecten in der Grafschaft Hanau = Münzenberg von Joh. Andr. Benignus Bergsträsser. Hanau 1778. 4.
- Briss. Brissonii ornithologia s. synopsis methodica sistens avium divisiones. a Paris 1760. 4. Tom. I VI.
- Brunni. Brunnichii Ornithologia Borealis Hafniae. 1764. 8.
- Clerck. Swenska Spindlar. Caroli Clerk aranei fuecici figuris et descriptionibus illustrati. Stockh. 1757. 4.
- Degeer. Des Herrn Baron Karl Degeer Abhandlungen zur Geschichte der Insekten, von Joh. Aug. Ephraim Goze. Leipzig 1776. Tom. I VII. 4.
- Esp. Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen von Eugenius Johann Christoph Esper. Erlangen 1777. 4.
- Fabr. Fabricii, Jo. Christ. Systema Entomologiae Flensburgi et Lipsiae 1775. 8.
 - Joh. Christ. Fabricii Genera Insectorum Chilonii, 1776. 8.
 - Joh. Christ. Fabricii Species Insectorum Hamburgi et Kilonii 1781. 8. Tom. I. II.
- Forst. Novae species Insectorum, Centuria I. auctore Joanne Reinoldo Forstero. Londini 1771. 8.
- Fuest. Joh. Caspar Fuestlins Verzeichnis der ihm bekannten Schweizerischen Insekten. Zürich und Wintersthur 1775. 4.

- Archiv der Insectengeschichte, berausgegeben von Joh-Caspar Füegly. Zürich 1781. 4.
- Magazin für die Liebhaber der Entomologie. 2 Th. 8. Zürich.
- Neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie. Zus rich und Winterthur 1782.
- Geoffr. Histoire abregée des Insectes qui se trouvent aux environs de Paris 1762. T.I II. 4.
- Goez. Entomologische Beyträge zu des Ritters Linné zwölften Ausgabe des Natursystems von Joh. Aug. Ephraim Goeze. Leipzig 1777. 8.
- Harr. Georg Albrecht Harrer Beschreibung derienigen Inssecten, welche Herr D. Jakob Christian Schässer in 250 ausgemahlten Kupsertaseln unter dem Titel Icones Insectorum circa Ratisbonam indigenorum ehes mals in dren Theile herausgegeben hat. Regensb. 1784. 8.

 Museum Harrerianum.
- Huffn. Berlinisches Magazin. Berlin 1765 69. I VI B. 8.
- Kleem. Beytrage jur Natur: oder Insectengeschichte von Christ. Friedr. Aleemann. Nurnb 761. 4.
- Knoch. Bentrage jur Insectengeschichte von Aug. Wilh. Knoch. Leipzig 1781. 8.
- Kram. Guilielmi Henrici Kramer Elenchus Vegetabilium et Animalium per Austriam inferiorem observatorum. Viennae 1756. 8.
- Kühn. Kurze Anleitung, Infecten zu sammlen, entworfen von Aug. Christ. Kühn. Eisenach 1773 8.

- Laich. Joh. Nep. Eblen von Laicharting Verzeichniß und Beschreibung der Eproler Insecten. Zurich 1781. 8.
- Linn. Caroli a Linné Systema naturae. Vindob. 1767. 8.
- List. D. Martin Listers Naturgeschichte der Spinnen übers haupt und der Engelländischen insonderheit, übersest von D. Fr. Heinr. Wilhelm Martini und zum Druck befördert von J. A. E. Goeze. Quedlindurg 1778. 8.
- Müll. Zoologiae Danicae Prodromus seu Animalium Danicae et Norvegiae Indigenorum Auctore Othone Friderico Müller. Havniae 1776. 8.
 - Vermium Terrestrium et Fluviatilium seu Animalium Insusoriorum, Helminthicorum et Testaceorum, non marinorum succincta historia auctore Othone Friderico Müller. Havniae et Lipsiae 1773.
- Naturf. Der Naturforscher. Salle 1774. I XXII. Stuck. 8.
- Pall. P. S. Pallas Neise durch verschiedene Provinzen des Rußischen Neichs. Franks. und Leipz. 1776. I — III. Theil. 8.
- Pod. Infecta Musei Graecensis, quae in Ordines, Genera et Species juxta Systema Naturae Caroli Linnaei digestit Nicolaus Poda. Graecii 1761. 8.
- Roef. Der monatlich herausgegebenen Insecten : Belustisgung von Joh. Aug. Rosel, I IV. Theil. Mürnsberg 1746 1761. 4.
- Schall. Abhandlungen der Hallischen naturforschenden Ges sellschaft. Dessau und Leips. 1783. 8.
- Schiff. Verzeichniß sostematisches der Schmetterlinge der Wiener Gegend, herausgegeben von einigen Lehrern am R. A. Theresianum. Wien 1776. 4.

- Schrank. E. J. Francisci de Paula Schrank. Enumeratio Insectorum Austriae indigenorum. August. Vindel. 1781. S.
- Scop. Johann Anton Scopoli Bemerkungen aus der Natur-Geschichte, erstes Jahr. Aus dem Lateinischen überseit von D. F. E. Gunther. Leipzig 1770. 8.
 - J. A. Scopoli Entomologia Carniolica. Vindobonae
 - J. A. Scopoli Introductio ad Historiam Naturalem.
 Pragae 1777. 8.
- Sulz. Die Kennzeichen der Insecten nach Anleitung des Königl. Schwed. Ritter und Leibarzts Karl Linnaus, erläutert von J. H. Sulzer. Zurich 1761. 4.
 - Dr. Sulzer abgekürzte Geschichte der Insecten nach dem Linnaeischen System. Winterthur 1776. 4.
- Uldm. Novae Infectorum species, quas dissertationis academicae loco, praes. Jo. Leche proponit Jo. Uddmann. Aboae 1753. 4.
- Veet. Johann Euseb. Voets Beschreibungen und Abbildungen hartschaaligter Insecten, überset von D. Georg Wolfgang Franz Panzer. Nürnberg 1785. 4.



of STATE AND A STATE OF THE STATE OF



I. Mammalia.

1. Vespertilio.

öhrige Fledermans. murinus. L. die gemeine Fledermans.

2. Canis.

familiaris. L. der Hund. *) Lupus, L. der Wolf. Vulpes. L. der Fuchs.

3. Felis.

Catus. L. die Rage.

4. Mustela.

Lutra. L. der Fischotter. Martes. L. der Marder. Putorius. L. der Iltis. Erminea. L. das Wiesel. Erminea candida. L. bas hermelin.

s. Ursus.

Meles. L. der Dachs.

6. Talpa.

europaea. L. der Maule wurf.

7. Sorex.

Araneus. L. die Spigs maus.

8. Erinaceus.

europaeus. L. der Jgel.

9. Lepus.

timidus. L. der Hase. Cuniculus. L. das Kas ninchen.

N 3

10. Ca-

Die Thiere mit einem *) bezeichnet, sind ben uns nicht einheimisch, sondern werden nur zuweilen gesehen.

10. Castor.

Fiber. L. ber Biber.

11. Mus.

*) Porcellus. L. das Meerschweinchen.

terreftris. L. die Felde maus.

amphibius. L. die Waf: fermaus.

Rattus. L. die Ratte.

musculus. L. die haus:

avellanarius. L. die Sas felmaus.

gregarius. L. die Feld:

sylvaticus. L. die Holze maus.

12. Sciurus.

vulgaris. L. das Eich:

13. Cervus.

Elaphus. L. der Hirsch. Dama, L. der Damhirsch. Capreolus. L. das Reh.

deplete the control of the control of the

14. Capra.

Hircus. L. der Bod, die Biege.

15. Ovis.

Aries. L. das gemeine Schaaf.

16. Bos.

Taurus. L. ber Dche, Ruh, Ralb.

17. Equus.

Caballus. L. das Pferd. Asinus. L. der Efel.

18. Sus.

Scrofa. L. das Schwein, wilde Schwein.

II. Aves.

19. Falco.

Milvus. L. Milan, Gabs ler.

gentilis. L. Falk. Subbuteo. L. Baumfalk. Alaudarius Briss. Ler:

chenfalt.

Aefalon. Brisf. Schmer: le.

Buteo. L. der Wenhe. Tinnunculus. L. Ros thelgener.

Lithofalco. Brisf. Stein:

Gyrfalco. L. Generfalk. Circus maior. Briss. Huhnergener.

aeruginosus. L. Waffers

maculatus Briss. Golde fuß mit schwarzem Schnabel.

palumbarius. L. Taus bengener.

Nisus. L. Sperber mit gestreifter Brust.

20. Strix.

Bubo. L. Schuhuh.
Otus. L. Horn: Eule.
Scops. L. Ohr: oder
Fuchs: Eule.
Aluco. L. Waldauf.

flammea. L. Schleners

Ulula. L. Stein: Eule. Steinauf.

palferina, bas Rauglein.

21. Lanius.

Excubitor. L. Großer Meuntodter.

Collurio. L. Rothko: pfiger Reuntodter.

rutilus. Brisf. Kleiner rother Reuntodter.

varius Briss. singende Rohe: Wrangel.

22. Corvus.

Corax. L. der größte Rabe.

Corone. L. der gemeine Rabe.

frugilegus. L. Saats trabe.

Cornix. L. Rebelfrahe. Monedula. L. Dohle.

glandarius. L. Balde heber.

Caryocatactes. L. Muß, heher.

Pica. L. Cifter.

23. Coracias.

Garrula. L. Birtheher.

24. Oriolus.

Galbula. L. Rirfchvogel.

25. Cuculus.

canorus. L. Gugfud.

26. Yunx.

Torquilla. L. Ratters winde.

27. Picus.

martius. L. Schwarzer Specht.

viridis. L. Grunfpecht. maior. L. große Bunt: fpecht.

medius. L. Beisspecht. minor. L. Grasspecht.

28. Sitta.

europaea. L. Graufpecht.

29. Alcedo.

Ispida. L. Eisvogel.

30. Upupa.

Epops. L. Wiedehopf.

31. Certhia.

familiaris. L. Baume

32. Anas.

*) Cygnus. L. Schwan. Tadorna. L.

fusca. L. braune Ente. marila. L. Berg Ente. ferus. L. wilde Gans.

*) moschata. L. Bifams

clypeata. L. Loffelente.

Clangula. L. Schnatters Ente.

Glaucion. L. Breitschnas bel.

Penelope. L. Pfeif:Ente. ferina. L. Fasten:Ente. Querquedula. L. große Kriech:Ente. Crecca L. fleine Rriech:

Circia, L. Sommer halb

Boschas. L. gemeine En

fuligula. L. Sauben: Ente.

*) rusicollis Kram. braunkopfige Eis:En: te.

33. Mergus.

merganser. L. Schnarrs

Serrator. L. Langschnas bel.

Castor. L Merrach.

Albellus. L. Boll Ente.

*) Aethiops. Scop. der Mohr.

Gulo. Scop. der Biels frag.

34. Colymbus.

cristatus. L. Landfras gen.

auritus. L. Taucher. fluviatilis Briss. kleiner Seehahn. nigricans. Scop. der schwärzlichte Taucher.

stellatus. Briinn. Ges stirnte Salb: Ente.

Lomvia Brunn. Balgel.

35. Larus.

Tridactylus, L. Winters meme.

Meme. L. fleine graue

cinerarius. L. die große aschgraue Meme.

maevius. L. die geflectte Mewe.

fuscus. L. die braune Mewe.

Atricilla. L. der Spotster.

mewe. L. die Lache

Catarractes. L. der ges ftreifte Struntiager.

36. Sterna.

Hirundo. L. Meers

N 5 nigra

nigra. L. die schwarze Meerschwalbe.

minuta. L. der fleine Rischer.

naevia. L. die Kirrmewe. fissipes. L. der Spalts fuß.

37. Ardea.

Ciconia. L. der weiffe Storch.

nigra L. der schwarze Storch.

Nycticorax. L. Quack, reiher, Focker.

Reiher. L. Purpurs

cinerea. L. gemeiner Reiher.

maior. L. der blaue Reiher.

stellaris. L. Rohrdom:

grifea. L.

minuta. L. kleine Mooß:

38. Tantalus.

Falcinellus. L. der Sie chelschnabel.

39. Scolopax.

Arquata. L. Brache schnepf. Goiffer.

Phaeopus. L. der Regens vogel.

Rusticola. L. der gemeis ne Schnepf.

Gallinago. L. der heers schnepf.

Calidris. L. der Roths

Limosa. L. der gemeine Pfuhlschnepf.

40. Tringa.

Pugnax. L. Streits

Vanellus. L. Gnbig.

Reuter. L. der rothe

Interpres. L. Rothbeine lein.

Oerophus. L. Gruns beinlein.

Hypoleucos. L. Was

41. Charadrius.

Hiaticula. L. Strands

Mori-

Morinellus. L. Possens reiffer.

Pluvialis. L. Grillvogel. Oedicnemus. L. Triel.

42. Fulica.

fusca. L. große Waffers huhn.

atra. L. Blasling.

Chloropus. L. Rhorhens nel mit rothem Blaffel.

43. Rallus.

Crex. L. Wachtel Ko:

aquaticus. L. Sammets huhnlein.

Porzana. L. Wasserhuhn mit kleinen weissen Dupfen.

44. Pavo.

*) cristatus. L. der ges meine Pfau.

45. Meleagris.

Gallopavo. L. Kalekus ter, Truthahn. 46. Phasianus.

Doc marine

Gallus, L. Haushahn, Benne.

Gallus cristatus. L. wall

Gallus ecaudatus. L.

Gallus morio. L. Moh: renhuhn.

Gallus crifpus. L. Straubhuhn.

Gallus pusillus. L.

Kafan. gemeiner

*) Pictus. L. Goldfafan.

*) Nycethemerus. L. Silberfasan.

37. Numida.

*) Meleagris. L. Perle huhn.

48. Tetrao.

Urogallus. L. Auerhahn. Tetrix. L. Birkhahn. Bonasia. L. Hafelhuhn. Perdix. L. Rebhuhn. Coturnix. L. Wachtel. 49. Co-

49. Columba.

Oenas. L. Feldtaube. hispanica. L. Spanische, oder Hühnertaube.

Dasypus. L. Rauchfuß oder Trummeltaube.

gutturofa. L. Kropfe taube.

cucculata. L. Schopf: oder Peruquentaube.

hispida. L. krause oder Stifteltaube.

laticauda. L. Pfauens

gyratrix. L. Purzels

turcica. L. Türkische Taube.

Palumbus. L. Ringels

Turtur. L. Turteltaube. risoria. L. Lachtaube.

so. Alauda.

pratensis. L. Beldlerche.
pratensis. L. Wiesens
Lerche.

arborea. L. Baumlerche. campestris. L. heides lerche. trivialis. L. Pieplerche.
cristata.L. Schopflerche.
spinoletta. L.
Spipola. Kram. Kraute
vogel.
cristata minor Briss.
Waldlerche.

250

si. Sturnus.

vulgaris, L. Staar. Cinclus, L. Bafferamfel.

52. Turdus.

viscivorus. L. Mistel,
Drossel, Schnarrer.
pilearis. L. Kramets,
vogel.
iliacus. L. Beindrossel.
musicus. L. Gingdrossel.
saxatilis. L. Steindross
sel.
roseus. L. Schopfdross
sel.
merula. L. Amsel.
torquatus. L. Ringams

53. Ampelis...
Garrulus. L. Geidens

fel.

54. Loxia.

54. Loxia.

Curvirostra. L. Krum:

Coccothraustes.L. Rern: beiffer.

Pyrrhula. L. Gumpel, Thumpfaff.

Chloris. L. Grunling, Grunfink.

55. Emberiza.

nivalis. L. Schneeams

Miliaria, L. grauer Ams mer.

Citrinella. L. Goldams mer.

Cia. L. Wiesenammer.
Schoeniclus. L. Mooß:
Emerling.

56. Fringilla.

Coelebs. L. Buchfink.
Montifringilla. L. Ings
wiß.
Carduelis. L. Stiegliß.
Canaria. L. Canarienvos

gel.

Marie College

Spinus. L. Zeisig.
Linaria. L. Hänsting.
Petronia. L. Grausink.
domestica. L. Sperling,
Spatz.
Passerculus. Briss.
torquatus. Briss. Rins
gelsperling.
campestris. Briss. Baums
sperling.
Linaria vulgaris Briss.
Steinhänsting.

57. Muscicapa.

Grifola. L. Todtenvos gel.

58. Motacilla.

Luscinia. L. Nachtigall.
modularis. L. Baums
Nachtigall.

curruca. L. Nachtsans ger.

Hippolais. L. grune Grasmucke.

falicaria. L. Weibens

ftelje. weiße Bache

Flava

flava. L. gelbe Bach: ftelge.

Oenanthe. L. Stein:

Rubetra. L. Braunkehle chen.

Rubicola. L. Weißtehl:

Atricapilla. L. Schwarze blattlein.

Phoenicurus. L. Roths schwänzlein.

fchwänzel mit rothges fprengter Bruft.

fuecica. L. Blankehle chen.

Rubecula, L. Rothkehle chen.

Troglodytes. L. Zauns könig.

Regulus. L. Goldhahn:

Trochilus. L. Tyranns gen.

Nothschwänzel.

59. Parus.

cristatus. L. Haubens meise. maior. L. Kohl Spies gelmeise.

meife. L. Blaus

ater. L. Tannenmeise. palustris. L. Plattens meise.

caudatus. L. Schwangs, meife.

60. Hirundo.

rustica. L. Hauss oder StachelsSchwalbe.

urbica, L. Mehlschwals be.

riparia. L. Uferschwals be.

Apus. L. Manerschwals be.

61. Caprimulgus.

europaeus. L. Geißs melfer.

III. Amphibia.

62. Testudo.

orbicularis L. Fluß-

63. Rana.

63. Rana.

Bufo. L. Rrote. Rubeta L. Bafferfrote. temporaria. L. Lands frosch. esculenta. L. Baffer: frosch. arborea. L. Laubfrosch.

64. Lacerta.

agilis. L. Springeidechfe.

aquatica. L. 2Baffereis dechse. palustris L. Sumpfeis dechfe. vulgaris. L. gemeine Gis dechfe. Salamandra. L. Gala: manber.

65. Coluber.

Berus. L. Matter. Natrix. L. Sausnatter. Prefter, L. Bafferschlan: ge.

66. Anguis. Gragilis. L. Blindfcleich. 67. Petromyzon. fluviatilis. L. Rennauge.

2000

68. Acipenser.

Sturio. L. Stor. ruthenus. L. Sterlet. Huso. L. Sause.

IIII. Pisces.

69. Muraena. * Anguilla. L. Mal.

70. Gadus. Lota L. Rutte.

71. Perca.

fluviatilis. L. Perfch ling, Burftel. Lucioperca. L. Echill. Afper. L. Strober. Zingel. L. Zindel. Cernua. L. Pfaffenlaus Schrollen. Schraetser. L. Schreizer. 72. Co-

72. Cobitis.

Barbatulus L. Grundel. Taenia. L. Steinbeiffer. fossilis. L. Bisturn, Wetterfisch.

73. Silurus.

Glanis. L. Scheiben, Wels.

74. Salmo.

Trutta, L. Lachsforelle. Fario. L. Forelle. Hucho. L. Huche. Salvelinus. L. Samling. Thymallus. L. Ansche.

75. Efox.

Lucius. L. Secht.

76. Clupea.

*Harengus? L. Hering. Mus. Schaeffer.

77. Cyprinus.

Barbus, L. Barbe.

Carpio. L. Karpfe.
Tinca. L. Schlene.
Carassius. L. Karausche.
Aphya. L. Greßling.
Rutilus. L. Rothfeder,
Altl.
Orfus. L. Körfling.
Erythropthalmus. L.
Rothauge.
Nasus. L. Rasen, Röss
ling.
Aspius. L. Schied.
Alburnus. L. Beißsisch.
Brama. L. Brachsen.

V. Infecta.

Classis I.

Eleuterata.

78. Lucanus.

Cervus. L. m. et fem. Schröter.
Parrallelepipedus. L.
Caraboides. L.
Hircus. Fuesl.

79. Scarabaeus.

* Nasicornis. L.

cylindricus. L. Fuesslini Harr. Typhaeus. L. Foffor L. scybalarius. Fabr. Subterraneus, L. teffelatus L. fordidus. Fabr. granarius. L. errathicus. L. conspurcatus, L, fimetarius, L. stercorarius. L. vernalis, L. contaminatus. Fuessl. merdarius, Fabr. porcatus. Fabr. foveolatus. Moll. Junaris. L. verticicornis, Laich, nuchicornis. L. Coenobita, Fuessl. Taurus, L. * Sacer. L. * Koenigii. Fabr. Schaefferi. L. Geoffroze, Sulz. thoracocircularis Laich. Schreberi, L. ovatus, L.

80. Trox.

250

fabulofus. L.
hispidus Laich.
pellucidulus. Sulz.
elongatus. Harr.

81. Melolontha,

Fullo. L.
vulgaris. L.
folftitialis. L.
vertumnus. Pall.
auftriaca Fuefsl.
Vitis. Fabr.
Frifchii. Fabr.
horticola. L.
Segetum. Fuefsl,
farinofa. L.
agricola L.
argentea. Fabr.
pulverulenta. Fabr.
ruricola. Fabr.

82. Trichius. fasciatus. L. hemipterus. L.

83. Cetonia. Eremita. L. aurata. Roef.

Sma=

Smaragdus. Bergstr. metallica. Voet. nobilis. L. hirta. L. stictica. Laich.

84. Hister.

unicolor. L.
4 - maculatus. L.
bipustulatus. Schrank.
Pygmaeus. L.
Aeneus. Fabr.
detritus. Fabr.

85. Apate. flavifrons. Fuessl.

26. Dermestes.

lardarius. L.
carnivorus. Fabr.
cadaverinus. Fabr.
murinus. L.
undatus. L.
Pellio. L.
20-guttatus. Fabr.
violaceus. L.
pfyllips. L.
cellaris. Fuefsl.
punctato - striatus.
Geoffr.

87. Bostrichus.

capucinus. L.
typographus. L.
piniperda. L.
microcraphus. L.
fcolytus. Fabr.

88. Byrrhus.

pilula. L. fasciatus. Fuessl. striatus. Forst. varius. Fabr.

89. Anthrenus.

Pimpinellae, Fabr. Scrophulariae, L. Verbasci, L.

90. Anobium.

Fagi. Fuessl. pertinax. L. flavipes. Fabr.

91. Ptinus.

germanus. L.
Fur. L.
rufo-villofus. Laichart.

La-

Latro. Fabr. pedinicornis. L. Scotias, Scop.

92. Bruchus.

2005

Pisi. L. granarius. L. Cisti, Fabr.

93. Elophorus. aquaticus. L.

94. Sphaeridium. scaraboides. L. haemorrhoidale. Fabr.

95. Hispa. * cornigera. Fabr.

96. Nicrophorus.
germanicus. L.
Vespillo. L.

97 Silpha. femorata. Müll.

littoralis, L.

grossa. L.
thoracica, L,
atrata. L,
4- punctata, L,
opaca, L.
pedemontana. Fabr.
obscura. L.
carinata. Fuessi,
scabra, L.
sinuata. Fabr.
rugosa. L.
ferruginea. L.
hirta. Fuessi,

98. Opatrum.

sabulosum, L. flavescens, Fuessl.

99. Coccinella.

unipunctata, Harr. subpunctata, Schrank,

2 - punctata, L.

5 - punctata. L.

6 - punctata. Fabr.

6 - punctata, Schrank,

7 - punctata. L.

7 - maculata. Fabr. constellata. Laich.

3 - punctata, Fabr.

2

12 .

12 - punctata. L. 13 - punctata, L. tessulata. Müll. ocellata. L. conglobata. T. 16 - punctata. L. 18 - maculata. Harr. 22 - punctata. L. 24 - punctata. L. conglomerata. L. 10-guttata. L. 14 - guttata. L. ornata. Fuessl. 20 - guttata. L. oblongo - guttata. L. minima. Müll. 2 - pustulata. Degeer. fasciata L. 4 - pustulata. L. luteo - rubra. Goez. 6 - pustulata, L. 8 - pustulata. Fuessl. pantherina. L. 10 - pustulata. L. 12 - pustulata, Fabr. 14-pustulata. L. tigrina. L.

100. Cassida.

marginella. Fabr. viridis. L. tigrina. Degeer.
nebulofa. L.
ferruginea. Fabr.
rubiginofa. Müll.
nobilis. L.
affinis. Fabr.

101. Chrysomela.

tenebricofa. Fabr. coriaria, Laich, Goettingensis. L. * Adonidis. Fabr. graminis. L. cuprea. Fabr. haemoptera. L. Populi. L. staphylaea. L. Boleti, L. 10 - punctata. L. Fridrichsdalensis. Müll. fimilis. Müll. lapponica. L. polygoni. L. cerealis. L. fastuosa. L. speciosa. L. limbata. Fabr. sanguinolenta L. marginata. L. haemorrhoidalis. L.

versicolora, Laich.
rusicollis, Fabr.
Tanaceti, L.
Alni, L.
Betulae, L.
vitellinae, L.
vulgatissima, L.
aenea, L.
20 - punctata, Fabr.
metallica, Fuessl.
verna Laich.

102. Altica.

oleracea. L.
nigripes. Fabr.
nitidula. L.
atricilla. L.
rufipes. L.
testacea. Fabr.
exoleta. L.
tabida. Fabr.
nemorum. L.
non-striata. Geoffr.

103. Clytra.

longipes. Fabr.
quadripunctata. L.
tridentata. L.
aurita L.
quadrimaculata L.

longimana. L.
bimaculata. Fabr.
rubicunda. Schall.
bucephala. Schall.
cyanea. Fabr.
Scopolina. L.

2000

104. Cryptocephalus.

bipunctatus L. oblongo - guttatus. Fabr. cordiger L. vitis. Fabr. Corylli. L. 6 - punctatus. L. 8 - punctatus. Fuessl. fericeus. L. quadrum, Fabr. vittatus. Fabr. moraei. L. quadripustulatus L. pini. L. bipustulatus. Fabr. labiatus. L. marginatus. Fabr. Hypochaeridis. L. violaceus. Laich. parenthelis. Fuefsl. hieroglyphicus. Laich. parvulus. Müll. flavo-guttatus. Schrank.

3

qua-

quadriguttatus. Müll, quinquepunctatus, Harr. obscurus. Fabr.

105. Ciftela.

ceramboides. L. fulphurea. L.

106. Crioceris.

polygonata. Laichart.
nigricornis. Fabr.
merdigera. L.
rufipes. Fuefst.
12-punctata L.
cyanella. L.
flavipes. L.
Afparagi. L.
campeftris. L.
Xanthopoda. Schrank.

107. Lagria.

hirta. L.

108. Curculio.

femicolon. Fuessl. Pini. L. Iaceae, Fabr.

Colon. Fabr. cruciatus. Fabr. Bufo. Fabr. Bacchus, L. Betulae, L. Populi. L. cupreus. L. pruni. L. rufiroftris. Fabr. frumentarius, L. dorfalis, L. futuralis. Fabra Crux. Fabr. Alliariae, L. granarius L. semipunctatus. Fabr, paraplecticus L. angustatus, Fabr. Afcanii, L. affinis. Schrank, Anthracinus, Laich, Pini minor. Laich. unispinus. Müll, inermis. Müll. aequatus. L. linearis. Fabr. bicolor. Fuefsl. denticulatus. Schrank, Abietis, L. germanus. L. Scrophulariae. L. assimilis, Müll,

- puncratus L. Cerafi. L. violaceus, L. nucum. L. ceraforum, Fabr, Druparum, L. Pomorum. L. Tortrix. L. excavatus. Laich. purpureus, Müll. viridis. L. nebulofus. L. fulciroftris L. incanus. L. 3 - guttatus. Fabr. lineatus. L. hispidulus. Fabr. punctatus, Fabr. obscurus. Fabr. major. Fuessl. cinereus. Schrank. tenebricofus. Fuefsl. candidus. Fuessl. splendidus. Fuessl. bilineatus, Laich. fingularis. Laich. vagus. Laich. mollis. Müll. hinnulus. Schrank. cupreo - fquamofus. Geoffr. Ligustici. L.

fulcatus. Fabr.
gemmatus. Fabr.
Pyri. L.
argentatus. L.
oblongus. L.
rugofus. Geoffr.
tessulatus. Müll.

109. Rhinomacer. curculionoides. Fabr.

110. Attelabus.

Coryli. L. curculionoides. L.

III. Clerus.

mutillarius. Fabr. formicarius. L. apiarius. L.

112. Notoxus.

mollis. L. monoceros. L.

buprestoides. Fabr.

2 4

114.

- × =

114. Prionus.

Faber, L. Frischii Harr. imbricornis. L. coriarius. L.

aedilis. L.
moschatus. L.
cerdo. L.
Scopoli. Laich.
alpinus. L.
nebulosus. L.
hispidus. L.
variegatus. Schrank.
clavipes. Schrank.

116. Lamia.

Textor. L.
Sutor, L.
Koehleri. L.
curculionoides. L.
triftis. Fabr.
fuliginator. L.
pedeftris. L.
Aethiops. Schrank,
fulvus. Schrank.
Scopoli. Fuefsl.

meridianus, L.

ruficollis, Fuefsl.

Inquifitor. L. bifasciatus. Schrank. sycophanta. Schrank. cantharinum. Fuessl. bifasciatum. Fabr. Schaefferi. Laich. Chrysogaster. Schrank.

119. Saperda.

carcharias. L.
fcalaris. L.
oculata. Fabr.
linearis. L.
cylindrica. L.
cylindrica. L.
cardui. L.
populnea. L.
tremula. Fabr.
punctata. L.
praeusta. L.
aeruginosa. Müll.
erythrocephala. Fuess.
bimaculata. Müll.
affinis. Harr.
verna. Müll.

120. Callidium. Bajulus. L. fennicum. L. clavipes. Fabr. violaceum. L. femoratum, L. variabile. L. rusticum. L. sanguineum. L. ftriatum. Fabr. undatum. L. Linneanum Laich, castaneum, Laich. cognatum. Laich. arcuatum. L. arietis. L. figuratum. Harr. plebejum. Fabr. ornatum. Fuessl. funebris, Laich, detritum. L. verbasci. L. mysticum. L. Alni, L. lucidum Scop. mucronatum. Fabr.

121. Donacia.

crassipes. Fabr. simplex. Fabr. assimilis. Schrank. fasciata, Fuessl.

122. Leptura.

= 3%c ==

melanura, L. fimilis, Fuessl. limbata, Laich. sanguinolenta. L. rubra. L. testacea, L. virens, L. scutellata Fabr. nigra. L. quadrimaculata. L. attenuata L. Scopoliana. Laich. armata. Fuefsl. quadrifasciata. L. fex guttata. Fabr. Uddmanniana. Uddm. cerambyciformis.

Schrank.
collaris. L.
thalassina. Schrank.
Chrysomeloides.

Schrank.

abbreviata. Fabr.

dimidiata. Fabr.

umbellatarum. L.

123. Lampyris.

noctiluca L. splendidula L.

124. Pyrochroa.

coccinea. L. fanguinea. L. Aurora. Fuessl.

125. Lymexylon.
navale. Fabr.

126. Cantharis.

fusca. L.
rusipes. Fuessl.
livida. L.
obscura. L.
melanura. L.
pulicaria. Fabr.
nigricans. Müll.
opaca. Müll.
rusa. L.
pallida. Geoffr.

127. Malachius.

aeneus. L.
bipustulatus. L.
affinis. Geoffr.
fasciatus. L.
bifasciatus. Harr.
bipunctatus. Fuessl.

128. Necydalis.

rufa. L.
coerulea. L.
Podagrariae. L.
fimplex. L.
Cantharoides. Schrank.
Pratterana, Schrank.
ftriata. Fuefsl.
uftulata. Schrank.
glaucefcens. L.
fqualida. Scop.
plumbea. Müll.

129. Elater.

ratisbonensis. Harr. ferrugineus. L. aterrimus. L. punctatus. Fuessl. murinus. L. teffellatus. L. fasciatus, L. aeneus. L. pectinicornis. L. cupreus. Fabr. nitens. Schrank. cruciatus. L. castaneus, L. obscurus. L. marginatus. L. thoracicus, Fabr.

haematodes. Fabr.
fanguineus. L.
fanguinolentus. Schrank.
balteatus. L.
fputator. L.
minutus. L.
limbatus. Fabr.
fubfufcus. Müll.
niger. L.
pullus. Müll.
bicolor. Geoffr.
bipuftulatus. L.
cinereus. Fuefsl.
badius. Müll.
dermestoides. L.

130. Buprestis.

mariana, L.
chrysostigma, L.
8 - guttata, L.
austriaca, L.
rustica, L.
plebeia, Fabr.
lugubris, Fabr.
Tenebrionis, Fabr.
Rubi, L.
manca, L.
viridis, L.
biguttata, Fabr.
atra, L.
nitidula, L.

laeta. Fabr.
falicis. Fabr.
cyanea. Fabr.
6 = maculata. Fabr.
haemorrhoidalis.

Fuessl.
berolinensis. Fuessl.
9 - maculata. L.
aurulenta. L.

131. Cicindela.

campestris. L. hybrida. L. germanica. L. biramosa. Fabr.

132. Elaphrns. riparius. L.

133. Hydrophilus.

piceus. L. caraboides. L. fcarabaeoides. L.

134. Diticus.

latissimus. L. amplissimus. Müll. marginalis. L.

femi-

semistriatus. L. sulcatus. L. cinereus. L. bipustulatus. L. Hermanni. Fabr. uliginosus. L. ovatus. L. comma. Müll. ornatus. Fuessl.

135. Gyrinus.

matator. L.

136. Carabus.

coriaceus. L.
violaceus. L.
cyaneus. Fabr.
hortensis. L.
convexus. Fabr.
auratus. L.
granulatus. L.
clatratus. L.
nitens. L.
inquisitor. L.
Sycophanta. L.
cephalotes. L.
leucopthalmus. L.
rusicornis. Fabr.

nitidulus. Schrank. pullus. Müll. virens. Müll. piceus. Müll. varius. Müll. crepitans. L. coerulescens. L. cupreus L. vulgaris. L. latus. L. ferrugineus. L. fexpunctatus. L. spinipes. L. limbatus. Fabr. melanocephalus, L. cyanocephalus. L. crux major. I. crux minor. L. germanus. L. ustulatus. L. lunatus. Fabr. quadriftriatus. Schrank. striato quater maculatus. Geoffr.

137. Blaps. mortisaga. L.

138. Tenebrio. molitor. L.

= 2500 ==

culinaris. L.

139. Helops. lanipes. Fabr.

140. Meloe.

proscarabaeus. L. majalis. L. ratisbonensis. Harr.

141. Lytta.

vesicatoria. L. austriaca. Schrank.

142. Mylabris. polymorpha. Pall.

143. Cerocoma.

Schaefferi. L. Marci. L.

144. Mordella.

aculeata. L. frontalis. L. thoracica. L. flava. L.

fusca. Schrank. barbata. Schall.

145. Staphylinus.

hirtus. L.
murinus. L.
balteatus. Müll.
olens. Müll.
erythropterus. L.
politus. L.
brunnipes. Fabr.
fuscicornis. Müll.
aeneus. Müll.
glaber. Müll.
penetrans. Müll.

146. Oxyporus, rufus. L.

147. Paederus. riparius. L.

II. Classis.

Ul on at a.

148. Forficula.

auricularia. L.

mi-

minor. L.

149. Blatta.

orientalis L. lapponica. L.

150. Mantis.

* religiosa. L.

151. Acrydium.

bipunctatum. L. subulatum. L.

152. Truxalis.

* nafutus. L.

153. Acheta.

gryllotalpa. L. domestica. L. campestris. L. nivea. Degeer.

154. Locusta.

viridissima. L. verrucivora. L. falcata. Schrank.

albopunctata, Harr.

155. Gryllus.

migratorius. L. ftridulus. L. italicus. L. viridulus. L. germanicus. Fabr. coerulescens. L. biguttulus. L. Danicus. L. rufus. L. lunulatus. Scop.

Classis III.

Synistata.

156. Monoculus.

Apus. L. Pulex. L. laevis. Fabr.

157. Oniscus.

aquaticus. L. Afellus. L. Armadillo. L. 158. Lepisma.

faccharina. L.

159. Podura. aquatica. L.

160. Ephemera.

lutea. L.
vulgata. L.
Danica. Müll.
marginata. L.
halterata. Fabr.
horaria. L.
nigra. L.
culiciformis. L.
bioculata. L.
diptera. L.

161. Semblis.

nebulofa. L. bicaudata. L.

162. Phryganea.

striata. L. grandis. L. rhombica. L. bimaculata. L.

flavilatera L. ciliaris. L. filofa. L. minuta. L.

- 26

163. Hemerobius.

perla. L.
chryfops. L.
phalaenoides. L.
hirtus. L.
ruficrus. Schrank.
Lineola. Schrank.
pulfatorius. L.

164. Myrmeleon. formicarium. L. tigrinum. Fabr.

165. Ascalaphus. barbarus. L.

166. Panorpa. communis. L.

167. Raphidia.

168. Cy-

168. Cynips.

2000

aurantii. Geoffr. Geoffroae. Geoffroae.

169. Tenthredo.

connata, Schrank, femorata. L. lutea. L. amerinae. L. fericea. L. fasciata L. nitens. L. marginata, L. marginalis. Harr. rustica. Müll. arcuata. Forft. trifasciata. Geoffr. bifasciata. Geoffr. 5 - fasciata. Harr. enodis. L. cyaneo - crocea. Forft. denticulata. Harr. subpectinata. Harr, pectinata. Harr. pennata, Harr. Iuniperini, L. Scrophulariae. L. wiridis. L. massata, L.

ovata. L. alni. L. coerulescens. Fabr. pavida. Fabr. abietis. L. germanica. Fabr. atra. L. cincta, L. rosae. L. feptentrionalis. L. mesomela. L. erythropus. Schrank. punctum album. Harr. bicincta. L. unicincta, Harr. bimaculata. Geoffr. ligata. Müll. ligatura. Harr. pellucida. Müll. bipunctata. Müll. ferruginea. Müll. campestris. L. erythrocephala. L. fylvatica. L. Populi, L. lucorum. Fabr. faltuum, L.

170. Sirex.

Gigas. L. affinis, Harr.

Juvencus. L. Spectrum. L. Nanus. Müll. Marifcus. L. Camelus. L.

171. Ichneumon.

piforius. L. oppugnatorius. Harr. jubilatorius. Müll. moratorius. Müll. 4 - punctorius Müll. 4 - Maculatorius. Harr. Polyzonias. Forft. extenforius. L. Jaboratorius. Müll. culpatorius, L. ferrugineus, Schrank. criminatorius, Harr. molitorius, L. crifpatorius. L. dubitatorius, Sulz. luctatorius, L. accufatorius. Harr. fasciatorius. Fabr. volutatorius, L. vaginatorius. L. curvatorius, Müll. perfuaforius. L. edomatorius. Harr. iugatorius, Harrr,

fusorius Fabr. deceptorius. Harr. deliratorius, L. falcatorius. Fabr. objurgatorius. Harr. glabratorius. Müll. peregrinator. L. restaurator. Fabr. profligator. Fabr. vespoides. Scop. denigrator. L. defertor, L. excuperator. Harr. peragrator. Harr. manifestator. L. compunctor. L. repugnator. Geoffr. delufor, L. titillator. extensor, L. clavator. Müll. receptor, Harr. certator, Müll. incrassator. Müll. speculator, Harr. refinellae. L. nigrator. Müll, rutilus. L. luteus. L. glaucopterus. L. circumflexus, L. acuminator. Müll. varie-Ą

variegatus. Fabr. longipes. Müll. pugil. L. falcifer. L. assectatus. L. assectatus. Harr.

172. Sphex.

fabulofa. L.
fpirifex. L.
viatica. L.
fusca. L.
gibba. L.
nigra. Fabr.
versicolor. Scop.
trimarginata. Müll.
cinerea. Fabr.
splendida. Müll.
exaltata. Fabr.

173. Scolia.

4 - punctata, Fabr. 4 - Fasciata, Harr.

174. Chrysis.

fulgida. L. ignita. L. inermis. Geoffr.

aurata. L. lucidula. Fabr. nobilis. Scop. cyanea. L.

175. Vespa.

Crabro. L.
vulgaris. L.
hortensis. Geoffr.
sylvestris. Scop.
rufa. L.
parietum. L.
gallica. L.
campestris. L.
interrupta. Harr.
coarctata. L.
biglumis. L.
excavata. Geoffr.
arcuata. Fabr.
bisasciata. L.

176. Crabro.

fpinofus. Fabr.
fosforius. L.
fexcinctus. Fabr.
cribrarius. L.
clypeatus. L.
bimaculatus. Fuessl.
vagus. L.

177. Andrena.

fuccincta. L. bicolor. Fabr. coerulescens. L.

178. Apis.

violacea. L. paludofa. Müll. cardui. Müll. minima. Pod. hortorum. L. collaris. Scop. pratorum. L. lapidaria. L. fylvarum. L. muscorum. L. acervorum, L. alpina. L. senilis. Fabr. albicans. Müll. flavescens. Harr. fulvescens. Harr. flavipes Fuessl. manicata. L. lagopoda. L. pilipes. Fabr. cunicularia, L. mellifica. L. truncorum. L. cineraria. L.

rufa. L.
centuncularis. L.
punctata. Fabr.
marginata. L.
quadridentata. L.
conica. L.
florifomnis. L.
longicornis L.
linguaria. Fabr.
maxillofa. L.
bicornis. L.
annulata. L.

179. Nomada.

ruficornis. L.
variegata. L.
Fabriciana. L.
gibba. Fabr.
Hattorfiana. Fabr.
cingulata. Fabr.
Vespiformis. Scop.
4 - maculata. Harr.

180. Formica.

herculeana. L.
rufa. L.
nigra. L.
fusca. L.
flavipes. Geoffr.

181. Mutilla.

europaea. L. glabrata. Eabr. Acarorum. L.

Classis IV.

Agonata.

182. Astacus. fluviatilis. Fabr.

Classis V.

Unogata.

183. Libellula.

quadrimaculata. L.
flaveolata. L.
fligmatizans. Fabr.
vulgata. L.
depressa. L.
vulgatissima. L.
aenea. L.
quadrisasciata. L.
cyanea. Müll.
Hauniensis. Müll.
rubra. Müll.
Fridrichsdalensis. Müll.

Frumenti. Müll. Harpedone. Sulz. parvula. Müll.

184. Aeshna.

forcipata L. grandis. L.

185. Agnon.

virgo. L. puella. L.

186. Julus.

fabulofus. L.

187. Scolopendra.

forcipata. L. electrica.

183. Trombidium.

holosericeum. L.

189. Aranea.

horrida. Fabr.

domestica. L. labyrinthica. L. 4 - lineata. L. holoserica. L. viatica. L. umbratica, Clerk. margaritata. Clerk. nasuta. List. quadrata. Clerk. octomaculata, Clerk. lunulata. Lift. trifasciata, List. quadrilineata. Lift. cruciata. List. palustris. L. diadema. L. marmorea, Fabr. cucurbitina, L. angulata. L. redimita. L. quadripunctata. L. fericata. Clerk. triangularis. Clerk, lineata. Clerk. variegata. List. hermaphrodita. Lift. montana. L. extensa. L. virescens. L. fandaliata. Lift. virgata. Geoffr. fcenica. L.

fimbriata. L. ramosa. List. literata. Clerk.

190. Phalangium. cornutum. L.

191. Scorpio.

Classis VI.

Glossata:

192. Papilio.

* 1. * Plebeii urbicolae.

malvae. L.
Tages. L.
Fritillum. Schiff.
Sao. Bergstr.
comma. L.
linea. Schiff.
* Brontes. Schiff.
* steropes. Schiff.

* 2. * Heliconii.
Apollo. L.

P 3 Mne-

Mnemofyne, L.

* 3. * Equites.

Polyxena. Schiff. Machaon. L. Podalirius L.

> * 4. * Danai candidi.

Crataegi. L.
Brassicae, L.
Rapae. L.
Sinapis. L.
Daplidice. L.
cardamines. L.

* 5. * Danai Flavi.

rhamni. L. Palaeno. L. Hyale. L.

* 6. * Nymphales gemmati.

Galathea. L. Aegeria. L. Megaera. L. Maera. L. Dejanira. L. Ligea. L. Alexis. Esp. Aethiops. Esp. Jurtina. L. Janira, L. Lycaon. Kühn. Hyperanthus, L. Arcanius. L. Hero. L. Pamphilus. L. Manto. Schiff. Tiphon, Esp. Philoxenus. Esp. Tullia, Müll. Pilosellae, Fabr. Agrestis. Ernst. Semele, L. Athene. Bergstr. Phaedra. L. Brifeis, L. Janthe. Esp. Fidia. L. Hermione L. Proferpina. Schiff.

* 7. * Versicolores.

* Ilia. Schiff.

* Jole. Schiff.

Clytie. Schiff.

* 8. * Maculato fasciati.

Populi. L. Sibylla. L. Camilla. Schiff.

* 9. * Angulati.

Atalanta. L.
Cardui. L.
Jo. L.
Antiopa. L.
Polychloros. L.
Urticae. L.
* Vau album. Schiff.
C. album. L.
Prorfa. L.
Levana. L.

* 10. * Nobiles.

* Pandora. Schiff.
Paphia. L.
Adippe. L.
Aglaia. L.
Niobe. L.
Latonia. L.
Euphrofyne. L.

Dia. L.

2000

* 11. * Variegati.

Phoebe. Schiff.
Agrotera. Bergstr.
Maturna. L.
Hecate. Schiff.
Delia. Schiff.
Athalia. Esp.
Dictynna. Esp.
Cinxia. L.
Didyma. Esp.
Lucina. L.

* 12. * Rutili.

Virgaureae, L.
Hippothoae, L.
Chryseis. Schiff.
Helle. Schiff.
Hipponoe. Bergst.
Phlaeas, L.
Circe. Schiff.

* 13. * Polyophtalmi.

Endymion. Schiff.
Daphnis. Schiff.
Arion. L.

\$ 4

Arcas.

Arcas. Esp. Bycene, Bergstr. Pseudolus, Bergstr. Damon. Schiff. Argiolus. L. Argyphontes. Bergstr. Hylas. Esp. Cyllarus, Esp. Corydon. Esp. Adonis. Schiff. Bellargus, Esp. Alexis. Schiff. Agestis. Schiff. Argus. L. Idas, L. Aegon, Schiff. Baton. Bergstr. Battus. Schiff. Amyntas. Schiff. Oceanus Bergstr. Mamers. Bergstr. Venilia. Bergstr. Cleobis. Sulz. Pampholyge. Bergstr.

* 14. * Subcaudati.

Rubi. L.
Betulae.
Quercus. L.
Pruni. L.
Lynceus. Esp.

193. Sphinx.

* I. Angulatae.

ocellata. L. Tiliae. L. Populi. L.

* 2. * Fasciatae.

Ligustri. L. Pinastri. L.

Atropos. L.

* 3. * Semifasciatae.

Euphorbiae. L.

Gallii. Schiff.

* 4. * Subcaudatae.

Nerii. L. Elpenor. L. Porcellus. L.

* 5. * Caudiberbes.

* Oenotherae, Schiff. stellatarum, L.

194. Se si a.

Bombyliformis. Esp.
Fuci-

Fuciformis. L. Apiformis. L. culiciformis. L. tipuliformis, L. Tenthrediniformis Sch. Afiliformis, Schiff. * fenestrina, Schiff.

195. Zygaena.

Minos. Schiff. Achilleae. Esp. Viciae, Schiff. Peucedani. Esp. Filipendulae. L. Onobrychis, Schiff. * Fausta. L. Aeacus. Schiff. Coronillae, Schiff. Phegea. L. statices. L.

196. Bombyx.

* 1. * Lunigerae.

Mori. L. versicoloria. L. bicoloria, Schiff. * Tremula. L. Tau. L.

* 2. * Pavoniae.

Spini, Schiff. carpini. Schiff.

2000

* 3. * Subnudae.

mundana. L. morio. L.

* 4. * Albidae.

Salicis. L. Chryforrhaea. L. Auriflua. Schiff. Monacha. L. Dispar. L.

* 5. * Nobiles.

Caia. L. Hebe. L. Hera. L. Plantaginis. L. Hospita. Schiff. * matronula, L. Aulica. L. villica. L. Dominula. L. Purpurea, L. Fuliginofa, L. grammica. L. P 5

Ruf-

Ruffula. L.

* 6. *. Luteopedes.

Lubricipeda. L. Menthastri. Schiff.

* 7. * Tentipedes.

Pudibunda. L. Fascelina. L. Coryli. L. Antiqua. L. Gonostigma. L.

* 8. * Signatae.

curtula. L.

* 9. * Dendatae.

Quercifolia. L.
Populifolia. Schiff.
Betulifolia. Esp.
Pruni. Esp.
Pini. L.

* 10. * Centropunctae.

Potatoria. L. Rubi. L.

Quercus. L. Trifolii. Schiff.

* 11. * Tomentosae.

Lanestris. L.
neustria. L.
Eueria. Knoch.
rimicola. Schiff.
Crataegi. L.
Populi. L.

* 12. * Capitones.

Bucephala. L. Oleagina. Schiff. caeruleocephala. L.

* 13. * Albocinatae.

Cossus. L. Aesculi. L.

* 14. * Lanceolatae.

Humuli, L. Hecta, L. Lupulina, L.

* 15. * Erosae. Libatrix. L. Palpina. L.

* 16. * Dorsodentatae.

Dictaea. L.
Argentina. Schiff.
Camelina. L.
Ziczac. L.
Dromedarius. L.

* 17. * Flexuosostriatae.

Fagi. L. Vinula. L. Furcula. L.

* 18.* Geometriformes.

Falcula. Schiff. Lacertula. Schiff. emarginata. Naturf.

197. No Eua.

* 1. * Nubilae.

Tridens. Schiff.
Pfi. L.
Rumicis. L.
Aceris. L.

Alni. L. Leporina. L.

* 2. * Tineiformes.

Quadra. L.
unita. Schiff.
Luteola. Schiff.
complana. L.
Irrorea. Schiff.
Pulchra. L.
rubicunda. Schiff.
Rubricollis. L.
Jacobeae. L.

* 3. * Variegatae.

Ludifica. L. Aprilina. L.

* 4. * Maculatae.

bimaculofa. L. oxyacanthae. L. Runica. Schiff. Batis. L. Perficariae. L. oculea. Fabr.

* 5. * Familiares.

Pyramidea. L.

6.

* 6. * Griseovariae.

Polyodon. L.
Monoglypha Knoch.
Flavic neta, Schiff.
Chi. L.
Atropos. Kleem.

* 7. * Cucullatae.

Verbasci. L. Abrotani. Schiff. Umbratica. L.

* 8, * Ligni colores. Exfoleta. L.

* 9. * Atrosignatae.

Nun atrum. Schiff. Fimbria. L. Janthina. Schiff. Pronuba. L. Myrtili. L.

* 10. * Rusticae.

Exclamationis. L. Segetum. Schiff. Brassicae, L.

* 11. * Venosae.

Pinastri. L. graminis. L. Typica. L. Atriplicis. L. Pisi. L.

* 12. * Trigonophorae.

Meticulofa. L. Rivularis. Fabr. Dissimilis. Knoch.

* 13. * Heliophilae.

Turca. L.
trilineata. Schiff.
virens. L,
L. album. L.
Pallens. L.

* 14. * Badiae.

Vaccinii. L. fatellicia. L.

* 15. * Aureolae.

Fulvago, L.

* 16. * Undatae.

Oo. L.
Derafa. L.
Flavicornis. L.
Delphinii. L.
Diffinis. L.
Affinis. L.

* 17. * Aequivocae.

Dipsacea. L. Alchymista. Schiff. Solaris. Schiff.

* 18. * Festivae.

Maura. L.
Fraxini. L.
Nupta. L.
Sponfa. L.
Promissa. Schiff.
* Paranympha. L.
Parthenias. L.

* 19. * Submetallicae.

Triplasia.

* 20. * Metallicae.

* Festucae. L.

Chrysitis. L. circumslexa. L. Gamma. L. Sulphurea. Schiff.

* 21. * Geometriformes.

Glyphica. L. Mi. L.

198: Geometra.

* 1. * Bistriatae.

Fasciaria. L.

* 2. * Albolineatae.

Papilionaria. L.
Cythifaria. Schiff.
Vernaria. L.
Bupleuraria. Schiff.
Thymiaria. L.
Bajularia. Schiff.
viridata. L.

* 3. * Bombyciformes.

Prodromaria. Schiff. Betularia. L.

* 4. *

* 4.* Crenato striatae.

Repandaria. L. alternata. Müll. fuffuscata. Klemm.

* 5. * Rectofasciatae.

Vespertaria. L.
Aureolaria. Schiff.
Palumbaria. Schiff.
Purpuraria. L.
Purpurata. Fabr.
Elinguaria. L.
Gilvaria. Schiff.
luridata. Naturf.
Pennaria. L.

* 6. * Angulatae.

Sambucaria. L.
Alniaria. L.
Quercinaria. Huffn.
Amataria. L.
Lunaria. Schiff.
Syringaria. L.
Emarginata. L.
Crataegata. L.
Dolabraria. L.
Prunaria L.
fordiata. L.

* 7. * Pulverulentae.

Atomaria, L.
Piniaria, L.
Wauaria, L.
Punctulata, Schiff.

* 8. * Alternantes.

Pusaria. L. Artemisaria. Fuessl.

* 9. * Undatae.

Brumata. L.
Hexapterata. Schiff.
Undulata. L.
Bilineata. L.

* 10.* Mediofasciatae.

cervinata. Schiff. Mensuraria. Schiff. Plagiata. L. Bipunctaria. Schiff.

* 11. * Angulato fasciatae.

Moeniaria. Schiff. chenopodiata. L. comitata. L. Ocellata. L.
Populata. L.
Prunata. L.
Hastata. L.

* 12. * Subfasciata.

fluctuata. L.
Albicillata. L.
Groffulariata. L.
Fasciaria, Harr.
Pantaria. L.
Maculata. Schiff.

* 13. * Unicolores.

Griseata. Schiff. Dealbata. Schiff.

* 14.* Arcuatostriatae.

Vibicaria. L.
Remutata. L.
ferpendata. Huffn.
immutata. L.
incanata. L.
Ornata. Schiff.

199. Pyralis.

Proboscidalis, L. Tentaculalis, L.

Rostralis. L. Bombycalis. Schiff. Glaucinalis. L. Grisealis. Schiff. Pinguinalis. Schiff. Dentalis. Schiff. verticalis. L. Flavalis. Schiff. Urticalis. Schiff. Nymphacalis. Schiff. Limbalis. Schiff. Potomogalis. L. Coronalis. Huffn. Forficalis, L. Fenestralis. Harr. corticalis. Schiff. Lemnalis, L. cingulalis, L. Cespitalis. Schiff. Farinalis, L. flammealis. Schiff. fanguinalis. Schiff. Purpuralis. L. Quadripunctalis. Schiff. Pollinalis. Schiff. Guttalis. Schiff.

200. Tortrix.

Quercana. Schiff. Prasinana. L. viridana. L.

Clorana, L. Literana, Schiff. Pomonana. Schiff. Arcuana, L. Hamana, L. costana. Schiff. Avellana, Schiff. christierna. L. Rofana, L. Schaefferiana. Harr. Logiana. L. Cynosbana. L. cinctana. Schiff. variegana. Schiff. Treueriana. Schiff. Linneana. Schiff. salicana. L. circulana. Harr. Rusticana. Harr. chaerophyllana, Fabr. Heracliana, L.

201. Tinea.

Muscella. Schiff.
Margaritella. Schiff.
Perlella. Schiff.
straminella. Schiff.
Pratella. L.
Ahenella. Schiff.
Petiverella. L.
Bracteella. Schiff.

Schrankella, Harr.
Carnella, L.
Evonymella, L.
Padella, L.
Frischella, L.
Atrella, Schiff.
Pusiella, L.
Swammerdamella, L.
Tapezella, L.
Flavisrontella, Schiff.
Calthella, L.
Taedella, L.
Degeerella, L.
Reaumurella, L.

202. Alucita.

Didactyla. L.
Ochrodactyla. Schiff.
Trichodactyla. Schiff.
Hexadactyla. L.
Pentadactyla. L.

Classis VII.

Ryngota.

203. Fulgora.

* europaea. L.

204. Membracis.

aurita. L. cornuta. L.

205. Tettigonia.

plebeia, L. haematodes. L. Montana. Scop.

206. Cicada.

Haemorrhoa. Schrank.
Aethiops. Schrank.
leucocephala. L.
viridis. L.
fenestrata. Schrank.
Rosae. Fabr.

207. Cercopis.

sanguinolenta. L. spumaria. L. gibbosa. Geoffr. Populi. L.

208. Notonecta.

Glauca. L. Minutissima. L. 209. Sigara. striata. L.

210. Nepa.

cinerea. L. linearis. L.

211. Naucoris.

212. Acanthia.

lectularia. L. clavicornis. L. Betulae. L. crassipes. Fabr. corticalis. L.

213. Cimex.

lineatus. L.
Frischii. Schrank.
maurus. L.
Schrankii. Goez.
variegatus. Geoffr.
Scaraboides. L.
litura. Fabr.
rusipes. L.
luridus. Fabr.

nigri-

nigricornis. Fabr. haemorrhoidalis. L. marginatus. L. Haemogaster. Schrank. quadratus. Fabr. denticulatus. Scop. pudicus. Schrank. prasinus. L. diffimilis. Fabr. iuniperinus. L. grifeus. L. Baccarum, L. Depurpureipennis. geer. festivus. L. Dominulus. Harr. Horologium. Harr. bicolor. L. albomarginatus. Schr. oleraceus. L. flavatus. Schrank. coeruleus. L. aeneus. Scop. morio. L. acuminatus. L. equestris. L. Hyosciami. L. apterus. L. calcaratus L. Pini L. Rolandri. L. lynceus, Fabr.

crafficornis. L. Coryli, L. campestris. L. pratenfis. L. tripustulatus. Fabr. faltatorius. L. ater. L. flavicollis. Fabr. trifasciatus, L. gothicus. L. capillaris. Fabr. faxatilis. L. tripunctatus. Müll. agilis. Schrank. Pandurus, Scop. tessellatus. Geoffr. laevigatus. L. virens. L. marginellus. Fabr. striatus. L. fusco - fasciatus. Geoffr. flavo quadrimaculatus. Degeer. Tipularius. L.

214. Reduvius.

personatus. L. annulatus. L. iracundus. Fabr.

215. Pulex. irritans. L.

216. Aphis.

Ribis. L.
Salicis. L.
Quercus. L.
Rosae. L.
Viburni. Fabr.

217. Chermes.
Alni. L.

218. Coccus.

Betulae. L. Hesperidum. L.

219 Thrips.

Phyfapus. L. Ulmi. Fabr.

Classis VIII.

Antliata.

220. Oestrus.

Bovis. L.

haemorrhoidalis. L.

2000

221. Tipula.

pectinicornis. L. Idriensis. Scop. rivofa. L. 4 - maculata, L. crocata, L. hortorum. L. oleracea, L. inquieta. Scop. flava. Geoffr. contaminata. L. lunata, L. pratenfis. L. cornicina. L. atrata. I.. nigra. L. annulata, L. flavescens. L. lineata. Scop. diluta. Müll. tenera. Müll. tarda. Miill. ferruginata. L. hortulana. L. marci. L. febrilis, L. Pomonae Fabr. crassipes. Müll.

222. Bibio.

plebeia. L.
marginata. Fabr.
anilis. L.
nigrita. L.
morio. L.
Anthrax. Schrank.
Satyrus. Fabr.
maura. L.
hottentotta. L.

223. Stratiomys.

chamaeleon. L.
Ephippium, Fabr.
microleon. L.
ftrigata. Fabr.
hydroleon. L.
viridula. Fabr.
hypoleon. L.
olens. Fuefsl.
marginata. Harr.
maculata. Harr.

-222

224. Rhagio.

fcolopaceus. L.
tringarius. L.
vermileo. L.
luteus. Harr.
hemisphericus. Harr.
diadema. L.

225. Syrphus.

mystacea. L.
pennata. Scop.
sonora. Müll.
Zonaria. Pod.
trisasciata. Scop.
quadrisasciata. Harr.
pertinax. L.
lappona. L.
tricincta Müll.
pendulus. L.
sloreus. L.
subcoleoptratus. L.
nemorum. L.

= 2000 ==

arbuftorum. L. tenax, L. oestraceus, L. fallax. L. fylvarum. L. bicinctus, L. arcuatus, L. fimilis. Geoffr. devius. L. fegnis. L. conopfeus. Fabr. elongatus. Fabr. diophtalmus. L. festivus. L. gibbofa. L. Ribesii, L. Pyrastri. L. Thymastri. Fabr. mellinus, L. scriptus. L. pipiens. L. albomaculatus. Fabr. vulgaris. Scop. vespiformis. L.

fuscus. Schrank.
bimaculatus. Harr.
fepulcralis. L.

226. Musca.

pellucens. L. meridiana. L. Caefar, L. Caesarina, Scop. mortuorum. L. vomitatoria. L. fera. L. grossa. L. rotundata. L. tremula. L. Larvarum. L. brafficaria. L. canicularis, L. Cemeteriorum, L. pluvialis. L. roralis, L. meteorica, L. putris. L.

2 3

cupra-

2000

cupraria. L. formofa. Scop. annexa. Müll. polita. L. ungulata. L. nobilitata. L. cucularia. L. scybalaria. L. stercoraria. L. fimetaria. L. parietina. L. vibrans. L. cynipsea. L. graminum. Fabr. dorfalis. Fabr. feminationis, Fabr. flava. L. folftitialis. L. Apiformis. Schrank. falcata, Scop. faltatrix. L. domestica. L. carnaria, L. fasciata. Müll.

pyritofa. Harr. cornuta. Harr. lateralis. L. transfuga. L. deceptoria. Scop. chrysorrhaea. Scop. murina. Schrank. tuberculata. Müll. pilosa. Harr. 5 - punctata, Harr. 4 - punctata. Harr. praeceps. Scop. 5 - fasciata, Harr. vulpina. Fabr. maculata. L.

227. Tabanus.

pellitus. Sulz.
bovinus. L.
autumnalis. L.
Bromius. L.
rusticus. L.
tropicus. L.

pluvialis. L.
bidentatus. Fabr.
coecutiens. L.
lugubris. L.
oculatus. Harr.
albipes. Schrank.

228. Asilus.

crabroniformis, L. gibbosus. L. ater. L. flavus, L. gilvus. L. marginatus. L. plumbeus. Fabr. forcipatus. L. germanicus. L. teutonus. L. Oelandicus, L. niger. Scop. aestivus. Schrank. nigerrimus. Schrank. ratisbonensis. Harr. culiciformis. Fabr.

229. Conops.
Vesicularis. L.
aculeata. L.
macrocephala. L.
flavipes. L.

2000

230. Stomoxys.

Siberita. Fabr.

calcitrans. L.

irritans. L.

231. Myopa.

ferruginea. L. testacea. L. buccata. L.

pipiens. L. lutescens. Fabr. pulicaris. L.

mucronata. Scop.

233. Empis.

pen-

2000

pennipes. L. livida. L. flava. L.

234. Bombylius.

maior. L.
medius. L.
capenfis. L.
minor. L.
ater. L.
hyalinus. Harr.

235. Hippobosca.

equina. L.
avicularia. L.
Hirundinis. L.

236. Pediculus. humanus. L. pubis. L.

237. Acarus. Ricinus, L. Dysenteriae. L. baccarum. L.

VI. Infuforia.

238. Vorticella.

Piriformis. Müll. convallaria. L.

239. Brachionus. urceolaris. L.

VII. Helminthica.

viridis. L.

fusca. L.

241. Tubularia. repens. Müll.

242. Nais.

Proboscidea. Müll.

Bar-

Barbata, Müll.

243. Lumbricus.

Terrestris, L. Tubifex, Müll.

244. Ascaris.

vermicularis. L. Lumbricoides. L.

245. Hirudo.

medicinalis. L. Sanguisuga. L. Piscium. Müll.

246. Fasciola.

Hepatica. L.

VIII. Testacea.

247. Limax.

ater. L.

cinereus. Müll.
Agrestis. L.
reticulatus. Müll.

248. Helix.

Pellucida. Müll. obvoluta. Müll. rotundata. Müll. Nitida, Müll. Ericetorum. Müll. striata, Müll. lapicida. Müll. Pomatia, L. Nemoralis, Müll. Hortenfis, Müll. Arbustorum. Müll. Incarnata. Müll. Succinea. Müll. Detrita. Müll. Perversa. Müll.

249. Buccinum.

Pere-

Auricula. Müll.

Peregrinum. Müll.
Palustre. Müll.
stagnale. Müll.

250. Planorbis.

Purpura. Müll.
carinatus. Müll.
Vortex. Müll.
umbilicatus. Müll.
gelatinus. Müll.

251. Nerita.

Elegans. Müll.
Licinia, Müll.
minuta. Müll.
vivipara, Müll.
Jaculator. Müll.
fluviatilis. Müll.
faciata. Schroet.

lineata. Schroet.

252. Ancylus.


lacustris. Müll. rubro - maculata. Schr.

253. Tellina.

rivalis. Müll. lacustris. Müll. amnica. Müll.

254. Mytilus.
Anatinus. Müll.
cygneus. Müll.

255. My a. margaritifera, Müll. Pictorum, Müll.



Nahmen : Verzeichnis

ber

Pflanzen,

welche

in unfrer Gegend wachfen.

Mahmens Arerseishung



Benüzte Bücher.

Caroli a Linne Systema vegetabilium cet. Edit. XIV. cur. Murray. Gottingae 1784.

Onomatologia botanica completa, oder vollständiges botanis sches Wörterbuch von einer Gesellschaft erfahrner Pflanzenkundiger, 9 Hände. 8. Frankf. und Leipzig 1772 — 78.

Fr. W. a Leyser Flora Halensis. 8. Halae Salicae 1783. Andr. Jo. Retzii Observat. botanic, Lips.

I Classis. Monandria.

Callitriche,
verna, Frühlingswasserstern.
Blitum,
* capitatum, köpfige Beermelde.

II Classis, Diandria.

Jasminum, * officinale, gemeiner Jasmin.

Li-

Die Pflanzen mit * bezeichnet wachsen nicht wild, sons dern werden in unseren Garten gezogen oder im Freven angebant. Ligustrum,

vulgare, Sartriegel.

Syringa,

vulgaris, spanischer Flieder oder Holler.

* perfica, perfifcher Flieder.

Circaea,

lutetiana, großes Berenfraut.

Veronica,

spicata, ahrenformiger Ehrenpreis.
officinalis, gewöhnlicher Ehrenpreis.
serpyllifolia, quendelblattericher E.

Beccabunga, Bachbungen.

Anagallis, Gauchheilblattericher E. Waffers gauchheil.

Teucrium, gamanderartiger E. blauer Gas mander.

Chamaedrys, wilder Gamander. agrestris, Acker: Ehrenpreis. arvensis, Feld: Ehrenpreis. hederaesolia, ephenblattericher E. triphyllos, drenblattericher E.

Gratiola,

officinalis, gewöhnliches Gnabenfraut.

Pinguicula,

vulgaris, gemeines Fett ober Butterfraut.

Verbena,

officinalis, gemeines Gifenfraut.

Lycopus,

europaeus, gemeiner Wolfsfuß, Wasserandorn.

Rosmarinus.

* officinalis, Rosmarin.

Salvia,

* officinalis, gemeiner Salben. pratensis, Wiesensalben.

* Sclarea, Muscatellerfraut.

Anthoxanthum, Ruchgras.

III Classis. Triandria.

Valeriana,

dioica, Sumpfbaldrian.
officinalis, gewöhnlicher Baldrian.
Locusta, Ackersalat.

Crocus,

* fativus, gemeiner Safran.

Gladiolus,

communis, gemeiner Echwerdtel.

Iris,

germanica, deutsche Schwerdlilie. pseud - Acorus, gelbe Wasserschwerdlilie.

Cyperus,

flavescens, gelbe Eppernwurgel.

Scirpus,

palustris, Sumpfbinsen.
caespitosus, Rasensemsen.
lacustris, Seebinsen.
setaceus, borstenartige Semsen.
Caricis Retz. Riedgras ahnliche Semsen.
sylvaticus, Waldsemsen.

Eriophorum,

polystachion, vielahriges Wollgras.

Nardus,

ftricta, fleifes Borften ober Marbengras.

Phalaris,

phleoides, lieschartiges Glanzgras. arundinacea, rohrartiges Glanzgras.

Panicum,

verticillatum, quirlformiger Schwaben. glaucum, eisengrauer Schwaden. viride, gruner Schwaden. Crus galli, Hahnenfuß.

* miliaceum, gemeiner Birfen.

Phleum,

pratense, Wiesenlieschgras.
nodosum, knotichtes Lieschgras.

Alopecurus,

pratensis, Wiesen : Fuchsschwanz. geniculatus, kriechender Wassersuchsschwanz.

Milium,

effusum, Waldhirfen.

Agrostis,

spica venti, Acker: Strausgras. arundinacea, rohrartiges St. stolonisera, auslaufendes St. capillaris, haarformiges St.

Aira.

aquatica, Wasser: Schmielen.
caespitosa, rasenartige Sch.
slexuosa, gebogene Schmiele.
canescens, graue Sch.
praecox, frühe Schmiele.
caryophyllea, Regleinschmielen.

Melica,

ciliata, mit Haaren eingefaßtes Perlgras. nutans, überhängendes Perlgras. uniflora Retzii, einblumiges Perlgras. coerulea, blaulichtes Perlgras.

Poa,

aquatica, Wasser Rispengras. trivialis, Weg R. angustisolia, schmalblätterichtes R. pratensis, Wiesenrispengras. annua, iähriges R. compressa, zusammengedrücktes R. nemoralis, Wald R. cristata, hahnenkammartiges R.

Briza,

media, mittleres Zittergras.

Dattylis,

glomerata, fnauelformiges hundegras.

Cynofurus,

cristatus, steifes Rammgras. coeruleus, blaues Rammgras.

Festuca,

ovina, Schaaf: Schwingel.
duriuscula, hartlichter Schwingel.
elatior, erhabener Schwingel.
decumbens, darniederliegender Schwingel.
fluitans, Mannaschwingel.

Bromus,

secalinus, Roggentresp.
mollis, weicher Tresp.
sterilis, unfruchtbarer Tresp.
arvensis, Ackertresp.

Bromus,

giganteus, Futtertresp. pinnatus, gesiederter Tresp.

Stipa,

pennata, gefiedertes Spartogras.

Avena,

elatior, Wiefenhaber.

* fativa, gemeiner Saber.

fatua, rifpenformiger Windhafer.

pubescens, haariger ziemlich ährenformiger Safer.

flavescens, Goldhafer. pratensis, Wiesenhafer.

Arundo,

phragmitis, Schilf. gemeines Rohr.

Lolium,

perenne, Winter : Lolch. temulentum, Sommer : Lolch, Tollkorn.

Secale,

* cereale, Roggen.

Hordeum,

* vulgare, gemeine Gerste.
murinum, Maufegerste.

fecalinum, Leyss. Rocken abnliche Gerfte.

Triticum,

* aestivum, Commermaigen.

* hybernum, Winterwaizen. repens, Queden, Grasmurgel.

Holosteum,

umbellatum, boldenformige Spurre, Suhner-

IV. Classis. Tetrandria.

Dipsacus,

fullonum, Walker ober Kartenbiftel.

Scabiosa,

fuccifa, Tenfelsabbiff. arvensis, Acker : Scabiose. sylvatica, Wald : Scabiose. columbaria, blane Scabiose.

Scherardia,

arvenfis, Scherardische Ackerpflange.

Asperula,

odorata, wahrer Waldmeister. arvensis, Acker: Waldmeister. tinctoria, Färber: Waldmeister. cynanchica, Bräunewurzel.

Galium,

palustre, Sumpf, Labkraut.
uliginosum, morastiges Labkraut.
spurium, unächtes Labkraut.
verum, wahres Labkraut.
Mollugo, breitblätterichtes Labkraut.
sylvaticum, Waldlabkraut.
glaucum, eisengraues Labkraut.
boreale, mitternächtliches Labkraut.
Aparine, Klebkraut.

Rubia,

* tinetorum, Farberrothe.

Plantago,

maior, großer Wegerich. media, mittlerer Wegerich. lanceolata, spikiger Wegerich.

Plan-

Plantago,

Pfyllium, Flohfaamen.

Sanguisorba,

officinalis, gewöhnlicher Wiefenknopf.

Cornus,

mascula, gemeiner Derlenbaum; Cornelfirschen. sanguinea, wilde Durlizen.

Alchemilla,

vulgaris, gemeiner Sinau.

Aphanes,

arvenfis, Acter: Frauenmantelgen.

Cuscuta,

europaea, europaische Flachsfeibe.

Potamogeton,

natans, schwimmendes Samkraut. perfoliatum, durchstochenes Samkraut. densum, dichtes Samkraut. lucens, glänzendes Samkraut.

Sagina,

procumbens, gestrectes Mastraut.

V. Classis. Pentandria.

Myofotis,

scorpioides, scorpionartiges Mauschrlein. a arvensis, Acker, Mauschrlein. b palustris, Vergiß mein nicht. Lappula, Rivinisches M.

Lithospermum,

officinale, gewöhnlicher Steinfaamen. arvense, Acter Steinfaamen.

Anchusa,

officinalis, gewöhnliche Dehfenzunge.

Cynoglossum,

officinale, gewöhnliche hundszunge.

Pulmonaria,

officinalis, gewöhnliches Lungenkraut.

Symphytum,

officinale, gemeine Schwarzwurzel. tuberosum, knolliger Beinwell.

Cerinthe,

maior, größere Wachsblume.

Borago, officinalis, gemeiner Boretsch.

Lycopsis, arvensis, Acter : Wolfsgesicht.

Echium,

vulgare, gemeiner Otternkopf.

Primula,

veris, Schluffelblume.

* Auricula, Aurifeln. farinofa, mehlige Schluffelblume.

Menyanthes, trifoliata, Biberffee.

Lysimachia, Mandala miliotana

vulgaris, gemeiner Weiderich.
nemorum, Hainlysimachie.
Nummularia, Wiesengeld.

Anagallis, arvensis, rother Gauchheil.

arvensis, Ackerwinde.

Campanula,

rotundisolia, rundblåtterichte Glockenblume. patula, schwedische Glockenblume. Rapunculus, Rapunzel Glockenblume. persicisolia, Glockenblume mit Pfirsichbaums blåttern.

rapunculoides, rapunzelartige Glockenblume. Trachelium, Glockenblume mit Nesselblattern, glomerata, angehäufte Glockenblume. * Medium, Wald : Glockenblume. Speculum, Frauenspiegel.

Phyteuma,

fpicata, abrichte Rapungel.

Lonicera,

caprifolium, Geisblatt. Xylosteum, Bedenkirsche.

Verbascum,

Thapsus, Wollkraut, Königskerze. Lychnitis, lichtrösgenartige Königskerze. nigrum, schwarze Königskerze. Blattaria, Schabenkraut.

Datura,

stramonium, Stechapfel.

Hyoscyamus,

niger, fcmarges Bilfenfraut.

Nicotiana,

* Tabacum, Tabacf.

Atropa,

Belladona, Tollbeeren.

Rhy Salis,

Alkekengi, gemeine Judenkirsche.

Solanum,

Dulcamara, Bitterfüß,

* tuberosum, Erdbirn, Kartoffeln, nigrum, schwarzer Nachtschatten.

Capsicum,

annuum, Spanischer Pfeffer.

Rhamnus,

catharticus, abführender Rreugdorn, Wegdorn. Frangula, Faulbaum.

Evonymus,

europaeus, europaischer Spindelbaum.

Ribes,

rubrum, Johannesbeere, Fürbizelstaude. Groffularia, Stachelbeere. Uva crispa, frause Stachelbeere.

Hedera,

Helix, Epheu.

Vitis,

* vinifera, Weinstod.

Thefium,

Linophyllum, gemeines Leinblatt.

Vinca,

minor, fleines Ginngrun.

Asclepias,

Vinceto xicum, Schwalbenwurzel.

Herniaria,

glabra, glattes Bruchfraut.

Chenopodium,

Bonus Henricus, guter Beinrich. urbicum, Stadte Gansefuß. rubrum, rother Ganfefuß. murale, Maurenganfefuß.

R 4

album,

album, weißer Gansefuß.
viride, gruner Gansefuß.
hybridum, unachter Gansefuß.
* Botrys, Tranbenkraut.
glaucum, eisengrauer Gansefuß.
Vulvaria, stinkeude Melde.

Beta,

vulgaris, gemeiner Mangold.

Ulmus,

campestris, Feld: Ulmbaum, Rufter.

Gentiana,

Pneumonanthe, Berbft: Engian; Lungenblum.

* acaulis, ftammlofer Engian.

verna, Frühlings: Enzian.

bavarica, bagrifcher Engian.

Centaurium, Taufendguldeufraut.

Amarella, bitterer Engian.

ciliata , Simmelftengel.

Cruciata , Rreugengian.

filiformis, fadenformiger Engian.

Eryngium,

campeftre, Feld: Mannstren.

Sanicula,

europaea, europaischer Sanikel.

Astrantia,

maior, große Affrang.

* minor, fleine Aftrang.

Bupleurum,

rotundifolium, rundblatterichtes Safenohrlein. longifolium, langblatterichtes Safenohrlein.

Tordylium,

Anthriscus, Bettellaus.

Caucalis,

daucoides, mohrenartiger Klettenkorbel.

Daucus,

Carota , gemeine Mohre.

Conium,

maculatum , geflecter Schierling.

Selinum,

Carvifolia, Gilge mit dem Feldfummelblatt.

Athamantha,

Libanotis, libanotisches Bogelneft.

Cervaria, hirschwurzel.

Oreofelinum, Bergpeterfilie.

Peucedanum,

officinale, gewöhnlicher harastrang.

Silaus, Gilau.

Laserpitium,

latifolium, breitblatterichtes Laferkraut.

Heracleum,

Sphondylium, beutsche Barenflau.

Angelica,

fylveftris, Bald: Engelwurgel.

Sium.

latifolium, breitblatterichter Baffermert.

* Sifarum , Buckermurgel.

Falcaria, Sichelfraut.

Oenanthe,

fiftulofa, holrochrichte Rebendolde.

Phellandrium,

aquaticum, Bafferpferdfaamen, Bafferfenchel.

Cicuta,

virosa, giftiger Buterich.

Aethusa,

Cynapium, Gleiffe, Sundspeterlein.

Scandix,

Pecten, Radel Rorbel. Cerefolium, Gartenforbel.

Anthrifcus , Rlettenforbel.

Chaerophyllnm,

sylvestre, wildes Körbelkraut, Kälberkropf. bulbosum, knolliger Kälberkropf. temulum, berauschender Kälberkropf. hirsutum, zotiger Kälberkropf.

Imperatoria,

* Oftruthium , großere Meifterwurg.

Sefeli,

glaucum, meergruner Gefel. annuum, iabriger Gefel.

Pastinaca,

fativa, Paftinate.

Anethum,

graveolens, Diff.

* Foeniculum , Fenchel.

Carum,

Carvi, Feld: Rummel.

Pimpinella,

Saxifraga , Dimpinelle.

* Anisum, Anis.

Apium,

* Petroselinum, Eppich, Petersilien. graveolens, Gellerie.

Aegopodium,

Podagraria, Geisfuß.

Viburnum,

Lantana, fleiner Schlingbaum. Opulus, Wafferholder.

Sambucus,

Ebulus, Attig.

nigra, Sollunder, Fliederbaum.

Alfine,

media, gemeiner Suhnerdarm.

Parnassia,

palustris, Sumpf: Einblatt.

Linum,

usitatissimum, gemeiner Lein. Austriacum, österreicher Lein. catharticum, Purgiersein.

Drosera,

rotundifolia, rundblatterichter Connenthau.

Myosurus,

minimus, fleinster Maufeschwang.

VI. Classis. Hexandria.

Bromelia,

* Ananas, Ananes.

Galanthus

nivalis, Schneetropflein.

Leucojum,

vernum, Mergenblume.

Narciffus,

* poeticus, poetische Marcisse.

* Pseudo Narcissus, unachte Marciffe.

* odorus, wohlriechende Marciffe.

* Jonquilla, Jonquille.

Allium,

* Porrum, Porre.

* Victorialis, Allermannsharnisch.

* Sativum, gewöhnlicher Knoblauch.

* Scorodoprasum, Rotambole.

Oleraceum, Roblinoblauch.

* ascalonicum, Schalotten. angulosum, ectige Knoblauch. Ursinum, Waldknoblauch.

* Cepa, Zwibel.

* Schoenoprasum, Schnittlauch.

Lilium,

* candidum, weiße Lilie.

* bulbiferum, Feuerlilie. Martagon, turfifcher Bund.

Fritillaria,

* imperialis, Ranfer : Kronblume.

* Meleagris, Kiwigen.

Tulipa,

fylveftris, milde Tulpe.

* Gesneriana , Gefnerische Tulpe.

Ornithogalum,

luteum, gelbe Vogelmilch.

umbellatum, boldenformige Bogelmilch.

Scilla,

amoena, Sternhyacinth.

Anthericum,

ramosum, astige Zaunblume. Liliago, Lilienzaunblume. calyculatum, Kelchzaunblume.

Asparagus,

officinalis, gewöhnlicher Spargel.

Convallaria,

majalis, gemeine Mayblume.
Polygonatum, Weiswurz.
multiflora, vielblumige Mayblume.
bifolia, zweyblätterige M.

Hyacinthus,

* non feriptus, blauer Snacinth.

* orientalis, morgenländischer Hyacinth. comosus, Acker Hyacinth. botryoides, wilder H.

Agave,

* americana, amerifanische Agave.

Acorus,

calamus, Kalmus.

Juncus,

conglomeratus, Binsen, mit zusammenges drungenen Blüthen. effusus, statterichte Binse. articulatus, gegliederte B. bulbosus, bollige Binse. busonius, Krötenbinse. pilosus, haarige B. campestris, Feldbinse.

Berberis,

vulgaris, gemeiner Sauerdorn, Weinnagelein. Rumex,

* sanguineus, rother Ampfer. crispus, krauser A. acutus, gemeiner A. aquaticus, Wasserampfer. Acetosa, Sauerampfer. Acetosella, Schafampfer.

Triglochin, palustre, Sumpf: Krotengras.

Colchicum, autumnale, Berbft Beitlofen.

Alisma,

Plantago, gemeiner Wafferwegerich.

VII. Classis. Heptandria.

Aesculus, Hippo - Castanum, gemeine Rostkastanie.

VIII. Classis. Octandria.

Oenothera,

biennis, zweniahrige Nachtkerze.

Epilobium,

angustisolium, schmalblätterichter Weiderich. hirsutum, zotiger W. villosum Leys. rauher W. montanum, Bergw. tetragonum, viereckichter W. palustre, Sumpsweiderich.

Vaccinium,

Myrtillus, gemeine oder schwarze Beidelbeere. Vitis idaea, Preußelbeere.

Erica,

vulgaris, gemeine Beide. herbacea, frautartige Beide.

Daphne,

Mezereum, Kellerhals. Oneorum, schweizerische Daphne.

Stellera,

Stellera,

Pafferina, gemeine Stellerische Pflange.

Polygonum,

Bistorta, Ratterwurg.

* viviparum, keimender Wegtritt.
amphibium, Wegtritt mit Weidenblättern.
Hydropiper, Wasserpfesser.
Persicaria, Flohkraut.
aviculare, Bogelwegtritt.
Convolvulus, Buchwinde.

Paris,

quadrifolia, vierblatterichte Einbeere.

IX. Classis. Enneandria.

Laurus,

* nobilis, gemeiner Lorbeerbaum.

Rheum,

* Rhaponticum, thracische Rhabarber.

* palmatum, mahre Rh.

Butomus,

umbellatus, boldenformige Bafferviole.

X. Classis. Decandria.

Distamnus,

albus, weißer Diptam.

Ruta,

* graveolens, starkriechende Raute.

Ledum,

palustre, Sumpf : Porsch.

Pyrola,

rotundi folia, rundblatterichtes Wintergrun. minor, kleineres W.

fecunda, einfeitiges 2B.

Chrysosplenium,

alternifolium, Goldmilz mit wechfelweis fter henden Blattern.

oppositisolium, Goldmil; mit einander gegens über stehenden Blattern.

Saxifraga,

* Cotyledon, Nabelkraut, Steinbrech. granulata, körnichter St. tridactylites, Sandsteinbrech.

Scleranthus,

annuus, iahriger Knauel. perennis, beständiger K.

Gypsophila,

rigida, steifes Sppskraut. saxifraga, Steinbrechgnpskraut.

Saponaria,

officinalis, gewöhnliches Seifenkraut.

Dianthus,

carthusianorum, Kartheuser: Relke. prolifer, sproßende N. * caryophyllus, Gartennelke. deltoides, deltaformige N.

arenarius, Sandnelfe.

Cucubalus,

Behen, gemeiner Behen. Otites, Dhrlofleinfraut.

Silene,

nutans, überhangendes Leinkraut.

Silene,

noctiflora, nachtliche Gilene.

Stellaria,

nemorum, Sain: Sternpflange. Holostea, Augentrostgras. graminea, grafige Sternpflange.

Arenaria,

trinervia, drennervichtes Sandfraut. serpyllifolia, Sandfraut mit Quendelblättern. rubra arvensis, rothes Sandfraut. fasciculata, buschelformiges S.

Sedum,

Telephium, gemeine fette Henne. rupestre, fette Berghenne. album, weiße fette H. acre, Mauerpfesser. sexangulare, Trippmadam.

Oxalis,

Acetosella, gemeiner Sauerklee. corniculata, gehörnter G.

Agrostema,

Githago, Kornwaden, Kornröslein.

Lychnis,

Flos cuculi, Suckugsblume. Viscaria, Pechnelke. dioica, getrenntes Lichtroslein.

Cerastium,

vulgatum, gemeines Hornkraut. semidecandrum, unfruchtbares H. arvense, Ackerhornkraut. aquaticum, Wasserhornkraut.

Spergula, arvensis, Acter: Spart.

XI. Classis. Dodecandria.

Asarum,

europaeum, europaifche Safelwurg.

Portulaca,

oleracea, Rohl: Portulaf.

Lythrum,

Salicaria, purpurrother Weiberich, Blutfraut.

Agrimonia,

Eupatoria, gewöhnlicher Dbermennig.

Reseda,

Luteola, Bau.

lutea, gelbes harnfraut.

* odorata, wohlriechendes S.

Euphorbia,

Peplus, runde Euphorbie.
exigua, kleine Euphorbie.
pilosa, haarige E.
platyphyllos, breitblätterichte E.
Esula, Eselsmilch.

Cyparissias, Eppresseneuphorbie.

Sempervivum,

tectorum, Dach Sauswurgel.

XII. Classis. Icosandria.

Punica,

* Granatum, Granatapfel.

Amygdalus,

* Persica, Pfersich.

* communis, Mandeln.

Prunus,

Padus, schwarze Bogelfirsche.

* Cerasus, Kirschbaum.

avium, gemeine Bogelkirsche.

* domestica, gemeine Pflaume. spinosa, Schlehen.

Crataegus,

torminalis, Elfebeere.

Oxyacantha, gemeiner Sagborn.

Sorbus,

aucuparia, wilder Sperberbaum; Bogelbeere.

Mespilus,

* germanica, Mispeln. cotoneaster, fleine Mispel.

Pyrus,

* communis, Birn.

* Malus, Apfel.

* Cydonia, Quitten.

Spiraea,

Aruncus, Geisbart. Filipendula, Filipendul, rother Steinbrech. Ulmaria, Johaniswedel.

Rosa,

Eglanteria, Wein: Rose. spinosissima, dornichte Rose. villosa, rauche R.

* centifolia, hundertblattrige Rofe.

* gallica, Provinz R. canina, wilde R.

Rosa,

alba, weiße R.

Rubus,

idaeus, gemeine himbeere. caesius, Bocksbeere. fruticosus, Brombeere.

Fragaria,

vesca, Erdbeere.

Potentilla,

Anserina, Ganserich.
argentea, silberweiße Potentille.
verna, Frühlings P.
alba, weiße P.
reptans, Fünfsingerkraut.

Tormentilla,

erecta, aufrechte Blutwurz.

Geum,

urbanum, Gewürznelkenartige Merzwurz. rivale, Waffermerzwurz.

Comarum,

palustre, Sumpf : Siebenfingerfraut.

XIII. Classis. Polyandria.

Attaea,

spicata, ahrenformiges Schwarzfraut.

Chelidonium,

maius, großes Scholfrant.

Papaver,

Argemone, keulenformiger Mohn. Rhoeas, Klapperrofe. dubium, zweifelhafter Mohn. Papaver,

* somniferum, schlafmachender Mohn.

Nymphaea,

lutea, gelbe Geerofe. alba, weiße Geerofe.

Tilias

europaea, europaische Linde.

Cistus,

Helianthemum, Ciftroslein, Connengunfel.

Poeonia,

* officinalis, gewöhnliche Pfingstrofe.

Delphinium,

Confolida , Feld: Ritterfporn.

Aconitum,

Lycoctonum, gelber Sturmhut.

* Napellus, blauer Sturmhut.

Aquilegia,

vulgaris, gemeiner Aglen.

Nigella,

* damascena, bamascenischer Schwarzfummel. arvensis, Acter: Schwarzfummel.

Anemone,

Hepatica, Leberfraut.

vernalis, fruhiahrige Unemone.

Pulfatilla , Ruchenschelle.

fylvestris, wilde Anemone.

ranunculoides, Sahnenfugartige Anemone.

Clematis,

Vitalba, gemeine Waldrebe. erecta, aufrechte W.

Clematis,

* integrifolia, Waldrebe mit ungertheilten Blattern.

Thaliarum,

minus, fleine Biefenraute. flavum, gelbe Biefenraute.

Adonis,

aestivalis, Sommeradonis. autumnalis, Berbstadonis.

Ranunculus;

Flammula, kleiner Sumpf Hahnenfuß.
Ficaria, Scharbock, kleines Schölkraut.
auricomus, goldgelber Hahnenfuß.
sceleratus, bösester Hahnenfuß.
bulbosus, knolliger Hahnenfuß.
repens, kriechender Hahnenfuß.
acris, scharfer Hahnenfuß.
lanuginosus, wollichter Hahnenfuß.
arvensis, Acker Hahnenfuß.
heterophyllus, schildblättriger Hahnenfuß.
aquatilis, Wasser Hahnenfuß.

Trollius,

europaeus, europäische Engels oder Trollblume. Helleborus,

* hyemalis, Chriftmurgel.

* niger, mahre Rieswurgel.

* viridis, grune Rieswurgel.

Caltha,

palustris, Sumpfdotter oder Schmalgblume.

XIV. Classis. Didynamia.

Ajuga,
pyramidalis, gulbene Gunsel.
genuensis, Genfer Gunsel.
reptans, schleichende glatte Gunsel.

Teucrium,

Botrys, Tranben & Gamander. Chamaepytis. Schlagfraut. Scordium, Lachenknoblauch. Chamaedrys, Bathengel. montanum, Berggamander.

Satureja,

* hortenfis, Garten : Saturei.

Hyssopus,

officinalis, gewöhnlicher Ifop.

Nepeta,

cataria, gemeine Ragenmunge.

Lavandula,

* Spica, Spick.

* stoechas, Stochastraut.

Mentha,

fylvestris, wilde Munze.

* crispa, krause Munze.
aquatica, Wassermunze.

* piperita, Pfessermunze.
sativa, kleine Munze.
arvensis, Ackermunze.
Pulegium, Polen.

Glecoma,

hederacea, epheuartige Gundelrebe.

Lamium,

album, weisse Tanbnessel.

purpureum, purpurrothe Tanbnessel.

amplexicaule, Tanbnessel mit Blåttern, die

den Stengel umfassen.

maculatum, gepfleckte Nessel.

Galeopsis,

Ladanum, Feld : Kakengesicht. Tetrahit, hanfartiges Rakengesicht. Galeobdolon, gelbes Kakengesicht.

Betonica,

officinalis, gewöhnliche Betonie.

Stachys,

sylvatica, Sienensaug. palustris, Sumpf: Rospolen. recta, gerader Rospolen.

Ballota,

nigra, schwarze Ballote.

Marrubium,

* candidissimum, fehr weisser Andorn. vulgare, gemeiner Andorn.

Leonurus,

cardiaca, Berggefpann.

Clinopodium,

vulgare, gemeine Wirbelbofte.

Origanum,

vulgare, gemeine Doften, Wolgemuth.

Thymus,

Serpyllum, wilder Thymian, Kundelkraut. vulgaris, gemeiner Quendel. Acinos, basilienartiger Quendel.

Melissa,

* officinalis, gewöhnliche Meliffe.

* calamintha, Bergmunge.

Dracocephalum,

* Moldavica, turfische Meliffe.

Melittis,

Melissophyllum, Melissenblatt, Waldmelisse.

Ocymum,

* Bafilicum, gemeine Bafilie.

Scutellaria,

galericulata, helmformiges Schildfraut.

Prunella,

vulgaris, gemeine Prunelle. laciniata, zerschlissene Prunelle.

Rhinanthus,

crifta galli, gemeiner Sahnenkamm.

Euphrasia,

officinalis, gewöhnlicher Augentroft.

Odontites, Zahntrost.

lutea, gelber Augentroft.

Melampyrum,

cristatum, hahnenkammartiger Ruhweißen.

arvense, Adertuhmeigen.

nemorosum, Hainkuhweißen.

pratenfe, Wiefenkuhweigen.

Lathraea,

fquamaria, gemeine Schuppenwurgel.

Pedicularis,

palustris, Sumpf , Lausekraut.

Sylvatica, Wald : Lausekraut.

Antirrhinum;

spurium, unachter Dorant.

Antirrhinum,

minus, fleiner Dorant.

Linaria, Flachsfraut.

* maius, großer Dorant.

Orontium, Drant.

Scrophularia,

nodosa, knotige Braunwnrzel. aquatica, Wasserbraunwurzel.

Digitalis,

* lutea, gelber Fingerhut. ambigua, zweifelhafter Fingerhut.

* purpurea, purpurrother Fingerhut.

Orobanche,

maior, große Commermnrzel.

XV. Classis. Tetradynamia.

Myagrum,

fativum, jahmer Leindotter.

paniculatum, rifpenformiger Leindotter.

Draba,

verna, Fruhlings : Sungerblumlein.

Lepidium,

* fativum, Gartenfreffe.

ruderale, Sundefeuche.

Thlaspi,

arvense, Bauernsenf. perfoliatum, durchstochene Tasche. Bursa pastoris, hirtentasche.

Cochlearia,

* officinalis, gemeines Loffelfraut.

* Armoracia, Meerrettig.

Iberis,

nudicaulis, Iberpflanze mit nackendem Stengel.

Aly Jum,

incanum, bestäubte Alpssen. calycinum, Kelchalpsse. montanum, Bergalpsse.

Lunaria,

* annua, ichrige Mondviole.

Cardamine,

impatiens, Spring , Bergfrege. hirsuta, zotige Bergfrege. pratensis, Wiesen , Bergfrege.

Sifymbrium,

Nasturtium, Brunnkrese.
sylvestre, wildwachsende Rauke.
amphibium, Wasserrettig.
Sophia, Sophienkraut.

Erysimum,

officinale, gebrauchlicher Wegsenf, hederich. Barbarea, Barbenfraut. Alliaria, Knoblauchkraut.

Cheiranthoides, levcoienartiger Bederich.

Cheiranthus,

Erysimoides, heberichartige Levcoje.

* Cheiri, gelbe Betel.

* chius, Levcoje von Chio.

* fenestralis, Fensterlevcoie.

incanus, bestaubte Levcoje.

* annuus, tahrige Levcoje.

* tricuspidatus, Levcoje mit dren langen Spigen.

Hesperis,

* matronalis, Matronal : Nachtviole.

Arabis,

thaliana, thalianisches unachtes Thurmkraut. lyrata, leperformige Arabis.

Turritis,

glabra, glattes Thurmkraut. hirsuta, zottiges Thurmkraut.

Braffica,

campestris, Feldfohl. Napus, Rubfaamen.

* Rapa, Ruben.

* oleracea, Ruchenkohl.

Sinapis, .

arvensis, Acker : Genf. alba, weisser Genf. nigra, schwarzer Genf.

Raphanus,

* fativus, gemeiner Rettich. Raphanistrum, Ackerrettig.

Isatis,

tinctoria, Farber : Waid.

XVI. Classis. Monadelphia.

Geranium,

cicutarium, Storchenschnabel mit dem Buts terichsblatte.

* moschatum, Bisam; Storchenschnabel. palustre, Sumpf; Storchenschnabel. pratense, Wiesen; Storchschnabel. robertianum, Ruprechtskraut. molle, weicher Storch. columbinum, Taubenschnabel. Geranium,

disseltum, zerschnittener Storchenschnabel. rotundifolium, rundblätterichter Storchens schnabel.

sanguineum, blutrother Storchenschnabel.

Althaea,

officinalis, gebrauchlicher Eibisch.

Alcea,

* rosea, Rosempappel.

Malva,

rotundisolia, Ganse: oder hasenpappel. sylvestris, wilde Pappel.
Alcea, Sigmarswurzel.

Hibiscus,

* Trionum, aufgeblafener Ibifch.

XVII. Classis. Diadelphia.

Fumaria,

bulbosa, knolliger Erdrauch. officinalis, gewöhnlicher Erdrauch.

Polygala,

amara, bittere Kreuzblume.
vulgaris, gemeine Kreuzblume.

- maior, große Kreugblume.

Chamaebuxus, Rreugblume mit Burblattern.

Spartium,

scoparium, besemartige Pfriemen.

Genista,

fagittalis, pfeilformiger Ginfter. tinctoria, Farbeginfter. germanica, deutscher Ginfter. Ononis,

arvensis, Ader: Sauhechel.

Anthyllis,

Vulneraria, Wundfraut, Wollblume.

Lupinus,

* albus, weiffe Feigbohne.

* luteus, gelbe Feigbohne.

Phaseolus,

* vulgaris, gemeine Bohne.

Dolichos,

* pruriens, iucenbe Fafeln.

Pifum,

* fativum, jahme Erbfe.

Orobus,

vernus, Frühlings: Erven. tuberosus, knollige Erven. niger, schwarze Erven.

Lathyrus,

pratensis, knollige Platterbse.
pratensis, Wiesenplatterbse.
sylvestris, wilde Platterbse.
latifolius, breitblatterige Platterbse.
heterophyllus, Matterbse mit ters

heterophyllus, Platterbse mit zerschiedenen Blattern.

Vicia,

pisiformis, erbsenförmige Wicke.
dumetorum, Heckenwicke.
sylvatica, Waldwicke.
Cracca, Bogelwicke.
sativa, zahme Wicke.
sepium, Zaunwicke.

Ervum,

* Lens, gemeine Linse. tetraspermum, viersaamige Linse. hirsutum, zottige Linse.

Cicer,

* arietinum, gemeine Richern.

Cytifus,

* Laburnum, Bohnenbaum.
nigricans, schwärzlichter Seisklee.
capitatus, köpfiger Seisklee.
supinus, kriechender Geisklee.

Colutea,

* arborescens, baumartige Blasleinfenne.

Glycyrrhiza,

* glabra, glattes Gusholz.

Coronilla,

varia, bunte Rronenwicke.

Hippocrepis,

comofa, zopfiges Sufeifen.

Hedysarum,

Onobrychis, turtifcher Gustlee.

Galega,

* officinalis, gewöhnliche Geifraute.

Astragalus,

glycyphyllos, wildes Susholz, Tragant mit gestrecktem Stamm.

Trifolium,

M. officinalis, gemeiner Steinklee. repens, kriechender Klee. pratense, Wiesenklee. alpestre, Alpenklee. arvense, Ackerklee.

Trifolium,

fragiserum, erdbeerähnlicher Klee.
montanum, Bergklee.
agrarium, gelber Klee.
flexuosum, beugsamer Klee.

Lotus,

filiquofus, Biefen : Chottenflee. corniculatus, gehörnter Schottenflee.

Medicago,

sativa, blauer Schneckenklee. falcata, Sichelklee. lupulina, Hopfenschneckenklee.

XVIII. Classis. Polyadelphia.

Citrus,

* Medica, Citrone.

* Aurantium, Pomerange.

Hypericum,

quadrangulare, viereckige Johannispflanze. perfoliatum, durchstochnes Johanniskraut. montanum, Berg: Johanniskraut. hirsutum, zottiges Johanniskraut.

XIX. Classis. Syngenesia.

Tragopogon, pratense, Wiesen & Bocksbart.

Scorzonera,

* hispanica, spanische Scorzonere. hirsuta, zottige Scorzonere. laciniata, zerschlissene Scorzonere.

Resepora

Lactuca,

* sativa, zahmer Salat. Scariola, wilder Salat. virosa, giftiger Salat. perennis, beständiger Salat.

Sonchus,

arvensis, Acter : Gansedistel. oleraceus, Rohl : Gansedistel.

Prenanthes,

purpurea, purpurrothe Prenanthe. muralis, Mauerprenanthe.

Leontodon,

Taraxacum, Pfaffenröhrl, Löwenzahn. autumnale, Herbstlöwenzahn. hirtum, rauher Löwenzahn.

Hieracium,

Pilosella, Nagelkraut.
dubium, zweifelhaftes Habichtkraut.
Auricula, Mäusehhrchen.
cymosum, Habichtkraut mit unächter Dolbe.
praemorsum, abgebisnes Habichtkraut.
murorum, Mauer: Habichtkraut.
austriacum, österreichisches Habichtskraut.
saudum, savonisches Habichtskraut.
umbellatum, doldenförmiges Habichtskraut.

Crepis,

tectorum, Dach : Grundveste. biennis, zweniahrige Grundveste.

Hypochaeris,

glabra, glattes Saufraut. radicata, gewurzeltes Saufraut.

Lapsana,

communis, gemeiner Rheinkohl.

Cichorium,

Intybus, wilde Wegwarten. * Endivia, gemeine Endivien.

Artium,

Lappa, gemeine Rlette.

Serratula, tinctoria, Fårber : Scharte. - arvensis, Haberdistel.

Carduus,

lanceolatus, Speerdistel.
nutans, Bisamdistel.
crispus, krause Distel.
eriophorus, wollentragende Distel.
acaulis, stammlose Distel.

Cnicus,

oleraceus, fohlartiges Kraffraut.

Onopordum,

Acanthium, gemeine Zellblume.

Cynara,

scolymus, gemeine Artischocke.

Carlina,

acaulis, stammlofe Ebermurg. vulgaris, gemeine Ebermurg.

Bidens,

tripartita, drenmalgetheilter Zwenzahn. cernua, niedergebeugter Zwenzahn.

Eupatorium,

cannabinum, Bafferdofte.

Chrysocoma,

Linofyris, leinblatterichtes Goldhaar.

Tanacetum,

vulgare, gemeiner Rheinfarren.

Artemijia,

Abrotanum, Stabwurg. campestris, Feld Benfuß. Absinthium, Wermuth. vulgaris, gemeiner Benfuß.

Gnaphalium,

arenarium, Sand & Ruhrpflanze. luteo - album, weißgelbe Ruhrpflanze. dioicum, Ruhrpflanze mit getrennten Geschlechs tern.

uliginosum, morastige Ruhrpflanze. sylvaticum, Wald Ruhrpflanze.

Conyza,

fquarrofa, Durrwurg.

Erigeron,

canadense, kanadisches Altmannskraut. acre, scharfes Altmannskraut.

Tussilago,

Farfara, gemeiner Suffattig.

Senecio,

vulgaris, gemeine Kreuzpflanze.
viscosus, klebrichte Kreuzpflanze.
sylvaticus, Waldkreuzpflanze.
erucaesolius, Kreuzpflanze mit Rantenblattern.
Jacobaea, Jakobsblume.

farracenicus, farracenische Kreuzblume.

After.

Amellus, Birgils Sternblume. * chinensis, sinesische Sternblume.

Solidago,

virgaurea, gemeine Goldruthe.

Inula,

* Helenium, wahrer Alant. falicina, Alant mit Beidenblattern. hirta, rauber Alant.

Arnica,

montana, Bergwolverlen.

Doronicum,

Pardalianches, größte Gemfenwurg.

Bellis,

perennis, beständige Maslieben, Gansblumgen.

Chryfanthemum,

Leucanthemum, große Maasliebe.
inodorum, geruchlose Wucherblume.
corymbosum, Wucherblume mit flachen Strauß
fen.

Matricaria.

Parthenium, mabres Mutterfraut. Chamomilla, gemeine Chamille.

Anthemis.

* nobilis, romische Chamille. arvensis, Ackerchamille. Pyrethrum, Bertram. tinctoria, Färbechamille.

Achillea,

Ptarmica, gemeines Miegkraut. Millefolium, Schafgarbe. nobilis, edles Achillenkraut.

Buphthalmum,

falicifolium, Rindsange mit Beidenblattern.

Helianthus

* annuus, iabrige Connenblume

Centaurea,

Cyanus, Kornblume.
paniculata, rispensormige Flockenblume.
Scabiosa, Eisenwurzel.
Jacea, gemeine Flockenblume.
Calcitrapa, Sterndistel.

Calendula,

* officinalis, gewöhnliche Mingelblume.

* pluvialis, Regenringelblume.

Filago,

germanica, deutsches Fadenfraut. montana, Bergfadenfraut. arvensis, Ackerfadenfraut.

Jasione,

montana, Berge Jaffone.

Viola,

hirta, Wald: Viole.
palustris, Sumpfviole.
odorata, wohlriechende V.
canina, Hundsviole.
tricolor, drenfärbige Viole.

Impatiens,

* Balfamina, Balfamine. Noli tangere, gemeines Springkraut.

XX. Classis. Gynandria.

Orchis,

bifolia, zwenblätterichtes Anabenkraut. Morio, Pickelhering. mascula, mannliches Anabenkraut. ustulata, gedüpfeltes An.

militaris, friegerisches An. latifolia, breitblätterichtes An. maculata, gestecktes An. conopsea, hohes An.

Satyrium,

albidum, weißlichter Stendel.

Ophrys,

Nidus avis, Bogelnest. ovata, gemeines Zwenblatt.

Serapias,

latifolia, breitblåtterichte Serapias. longifolia, langblåtterichte S. grandiflora, großblumige S. rubra, rothe S.

Cypripedium,

Calceolus, gemeiner Benusfchuh.

Aristolochia,

clematitis, gemeine Ofterlucen.

Arum,

maculatum, gewöhnlicher Aron.

Calla,

palustris, Sumpf Calla.

XXI. Classis. Monoecia.

Chara,

vulgaris, gemeiner Armleuchter. flexilis, beugsamer Armleuchter.

Lemna,

trifulca, Bafferlinfe mit dren Furchen. minor, fleinere Bafferlinfe. Typha,

latifolia, breitblätterichte Kolben. angustifolia, schmalblätterichte Kolben.

Sparganium,

erectum, aufrechte Igelstolbe.

Carex,

dioica, Riedgras mit getrennten Geschlechtern. leporina , Sasenriedgras. intermedia Retzii. mittleres R. vulpina, Fuchsriedgras. muricata, jacfigtes R. praecox Leyf. fl. Hal. fruhjeitiges R. flava, gelbes R. digitata, gefingertes It. montana , Bergriedgr. humilis Leyf. niedriges ober fleinstes R. pallescens, blages R. panicea, schwadenartiges R. diftans, abstehendes R. acuta, spißiges R. vesicaria, Blafen R. hirta, rauhes R. fylvatica Leyf. fl. Hal. Balb: R.

Betula,

alba, weiße Birke. Alnus, Erle.

Baxus,

sempervirens, Bur.

Urtica,

urens, kleine Brennegel. dioica, Regel mit getrennten Geschlichtern.

Morus,

* alba, weißer Maulbeerbaum.

* nigra, schwarzer M.

* rubra, rother M.

Myriophyllum,

verticillatum, quirlformiger Feberball.

Sagittaria,

sagittifolia, Pfeilfraut mit Pfeilblattern.

Poterium,

Sanguisorba, gemeine Becherblume.

Quercus,

Robur , gemeine Giche.

Juglans,

* regia, gemeine Ballnuf.

Fagus,

fylvatica, gemeine Buche.

Carpinus,

Betulus, gemeine Sainbuche.

Corylus,

Avellana, gemeine Safelftaube.

Pinus,

fylvestris, gemeine Fichte.

* Larix , Lerchenbaum.

* Picea, Beiftanne.

Abies, gemeine Tanne.

Ricinus,

* communis, gemeiner Wunderbaum.

Momordica,

* Balfamina, gemeiner Balfamapfel.

* Elaterium, Efelsturbis.

Cucurbita,

* lagenaria, Flaschenkurbis.

Cucurbita,

* Pepo, Pfeben.

Cucumis,

* Melo, Melone.

* fativus, gahme Gurfen.

Bryonia,

alba, weiße Zaunrube.

XXII. Classis. Dioecia.

Salix,

triandra, Weide mit dren Staubfaden, vitellina, gelbe Weide. fragilis, Bruchweide. purpurea, purpurrothe W. Helix, Bachweide. caprea, Palmweide. alba, weiße W.

Viscum,

album , weiffer Miftel.

Spinacia,

* oleracea, fohlartiger Spinat,

Cannabis,

* fativa, gahmer Sanf.

Humulus,

Lupulus, Sopfen.

Populus,

alba, weiße Espe, Pappelbaum. tremula, Zitterespe. nigra, schwarze Espe.

Mercurialis,

annua, iahriges Bengelfraut.

Mercurialis, perennis, ausbaurendes Bengelkraut.

Juniperus,

* Sabina, Sevenbaum. communis, gemeiner Wachholder.

Ephedra, * monostachia, einähriger Rosschwanz.

XXIII. Classis. Polygamia.

Andropogon, Ischaemum, deutsches Bartgras.

Holcus,
mollis, weiches Honiggras.
lanatus, wollichtes Honiggras.
odoratus, wohlriechendes H.

Valantia, cruciata, freutsformige Baillantische Pflanze.

Parietaria,
officinalis, Tag und Nacht Kraut.

Atriplex,
portulacoides, portulakartige Melde.
hortensis, Gartenmelde.
laciniata, zerschlissene Melde.
patula, ausgebreitete Melde.

Acer,
Pseudo-platanus, unachter Ahorn, Masholder.
campestris, Feld Masholder.

Fraxinus, excelsior, hohe Esche.

Ficus,

* Carica, gemeine Feige.

XXIV. Classis. Cryptogamia.

Equisetum,

sylvaticum, Wald: Kannenkraut. arvense, Ackerkannenkraut. palustre, Sumps: Kannenkraut. sluviatile, Fluß: Kannenkraut. hyemale, Winter: Kannenkraut.

Osmunda,

Lunaria, Mondraute.

Pteris,

aquilina, Adlerkraut, Flugelfarren.

Asplenium,

Scolopendrium, Hirschzunge. Trichomanoides, gezähntes Milzkraut. Ruta muraria, Mauerraute.

Polypodium,

vulgare, gemeines Engelsüß.
fontanum, Brunnen Engelsüß.
cristatum, Hahnenkammartiges Engelsüß.
Filix mas, Farrenkrautmannlein.
Filix soemina, Farrenkrautweiblein.
aculeatum, dornichtes Engelsüß.
fragile, zerbrechliches Engelsüß.
Dryopteris, kleines Engelsüß.

Lycopodium,

clavatum, feulenformige Barlappen.

Sphagnum,

Sphagnum, palustre, Sumpf Torfmoos.

Fontinalis, antipyretica, Fieber Flusmoos.

Polytrichum,
commune, gemeines Haarmoos.
undulatum Leysseri, Flor. Hal. wellenformis
ges Haarmoos.

Mnium,

purpureum, purpurrothes Sternmoos.
capillare, haariges Sternmoos.
ferpyllifolium, Sternmoos mit Quendels
blattern.

Bryum,

apocarpum, unfruchtbares Knoten: Moos. extinctorium, lichtschneutähnliches Knoten: Moos.

pomiforme, apfelartiges Kn.
pyriforme, Birnförmiges Kn.
subulatum, pfriemenförmiges Kn
rurale, Feldknotenmoos.
murale, Mauerkn.
scoparium, Besemkn.
truncatulum, gestumpstes Kn.
argenteum, silbernes Kn.
pulyinatum, Küßenkn.

Hypnum,

Mangary

triquetrum, brenseitiges Astmoos. rutabulum, gemeinstes Ustm. filicinum, Farrenkrautartiges Ustm. Hypnum,

proliferum, sproßendes Astmoos. parietinum, Wandastmoos. cupressi forme, Enpressen Astmoos.

Jungermannia,

bidentata, zweniährige Jungermannie. nemorea, Walds Jungerm. reptans, Kriechende J. platyphylla, breitblätterige J.

Marchantia,

polymorpha, sternartiges Marchantisches Ufstermoos.

Lichen,

geographicus, geographische Flechte. fanguinarius, Blutflechte. candelarius, Lichtflechte. tartareus, Farberflechte, centrifugus, falte Flechte. faxatilis, Steinflechte. olivaceus, Diwenflechte. parietinus, Wandflechte. phyfodes, aufgeblafene Flechte. ciliaris, gefrangte blatterichte Fl. islandicus, islandischer Doos. fraxineus, Efchenflechte. prunasti, Schlehenflechte. caninus, Sundeflechte. pyxidatus , buchfenformichte Blechte. rangiferinus, Rennthierflechte. hirtus, rauhe Flechte.

Tremella, purpurrothe Gallerte.

Conferva,

rivularis, Bach: Wasserfaden, Grasleder. bullosa, blasichtes Gr. aeruginosa, kupfergrunes Gr.


Byssus,

Flos aquae, Stanbaftermoos, Wasserblume. incana, graues stanbichtes Stanbaftermoos. aeruginosa Leyss. kupfergrunes St.

Fungi.

Agaricus &c. &c.

s. meines Oheims D. Jac. Christiani Schaeffer Fungorum qui in Bavaria & Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur Icones nativis coloribus expressae. Tomi IV. Ratisbonae 1772.




Mahmen : Verzeichnis

ber

Minern und Versteinerungen

welche

in unfrer Gegend gefunden werden.





REGNUM MINERALE

Secundum

Cronstedti Mineralogiam.

Classis I.

Terrae. Erdarten.

Ordo I. Terrae calcareae, Terrae calcarea indurata. Lapis calcareus, Raitstein.

Marmor fusci coloris Weltenburg, vic. Ratisp.

Marmor fusci coloris Regeldorsense vic. Ratispon.

Marmor venis fuscis Regeldorf, vic. Ratisp.

Marmor ex carneo albido et rubro variegatum Mitterfeldens. Bavar.

Marmor nigricans Mitterfeldens. Bavariae. Marmor album Kapselbergens, vic. Ratisp.

Spatum Drusicum,

Spatum crystallisatum alcalinum Klein-Prusfening vic. Ratisp.

Spatum alcalinum crystallisatum in nidis lapideis calcareis inventum Salerens, vic. Ratisp.

Siniz.

Stalactites calcareus. Tropfstein.!

Stalactites von Dechbetten vic. Ratisp. Stalactites Salerenf. vic. Ratisp.

Terra gypsea pulverulenta, Guhr, Hims melsmehl.

Farina fossilis aus dem Mehlbruch am Sinzingerweg an der Donau ohnweit Regenspurg.

Ordo II. Terrae Siliceae. Rieselarten.

Adamas ruber , Rubinus. Rubin.

Quarzum rosei coloris, rubinum spinellum imitans von Rabenstein prope Deckendorf.

Saphyrus. Caphyr.

Fluor quarzofus Saphyrum aemulans von Bomas bey Deckendorf.

Quarzum crystallisatum. Quarstryftall.

Drusa quarzosa nitriformis aurantiis apicibus Bavar.

Drusa quarzosa nitriformis aggregata acaulis flava von den Staufferbergen.

Drufa quarzofa nitriformis aggregata acaulis alba diaphana Bavar.

Fluor amethysti ex montibus Donaustaussensibus vic. Ratisp.

Arcilla von De

207

Lapis corneus. Hornstein.

Globi lapidis cornei in lapidicinis calcareis intra strata inventi Salerens, vic. Ratisp.

2500

Sardonyx.

Sardonyx in agris Ratisp.

Agathes. Agath. William sainel to silligia

Agathes in agris Ratisp.

Agathes Hirschling. Palat. Sup.

Silex communis. Gemeiner Riefel.

Lapilli pellucidi, Caillou Gallis dicti ex Danubio prope Ratisp.

Jaspis. Jaspis.

Jaspis fulvus striatus maculis sanguineis Bavariae.

Spatum Scintilans. Feldfpat. Porphyr.

Marmor porphyrum simulans e vineis Stauffensibus vic. Ratisp.

Ordo IV. Terrae argillaceae. Thonerden.

Bolus. Bolus.

Bolus citrina Abacensis vic. Ratisp.

Bolus von Stauff. vic. Ratisp.

Terra pictorum lutea Ambergensis Palat. Sup.

Bolus rubra sigillata vulgaris Landshutensis Bavariae, Bolus alba figillata vulgaris Landshutenfis Bavariae.

Argilla communis, vulgaris. Gemeiner Thon.

Argilla ex fodina Leimberg in via ad Abacum et quidem prope der Burgfried Säulen.

Argilla ex fodina in fylva prope Dechbetten Abbatiae Prüffeningensi propria.

Argilla von Degelberg hinter Dechbetten.

Ordo V. Terrae micaceae. Glimmerarten.

Talcum argenteum in lapide durissimo Quarzo et spato vitrescente von Kirn vic. Ratispon.

Mica rubicunda argentea splendens von Teubliz vic. Ratisp.

Mica miculis minimis auratis vic. Ratisp.

Mica aurea ex Danubio vic. Ratisp.

Mica miculis minimis auratis Lapidis subalbi vic. Ratisp.

Ordo VI. Fluores minerales. Sluffarten.

Fluor Spatosus. Fluffpat.

Fluores Amethystini et Smaragdini cum crusta crystallisata et absque illa von Bach vic. Ratisp.

Classis. III.

Phlogista mineralia. Erdharze. Molybdaena. Wasserbleu.

Molyb-

Molybdaena Bavariae.

Phlogiston argilla mixtum. Lithantrax. Steinkoble.

Lignum in gagatem versum ex stratis argillae fodinae in via ad Abacum prope sic di-Etam altam crucem.

Classis IV.

Metalla.

Ordo I. Ganze Metalle.

Minera Cinnabanis nativa

Aurum. Gold.

Gold Sand aus der Donau prope Ratisp.

Argentum. Gilber.

Terra min. Argent, gerens. Ratisp. effossa. Minera Argenti von Regeldorf palat. Sup. prope Ratisp.

Ferrum. Gifen.

Minera ferri in stirias clavas stalactitarum more concreta et mica ferrea repleta in stratis argillaceis et via bey der Burgfried Säule am Islinger Weg obvia vic. Ratisp.

Minera Ferri in vermium figuram figurata Dens moleris petreficius liocil cuid sirelom anoci-

Minera Ferri stiriformis Prüfeningens, Ratisp. Geodes ex minera Ferri von der Burgfried Säule am Islinger Weg vic. Ratisp. 4m0

Minera Ferri in arena von Kara pago vic. Ratispon.

Minera Ferri von Regeldorf vic. Ratisp.

Minera Ferri, so in Schlacken wieder angeschossen und auf dem alten Eisenhammer hinter Sulzbach prope Stauff aus der Erde gegraben und wieder gut gemacht wird.

Ordo II. Salbmetalle.

Cinnabaris nativa. Bergeinober.

Minera Cinnabaris nativa Bavar.

Dendrites.

Lapis Schistus cum dendrite luteo nigroque Abacensis vic. Ratisp.

and grade L. Gamer !

Aetites.

Actites oblongus von Adlersberg vic. Ratisp.

Petrefacta.

Zoolithi.

Tranc-

Dentis humani molaris frustulum ex lapidicina Pfaffelsteinens, prope Ratisp.

Caput, Cornu, Dentes et ossa calcinata Rhinocerotis unicornis in vicinia Ratisp. essossa.

Dens molaris petrefactus Ratisp. im Zwibel-

Ossa petresacta cum tubulis vermicularibus ex lapidicina Pfasselstein. vic. Ratisp. Ossiculi petrefacti frustulum ex lapidicina arenaria prope patibulum territorii Ratisp.

Glossopetrae nigrae et flavae ex lapidic. Salerens.

Glossopetrae ex lapidic. Kneiting prope Ratisp.

Glossopetrae ex lapidic. Pfasselsteinens. vic. Ratispon.

Dentes rugosi haemisphaerici ut et planiores oblongi et rotundi petrefacti Crayracionis seu Hystricis seu Ostracionis ex lapidic. Salerens, arenaria vic. Ratisp. vulgo der obere Bruch dicto.

Dentes molares piscium petref. rotundi Knei-

Dens caninus striatus piscis petrefactus von untern Bruch Salerens, vic. Ratisp.

Conchilia petrificata.

Entalia.

Entalia et tubuli vermiculares ex lapidicina calcaria Salerenf, prope Ratisp.

Tubuli vermiculares ex lapidic. Pfaffelstein.

Tubuli vermiculares vom Galgenberg prope Ratispon.

Comu Ammonis n. Sp. globesstinmala umo

Corun

Belemnites ex lapidic. prope patibulum Ratispon.

Belemnites Salerensis vic. Ratisp.

Belemnites von Schwäbelweiss. vic. Ratisp.

Tubuli concamerati.

Orthoceratites Salerenf. vic. Ratisp.

Turbines.

Turbines petrefacti ex monte Dechbetten vic. Ratisp.

Trochiti.

Trochus petrefactus ex lapidicina prope patibulum Ratisp.

Cochlea umbilicata monte prope Pfaffelstein vic. Ratisp.

Cochlea umbilicata Salerens. vic. Ratisp.

Cochlea turbinata von Dechbetten vic. Ratisp.

Cylindrites.

Cochlea cylindrica vom Galgenberg gegen den Degelberg vic. Ratisp.

Cornua Ammonis.

Cornu Ammonis non spinatum striis simplicibus ex vicinia Ratisp.

Cornu Ammonis non spinatum striis simplicibus ambitum transeuntibus von Schwäbelweiss vic. Ratisp.

Cornu Ammonis n. Sp. globosum striis et trifurcatis ambitum transcuntibus ex vic. Ratisp.

Cornu Ammonis n. Sp. striis trifurcatis von Sala prope Abach vic. Ratisp.

Cornu Ammonis n. Sp. ftriis tri et quatrifurcatis ab initio tuberculo ornatis Salerenf. worvic, Ratisp. and A suppole winifug

2000

Cornu Ammonis n. Sp. striis tri et quatrifurcatis von Schwäbelweiß. vic. Ratisp.

Cornu Ammonis n. Sp. striis bi et quatrifurcatis ambitum trajicientibus ex vic. Ratisp. Nautiliti,

Nautilus laevis von Winzer prope Ratisp. Nautilus striatus eiusd. loci.

Ostreae.

Ostrea minima in silicem mutata Pfaffelstein. Rastellum Luidii dictum ex lapidic, calcaria Salerenf.

trus elevationibus Vvu

Chamites.

Chama von Wuzelhofen vic. Ratisp. Chama rotunda planior lineis subtilissimis transversim striatis vic. Ratisp. Concha Veneris ex lapidic. Pfaffelsteinens. Concha Veneris von Dechbetten vic. Ratisp.

Pestinites.

Pectinites oblongus vic. Ratisp. Pestines non auriti Kneitingens. Pectines non auriti Salerenf. Pectinites uno latere e cardine protensiori striis aunal mile fubtilioribus vic. Ratisp. Pecten albus striis subtilioribus eiusd. loci.

Pectinites in lapide corneo Salerenf. vic. Ra-

Pectinites oblongus striatus pars interior cum

Pectinites dupplicatus Kneitingens. vic. Ra-

Pectinites suprema portio alata aus dem Niedermünster Steinbruch auf den Galgenberg prope Ratisp.

Pectinites testa altera plana, altera convexa Kneiting. vic. Ratisp.

Pectinites striis elevatioribus Wuzelhofens. vic. Ratisp.

Pectinites imbricatus et echinatus Salerens, vic.

Pectinites oblongus striatus Pfasselsteinens. vic.

Pectunculus striis minutissimis in lapide corneo Ratisp. iv modeland de la lapide cor-

Pectunculus striis profundioribus marmoreus ora Ziczac formante ex lapidic. Salerens. prope Ratisp.

Pectunculus albus uno cardinis latere latus se extendente Salerens, prope Ratisp.

Pectunculus radiatus striis laevioribus Salerens.
vic. Ratispinalis de la compositione de

Pectunculus planior Salerens, vic. Ratisp.

Pectunculus subtilissime striatus rostro in car-

Pectunculus subtilibus ora sinuata fere diaphanus Kneiting.

Pectunculus rotundus subtilissime striatus Sa-

= % ==

Pectunculus bifurcatus subtilissime striatus Pfaffelsteinens.

Pectunculus striis profundioribus Hirschlingens. et Kapfelbergens. vic. Ratisp.

Musculites. On at anothern inesh

Arca Noae ex lapid. Monasterii Inferioris in monte patibuli prope Ratisp.

Mytulites.

Mytilus planior ex lapidicina prope patibulum agri Ratisp.

Mytilus rotundior von Galgenberg vic. Ra-

Tellinites.

Tellina rotunda plana vic. Ratisp.

Tellina planior fasciata rostro paulisper in car-

Tellina in extrema parte striata plana vic.

Tellina plana rubicunda vic. Ratisp.

Tellina transversim striata in monte patibuli agri Ratisp.

Bucardites.

Bucardites seu nucleus conchae cordiformis intra cardinem et oram breviorem speciali

ciali excrescentia donatus, ut ei apertum patellinarum adnatum esse videatur ex lapidicina calcaria Salerensi vic. Ratisp.

Bucardites Pfaffelsteinensis.

Nucleus Bucarditis s. concha venerea cum cornibus completis ex lapidicina Monasterii Inferioris in monte patibuli prope Ratisp.

Concha cordiformis eiusd. loci.

Bucardites von Dechbetten vic. Ratisp.

Gryphites.

Concha curvirostra striis transversis ora ampliori Kneiting.

Concha curvirostra rostro spiram Neritis formante vic. Ratisp. Salerens. von obern Bruch.

Concha curvirostra mucrone minimo Pfasselsteinens. vic. Ratisp.

Concha curvirostra maxima rostro in spiram
Neritarum desinente ventre crassiori alato
cum operculo plano ex lapidicina in
monte patibuli prope Ratisp.

Concha curvirostra circellis innumeris ad modum testudinis Africanae pictum ex lapidic. Pfaffelsteinens, vic. Ratisp.

Concha curvirostra ora duplici ampliori von Dechbetten vic. Ratisp.

- Terebratulae. A alas Ingland annida.

Concha anomia laevis ex lapidic. Salerenf. prope Ratisp.

- ok -

- Concha anomia striata in extimo ora sinuosa ex lapidicina Kneitingens.
- Concha anomia von Sala prope Abach vic. Ratisp.
- Concha anomia undulata ex lapidicina calcaria Pfaffelsteinens.
- Concha anomia subtilissime striata Hirschlingens.

 prope Ratisp.

Echinites.

Flertha -

- Echinus cordatus spatagus s. clypeatus Kapfelberg. vic. Ratisp.
- Echinus planus spatagus in lapide fissili Kelheimens. Bavar.
- Echinus spatagus minor Salerensis ad Reginam prope Ratisp.
- Echinus clypeatus stella maiori in quinque radios excurrente planior ex vic. Ratisp.
- Echinus mammillaris mammillis acutis minoribus ex lapidicina in monte Pfaffelstein. vic. Ratisp.
- Echinus marinus mammillis minimis Salerenf.

 ad Reginam prope Ratisp.
- Echinus mammillaris mammillis maximis admodum magnus ex lapidicina Salereni. ad Reginam fluvium vic. Ratisp.

Echi-

Echinus mammillaris Kapfelberg. vic. Rati pon.

Acetabula.

Frustula Echini marini mammillis maioribus inordinatis Salerens, ad Reginam sluvium prope Ratisp.

Aculei. Dibiqui vo atalabau simona adonco

- Aculei Echinorum oblongi acuti acuminati Salerens. ad Reginam sluvium prope Ratisp.
- Aculei Echinorum minimi acuti longiores eiusd.
- Lapides Judaici pentagoni incurvati fingulares eiusd. loci.

heimenf Bavef.

Entrochi.

Echi-

- Entrochi rotundi minores a margine ad centrum subtilissime striati e lapidicina Salerens, prope Ratisp.
- Lapis pentagonus ad stellarum marinarum familiam pertinens Salerens. vic. Ratisp.
- Asteriae orbiculares f. dolioli Scheuchzeri Salerens. vic. Ratisp.
- Caryophyllithus pentagonus ex lapidic. calcaria Salerenf. vic. Ratisp.

Herba.

Radices graminis petrefactae Ratisp. aus dem Stadtgraben.

- ofc

Ligna.

Frustula ligni petrefacti e sepulcro Romano prope portam S. Petri Ratisp. essossa.

Funcites Salerenfis prope Abs

- Lignum petrefactum in agro prope Hohen Gebrahim inventa vic. Ratisp.
- Carbo lapidi arenario inclusus rarissimus in lapidicina prope patibulum territorii Ratisp. inventus.

Coralliolithes.

Corallium petrefactum ex lapidicina calcaria Salerens. vic. Ratisp.

Ramus Corallii maximus eiusd. loci.

Madrepora.

- Madrepora striis in lapide calcario Kapfelbergens. vic. Ratisp.
- Madrepora stellis concavis inaequalibus ex Danubio vic. Ratisp.
- Madrepora ramosa per totum lapidem dispersa ex monte inter Dechbetten et monasterium Pruseningense vic. Ratisp.

Retepora.

Retepora minima Salerens, prope Ratisp.

Fungites.

Fungites Salerensis prope Abacum vic. Ra-

Fungus infundibiliformis eiusd. loci.

Fungus striatus ex lapidicina arenaria prope patibulum territorii Ratisp.

Fungus reticulatus ex lapidicina Salerens. prope Ratisp.


Alcyonium petrefactum von Sala prope Abach vic. Ratisp.

Alcyonium tuberosum ex sapidicina Salerens, prope Ratisp.

Ramons Coralli maximus sived, loci,

Madesports firits in Japide calcano)

gentlyice Racips



Madrepora ramola per tetum lapidem difectia

rium Prufeningente vic. Meusp.

roomte fater Brechbetten et monaffe-

Refebora

Actepora munima Sal

Bon den eingeschlichenen Druckfehlern scheinen folgende besonders bemerklich:

Seite 34. Zeile 9. lies Eisen, und Kupferhammerschmiede. 3. 12. v. u. Salzheber. S. 36. 3. 14. Stifter und Klöster. S. 49. 3. 15. Prückel. S. 53. 3. 4. v. u. Epizootie. S. 57. 3. 14. v. u. contaminatur. S. 90. 3. 4. bange Niedergeschlagenheit. S. 94. 3. 11. Gum. Gutt. S. 96. 3. 13. v. u. ein Brechmittel. S. 98. 3. 5. v. u. anschaulich. S. 107. 3. 13. einst für meist. S. 112. 3. 1. Boerhave. 3. 2. Kämpfs. S. 115. 3. 12. v. u. Zehrsieber. S. 116. 3. 7. v. u. nach folge, lies aus Mitleidenschaft. S. 117. 3. 4. Trachea. 3. 12. ursprünglich für wirklich S. 125. 3. 12. v. u. seinen sehr abzgezehrten Körper. S. 136. 3. 17. Hausarzt. S. 137. 3. 5. sphacelos. S. 143. 3. 12. v. u. viermal, nähmlich alle andere Abend 15 bis 20. Stücke. S. 146. 3. 2. vierzehniährigen. S. 151. 3. 7. v. u. schwazte. S. 157. 3. 2. v. u. talkartige. S. 161. 3. 3. v. u. nach Gliedmaßen, lies: die langweiligste Wiedergenesung nach überstandener Krankheit — Erscheinungen, welche alle daraus zu erklären sind, daß die Nerven, die Leiter der thierischen Lebenskräfte, zu sehr gelitten — S. 164. 3. 7. in wahren Brand. S. 184. 3. 7. Summa 722.

Mon den eingeschlichenen Drudfellern scheinen folgende befondere bemeittig: Talk Constitution of 2 -52 THE STREET HEAVENDERS OF STREET STREE mater Singo. 15-121. S. 7. Cuality 1220

Erste Benlage.

Auszug aus den Wetterbeobachtungen von 1783.

· Physical Company	Des Ba	rometers	Des Ther	mometers	Des Hygrometers				
Monate.	Höchfter Stand.	Tiefster Stand.	Höchfter Stand.	Liefster Stand.	Liefster Stand.	Höchster Stand.			
Jenner.	" "" 5 27. 3, 5	26. 3, 0	8, 6	- 4, 6	11, 0	25, 3			
Horming.	27. 4, 6	26. 3, 9	7, 6	- 4, 3	10, 9	28, 2			
Merz.	27: 4, 3	25. 11, 8	11, 4	- 6, 0	14, 5	50, 7			
Upril.	27. 5, 4	26 8, 4	16, 7	- 0, 8	20, 5	56, 3			
Man.	27. 1, 3	26. 6, 3	21, 9	2, 6	17, 7	56, 7			
Juny.	27 4, 0	26. 7, 5	22, 0	9, 2	19, 2	46, 0			
July.	27. 4, 0	26. II, I	23, 5	9, 5	22, 2	56, 4			
August.	27. 4, 0	26. 10, 2	26, 7	8, 7	17, 9	51, 0			
September.	27. 4, 6/	26. 5, 1	20, 2	6, 9	22, 2	48, 4			
October.	27. 4, 8	26. 9, 5	18, 2	I, 0	12. 9	47, 9			
November.	27. 6, 2	26. 6, 2	11, 2	- 4, 8	12, 8	34, I			
December.	27. 4, 8	26. 2, 0	3, 9	- 20, 0	12, 0	30, 3			
Ganzes Jahr.	27. 6, 2	25. 11, 8	26, 7	- 20, 0	10, 9	56, 7			

Die herrschenden Winde dieses Jahres find W, NW, SO.

Die Menge des gefallenen Regens und Schnecs im Wienergewicht beträgt 22 Pfunde, 20 Lothe.

Gritte ja Single one one butter Tenner. The Orogen by evialence thegone with

Auszug aus den Wetterbeobachtungen von 1784.

	Des Va	rometers	Des The	rmometers	Des Hyg	Des Sygrometers				
Monate.	Höchster Stand.	Lieffter Stand.	Sochfter Stand.	Tieffter Stand.	Lieffter Stand.	Hochster Stand.				
Jenner.	27. 4, 6	25. II, 7	2, 2	— 15, 7	10, 4	29, 0				
Hornung.	27. 4, 7	26. 0, 8	6, 0	- 15, 8	12, 3	30, 4				
Merz.	27. 1, 8/	26. 0, I	12, 4	- 8, 5	13, 6	48, 6				
April.	27. 1, 6	26. 5, 8	14, 6	— 5, 8	18, 6	50, I				
Man.	27. 4, 8	26. 7, 9	24, 2	2, 7	23, 4	59, 4				
Junn.	27. 4, 0	26. 9, 2	23, I	4, 0	22, 8	58, 8				
July.	27. 4, I	26. 8, 6	24, 6	8, 4	22, 3	60, 0				
August.	27. 4, 4	26. 8, 5	25, 1	6, 6	23, 8	53, 3				
Geptember.	27. 5, 2	26. 9, 7	22, 3	4, 9	22, 3	58, 3				
October.	27. 4. 6	26. 8, 1	11, 7	- I, 5	16, 5	43, 3				
November.	27. 5, 6	26. 7, 2	10, 8	— I, 7	14, 4	33, 9				
December.	27. 2, 3	26. 2, 8	5, 3	- 12, 8	12, 5	23, 6				
Ganges Jahr	27. 5, 6	25. 11, 7	25, I	- 15, 8	10, 4	60, 0				

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH					
Heitere Tage	hatten	wir	das ganze	Jahr	57-
Schone Tage		- ,	-	-	74.
Wermischte	_	-		-	104.
Trube	_	-	-	-	131.
Regnerische	-	_	-	_	94.
Mit Schnee		_	_	-	43.
Nebel	-	_	_	_	65.
Donnerwetter		-	_	_	18.

Die Menge des gefallenen Regens und Schnees beträgt im Wiener Gewicht 17 Pfunde, 28 Lothe.

Branch ann consult in most totales SHALL SHALLS

Auszug aus den Wetterbeobachtungen von 1785.

A STATE OF THE STA	Stand des	Barometers.		eters nach ımür.	Dygrome de	ters nach Luc.	Angahl der schönen und trüben Tage.				
Monate.	Höchster.	Liefester.	Höchster Grad der Wärme.	Niedrigster Grad.	Größter Grad der Feuchtigs Feit.	Größte Trockne.	Ganz heitere Tage.	Schös ne Tage.	Ver: mischte	Trübe.	
	Boll. Lin. Decis									1	
Jenner.	27. 5, 9	26. 3, 9	2, 0	- 11, 0	11, 2	22, 6	6	4	5	16	
Hornung.	27. 3, 0	26. 2, 3	3, 0	- 14, 2	14, 0	28, 8	2	3	10	13	
Merj.	27. 2, 7	26. 6, 2	3, 8	- 20, 2	17, 6	38, 3	11	4	7	9	
April.	27. 5, 9	26. 5, 4	12, 5	- 6, 4	18, 7	45, 0	3	5.	13	9	
Man.	27. 6, 2	26. 8, 6	19, 5	1, 9	20, 6	57, 7	5	10	8	8	
Junn.	27. 5, I	26. 9, 9	22, 3	4, 6	21, 4	57, 3	3	11	8	8	
July.	27. 3, 8	26. 6, 9	21, 5	8, 0	19, 6	51, 0	2	3	15	11	
August.	27. 2, 9	26. 9, 3	23, 6	5, 2	21, 0	49, 0	0	6	14	II	
September.	27. 3, 6	26. 6, 6	24, 0	2, 6	19, 3	48, 7	3	6	15	6	
October.	27. 4. 6	26. 9, 0	14, 8	— I, 4	14, 6	41, 5	3	6	12	10	
November.	27. 5, 3	26. 1, 6	9, 8	- 2, 6	12, 8	30, 2	5	3	9	13	
December.	27. 3, 3	26. 4, 0	4, 6	- 5, 4	13, 1	28, 3	2.	6	5	18	
Ganzes Jahr.	27. 6, 2	26. 1, 6	24, 0	- 20, 2	11, 2	57, 7	45	67	121	132	

Regnerische Tage hatten wir anno 1785 in allem 96 : Tage mit Schnee 37. Donnerwetter, welche über die Stadt him gezogen, 10.

Das Regen = und Schneemaaß des ganzen Jahres beträgt im Wiener Gewicht is Pfunde, 22 Lothe. Juny, July, August waren gerade die nassesten Monate.

Der herrschende Wind war Nord, nebft ben zwen angranzenden NO und NW. Leitern hatten wir am haufigfien.

the probable Same? Server. Davider. the Taxonian her waspe Augusta de de chapte mai da da la lancida de la lanc

Auszug aus den Wetterbeobachtungen von 1786.

	Stand des	Barometers.	Thermo	meters.	Spgro	meters.
Monate.	Sochster.	Tiefester.	Höchster Grad der Wärme.	Höchster Grad der Kälte.	Gråd der größten Feuch- tigkeit.	Höchster Grad der Trockne.
Jenner.	27. 5, 9	26. 2, 5	6, I	- 12, 8	9, 1	20, 8
Hornung.	27 7, I	26. 6, 1	6, 2	- 8, 9	II, I	45, 5
Mert.	27. I, 7	26. 3, 7	13, 6	- 8, 5	14, 9	41, 8
April.	27. 4, 8	26 3, 5	17, 2	0, 5	15, 7	54, 9
Man.	27. 4, 4	26. 7, 4	20, I	2, 3	18, 8	57, 5
Juny.	27 3, 4	26. 9, 3	22, 2	9, 8	21, 8	54, 8
July.	27. 3, 7	26. 10, 2	21, 6	9, 0	19, 0	47, 2
August.	27. 2, 8	26. 8, 5	18, 9	8, 4	19, 6	41, 0
September.	27. 4, 9	26. 3, 9	19, 5	4, 5	20, 3	43, 5
October.	27. 4, 7	26. 8, 2	15, 1	- 2, 8	20, 2	38, 0
November.	27. 2, 4	26. 2, 3	5, 2	- 4, 3	13, 2	30, 0
December.	27. 6, 4	26. 4, 4	6, 3	- I4, 4	12, 0	23, 3
Ganzes Jahr.	27. 7, I	26. 2, 3	1 22, 2	- 14, 4	9, 1	57, 5

Der Regen von 1786 beträgt im Wienergewicht 28 Pfunde, 26 Lothe: es war also viel naffer als die vorigen dren.

	NO MARIA	August 1	
	图2019年4月8		773
	in Related a		350 010
		327.2 5. 9	Sennor.
	E	1 -1 11 15	- Lammag.
	1 8 81		410100
			Jack
	A notes		- 9092
	1 0 2	4 6 6 5	. design
			- amp
500			1.000,00
1200			en succession of the second
	2 2 3	THE PARTY	williams SD
1	1 2 2 3	34.	Todopola 1
		15 754	160 20000
	Contains into		To Ber Elegen
		-931	magiron
		The Property	
100			
100			

3wote Benlage.

Summarisches Verzeichniß der in der evangelischen Gemeine zu Regensburg Getrauten, Gebohrnen und Gestorbenen.

Jahr	Getraute Gebo	darunter Ohr. Todtgeb.	Gestorbene	Rinder	bochstes Alter der Verftorbenen.
1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776.	65. Paar 23 71. — 27 93. — 22. 67. — 22 69. — 25. 74. — 23. 76. — 25. 62. — 22. 64. — 24. 57. — 24. 63. — 22. 53. — 18. 72. — 21 80. — 23. 75. — 24 68. — 25	ohr. Zodtgeb. 6.	285. — — 382. (an Pocken 289. (allein 78. 260. — — 278. — — 291. — — 293. Pock. 27R. 256. — — 239. — — 369. Pock. 79R. 318. Pock. 16R. 371. — — 289. — — 234. — — 263. — — 268. — —	118. 198. 138. 124. 126. 147. 138. 108. 114. 187. 126. 125. 128. 119. 108. 121.	33
1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786.	60. — 24 53. — 23 68. — 25 70. — 253 79. — 16 57. — 243 60. — 247 55. — 280 57. — 253	6. 6. 3. 6. 4. 5. 8. 12. 5. 5. 5. 5. 5.	277. — — — — — — — — — — — — — — — — — —	148. 92. 118. 90. 133. 160. 152. 147. 109. 136.	30 \$\text{\$\text{\$0}\$. 60-69 \$\text{ \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$2}\$}}\$ \$\$\text{\$\tex{

affides (Organismin reach) 5004 -4 36 -H . GO

Begraben im Monat

Gebohren im Monat

	J.	F.	M.	A.	M.	J.	J.	A.	S.	0.	N.	D.	11	J.	F.	M.	A.	M.	J.	J.	A.	S.	0	N.	D.
1772.	25.	30.	38.	38.	43.	31.	29.	28.	29.	27.	27.	26		17.	9.	16.	13.	13.	13.	21.	12.	13.	18.	22.	16.
	100	1000		100000	32.	1000 M	0.988	St. 188	6 80	1000	The same of	S. C.						15 15 19	1000					17.	
1774.	23.	25.	29.	20.	18.	12.	II.	26.	27	15.	13.	15.		19.	15.	19.	12.	20.	19.	18.	24.	19.	21.	18.	21.
¥775.	19.	16.	23	18.	20.	33.	22.	17.	32.	21.	19.	23.		22.	19.	18.	19.	13.	26.	16.	18.	21.	24.	20.	18.
1776.	18.	19.	2.2	25.	27.	15.	17.	23.	28.	25.	28.	21.	11	16.	20.	21.	17.	25.	21.	21.	19.	19.	25.	27.	13.
3777-	25.	27.	27	31.	23.	25.	23.	26.	17.	23.	II.	19.			7000		1000					1000	The state of	21.	NO DESCRIPTION OF THE PERSON O
1778.	1000	1000	200	100	31.				100000	30	100				1 - 750 0	100000	1000	Market State	The state of	and the	1	San Control	1.9.1.1.1.1	17.	
1779.	25.	18.	20.	23.	24.	24.	31.	24.	20.	14.	22.	13.	II	25.	25	14.	16.	16.	23.	14.	21.	2.1.	28.	25.	26.
1780.	14.	14.	28.	23.	23.	18.	22.	23	12.	18.	19.	20.	H							1			3	22.	
1781.		1	1000	10000	22.	1	17.1383	169	0.000	L. FORMAN		100000	11			1000	1000					1000	330	21.	
1782.		1		1	27.	No. of the last	MALLE MAN	1	No.	To read					1		-		333	1000	1			26.	
1783-	1000			100	31.				100	The second		10000	H			1	No Par	1	300		1	1	1000	19.	
1784.	1000	1000		10000		133	-57	1330	100000	1000		15.			1000		100			1 2 4		1000		16.	
1785.		1			25.	15000			1000		23.	28.	1						100	1000		1	1000	19.	0.00
1786.	134.	121.	138.	138.	: 18.	133.	121.	118.	116,	116.	115.	116.	11	29.	114.	119.	122.	129.	120.	124.	121.	114.	117.	17.	174

... Begraben im Divingt \$773. 41774 STEE 10000 4878 1285Z Billion St. Mar Land on Land Land Land Land Land

Summarisches Verzeichniß,

der in den zwo Stadtpfarren, und der ben den Reichsstiftern Ober- und Nies der munster zu Regensburg

Getrauten, Gebohrnen und Gestorbenen.

Jahr	Getraute	Gebohr.	Geftorb.
1766.	130. Paar	453.	437•
1767.	124. —	430.	413.
1768.	130. —	417.	416.
1769.	106. —	424.	404.
1770.	79. —	428.	448•
1771.	41. —	296.	445-
1772.	67. —	214.	560.
1773-	105. —	245.	373•
1774-	138. —	363.	355-
2775-	164. —	425.	381.
1776.	166. —	417.	380.
1777.	172. —	424.	371.
1778.	155. —	398.	372.
1779.	154. —	441.	404.
1780.	144. —	460.	373-
1781.	149. —	424.	406.
1782.	128. —	415.	372.
1783.	129. —	449.	418.
1784.	132. —	433-	474-
1785.	130. —	437-	392.
1786.	113	437.	388.

Withinging and the committee abtorareen, molor ist dimensional nativilladiant and an appropries utan, Grashanan uma Gaga \$51 4354 HI. 473 ,obg .sp: :070 135% 2373 BEEF. 417. 172 1100 Train . 24至年 TANK. PREL

	CONSP	ECTUS MO	ORBORUM	ANNUORU	JM ELAPSO	DECENN	O REGINI	OBSERVA"	TORUM	la sure La supplication
	1777.	1778.	1779.	1780.	1781.	1782.	1783.	1784	1785.	1786.
Januarius.	Afilmata. Cazarhi, Tuffes freq. Phthricis et vémicas in perces alentibus ments infau flux. Abortus divert temporia, in peinis tri- mettres. Varioltrus bon. ind. continuatio.	Morbi catarchal, Rheu, matifiai, Paimanum Ia, be laborator minime turi — Febres tertia- nee. Temp. calidior menfe fupeliscii i ceter, ca- dem.	Mothi catarth, cuimque generis. Febres malignoe lentae Vo- gelli f, nervoñe An- giorum, praeterio men- tee iam cetxe. Dolo- res articulorum. Temp. maxime incon- fians et commutata.	Catarrhi, Tuffer, Rheu matiful, Fautium do- lores free, Febreiery fipelacese, non nan- quam obviae, Temp, feigidifus,	Catarthi eme. gen Afthmata et leator Apopleside infalter fe niotes vexabant — iu niotes water Tuffe, phthifin generanes. Temp. varia — frigi da : ficea i brenida : ni vofa : pluviofa.	Tuffes: Febres then mat, et casarh, iado lis Podagra Haemor thapas uterinas. Va tiolee ratior. Temp. fingulis fere fet horis commutata — femper frigidialcula—humida.	Cateral, Tuffer, Do- lette articulorum, Apo- piecia, certe Hemi- piecia feaiorum, Pathi- la pulmonal. Temp. iaconfians ful- surfier, menfir frigida. Polt plaviola — fub fi- gen amocna.	Morbi counth. Pebei quaedam billofa, pice riedis speciem pries ferens emeticis et ci thericis folum fana da, frequens. Morbii. Temp. perfrigidat ni ves continuae et for quotidinae.	Tuffes, reeffiler. Tu mores se Febres ex serrh. belifote ruillee Morbi gaffrici purr serrarum. Pleusitis ver pararum. Pleusitis ver pararum. Variolae bo nate. Temp-far frigida et fic ea: ultimo stenfi, di nives multue.	Febr, can, billiofie frequentifi, facile in guardas verte ubb billi shoudarn non fisem climinabours, Haemorathagise uteri et abortus. Variolas vera et fipurise; Tulis convultiva, infant. Temp, non certa frigida, humida,
Februarius.	Rheumstifni, Otalgis Odontalgia cet. Cetar- rhi omo. gen. Phthific et Hydropicia non rul- li. Variolae benignae.	Temp. frigida ; nives	Febres mal, lent, Rheu- mardini, Dent, dolo- ces, Faucium inflam- mat, frequent. Temp, menfis incuntis humida, nebulofa; ex- cuntis ferena quin ca- lida,	Pathifis infefts,	Pulmonarii praecordio rum morbis praecipus aegrotabant, Ceterum conflicatio Caternalii. Febres intermittente: rane. Temp. Intetta, plavio- fa, frigida.	Tems, varia, A die 1	Temp, plerumque plu	Febres caterrh. billo fae indolis. Tuff phthyficos maxime i fettans. Morbilli. Temp. Frigus cum a ve multa — blenf exitus tribli elavi squarum nobillis.		Meebi rheemssica bi- liofi multi emetich fu- pat, Cararlo, Tuffer, Pedagra. Variolee et Tufis convulfiva in- fant. Temp. Primem uvida dein amouna et ficca port frigida, popullo- la.
Martius.	Febrei inflammatoriae non malles involere: Podagra flos vificavir. Variolae continuama: Tuffa contrativa: ve- savit parvulos,	Leviores eculor, in. flammationers, Febres cararts. Tuffer, Receasant convultionibus frequentel mote. Tresp. Uvida, far calida — budden fices in twe fere sullar,	Morbi catarrh, oma, gen. Infantes pracci- pue, et liberi annun feptimum nondum egretti, Febelbus ca- berth obnoxii. Temp. ficca, amoena: dots fereni, calidi.	Febres catarth, fre- quences, Dolores ar- ticolorum. Temp, interes, plerum- que pluviofa humida, frigida.	Tuffes; pottim Pleusi tides cum fputo croen- to. Variolae rarae be- nignae. Temp. amoena fit ca- tida.	Moebi poftoris varii Febres catarith, cur Tuffi can ex pulmoni bus quam ex addemi ne proveniente, infan tes practigue vexaban — Dolores rheumat. Temp. frigida, humid rato per diem ferena.	Morbi pettoris, Tuf fea,Ruccedines,Feber causerh, perchaetitans in primis informen. Rheumantiful. Dolore artic: Scabies. Temp. Printum homid dein ficea — ventoria— amoena.	Catarrhi vehemen cum febre et fruto fe re parallento. Teb. bi liefae multire, non nul lae puridae letal. A thinios. Apoplexia. Trmp. frigida - humi da - nives.	tis, Bilis omnium fer morbor, fons et origo Infultus apopletici- Variolae feorad, et mi	Febr. catarth et rheum, bilistic multar, Apo- plexiae, Variolar et tudis convelle non ra- to lechifera. Temp, prim, amoena dein nives et gelu poli nives, et plusiae et caelum fesen, alterna- bont,
Aprilis.	Verieles consisents	Petr, interm praecip- testamae. Discribesse parvulceum et adultor. Morbilli-bonse indol.	Temp. incends, calids, feca.	Febr. carrett. Ca. carthi fingl. Filmo- num aut alias viferin labe laboranium nor- tes aut funes pericu- ty. Febres interm. fpo- rad. Temp. frigida — ple- rumque bumida.	Temp, amoens calida	Febres terr. Motos febr. e crudis in vin primis fordibus, Colica. Temp. femper frigidi initio ferena — poli	Colicae biliofue, Ca-	Pebers billiofre for	Febres biliof, multue conia Genia, sheema tica, opopietica, ma niaca, abbunitca te clue, abeuntes non nur quam in purridas le stulce — Febris in a cermi, proxime terris-	Dolecte rheun, acu- imma e Nile i Colicae birdene quin fere Cha- lera medio mente ade- can i Cararhi peri- nace; Infantes acro- riante consideration of the Tuffi corrult rato Va- riolis. Carlum ferenum cali- dum.
Maius.	Febres interm, prae- fertim tert. Dolores rheum. Variobse bo- nae femper indolis, jed rarse. Temp frigida plaviofa ultimi menfis dies ca- liés.	Morbillorum continua-	Dolater colici: Feb- rei rheumat, intermit- tentes praccipue. Temp. calida, amoena, tieca.		Moeas febrium in pri- mis serianne. Infultu- apopletiic. Temp. calida: pofi fri- gida et venoca: ite- rum calida et ficca,	pit per 4 hebden. Temp. hamids, frieids	Febr. cutar. bonae in- termitetures glerum- que tertianne, Morbus atticulorum, faucium Dolores, Temp. certa: cullida, ticca.	Febres tertisnae,	Morbi biliofi vi et nu mero autii. Febre tertianae : Rheumarii ni. Varietae rariores.	Morbi rheumstico bi- lioù frequentes nec manquam fancili. Mor- bi pectoris varil. Pathi- fici laboranter. Hydro- pes pecit. Variolae fpa- tier. Tulis convul. Temp. in constant, fri- gidicicals.
Junius.	Febres interm. Fau- cium dolores. Variolae sporadicae. Temp. varia — sicca et calida cum humida et frigida aitem.	Tuffes non nullise fto- math, cum febre con- incides. Appolexiae fe- niorum. Morbilli er febres terriame ran- Temp, amonta — fub in, meni. plaviota.	Dolores theomatici et articulorum. Variolae fgurise. Temp. varia, calida, humilas.	Delores rheum, Mochinereum irritabil, us mocas cellept, hafter affectiones, paealyses apoptexise. Temp, frigidala humi- da.	Pulmonstiorum diferi- mina et mortes. Distribone quin Dyfeate- fate lenior. Tenty, initio amocaa, et caliba — in fate hum, pluv, et vent.	Febris cotartà, epid. continuatio et propagatio — ut equiden ad po es affecto viderim brevi remp, fpatio. Sequebannar dolore: Saucium. Temp. calida, amoera, fices.	illis nebula Sisbourand	Febres billofae free Morbi gaftrici mult Febres tertiane co tarth. Rheum, rat. Temp. calida feca - non multae pluviae.	Febris femper billofs- non nauquam in putri- dam degen. Febres tert. Variolse verse— hine inde fputise. Temp. Varia femper frig duls.	Febr. rheum bil. Mor- bit gaft. bil. Diarh. Dol. collit &c. fre- quences. Febres is term sheum. I uff. con- vulf free. Variolase ve- rue et fpiz. Trap, isilio amoena calada — in fine humi- da.
Julius.	Febres intern, ratio- res : Variolae ratif. Morbl pauci. Temp, frigida, plevio- la, nebulota — toni- trux et fulnita mais,	(Cents table)	Perpauci aegrotantes. Excunte menfe Disr- thoese. Temp. calida, ficca, amocna.	dae malignae, indeba.	Indigefliones, Dolores cholici. Distribuse quin Dyfenterise freq. Temp. fat calida et fic- ca.	Variolae et febris fest- lat, freq.	Febres tert, rar. Infal- tus apoghett, fectioran Junier, morbus ar- ticul. Caelone fervidum ne- bula itha fingulari re- ctum.	dante bile oreac.	Tour, varia : playing	Dolores colici ; Cho- lorae ; Diarrhoea, Feb- res tert, multae, Ar- thriti biliofae iadol, pertitux. Variolae — Tufis convalí, freq. Trap. eb multas pla- vias temper uvida.
Augustus.	Pauci morbi: non nul- li Catarrhi, Rheumstif- mi, leviorer faucium Inflamma. Temp. fat calida et ticca : nobbe in fase mentis frigidae.	The same of		Diarrhoese. Febres putridee maligne fpo. rad. Caelum fedum.	tions therences				Diarrhoese — Dyfen- erise Morbique-billof puerperas praccipus vexantes. Contam unidam et fri- gritum.	Monhi billofo - rheu- mat. Dolor colicus. Cholera, Diarrit Indi- geft. Febres latern. Ingeredic — Soporo- fina femel vidi Taff. Sonor, Varial verse et fruitset. Trang. frigida, plavio- fie.
September.	Distributes, Catarrii, Rheumatifini, Tuefil- larun inflammationer a- Tuffis convulfice. Temp. ficea, callda, amoena i moèter fri- gid,	Distrincese, Catarrhi, Podogra, Pleuritis fpuria, Temp. hunida, frigida-	Dyfenterise non nul- lse,	enterior rar. Corprae. Catarthi, Tusta con- valli. Temp. prinsum celida	Diarrhoese et Dyfen- teriae inter rafices praefettim frequences Apoplexia, Paralytis, Tesp. Calida — non frigida humida, vent.	ris totius, vel paroti-	Tutis estarrh, et con- sulfivz, Variolae,	enteria, Febres bit, multae putrides que- dan : intermits, copio- foe Varioles rare.	Dolores colici; Dlar- rhocze, Dyfenterise, Febers terisease— quos morbos billi abun dans progenuit onner. Temp, primum calida et amica: port pluv. nebul, frigida.	multi Dolores colori Diarrhoese, Feb. in- term, Apoplexia, Po- dagra,
October.	Catarrhi et Febres e faburra in prim, viis. Pedagra. Tuffs con- vulf. Variolae in re- recionibus urbi noffrae vients multae. Temp. Varia — A die 10-15 frigus magnum: 24-31-horse verpert. coliddimae — tonstrua et fulm.	Morbi caarrhal, Afth- mata, Tuffer, aliae pe- doris afect. Erythys- las i Archrisis Pedagra. Temp. playsiofs — fri- glah — calida Die 19. Danubi eluvio.	Affectiones pectoris, Cararbi cet. Dolores collect freq. Variolae (porad. Carlam amoerum et calidam — Tandem pluviolum.	Diarrhoese Eryfpelas, Rheumatiin, Feld ca- turbales, Synothi pu- tridae mal, Temp. frigids, bunida zaro ferena.	Inflammationes fauc. Angiase. Dolores Ar- their. Februs quotid. Variolae froq. Tomp. uvida, frigidiuf- cula. Pluvise multae.		Temp varia: amoena	Temp. Post ficcam ha-	fine fices fat frigida.	Dolores rheum, Morbi billess freq. Fodogra, Apoplex, Catarth, suf- focat, Tuff, consulf, Febr. tert. spor. Tu- more gland. inguin- Abertus. Tempefas conshans et anotas.
November.	Morbus regios fenior, Tutis alique affect, pectoris. Podagra, Temp. pluviofa, ne- bulofa parum frigida.	Tuffer, Faucium in- dam, Rhegman, Do- bers colic, Aborus- Temp, playlofs et ne- bal. Post reigns fun- mum aura fere repens.		Rheumatiful, Del ar- ticul. Febres intern, parvulerum. Vaiolas rares. Temp. Pluvine - post frigun et carium fe- renum.	Delores arthr, multi et Podegrici, Febre- nea nullar tert. Va- tiolie bonac freq. Temp. humida frigida	Delores colici, Rheu- marifmi, Afthrasta, Ery- fipelia. Inflam. fou- count. Cariam gelidum. Nives.	frigida fices.		la, ficca.	Morbi theumat, billofi freq. Podagra. Apo- olex. Erysp. Aften. Catarria, Peripasum, otha. Icherus. Va- iolae ben. Tuff. con- uif. Fremp. primum frigida, ein humida nebal.
December.	Culos boulden at	Morbi catarth. Apo- plexia, Febr. continua- feu fynochi puridae in sedibur a reth- gamete Dambio predii obvine. Temp. plusofa paene calida, Nisca pullae. Venti,	Code - Land - Maria	Rheumatz, Rausedo, Catarrii, Febrei in- term. Temp. humida, fryida,	Amhritir, Afthm. Apo- plexine. Variales. Febr. fearlatina. Temp. varia: frigut, nebulae, pluviae, ni- vez.	ou minime accreum.	freep, varia, die 29 - 9	emp. fie frigida, fc- ti	emp. pro mente amoe	opine. Eryfipeler, equentes Indig. Hac- orthogies. Abores- tobi mucofo - bilofi- arioles. Apoplexies. imp. initio frigida, in alves ce plurase,

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
35%	1	A CAST DESIGNATION OF SHARE	
		- Top an a resident	
-	0.1019 01019	Anne desillerad.	- Shirta A
	TAR PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE		
-	75 100 100	Marie ar, continuació	
		Communication of the service	
	人名 中心 以上	Hally a Strain Franch	
	-	neografication of the	
	and the same of the same of	The state of the s	
	ALTERNATION DE		经验的国际
	CA STREET	shreet interm, pane-	
130			
	E STATE OF THE STA	resolve trat diffe	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF
	riging, apagi	roeding Variable boy	
		lation remain suc	
	created the series	and range.	Maius
		******	CUIDAN
15	No. of Parties		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
The same		defendy adigish specific	
		so sits attion indicted	
1	THE PARTY OF	The Real Property Control of the Con	draw and the second

	A STATE OF THE PARTY OF		
8	W. Tolley	The state of the s	Commission of the last section in
		THE PARTY NAMED IN	
	* as woll of R	holiege income. Tou	
	Tura Valoria		
		ream dolores	
		Variation (portained	arrest T
	1. 1. T. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Language from the selection	51111111
	And the second		
		and the second second	
	1. 张一切自己	HARMEN-LOUIS CONTRACTOR	
	. Broth and	HOLDER WAS STORED	
	AT THE REAL PROPERTY.		All the second of the second o
		AND THE RESIDENCE OF THE PARTY	
	TO THE PERSON NAMED IN	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
	A STATE OF THE STA		
	Toni long	Mint subbey 1 3	The same of the sa
	The section of	willing the block of the State	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.
	Taxonish	10 M . 420 Mg 10 10 TO	The state of the s
300	S. S. W. T. C.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1931	Carry Carry	de la	autin the
	THE MUNICIPAL OF	Town, trigitly, planted	
1324	has be willed	with the state of	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
	105 July 14	attente attentione en ment	
14-19	1		
149	B187000000	The state of the state of the state of the	
	200000000000000000000000000000000000000		
1	TO PARTY OF THE PA	STATE OF THE PARTY	The second secon
	The state of the state of	Commence of the second continues of	The Many of the Control of the Contr
	The state of the s	TENNESS CONTRACTOR OF THE SECOND	The second second second second
	The second	the second second second	
	Within world	Paget merbic hen nel-	
			SALASTA CATALON
		15 Chestriff, thisespecial-	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW
		only-leviner feathers	
			Augustus.
			· Call Land Land
	The same was	29, 45/00 100 24/2	
	TARREST !	THE PARTY OF THE P	

.

