

Commentatio sistens partus naturalis brevem expositionem / [Johann Jacob Römer].

Contributors

Römer, J. J. 1763-1819.

Publication/Creation

Goettingae : J.D.G. Brose, 1791.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/d5vkwf4j>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



44384/B

J. x x x
18/2





Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b28764651>

20
COMMENTATIO
SISTENS
PARTVS NATVRALIS
BREVEM EXPOSITIONEM

A V C T O R
D. IOANNES IACOBVS RÖMER

EDITIO SECVNDA

GOETTINGAE,
Apud IOANN DANIEL GOTTHELF BROSE

СОИДИТИИ

SISTENS

БРЕВЕ ИЗЪ ПОСЛОВИЦ
И МАГИЧЕСКИХЪ МЕНЬШИХЪ

А С Т О В

Д. ДОВАНСКАГО



ДЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ

ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ПЕРВЫЙ ПОДАЧА ВЪ БАНГКОКЪ

35014

PIIS

IOH. HENRICI RAHNII

MANIBVS

PAVLO VSTERI

IOH. HENRICO LAVATER

AMICIS. COMMILLITONIBVS.

SACRVM.

Hodges
23/6/03

pis

ПИНА ГЕРІЦЯНІ
HOH. HENRICI

MANIBAS.

PALO VSTERI
HOH. HENRICO LAVATERA

AMICIE. COMMUNIIONIBAS.

SACRAM.

Cum maximam, quo hic commorarer,
temporis partem, in addiscendis artis
obstetriciae disciplininis versatus sim,
haud abs re fore duxi, peracto iam curri-
culo academico, quaedam ex ea ipsa petita,
proferre. Et quidem de *partu naturali*
mihi sermo erit, quod superuacaneum et
nullius momenti videbitur iis, qui obi-
ter tantum et quasi praetereundo ob-
stetriciae artis fontes adiere. Evidem
multo magis vereor, ne viri in arte nostra
peritissimi praeponerum potius et ad proue-
ctiores annos remittendum ducant labo-
rem meum. Quem enim, qui vn-
quam obstetriciam professus est artem, la-
tere potest, partum naturalem fundamen-
tum esse, quo omnis nostra theoretica par-
tus cognitio nitatur, auxilium in praeternat-
uralibus et difficilibus casibus ferendum,
superstruatur? Quis est, qui nesciat, in
partu naturali, quamuis vulgatissimo, mul-
ta adhuc, et haec quidem grauia, esse ob-
scura, et non nisi serie obseruationum soli-
darum, et maxima cum diligentia instituta-
rum eruenda, firmando?

Noua autem atque inaudita proferre, vetat iuuenilis et nondum satis experta aetas, vetant limites, quas mihi ipse in elaborando isthoc specimine breuissimas, praescribere debui. Sed eandem materiam vbetiori et pleniore sermone, et multo pluribus firmatam et locupletatam obseruationibus post aliquot annos pertractandi animus mihi est; ita ut sequentes pagellae schema tantum seu skeleton sectionis scripti illius, quae (missis theoriis de partus mechanismo etc.) strictiori sensu de partu naturali aget, offrant. Sequenti vero ordine rem ipsam adgrediar:

1. Ex obseruationibus a me ipso summa qua potui diligentia et attentione, in nosocomio grauidarum Goettingensi, sub auspiciis praceptoris mei et Fautoris pia mente colendi Cel. Prof. FISCHERI, florente, institutis, vnam alteramue continuo sermone narrabo, vt exinde methodus appareat, quam in exarandis fere quadraginta aliis sequutus sum.

2. Deleatum quatuordecim obseruationum in formam tabularem redigam, omnia quae mihi memoratu digna visa sunt comprehendentem.

3. Ex his Obseruationibus, veluti corollarium, partus naturalis historiam deducam.

Fortassis nonnulli mirabuntur, quod tam parcam auctorum copiam citatam reperient; ad sciant rogo, hoc bono consilio fuisse factum. 1. enim, lectione omnium librorum et breuiuscularum commentationum ad dissertationis Thema facientium tempus, senioribus, grauioribusque et per totam vitam profuturis lucubrationibus destinatum terere nolui; neque inamen iactantiam maximo soluere damno meo. Quamuis autem 2., persuasum habeam, quod scribenti de hac illaue materie, optimi quiuis fontes adeundi sint omnes, tamen non video, cur lectores tam omnis eruditionis expertes sibi singat auctor, quin hos in arte magistros et alios plures iamdudum legerint atque in succum et sanguinem conuerterint. Taedium sane et stomachum mouet, si quotidie tantam scriptorum copiam prodire videmus, quorum quarta seu tertia pars in citationibus aequa superuacaneis quam falsis et saepissime ab antecessoribus mutuatis consistit. Ego nempe auctores allegando hanc legem sequutus sum; vt vbiunque cum plurimis ab omnibus pro *artis magistris* habitis sensisse, nullum plane testimonium subiungerem, quia meis obseruationibus tam certus factus sum, eos bene obseruasse, vt easdem nunc pro meis agnoscam et vna cum antecessoribus meis earum veritatem vindicem: vbiunque autem a praeclararorum, et summorum in arte virorum sententia discreparet, vel

vbi hoc vel aliud propositum auctoris cuiusdam, adhuc incertum et ambiguum haeret, ego vero siue testimoniis aliorum siue meis obseruationibus hanc vel illam difficultatem tollere, errorem emendare posse crederem, tunc sancte auctores allegarem, tam illos cum quibus, quam contra quos sentirem. Si autem iudicium isthuc meum de citationibus contemtui verae eruditionis, siue propriae negligentiae, quam defendere studerem, tribuere velit aliquis, certe, multum falleretur. Nam si quis alias, certe ego vetam eruditionem et praecipue historiae litterariae studium adamo et pro viribus colo, mihiique facile fuisset immensam copiam auctorum de materia mea tractantium, referre. At omnia haec *suo loco*, bona atque optima esse, sed heic neutquam pertinere existimo. Caeterum ipsi de hac re iudicent viri omnis generis eruditissimi: ego leuiter tantum opiniones meas proposui, et ad illorum indicium libenter me compono.
Nunc ad rem.

I.

*Partus absolute naturalis foeminae
primiparae.*

A. M. W. mulier viginti trium annorum, bene conformata, robusta, staturae procerae, quae inde ab initio mensis Augusti anni 1785 grauiditatis signa, et ad finem

De-

Decembris primos embryonis motus sensisse se credebat, et versus d. 24. Iunii mensis, gestationis finem exspectabat: caeterum per omnis grauiditatis tempus sana, exceptis affectibus quibusdam peripneumonicis, a plethora oriundis, qui autem venaesectione et regimine antiphlogistico statim tollebantur.

Haec vespera diei 18. Iunii mensis hora decima subitaneo vomitu corripiebatur, quem illico dolores *praesagientes* excipiebant: hie in medio abdomiue inciepiebant, et sensim sensimque per eius latera pergentes tandem in lumbis cessabant, et longioribus interuallis redibant. Perfriguit paullulum foemina, sed praeterea nihil incommodi sentiebat. Transacto sic medio noctis dolores nunc paullulum frequentiores fieri coepere.

Hac nocte aegra nullum plane ad ponendam vrinam stimulum sensit: at mane diei 19 symptoma istud apparuit.

Die 19, hora 8 matutina. Dolores quibusuis dimidiis horae quadrantibus redeunt; augentur numero quando foemina circumit, minuuntur, quando subsidit.

Ventriss tumor minor quidem factus tamen vmbilicum palma transuersa superans. Integumenta admodum expansa, attenuant abhinc quatuor diebus aliquantulum relaxata. In dextro latere tumor nonnihil maior percibitur, quam sinistro. Genitalia externa tument: vagina relaxata, lubrica. Caput luculenter praeuum, supra arcum

ossum pubis firmiter haerens, immobile. Cervix vteri, tam alta haerebat et tam profunde in excavatione ossis sacri occultabatur, ut digiti tangeutes vix ac ne vix eam assequi possent. Solummodo superueniens dolor, eam digitibus explorantibus appropinquabat, et tum reperiebatur ceruicis adhuc portiunculam minutissimam adesse, orificii aperturam circa tres ad quatuor lineas in diametro habere, et velamenta se tendere.

Cum iam per triduum alui obstrunctione laborauerat, enema parturienti applicabatur: quo facto duabus vicibus aluum depositus, et doloribus auctis afficiebatur.

Hora 11. Nihil quidquam mutatum, excepto vteri orificio nunc paullulum magis aperto.

Meridie aegra magna cum appetentia cibos sumsit. Hoc vero nullam dolorum mutationem adferre videbatur.

Hora $3\frac{1}{2}$ vespertina. Omnia in eodem statu, nisi quod nunc medium digitum per os vteri transmittere valerem. Cervix nedum adhuc omnis euanuit.

Hora $6\frac{1}{2}$. — Dolores multo vehementiores fiunt. Labia orificii vterini nunc omnimode detersa; Diameter oris vteri dimidi pollicis magnitudinem aequat: Velamenta etiam, sub doloribus tensa, nunc maiorem circumferentiam prae se ferunt. Orificium vteri antea vix attingendum, nunc pollice depressius. Ad matris sinistram distincte sentio futuram sagittalem secundum

diametum obliquum procedentem: supra ossium pubis arcum fontanellam minorem: sensisse mihi etiam lambdoideae crus videtur.

Hora octaua vespertina denuo clysma applicabatur, quo cum sordes multae dieictae fuere.

Viginti ante nonam horam minutis, vomitus vehemens exortus.

Hora 9. — Transitus in *secundum stadium* in propinquuo est. Mucus vaginae rubro tingitur. Orificii vteri crassities dimidiā lineam non excedit; aperturae diameter tres pollicis quadrantes aequat. Dolores vehementes quidem et frequentes, at a parturiente non suffulti, aderant.

Hora 9 $\frac{1}{4}$. Iam secundum stadium penitus ingruit. Orificii aperturae diameter pollicem superat. Velamenta, etiam cessantibus doloribus extra orificio protrusa. Dolores efficaces, singulis fere quatuor minutis redeuntes.

Abdomen tactu dolore coepit. Hora undecima. Velamenta ex orificio prominent satis, sed nondum tantopere expansa ut rupturam tam proximam crederes: attamen rumpunt. *Initium stadii tertii.*

Aquae, octauam mensurae partem efficienes, magno cum impetu profiliere.

At nunc lentius exspectatione nostra processit res: dolores quidem et vehementes erant et frequentiores: at parturiens sub doloribus dorsum incuruabat, ita ut nifus efficaces edere non posset. Verisimile etiam

etiam est, crebras explorationes, quibus vagina omni muco suo priuabatur, in causa huius lensoris fuisse.

Hora 11 $\frac{1}{4}$ — Caput totum quantum in vagina; perinaeum sub doloribus tensum.

Quatuor ante primam diei 20^{mi} horam minutis, tumor capitis iam extra labia magna conspicuus, et pauca minuta post, peperit foemina,

Post partum viribus delapsa aegra, toto corpore contremiscebat, admodum dolorosa, frigore concutiebatur et Lipothymia leuiori. Tum paullulum calidioribus vestibus tegebatur puerpera, illique guttulae quadraginta Liquoris anodyn mineralis Hofmanni instillabantur: quo facto suavis somnus solutionem placentae nonnihil retardans, illam excepit. Tandem hora secunda noui diei paucae guttulae sanguinis stillauere. Sed expulsio totalis placentae, tantum viginti post horam tertiam minutis euenit, sine magna sanguinis deperditione.

Infans recens natus foeminini generis erat.

Pondus eius 7 $\frac{1}{4}$ libr.

Magnitudo viginti vnius et dimidii pollicum

Diameter. capitis maior 4 poll.

- - - - minor 3 $\frac{1}{2}$ poll.

Funiculus vmbilicalis crassus, collo infantis semel circumvolutus, hic illic varicibus aspersus, viginti nouem pollices longus erat.

Is, vti fere apud omnes caeteros compertum fuit, versus marginem placentae insertus, et Velamenta eccentrica rupta erant.

Placenta oblonga, 1*1*/₄ libr. aequilibrabat.
Notanda.

1. Quod parturiens doloribus tam atrocibus in pedibus et genubus cruciebatur, vt quum a valida sustentatione harum partium multum leuaminis sentiret, quauis occasione hocce auxilium a nobis expeteret.

2. Quod iam inde a hora secunda diei 19 tam bene se gereret in sella obstetricia, vt, quamuis pro lubitu illi ingredi, decumbere, sedere licium fuerit, tamen hunc sicutum quibuscunque aliis praeferret.

II.

Christiana KÖHLER, Nordhusiae incola, nouemdecim annos nata, primipara, statura mediocris, inde a tertia Iunii 85 hebdomade grauida, penultima eiusdem anni hebdomade motus infantis primum sensit. De cetero per totum grauiditatis tempus sanissima, nis quod mammarum dolores atroces perpetua est, qui vero cessauere.

Haec noctu diei vigesimi Martii 1785 doloribus lumperum, sensu aegritudinis, et crebro instinctu vrinam mittendi, corripiebatur. Dolores in lumbis incipiebant, et exinde per totum abdomen se propagabant.

Die 21. hora 9 matutina Dolores vehementes, frequentes. Perfrigerium. Nausea.

Abdominis tumor vmbilicum palma superat; durissimus; in primis in regione vmbilicali, vbi quasi in montem ascendit: in dextro latere paullulum maior. Vmbilicus ad omnes dimensiones valide protrus. Pudendorum labia tumida. Vagina muco repleta, dilatata: caput mobile, supra arcum ossium pubis defixum: segmentum inferius carnosum. Portio vaginalis penitus detersa: orificium vteri renuissimum et eo usque apertum ut medium digitum immittere possis; orificii margo rotundus, et acutissimus, ita ut nullum dubium amplius adsit, primiparam eam esse. De velamentis nondum satis distincte aliquid sentiebatur.

Meridie in eodem statu omnia reperiebantur, si orificium excipias, nunc magis apertum, et velamenta tactu distinctissima.

Hora 3 $\frac{1}{2}$ pomerid. Abdominis tumor transuerso digito magis subsidebat. Partes genitales muco quam maxime repletae. Orificii aperturae diameter tres pollicis quadrantes aequat. Velamenta sub doloribus paucis lineis ex orificio prominent, etiam cef-santibus doloribus facilis negotio distinguenda. Dolores valde efficaces quo quis quinto f. sexto minuto redeunt.

Hora 6. Vomituritio. Vomitus exiguus spontaneus: Dolores et vehementia et frequentia aucti. — Vacuum sinistri lateris nunc magis notabile. Vterios maxime dilatatum, tenuissimum. Velamenta iam extra
do-

dolorum tempus non nihil prominent, recte sita esse videntur. Mucus sanguine tintus.

Hora 6 $\frac{3}{4}$ Clyisma applicabatur, quod sedes copiosae insecutae sunt. Postea dolores multo minus efficaces et lentiores evasere.

35 minut. post h. 8. Velamenta rumpuntur. *Initium stadii tertii.* Iam languore coepit parturiens, et dolores vix aliquid effecere; ita ut hora decima optimum fore ductum fuerit, forcipem applicare: minime nempe dubitatum fuit naturam solam non sufficere ad expellendum infantem: at quum iam per aliquod tempus caput in vaginam propulsum fuerit, metus exstisit, ne si diutius illic commoraretur, hoc vitae infantis periculosum fieri posset. Forcipe itaque facillime applicato, octo tractionibus, quibus decem minuta impendebantur, absolutus fuit partus, et viginti minuta post, placenta insecura.

Infans foeminini generis, statim vocifero, et oculos aperiendo se in vita esse prodidit, neque nulla signa applicati forcipis praefixa se tulit.

Pondus - - - 6 libr. Mensura - - 22 pollic.

Capitis diameter maior - 4 $\frac{1}{4}$ pollic. minor - 3 $\frac{1}{4}$ pollic.

Funiculus umbilicalis 28 pollices metebatur, nodo vero distinctus.

Placentae pondus libr. j. Funiculus umbilicalis versus placentae marginem insertus et velamenta eccentricice rupta erant,

III.

*Partus naturalis neruosis ex spastico genere,
symptomatibus remoratus.*

Die 5. Augusti, vigesima septimana abinde grauida primum motum embryonis sensuerat elappa nunc erat. Iam ante annum filiam pepererat. At partus iste per tres dies durabat, et quamuis tandem vivum infantem in lucem ederet, difficillimus erat. Abdomen modice expansum, recte subsidebat, et praeter naturalis nihil praese tulit. Crura, pedes atque genitalia varicibus adspersa erant. (Hos sequelam praecedentis retardati partus praedicare, quo partes hi debilitabantur, nullus dubito). Iam ante hos dies ventris tormina et auctos nisus vrinam mittendi passa est aegra.

Circa medianam noctem primis doloribus corripiebatur, et mane hora secunda orificium vteri pelvis medium occupans ad quatuor lineas in diametro apertum inuentum fuit: caput pelvis cavitatem omnino explevit. Dolores naturales, id est, simplices, boni et efficaces aderant, ideoque orificium vteri hora quarta iam ad decem lineas aperatum. Velamenta, ut videbatur, tantum ex inopia aquarum non distendebantur, sed firmiter capiti adhaerebant: caput ipsum orificio vteri maxime accommodatum erat. Quid multa? tam faustum et naturalem patrum praedicebant fere omnia signa, ut nullum dubium restaret, eum hora septima matutina certo certius fore absolutum.

Hora

Hora 4. matutina patellam parturienti coffeea plena in praebebant; hanc autem mox in sequuto vomitu eiiciebat.

Hora quinta frigore aliquantulum affiebatur (vomitus et frigus alternis vicibus succedentes signa sunt pathognomonica dolorum spasticorum), postea languore et debilitate quadam singulari, quibus dolorum efficacia minuebatur: hanc ob rem versus sextam horam iteratis vicibus aliquantulum liquoris anodynī sumfit, quo vires restaurari videbantur. Sed hora septima frigus et languor denuo exorta. Liquori itaque 15-20 Laudani liquidi guttulae addebantur, at statim vomitu eiiciebantur; (Laudanum non in causa huius vomitus fuisse, testatur Coffea ante aliquot horas vomitu eiecta) nihilo tamen minus vires restauratae videbantur; quamuis partus nequidquam ulterius processisset, hoc solo excepto, quod orificium vteri nunc ad $1\frac{3}{4}$ pollic. diametrum expansum, caput magis versus pelvis exitum protrusum, iuxta velementa orificio vteri proxime appositum reperiretur. Nunc (hora 7) autem, cum doloribus simul ventris tormenta ingruebant.

Rebus sic stantibus, versus horam octavam rursus 15 ad 20 Laudani liquidi guttas, cum sufficiente quantitate liquoris anodynī sumfit, neque amplius respuit. Sed loco simplicium et efficacium dolorum, ventris tormenta magis magisque aucta fuere, et cum quouis dolore lotum expellebatur, Languore iterum correpta est aegra. Dolores

res vero isti, quamuis spurii, tamen nequam
quam *colici*, sed *spasici* erant, et quidem
partiales, utri parietem anteriorem et re-
gionem vesicae vrinariae occupantes.

Cum in eodem statu maneret foemina,
et partus neque promoueretur, neque retro
iret, hora $9\frac{1}{2}$ nunc tertia vice quindecim
guttae Laudani cum Liquore anodyno sum-
fit sed sine successu: et languor enim, et
dolores spurii potius augebantur quam im-
minuebantur. Lipothymiae quidem non
aderant, sed nihil minus debilitas ad sum-
mum gradum peruenta erat: ad modum in-
fantum mammam fugere non valentium, seu
moribundo similis, cui deglutitio iam ces-
sat, ne guttulam fere iusculi deglutire vale-
bat. Desperatae sic quidem res videbantur,
at reuera non erant. Cum enim praeter
alia signa, calor non multum auctus, et pul-
sus haud ita vitiatus maneret, minime du-
bium erat, quin debilitas ista praeter natu-
ralis aliud quidquam sit, quam spasmus,
quo cessante melioris notae dolores exori-
rentur et simul ac vires, nequaquam cor-
pori ereptae, sed tantum spasio sopitae
quasi seu suppressae, reuerterentur; et hoc
modo partum praeter omnem spem et opi-
nionem facilem euafurum.

Hora undecima i vehementia modo
dictorum dolorum spuriorum ad tantum fa-
stigium euehebatur, ut parturiens, quamuis
summo languore et debilitate oppressa, ta-
men alta voce eiulatus emitteret,

Certissimum quidem erat, Laudanum non in caussa dolorum istorum fuisse; attamen quum usus eius nullum fructum attulisset quinimmo dolorum vehementia indies aucta fuisset, nihil amplius de isto remedio exspectandum erat. Dolores vero isti non erant spastici inuersi ordinis, ubi orificium vteri rursus contrahitur. Venaelectio non nisi cum summo parturientis periculo institui poterat: Clyisma itaque andynum praescribebatur ex Essent. Castor. cum Lid. C. C. succ. et pulv. antisp. Nitr. At cum haec agebantur, foemina inde a 11 $\frac{1}{2}$ ad 12 horam sex dolores habebat, quos valide, et *sine eiulatu* sustinuerat. Post hos exploratione facta compertum fuit orificium vteri eximie dilatum, et velamenta lata, expansa: nunc digitis rumpebantur:

Sequentia impediebat, quo minus ruptura ista artificialis citius institueretur:

1. In lecto id minus commode institui, et in sedile transferri aegra non poterat.

2. Antea ad nixus edendos, (siue in lecto siue in sedili id fieret) nimis debilis erat.

3. Orificium vteri non erat sufficienter aperatum, neque velamenta satis protrusa.

His peractis aegra derepente tanto vi-
gore reuiuscere coepit, ut caput primo post
aquarum effluxum exorte dolore validissime
protruderetur, et tempus fere deficeret eam
in lectulum ad parturiendum adaptatum
transportandi, ubi percessis quinque vel sex
doloribus (adeoque ante et post velamento-

rum rupturam 13-15 dolores omnes has mutationes efficiebant) enixa esset pueram sanissimam et valde robustam.(Clyisma ergo non applicatum fuit). Placenta facillimo negotio insequuta.

Puerperio tranquillimo, et ne minima quidem insirmitate turbato gauisa est mulier.

* * *
III.

Partus naturalis historia.

Priusquam me ad tertiam dissertationculae meae partem accingam, necesse videtur quaedam admonere, quae vel ad meliorem intellectum, vel ad arcendas has illasue alienas interpretationes seruire possunt.

Memores igitur sint lectores mei, hoc loco solummodo de *partu naturali et in illo peragendis* sermonem esse; itaque omnia, quae conuenientiae et nexus gratia hic illic interspersa sunt, et vel ad grauiditatis symptomata, et tempus, vel ad partus theoriam, vel ad casus praeter naturales pertinent, pro alienis habenda esse. Deinde non aegre ferant, vbi omnia sermone minus prolixiori et breuibus tantum prolata reperient. Nam hac in re exemplar mihi quasi imprimis proposui, *Hironymum David Gaybium*, cuius breuitatem in dicendo, coniunctam cum subtilitate summa, si cui attingere liceret, illum ego mihi virum egregie doctum laudauerim; me ipsum autem ne ex longinquo quidem attigisse, omnium optime noui ipsem et ego. Interim vero periculum fecisse non piget: enim,

enim uero persuasum habeo, id mihi maximo
usui fuisse, et illum tantummodo doctrinam
suam habere absolutam, qui eam tam sub-
tiliter, clare, accurate atque solide expli-
care posset, vti modo dictus medicorum
primipila. Neque hoc vt tempori parcam
feci, quum de certo affirmare possum, ne-
gotium mihi multo facilius fuisse, si quod
vna plagula exposui quatuor vel quinque
conscriptissim. Tandem ingenue rogo, per-
suasum habeant, vbi forsan huc illuc a viris
ceterum celeberrimis et doctissimis dissen-
tiam, id nulla omnino alia ex causa, nisi
veritatis studio factum fuisse. Nihil enim
magis in votis habeo, nisi vt, si errauerim,
a iudicibus meis meliora ediscam.

* *

Sub finem decem circiter mensium lu-
narum inde a conceptionis tempore foemi-
na grauida tandem *parit*, i. e. infantem
per 280 dies in sinu gestatum, in lubem edit.

A variis varie diuiditur partus: siue
enim est naturalis siue praeternaturalis;
siue facilis, siue difficilis, et sic porro. At
omnes hasce diuisiones et distinctiones enu-
merare heic non nostrum est, quamuis
cunctarum, (praeter eam sanae rationi con-
trariam distinctionem, vbi partus naturalis
s. perfecte, s. imperfecte naturalis iterum
audit (v. HAGEN's neües Lehrgebaüd) vti-
litatem rite agnoscamus.

Nobis *naturalis* partus — cuius *unicum*
tantum genus existit — omnis ille audit,

quo foetus solas per naturae vires, nulla adiutus arte, ex vtero materno expellitur, vel saltem expelli posset, nisi obstetricanti varias ob causas melius visum fuerit accelerandi expulsionem istam.

Quemcunque partum (naturalem aequem ac praeternaturalem) *Signa* quaedam precedunt, scitu perquam necessaria, quibus imprimis edoceemur, num partus reuera initet, et qualis futurus sit.

* * *

Signa partum naturalem, tres, quatuor, ad octo et plures dies *praecurrentia*, plus minus conspicua, quandoque, at raro, plane imperceptibilia: pro diuersa aetate, constitutione, temperamento, subinde aliquantulum diuersa, haec fere sunt:

Foemina inde a tempore primae conceptionis circiter ducentos et octoginta dies numerat: mucus solito maiori copia seceritur albus, crassus, viscidus, emolliens, lubricans, praeparans, subinde tam copiosus, ut vagina effluat: molestia et pondensis sensus in infimo ventre, cum frequenter mingendi cupiditate a sensim sensimque tentata atque incepta eius dilatatione originem ducens: abdominis forma mutata, tumor eius plerumque delapsus, cum parturientis faciliori respiratione, et magno totius corporis leuamine: tument labia magna vti et parua, emollita; hiat vaginae introitus: vagina ipsa paulatim dilatata, rugis plicisque euanescentibus.

Notas hafce probe perspectas habeat iuuenis obstetricans, ne aliquando, de instantे partu interrogatus, errorem committat, famae suae perquam nocitum.

*

Signa ista citius tardius excipiunt *dolores* (Wehen, Labour-pains, douleurs) i. e. sensationes molestae, ortum trahentes a contractionibus vteri, ab onere suo se liberare tendentis. His natura vtitur tamquam instrumentis ad partum perficiendum.

Diuiduntur dolores isti siue secundum eorum naturam, siue secundum eorum vehementiam et tempus quo in partu occurruunt.

Quod attinet ad *naturam*, sunt vel spurii vel veri.

Dolores spurii haud ab vteri contractionibus oriuntur, sed tantum dolores colici sunt et tormina dolores veros et partum appropinquantem mentientia. Partum autem nequaquam promouent et sublata caussa statim cessant, et si antea satis molesti fuerint.

Dolores veri nonnisi instantе partu et a veris vteri contractionibus, proficiscuntur, foetum ita propellentibus, vt a partibus superioribus inferiora versus directae sint contractions. Hi, priusquam infans sit in lucem editus nulla arte sedari possunt.

Sunt vel praeternaturales, vel naturales.

Dolores veri praeternaturales semper spastici generis sunt: ab aetate, constitutione, temperamento, animi affectibus, nimia vteri

distentione (in foemina delicatula, primipara), situ foetus peruerso, nimia irritabilitate et sensibilitate parientis, foecibus alvinis s. lotio retendis, primarum viarum impuritatibus, mala peluis conformatio, peruerso obstetricis auxilio, anni tempestate, temperatura cubuculi, cet. originem trahunt. Alternantibus quidem vomitu et frigore, facie iam a primo partus tempore rubra, inflata; pulsu celeri, exili, contracto, duriori; dentium mox stridore, mox valida compressione, subsultu' tendinum, crebris Lipothymiis, languore, inefficacia, explorationis ope, praecipue autem eiulatu parturientis et ex eo dignoscuntur, quod fere semper exhibitis anodynis et opiatis cessant, cum e contrario dolores veri naturales nullo unquam remedio sedandi sint. Coeterum secundum caussarum diuersitatem diuersimode iis medentur.

Quodammodo et *dolores tergiuersantes*, cum languore et insigni torpore parturientis coniuncti, huius loci sunt, quum ab iis partus praeter naturam tardus euadat.

Sed in primis ad scopum nostrum pertinent *dolores veri naturales*, quum unice in illo solum partus genere quod mihi paulo accuratius depingendum proposui, occurrant.

Hos secundum diuersa partus tempora, quibus superuenire solent etiam multum inter se differre, neminem rei obstetriciae vel tantum non ignarum, latet. Quod discrimin ita magnum reperitur, vt

ab eo, additis nonnullis aliis phaenomenis, *stadia* quaedam partus clare nobis fingere possimus. Haec distinctio tam in enarranda historia partus, quam in ferendo prognostico multum commodi affert.

Sunt autem *stadia* ista numero *quatuor*. Nonnulli auctores tria tantum agnoscunt, ita nempe, ut tertium et quartum haud distinguant: Id quod vero perperam fit cum omnino inter se differunt, et iam a natura ipsa distincta esse videntur, veluti ex iis quae sequentur, patefiet.

Decursum itaque dolorum istorum eo modo enarrabo, vt, quae simul obseruantur phaenomena suo loco inseram, sicque uno filo totam partus naturalis historiam comprehendam.

Dolores praesagientes. Stadium primum.

Nostris *Necker*, s. *Röpfer* Gallis monches audiunt, quum nouae in his malis foeminae saepe iis fallantur, et partum proprius instare putent, quam reuera est. Hoc leue dolorum genus iniucundum magis, quam vere molestum, foeminam grauidam inuadere solet, praesentibus iis mutationibus externis supra commemoratis.

Omnibus quidem horis, attamen praecipue circa tempus vespertino primi sentiuntur. Plerumque 12 - 18 horis finiuntur, interdum vero etiam per tres ad sex dies protrahi possunt; quandoque duas ad tres tantum horas perdurant, in foeminis primi-

paris longioris, multiparis breuioris duratio-
nis. Incipiunt horripilatione, vomitu, vinam
mittendi desiderio, capitis doloribus, inqui-
tudine et praecordiorum anxietate; superue-
niunt mox dolores ipsi, tensionis et ponderis
sensu, in lumbis exorto, qui nunc per latera
abdominis ad regionem pubis descendit, con-
spicui: rarius, i. e. singulis dimidiis horis, s. ho-
rae quadrantibus inuadunt, minus molesti, et
foeminam, nisi primipara sit *) hilarem re-
lin-

*) Vti sub quoquis passu, ita etiam in partus ne-
gotio, admiranda nobis naturae sua vbiique
lex ac solertia occurrit, propter quam omnia
quae fiunt, tam diuersissimis modificationi-
bus subiecta sint, vt singulis, sub quibus
fiunt, conditionibus, aptissima sint. V. gr.
in primiparis genitalia & vagina plerumque
adhuc augusta, firma, tensa, elastica & ad
dilatandum non tam apta sunt, quam in multi-
paris. Idcirco etiam dolores hi, apud primipa-
ras omnium longissime durant, et vehemen-
tiores omnino sunt: quo fit, vt pedetentim
et sine magna molestia partes in eum statum
commutentur, qui ad partum commodissimus
sit: cum e contrario, vbi id non fieret, par-
tus valde protraheretur, foeminaeque multo
maiores et vehementioris cruciatus afferret. —
Superuacaneum itaque, et nullius vtilitatis
cendum auxilium eorum, qui in partu na-
turali, digitorum ope, partes genitales dila-
tare et hoc modo naturam iuuare modo plane
erroneo somniant. Cum eos fugere haud de-
beret, naturam id solam, et nulla adiuta arte,
efficere, et quidem longe alia ratione, ea
nempe, vt legibus inuersis, in aperiundo
vteri orificio obseruandis, vtatur, et ab in-
terioribus nimirum ad exteriora progrediatur:

linquunt. Parturiens sub his doloribus, tantum minori gradu, ita se gerit, vti in stadii secundi descriptione dicetur.

Dolores istos veros esse, partumque instare, tantum ab expertis multiparis noscitur, et ab obstetricante non nisi praegressa exploratione affirmari potest. Hi enim dolores praeter praesentiam ante dictorum partum praecurrentium signorum se produnt segmento vteri inferiore maxime expanso, breui, et ob capitis globum in illo degentem, et firmiter supra arcum ossium pubis positum, sphaerico; orificium vteri vero tam detersum et extenuatum est, vt ab externo ad internum fere nullum interstitium supersit; ad unam duasue lineas apertum esse, et per aperturam istam sub vteri contractionibus tensio velamentorum sentiri debet. Notandum vero, quod in multiparis orificium vteri multo citius et ad maiorem diametrum dilatatum sit, ita vt fere semper digitum medium, immo duos, intromittere possis. Ibi instantis partus indicium certum, solummodo velamenta sub doloribus tensa, digitis explorantibus obuenientia, et canalis ceruicis plane petrusus, praebent.

Dolo-

maximam praeterea diuersitatem versari, inter illam continuatam et partibus accommodatum dilatationem, quae valamentis et capite foetus sensim et opportune fit, et inter debile illud, non sine internalis continuatum et partibus non accommodatum auxilium, quod digitibus fit.

Dolores praeparantes. Studium secundum.

Paulatim dolores et frequentiores redire, , et vehementiores fieri incipiunt: anxietas, caeteraque symptomata ingrauescunt: parturienti *sub doloribus* genae rubent, si deambulauerat antea, nunc pedem sistit et quaecunque illi obuia manibus prehendere, et firmiter tenere cupit: inspiratio vehemes subsequitur, simul et pectoris et abdominis musculi versus inferiora nisus edunt et parturiens etiam inuoluntarios nisus edit, ac si aluum deponere cuperet. Inuadunt omnibus 6 - 8 - 10 minutis, per dimidium s. integrum minutum durant, in interuallis vero foemina se reficit ac mox placida et tranquilla fit.

Huius vero stadii initum adesse dicitur, si mucus ille albus in vagina secretus nunc cum sanguine sit mixtus *). Tunc temporis orificium uteri saltem ad dimidium pollicem in diametro est diductum; sub doloribus tensae foetus membranae iam in eo percipiuntur. Post finem singuli eiusmodi doloris, aquae paulum adscendunt, vt tamen minus quam ante eum dolorem altae sint: deinde etiam silentibus doloribus protrusae manent, et sub fine tandem stadii secundi ita deprehenduntur, vt quasi durescant et sub quoquis dolore rumpere minentur (springfertig). Scilicet sensim sensimque *increscendo*, formam oblongam, ouiformem

*) Signum istud non quidem in omni, sed tamen in quam plurimis partibus ad est.

mem praese ferunt, in conum nempe fastigatae, cuneum quasi, cuius etiam officia praestant, referunt. Subinde tam magnae molis sunt, ut de vagina emineant, et hoc modo ipsa genitalia externa diducant. Orificium et segmentum vteri inferius, dum haec geruntur eosque euaneant et diducuntur ut amplissimum ac tenuissimum dici queat et cum ipso vtero et vagina canalem aequem latum efficiat, foetum transmittentem. Tandem cum leui plerumque fragore et impetuosa liquoris amnii profusione, *membrane rumpuntur*

Stadium hoc per 2 - 3 - 6 horas durare potest, et etiam multigaris tam molestum fit, ut cum ad primum non attenderint, nunc magis circumspectae fiant. Signa eius ex symptomatibus apparent.

Dolores veri ad partum. Stadium quartum.

Statim post velamentorum rupturam obseruamus dolores nunc nulla habita ratione vehementes et frequentes fieri. Vbi enim omnia in partu rite procedunt, singulis duobus vel tribus temporis minutis redeunt dolores. Eos vero multo efficaciores ac veluti aliis naturae esse, quam praecedentes, primus iam intuitus demonstrat.

Facies ruberrima, pulsus plenus et celer, sudor ex quauis totius corporis parte stillans, oculi splendentes, tremor totius corporis et inprimis genuum, summa corporis inquietudo, anxietas, inspiratio suspiciofa, laboriosa, diuturna, et nisus validdissimi-

diffimi quos exserit parturiens, indicant naturam nunc omnes vires impendere, et nihil aliud moliri, nisi ut aegram breuionere suo liberet. Non longo tempore post etiam effectus magni huius laboris apparent. Caput nempe, velamentis non amplius obtectum, statim in illum quem ante aquarum effluxum Chorion et amnios occupauerant locum, intrat, et per totum suum ambitum orificio vteri cingitur. Tunc temporis *caput coronatum* (Kopf in der Krönung. Tete couronnée Germanis et Gallis) audit, Quouis dolore caput, et quidem primum occiput magis in cauum pelvis deprimitur, atque hoc modo magis magisque ab omni latere comprimitur. Capitis inde ossa in conum fastigiantur: integumenta capitis cum antea non ubique sint dura et tensa, modo in plieas abeunt, eundem, cum futuris curium feruantes. Postea dum per fretum ossibus pubis et sacro interceptum lento modo transit, tumere incipiunt, id quod *capitis tumorem* appellamus.

Stadium istud intra horae (et saepissime semihorulae) spatium absolutur, sed tam vehementer, afficit parturientem, ut ingruente

Stadio quarto, c. doloribus conuassantibus
vix eandem agnosceres. Doloribus enim vehementissimis creberremisque excruciata, oculis furibundis extra cauitatem protrusis, fronte et genis madidis, facie ruberrima, feruente, vrente; dentium stri-dore,

dore, siti summa quandoque vomitu, respiratione difficillima, anhelosa, summa impatientia et inquietudine concomitata; sub totius corporis tremore, omnibus viribus ad magnum opus impensis, sine ulla intermissione siue requie affectam reperi-
res. A capite profundius nunc descen-
dente canalis vrethrae premitar, hinc vri-
nae effluxus impeditur. Caput ipsum,
tum ex vteri ostio dimissum, totum in va-
gina haerens, ita perinaeum sub doloribus
in hemisphaerium distendit: intestinum re-
ctum, mechanice pressum, faeces suas di-
mittit, et ani orificium in rimam longitudi-
nalem, secundum pelvis diametrum maio-
rem directum, intromissione vnius s. duorum
digitorum adaptatum aperit. Paucis infe-
quentibus minutis tumor capitis extra labia
maiora conspicuus fit, et perinaeum cutis-
quae vicina vehementissime distenta semper
manet: et tenuitate chartam scriptoriam
refert. Anxietas parturientis nunc sum-
mum attigit gradum: adest momentum,
quo sibi ipsae mortem certam instare putant,
quo veri *conquassantes* dolores ingruunt: non
secus cruciatus suos verbis exprimere valent,
quam comparando eos cum dilaceratione
vartium cultrorum ope. Tandem sub acuto
matris clamore et vna cum peculiari tre-
more caput euoluitur; ita quidem vt ea oc-
cipitis pars, qua lambdoideae crura cum
sagittali conueniunt, intra arcum ossium
pubis maneat, et hoc hypomochlii munere
fun-

fungente, facies primum in conspectum veniat. Reliquum corpus fere semper facile sequitur, si partus sit naturalis: subinde quidem a nimia humerorum latitudine difficultates quaedam oriri possunt, at plerumque minus graues; ut idcirco partus haud alio nisi naturalis nomine insigniendus veniat.

Foetum continuo sequitur sanguinis copia (librae unius pondus circum circa semper fere aequans) qui ultimo partus tempore vasis vterinis exstillasfe videtur, una cum liquoris amnii ea quidem portione, quam secundariam appellare solent medici obstetricantes. Tum demum foemina dulce matris gaudium post tantos labores sentit. Dolorum enim expers summa tranquillitate et serenitate perfusa est, ita ut plures id temporis momentum inter felicissima & iucundissima vitae ponere minime dubitauerint. Blandus nunc interdum somnus defessam recreat, suavia insomnia exhilarant. Haec quidem beatitudo vix per semihorulam, tamen subinde etiam per horam integrum durat. Interim vterus *aequaliter ubique* se contraxit (quod uniformi modo iam in ipso partus momento, cum vterus vacuum se prima vice senserat factum fuit) et eo modo placentam paulatim a parietibus suis separauit.

Paucarum guttularum sanguinis effluxus, et vteri tumor, qui nunc sub umbilico circumscrip^tus, paruus et durus per-

cipitur, indicant, placentam solutam et nunc in eo esse, vt exitum ex vtero molitur spontaneum. Noui hinc exoriuntur do-lores, neque admodum graues, quibus tam en puerperae somnus perturbatur, ac pau-lo post placenta tum pondere suo, tum vte-ri contractionibus adiuta viam sibi parat, aperiundo denuo vteri os, quod antea pau-lulum contractum clausumque fuit, sicque descendendo in vaginam sponte plerumque in lucem prodit.

Tempus, quo placenta vtero excludi solet, varium est: raro casu accidit, vt foetum protinus sequatur, rarissimo exemplo vna cum embryone ita expellitur, vt ouī nexu cum vtero soluto, ouum, membranis quae liquorem amnii cum embryone ac pla-centa continent integris, in conspectum ve-niat. Saepissime intra vnius horae spatum ex vtero propulsa placenta et in vagina ha-rens, perinaeum, partesque vicinas eadem, at minus molesta, ratione diitendendo, vti antea foetus, ab obstetricice deprehenditur. Interdum vero, quod quidem omnino nihil nocet, et non nimis pertimescendum est, per integrum et plures etiam dies in vtero remoratur, attamen non sine morbi sus-spicione.

Post exclusionem placentae, vterus vi quae ei inest elastica atque contractili, de-nuo se contrahit, vsquedum ad figuram et magnitudinem quam in mulieribus non gra-vidis reperimus, sensim sensimque accedat.

Placentae autem exclusionem sequitur sanguis modo maiori modo minori copia, ex ostiis solutione placentae dilaceratarum venarum vteri stillans, subinde tam copiosus, ut vrgens vitae periculum afferat.

Absoluta eorum quae in partu naturali occurunt, historia, supereft etiamnum vt quaedam

*De ope in partu naturali ferenda
adiiciamus.*

Ea quae obſtetricem, ſiue viri ſiue foemina hoc munere sub partu fungatur, decent, longiore ſermone commemorare, animus non eft. Dixiffe ſufficiat, mihi tantum de viris probis, in arte magiftris, et foeminis honestis atque peritis sermonem eſſe.

Quam primum accersitus erit obſtetricans, ante omnia prognofin quamdam edicere vrgabitur. De ea autem effattum ſuum ſemper incertum atque mancum manebit, quum, proh dolor! Semeiotice obſtetricia, nondum ad eum perfectionis et certitudinis gradum peruererit, cui neceſſario opus eft ad prognofin certam atque ſolidam ferendam. Verum enim uero occurunt caſus plurimi, vbi ſe neceſſitate coactum ad interpretandam ſententiam ſuam vidit. Tunc praemiffis quibusdam generalioribus quaefitionibus, ad signa praecurrentia, dolores praefagientes &c. ſpectantibus, ad

Explorationem.

refugere debet. De hac prima illi lex eſto, ut eam quantum potest diſferre ſtudeat, quia

quia plerumque fouent foeminae eam de nobis sententiam, ut partus, etiam naturalis, accelerari possit, simulac tactu de foetus situ certiores facti essemus. Qua sola opinione fit, ut a nobis petant quod earum pudicitia alio tempore firmiter recusaret. Hinc si u. g. iam in primo partus stadio explorationem instituimus, et foeminae adhuc per duodecim et quod excurrit horas increcentibus magis magisque doloribus excruciantur, bonam quam de nobis foverunt opinionem deiiciunt, ac desperare coeperunt, id quod praecauere potuissemus, si tantum sub initio stadii tertii explorasssemus. Admonitione vix opus habet nostra, ut in peragendo isto negotio cauta ac leni manu agatur, et decentiae quam maxime consulatur. Quodsi itaque obstetricans foemina siue in lectulo, siue in sella obstetricia explorare velit, semper eo respiciat, ut suetis vestimentis admictam linteo largo atque commodo adhuc obtegat.

Exploratio foemina vel subsistente, vel sedente, vel in lectulo aut in sedile aut in latera, aut in dorsum procumbente institui solet. Situs lateralis et decumbens reliquis praestare mihi videntur. Multis iisque grauibus argumentis adductus, praeunte Puzos, Levret, Raulin, Baudelocque, Deleurye, Stein, aliisque viris in arte praeclarissimis, experientissimis, semper et ubique, duobus digitis, medio nimirum atque indice, oleo quodam

expresso, non rancido, bene munitis, explorandum, atque vlnam manus explorantis, vbicunque fieri potest, flexo eiusdem lateris genu imponendum esse puto, nam indies praestantiam atque emolumenta insolitae alias huius explorandi methodi experior.

In interuallis vtique dolorum exploratio institui debet, neque prius finienda, quam subsequutus dolor iterum cessauerit, quo melius dolorum efficaciam, oris vteri aperturam, atque velamentorum figuram et naturam discernere queamus.

Praeterea exploratione tumorem, humiditatem et dilatationem genitalium externorum et vaginae, ac partem praeuiam foetus cognoscimus.

Sciscitando, et exploratione externa de reliquis momentis, nobis scitu necessariis, simus certiores.

Quodsi igitur hisce adminiculis inuenimus, signa ea adesse, qualia in primo, feundo tertio, quarto, partus studio depicta fuerant, tunc *hoc* vtique affirmare possumus at *de reliquis* (si famae consuere velimus) -- fere nihil.

Verum enimvero, *vti* experientia, optima semper duce, edocti compertum habemus, singulos partus naturales fere semper, quod attinet generaliora, inter se conuenire ita quoque haec eadem nobis discriminat magnum in quocunque partu, pro natura singularum mulierum parturientium monstrat.

De

De *euentu* partus tum demum certi
quid dici potest, vbi omnes res caeteras,
aetatem, corporis constitutionem, partus
praegressos, dolores praesentes, pelvis
conformationem, velamentorum figuram *),
capitis foetus situm **), inter plura alia,
probœ perspecta habeat obstetricans.

C 3 Qui-

*) Obstetricantes tactu erudito praediti et experti
iam a figura et situ membranarum partum na-
turalem vel praeter naturalem pradicere va-
lent. Nam si caput solum praeuum fit, tum
semper plus minus rotundae sunt, i. e. capitum
figuram et ambitum referunt versus uteri ori-
ficium; versus anteriora vero angustiores de-
prehenduntur, coni figuram simulantes, cu-
ius basis in orificio, apex in vagina fit. Quan-
doque haemisphaerica remanent, quod qua-
tuor obseruauit vicibus, in quibus omnibus
stadium tertium et quartum non ultra tria
minuta durauere. Obstetricantis itaque atten-
tionem meretur ista Membranarum figura.

**) Magnus inter scriptores rei obstetriciae dis-
sensus est, de situ capitum foetus in partu, et
vix meum censeo tantas componere lites. Re-
feram ea, quae ego, trigesies saltem sensi et
tactu percepi. In primo et secundo stadio
foetus facies latus aliquod, plerumque dex-
trum, respiciebat: futura sagittalis, secun-
dum diametrum obliquum, scilicet Deuenteri sita
erat: tunc sensim ingruente stadio tertio,
et praecipue sub vigore eius, caput ita versum
fuit ut incipiente stadio quarto fontanella mi-
nor in regione arcus ossium pubis, futura vero
sagittalis, secundum diametrum minorem sita
inueniretur. Tunc occiput, figura conum
referens sub arcu pubis figebatur, et in linea
semicirculari, facie primum apparente euol-
ueba-

Quibus iam, vt plura pratermittam,
apparet, obstetricantem, quantum fieri
potest, in prognosi edicenda quam maxime
cautum semper esse opportere. Quodsi vero
necessario aliquid praedicendum esset, tuuc
comparatis ac bene consideratis phaenome-
nis iudicium ferat circumspectum ac potius
ambiguum, ne parturientem vana spe de-
piat, famamque perdat.

Quamquam partus *naturalis* proprie sic dictus, sit functio foeminae sanae imo signum optimae valetudinis, ideoque foemina doloribus ad partum correpta haud tamquam aegrota artis opem efflagitans considerari possit; attamen negari non potest, auxilium ab obstetricante superuacaneum non esse, cum multum leuaminis afferre, variaque pericula, parturienti imminentia, auertere possit. Coeterum vero semper in memoriam reuocandum, obstetricantem potius observare quam agere, naturam potius sequi quam praeuenire debere, seque, uti semper, naturae ministrum non magistrum esse.

Supellex obstetricia in partu naturali
necessaria comparata esse debet modo se-
quenti. Adeisse debent:

Sella

uebatur. Haec naturalis capitis versio, non-nulos obstetricantes, ni fallor, in errorem induxit, ut putassent, se situm capitis peruersum in naturalem digitorum ope mutasse cum mathematice demonstrari possit, id fieri numquam posse.

Sella obstetricia commoda (instar omnium est, quae ab ill. Stein nomen habet): Syringa pro clysteribus: Fasciola ex 6. 8. filis tenuioribus composita et cerata, ad deligandum funiculum vmbilicalem apta. Forceps apicibus detruncatis, versus apicem incuruis (Galli ad hunc scopum vtuntur forcipe peculiari, quam *Ciseaux en Ecreuisse* nuncupant); lanceola f. Phlebotomus; Spiritus salis ammoniaci. Adsint praeterea: Vinum, acetum, vnguifosi aliquid, oleum amygdalarum dulcium, butyrum recens, insulsum, copia sat magna fortis cuiusdam decocti mucilaginosi, aqua calida, linterum denique siccorum, calidorumque sufficiens copia.

Sub primo nunc partus stadio obstetricans nil aliud aget, nisi vt omnia parata sint curet, que vel ad leuamen foeminae parturientis, vel ad nascituri infantis curam facere possunt Sequentium igitur capitum curam habebit:

Cubiculum. Pro re nata sit magnum satis spatisum et ita collocatum, vt aëri liber transitus concedatur simulque, si necessitas vrgeat, calefieri possit.

Situs parturientis. Accedat quam maxime ad situm quem in summa corporis quiete obseruare solemus, sitque eo modo accommodatus, quo nixus validissimi edi possunt. In primo quidem et secundo stadio parum refert, vtrum parturiens incedat, aut subfistat, vel fedeat, an vero decum-

bat. At effluxis aquis in situm se conferre debet, ante partum non relinquendum. Hoc casu autem mulieris situs debet esse medius inter sedentis et recumbentis in dorsum. Os coccygis sit ab omni compressione liberum, femora disiuncta. Genua flexa subfulciantur, pedes figantur, atque imponantur firmis ac durioribus fulcimentis. Vtrique etiam manu constringat mulier corpus quoddam firmum, quo validiores ad expellendum foetum nixus edere queat. Ad impetrandum hunc scopum variae gentes variis utuntur artificiis. Germani et Bataui enim commendant sellam obstetriciam: Gallis lectulus in usu est: Anglis quoque hi praeterea in situ parturientis laterali operem ferunt. Perinde videtur, utrum sella a lectulo utamur, modo ambo ad officia sua commoda sint.

Sellae obstetriciae duo praecipua requisita sunt, ut mobile fulcimentum dorsale sit, atque ipsa facile et commode ex uno in alterum locum transportari possit. Iuncta haec duo commoda, praeter multa alia, offert illi *Steinii* illa, secundum *Deuenteri* quidem ideas fabrefacta, at quoad maximum partem correcta.

In *Gallia* plerumque sternitur lectulus ita, ut supra planum inclinatum parturiens jaceat, lumbos, dorsum, humeros caputque gradatim altiora habeat clunibus. Proxime ad sellae commoda accedit methodus ista, saepius ipsi sellae preferenda, modo ita

com-

comparatus sit lectulus, ut progrediente partu reliquum corpus in situm fere horizontalem redigi possit.

Angli, vti supra dictum fuit, situm lateralem praeferunt, quo foemina lateri sinistro incumbens, facie ab obstetricante remota, cruribus inflexis, suffultis, genubus puluinari conduplicato a se inuicem remotis, auxilium accipit.

Obstetricans autem nulla praesente sella s. lectulo commodo, praesentibus e sellis, scamnis, tabulis, puluinariibus, stragulum commodum conficere, et temporis seruire bene calleat.

Vestitus foeminae ita comparatus sit, vt nuspian corpori firmiter adhaereat, sed omnia laxa atque commoda sint, nullumque doloribus impedimentum, s. parturienti periculum afferant. Neque nimis densus nec nimis tenuis sit, munditiei inferuiat et ad subito commutandum sit idoneus. Arridet quoque cl. *Plenckii* consilium, qui varicibus in pede praesentibus, fascias applicare iubet, ne ex improviso rumperent, vittaeque periculum afferrent. Ad praecauidas strumas; collum firmiter ligare solent nonnulli, at pessimo consilio. Praestat enim aliud remedium, de quo infra agam.

Cibus non plane negandus, at talis porrigendus, qui facilis fit digestu, neque vllas molestias, siue flatus, siue cruditates generare possit. *Potus* autem pro lubitu expeditandus modo frigidus, modo tepidus.

Maxime vero conductit decoctum hordei cum succo citri, infusum quodcunque theaeforme, in primis Fl. Chamomillae: Aqua cum crista panis decocta, addito ad gratum saporem aceto: neque aqua frigida siue meraca siue vino mixta plane contemnenda erit. **Confortantia**, calefacientia, spirituosa suo quidem loco, at raro, prodesse possunt; saepius autem quando temere et sine indicacione propinantur, omnino obsunt. Melius itaque erit, eorum usum communi obstetricum plebi plane interdicere. Quando vero opus esset tali cardiaco, tunc vinum generosum Burgundicum, aut vinum meracum Rhenanum, reliquis fere omnibus palmam praeripit.

Excretionibus tum *alui*, tum *lotii* ante omnia prospiciendum. Mirum enim est, quantum ad partum facilitandum conferat foecum in intestino recto accumulatarum euacuatio, et quanta partus impedimenta ab eodem intestino a foecibus distento oriantur. Prima itaque cura obstetricantis in eo versetur, ut foeminae *clyisma* emolliens ex infusionis Fl. Chamomillae, Maluae, Altheae cum lacte, oleo, vel iusculo carnis non salito applicari, et pro re nata repetere iubeat. Dein lotium quoque mittere debet parturiens, quousque eius excretio non fuerit suppressa. Quo casu, urgente necessitate, ad catheteris applicationem confugere debemus hanc vero operationem difficillimam, nec nisi a viro peritissimo exercendam

dam esse, in eo consentiunt omnes fere summi in arte viri, negante, nescio quo iure, solo cl. *Hagen.*

Venaeseditio quidem raro instituenda, cum plerumque plus nocet quam proficit. Sed omnino occurrunt casus, vbi maxime necessaria erit. Hos secundum therapeutices praecpta dignoscere debet obstetricans, et si recte percepit, saepissime vnica tantum VS miraculum quasi patrare potest.

Haec fere sunt, quae in primis partus stadiis perficienda incumbunt obstetricanti. Si exploratione certior factus est de recto foetus situ et de partu vere instanti, tunc omni exploratione abstineat, donec membranae rumperint. Alienum plane et multis modis noxium foret, vbi hanc regulam negligeret. Quo magis enim otiosi sumus eo melius opus perficimus.

Praeter supra recensita, obstetricantis auxilium sub partus initio, erit, parturientis animum erigere, et omnibus persuasionis artibus dolores eius subleuare, praecipue vbi in partus negotio noua sit foemina, hortando ut bene speret, pollicendoque tempore oportuno opem. Neue obliuiscatur adstantium et muliercularum inutilium et parturienti minus acceptarum turbam dimittendi, et tantum eas seruet, quas sibi commodo futuras credit.

Varias ob causas plurimum conductit, parturientem statim post aquarum effluxum in eum situm rransferre, in quo partum editura

tura est. Numquam enim de certo dicere possumus, vtrum maiore, an minore temporis interuallo post, partus infecuturus sit: neque vlo modo dubitandum, foeminam in situ supra commemorato, multo validiores, eosque securiores nixus edere posse, quam si adhuc in pedibus subsisteret, aut incederet. Itaque nunc parturiens in situm satis commodum et aptum transferatur, obstetricans vero, sella humiliori contra eam sedeat, vt genubus sellam siue lectulum attingat, hisque parturientis crura a se inuicem remota teneat. Obstetricans super femora linteum conduplicatum expandat, deinde parturientem linteo largo obtegat, ne decentiam vlo modo negligat: caeterum vestimenta nequaquam deponat, ne lanitatem referat, sed sufficiet munditiae ergo, manicas vestimenti apertas aliquantulum reiicere.

Vt vero vires ad partum, quas vocant secundarias, efficaciores reddantur, fulcimenta quaedam parturienti ministrare expedit; si lectulo vtatur, ambae columnae aut ambo pedes huic muneri satisfacent, si autem latior sit lectus, asser transuersus poni potest, quem ad lecti fulcra, aut si lectus loris subtentus sit, ad clavum ligneum huic infixum, alligandum curabit obstetricans. Quorum defectu duae adstantes, parturientis femora diuaricata tenebunt, manibus mulieris genubus admotis. Admodum quoque conductit,

osi

osi sub vertebrarum lumborum et ossis sacri regione linteum triplex vel quadruplex ponatur, vtrinque prominens, quo sub dolorum accessu subleuetur foemina, et levamen illi eximum praebeatur.

In sella omnia haec commoda iam adsunt; et obstetricantem nihil aliud agere oportet, nisi vt ipse genua foeminae fortiter sustineat, donec alibi opem ferre coactus fuerit, tunc temporis duabus adstantibus id negotium reliquendum. Altera adstantis caput parturientis leuiter versus pectus premat, ibique firmiter teneat, vt struma praecaueatur (quod quidem auxilium multo minus periculi habet, quam ligatura illa supra nominata; neque vlla inde molestia parturienti exsurgit, si cum vrbanitate fit.)

Dum parturiens in situ isto decumbet hortetur eam obstetricans, ne dolores irritos esse sinat, sed potius efficaciores reddat, musculos abdominales contrahendo, valide sed lente spiritum ducendo, leniter vero exspirando, eosdem conatus edendo, quibns aluum exonerare solet. Adebet enim tempus, quo natura omnibus viribus intentis, exitum foetus molitur: sustentare molimina ista, hoc opus, hic labor est. Adebet nunc tempus, quo prudentis cunctationis fructus capere possumus, nisi primo et secundo stadio foeminam modo plane noxio ad nixus edendos exhortati sumus, et labore vano defatigauimus.

anno Simulac velamenta rupta fuerunt, obstetricans exploratione certior fieri studet de capitis recto situ, et in os vteri ingressu. Si omnia ex voto cedere inuenit, tunc vel plane omni ulteriore exploratione abstineat, vel saltem rarissime id peragat, ne foeminae inde dolores exoriantur, et vagina mucro suo, ad facilorem capitis transitum maxime necessario, destituatur. Vbi autem scire refert, num dolores reuera efficaces sint, nec ne, tunc exploratione opus est, ante, sub, et post dolorem instituta.

Quartum nunc appropinquat stadium illud, quo, si unquam, auxilio opus habet parturiens nostro. Scilicet, sub validis istis nixibus caput magis magisque in cavitatem pelvis descendit, Tandem totum in vagina haeret, et nunc sub doloribus perinaeum tensum sit et extenuatur: sentitur caput perinaeo veluti obvolutum, haemisphaericum. Notandum, quod quanto ulterius processerit caput, eo magis deprimendus sit Iectulus siue sella, ita ut situs eius mox ante partum, sit decubentis in dorsum.

Tum pinguedine quadam, butyro recente, oleo amygdalarum dulcium, vel etiam decocto Maluae, s. Altheae, vaginam labia, et praecipue perinaeum, inungat et obliniat obstetricans, ut partes inde fiant laxiores, et reddantur magis lubricae. Dein sub quoquis dolore expansum perinaeum firmiter vola dextrae suae sustineat, et valide premat superiora versus.

Si altius descenderit caput, eiusque tumor inter labia magna appareat, et perinaeum tersum manet, tunc idem auxilium ita continuatur, ut dextra semper fortiter perinaeum sustineat, sinistra genitalibus oleum applicante. Manus vero ita posita sit, ut carpus ad commissuram labiorum inferiorem planum inclinatum formet, super quod caput lento modo e vagina progreditur. Quotiescumque manus per longius intervallum perinavo applicata esse debet, tunc vlna genu eiusdem lateris imposita suffulciatur, subinde etiam altera manu iuvetur.

Alios fuisse obstetricantes, qui hoc tempore auxilium nefandum et omnino reiiciendum, commendauerint, neminem fugere potest. Praecipiebant nimirum; hoc tempore duobus inter perinaeum etcaput foetus intermissis digitis, perinaeum retro, posteriora versus premendum et infra caput ducendum esse, Luce autem clarius patet, quam peruersum ac periculosum sit auxilium istud. Perinaeum enim, chartam scriptoriam tenuitate referens, et a capite solo tantopere expansum, ut quavis occasione rupturam minitur, magis adhuc extenuare atque expandere, nonne hoc idem est, ac si eiusdem rupturam accelerare velles? — Et revera nusquam alias plura de perinaei rupturis legimus, quam apud eos scriptores, qui nefandum istud artificium commendant. Cum e contrario qui descripto modo parturienti suc-

succurrunt, inter quos praeclari nominandi
veniunt *Smellie*, *Stein*, *Plenck*, de hoc in-
fortunio vel plane numquam, vel saltem ra-
rissime loquantur. Evidem auxilium ist-
hoc sequutus, nullam usque ad hunc diem,
perinaei rupturam deprehendi. Quinimo
quater, sub partu admodum praecipiti *fren-
ulum* fere intactum et bene conseruatum
vidimus, sed etiam in his casibus semper
tumorem capitinis reperimus, neque umquam
sphaericum in lucem editum caput (quod
quidem accidere posse neutiquam nego; sed
tantum dubito, an tam frequenter accedat,
ut Cl. *Hagen* hoc affirmat . . . et si accide-
ret, tamen oriretur questio; num, si peri-
naeum probe sustentatum foret, capite
etiam sphaerice prodeunte, frenuli et peri-
naei ruptura non praecaueri posset?).

Fit interdum, ut pars segmenti infe-
rioris vteri (plerumque anterior et superior)
inter capitinis foetus ossa et arcum ossium pu-
bis comprimatur, ita ut tumere incipiat, et
nonnisi summa cum difficultate retrocedat:
vel etiam alia ex causa vterus non prossus
caput derelinquit et hoc modo partum re-
tardar. Tunc sequens eximiae utilitatis com-
perimus auxilium: digitum nempe medium
et indicem alterutrius manus, ita ab utro-
que latere capiti foetus apponendi, ut ea
orificii vterini pars leniter reprimatur. Qua
encheiresi saepius partum ad unam et plu-
res horas promouimus.

Saepius etiam capiti, si iam exitum parat difficultas quaedam obuiam venit, ita ut si iam extra genitalia conspiciatur, sub dolorum interuallo quasi retrocedat. Mirum quantum in hoc casu promoueat partum encheiresis illa, quo vnum vel duos digitos illius manus, quae perinaeum sustinet, in orificium ani apertum introducimus, et hac ratione caput ibi retinemus ubi a doloribus propulsum fuit.

Ita fiet, ut tota tandem capitris moles, e sinu pudendorum exeat, quod obstetricans nunc sinistra sua sustinere, dextra vero exitum humerorum et reliquarum corporis partium adiuuare debet. Si autem humerorum exitus paullum retardaretur, indice sub axillas demisso et sic trahendo solucio eorum accelerari oportet. Deinde totum corpus secundum axin pelvis extrahitur, et infans transuersim gremio obstetricantis imponitur: postea funiculus umbilicalis ad longitudinem quatuor pollicum a corpore infantis satis arcte ligandus, atque ad distantiam viii pollicis extra hoc dissecandus est. Infans mox balneo tepido committitur, et ubi a sanguine purgatus fuerit, mensuris et pondere compertis, inspectisque ab obstetricante, ore, naribus, auribus, palpebris, ano. meatus vrinarii apertura, ut si quid in iis naturae instituto alienum inueniret, tempestiuam opem ferre possit, linteis, calidis vestitur et in lectulam ponitur.

Post hoc puerpera in situm plane horizontalem transfertur et pedibus iunctis somno per semihorulam relinquitur. Quod si nulla oriuntur symptomata, quae ad accelerandam secundinarum extractionem cogunt, a. gr. conuulsiones, haemorrhagiae, commode per vnam et plures horas exspectari potest, vsquedum foemina ipsa, (quod plerumque fit), nos moneat, vt ad hanc solutionem cogitemus. In hoc interuallo vt plurimum paucae sanguinis guttulae stillauere, et omnes illae mutationes, quas iam supra memorauimus, conspicuntur, ita vt placente iam in vagina haereat et obstetricanti nihil aliud agendum sit, nisi leni attractione funiculi umbilicalis, exitum eius tabsoluere.

Sed quandoque accidit, vt vterus totus quantus sit contractus, vtque sanguis stillauerit, et nihilo minus placenta non sequatur. Huius phaenomeni ratio plerumque ea est, quod vel moles placentae vaginam tam arcte implet, vt hinc difficultas aliqua nascatur, vel portio eius in orificio vteri remansit et ab illo constringitur. Si obstetricans hunc casum probe perspexerit et persuasum habat placentam ab vtero esse separatam, et foemina propter hanc moram anxia et sollicita sit, tunc illi hoc modo succurrendum. obstetricans, vt supra dictum fuit, sedeat, et digitis medio et indice dextrae manus linteo tectis, funiculum umbilicalem bis circa hos voluit, et quidem ita,

ut pollex superiora spectet et tota manus proxime ad genitalia accedat. Tunc iisdem digitis manus sinistrae in vaginam immisit, et usque ad insertionem funiculi in placentam protractis, his funiculus deprimitur, et eodem tempore dextra traditionibus leuoribus, spiralibus attrahitur, ad axis pelvis normam.

Placenta fere semper has leuiores tractiones sequetur, quod facili opera ab obstetricante percipitur; tunc pergendum est, et funiculus denuo circa degitos voluendus, si longior factus est, ut eo maiori efficacia trahere possimus.

Sin vero minus id acciderit, atque e contrario funiculus retraheretur, et placenta minime sequente etiam si tractiones paullum fortiores instituerentur, tum subito ab hac encheiresi desistendum. Quid ultius sub his periculosis circumstantiis agendum sit, cum ad opem in casibus praeter natura libus ferendam pertineat, huius loci non est.

Si vero sequatur placenta, et iam in vicinia labiorum maiorum appareat, tum sinistra versus commissuram inferiorem descendendum, ut vola eius excipiatur placentae: dextra funiculum relinquit, et velamenta reuersa, et post placentam sequentia, leniter attrahit,

His peractis obstetricans manum adhuc in uterum infert, et grumos sanguinis, qui in cauitate eius reperiuntur, euacuat, simul

que certiorem se facit, contractiones vteri
bene succedere.

Piget sane, de multuariis infirmitatibus et periculis loqui, quibus foemina exposita est, si neglectis istis regulis, ab obstetricante seruandis, sine die et consule, simulac placenta non breui opparet, manus vtero immittitur et placenta saepenumero vnguibus separatur. Legant, obsecro, omnes hanc perniciosa[m] nimis regulam sequentes, Cl. *Aeppli* de hac re egregia scripta, et si tunc temporis non credunt cautori, neque meliora edocentur, arti obstetriciae valedicant potius, quam vt auctores esse malorum innumerorum pergent.

Foetu in lucem edito, simulque secundinis extractis; si sanguis, sublata iam resistentia nimia violentia agatur in aortam descendenter, ortum praebet. Lipothymis syncope, conuulsionibus et id genus aliis; quibus occurritur ventrem fascia lata leniter constringendo (vti Cl. *Monro* post paracathesin abdominis applicare iussit). Mater deinde in lectum calidum et mundum transferenda, femoribus ad se inuicem adductis et cruribus extensis, linteisque modice calefactis, vino generoso cum oleo quodam dulci mixto, imbutis, genitalibus et abdomini applicatis ne vterus ab aëre frigido laedatur, lochiaque supprimantur. Si debilis sit, quoddam iuscum loco calefacentis potus porrigitur etc. Lintamenta crebro immu-

immutanda: munditiae summa cura habenda. Curandum tandem, ut quiete tam animi quam corporis perfectissima fruatur parturiens.

Sed hic pedem figo, et in aliud tempus differendum puto, innumeras describere diuersitates, quae, siue a nimia aquarum copia, siue a peruersa valetudine parturientis, siue ab obliquitate vteri, siue ab animi affectibus, nimia magnitudine infantis, angustia peluis, spasmo &c. in partu exoriri possunt, quamquam tandem naturalis fiat. In tabula exhibita et in secunda et tertia obseruatione varii eiusmodi casus occurront. At nimis prolixum foret, si de singulis seorsim tractare vellem.

87

THESES.

I.

Periculi plena, ideoque damnanda, est illa
encheiresis, ubi expanso iam atque extenuato
a capite perinaeo, perinaeum digitis in vagi-
nam intomissis expandere adhuc et reprimere
praecipitur.

II.

Leuctio librorum, quos veteres graeci et latini
reliquerunt, nostri aeui medicis neutiquam
necessaria esse videtur.

III.

Foemina, ubi abortum passa fuit, methodo
antiphlogistica potius refrigeranda est, quam
Tincturae Cinnamomi aliorumque calefacien-
tium usu exaestuanda.

IV.

Explorationis distinctio in perfectam et imper-
fectam, omnino nihil praeter nomen noui con-
tinet

*tinet; ab omnibus nempe inde a Smellie
obstetricantibus suo loco usitata.*

V.

*Opportuno forcipis Leuretianaे usu vigentibus
spasticæ indolis ad partum doloribus, Ca-
storeo, Lip. anod., Spir. C. C. et reliquis
omnino carere possumus.*

VI.

*E certissimis grauiditatis signis, in primiparis,
est orificii uteri figura in rotundam mutata.*

VII.

*Fallax fere semper trahitur conclusio ex experi-
mentis in brutis captis ad hominem.*

VIII.

*Febre puerperarum moriuntur interdum, qui-
bus utero inciso foetus fuit extraðus. Num
seruandæ, ubi ante operationem eius febris
cura prophylactica fuerit instituta?*

IX.

*Frenuli post partum praesentia certissimum prae-
bet documentum auxiliī caute atque circum-
specke administrati, absentia vero contra-
rium docet.*

X.

X.

Quo iuniores sunt mulieres, modo annum aetatis decimum septimum peregerint, eo felicius parturiunt.

XI.

Occurrunt omnino casus, ubi sectio Symphyseos ossium pubis embryulciae et operationi caesareae praefat: minime itaque plane reiicienda.

XII.

Foeminis grauidis, ultimo praecipue grauiditatis tempore, saepius conuenire videtur emesis, duam venefactio.

Numerus Obliteracionum.		Numerus Grauidationum.		Habitus et Conformatio-Perfornata.		Conformatio Perforata.		Tempus concepcionis.		Tempus partus.		Sensitioes, valetudo foeminae grauiditatis tempore.		PARTVS HISTORIA.											
1.	P.	Status medioc-robusta, fana,	Bona.	Vltima Martii 85, hebdom.	D. 9 Febr. 86.	Semper bene se habuit.									Primi dolores hora nona noctis inter 9 et 10 Die Febr. — Hora 9 ¹ matut. Signa adnot. — Hora 12 Aque formatae. — H. 12 ¹ Velamenta rupta. <i>Intrinsum statu tertii.</i> — H. 14 ¹ Caput totum in vagina, prope finum pudendum. — H. 2d ¹ postmeridiana capitis tumor inter labia maiora apparet. — H. 2d ¹ Stadium quartum. H. 2, 57 min. PARTVS. — H. 3, 20 min. placentula folata . . . post copiosus sanguinis effluxus.		6 ¹ liber.	20 pollic.	4 ¹ pollic.	3 ¹ pollic.	10 ¹ pollic.	Craffus femorae circunferentia infans colatum contortus.	1 ¹ libr.		
2.	P.	Parva, et bene conformata, fana et robusta.	Bona.	Tertia Martii 85, hebdom.	D. 19. Decembr. 85.	Bene se habuit. Alieni nihil sensit. Fine Novembris mammae lacte impleri coepere.									Vespera diei 17 dolores praesagiantes. D. 18. H. 11 stadium secundum. — H. 10 vespert. stadium tertium. — H. 12. Stadium quartum. — H. 12 ¹ PARTVS. — 12 ¹ placentula.		—	—	—	—	—	—	—		
3.	M.	Bene conformata fana,	Bona.	Secunda Sept. 85, hebdom.	D. 13 Febr. 86.	Nauseam, vomitus, dolores mammarium perpella est.									Primi dolores H. 8, vespert. d. 12. — Altero mane H. 11 iam principium stadii tertii aderat. — H. 14 ¹ Caput coronatum. — H. 15 ¹ Caput iam totum extra orificium vteri. — H. 16 ¹ stadium quartum. — H. 16 ¹ Placentula expulsa.	6 ¹ liber.	21 pollic.	4 ¹ pollic.	3 ¹ pollic.	14 ¹ pollic.	Sanguineus.	1 ¹ libr.			
4.	M.	Vt supra.	Bona.	Secunda Iunii hebdom.	D. 23 Martii 86.	Fluxum menstruum vsque ad dimidium fere grauiditatis tempus habuit.									Notte D. 22 dolere coepit. — Mane hora 7 ¹ Aque spuriae effluxere. — H. 8, initium stadii secundi. — H. 10 ¹ Stadium tertium. Statim rugae integumentorum capituli apparent, caput ubique orificio vteri circumdatum. — H. 11. Caput totum in vagina. — 5 minut. post, tumor capitis extra labia magna conspicuus. Spasmus pedum. — H. 11 ¹ INFLUXUS in lumen editus: postea copiosus aquarum turbulentarum et flocculentarum effluxus. Placentula paucis post H. 12 minutis insequuta.	7 ¹ liber.	22 pollic.	5 pollic.	4 pollic.	23 pollic.	Craffus.	1 ¹ libr.			
5.	M.	Vt sopr.	Bona.	4ta Iunii hebdom.	Eadem Die.	Bene se habuit. Vitam foetus versus finem Septembri fecit.									Meridie D. 22, dolores praeligentes. — Sequentia nocte H. 1 ¹ stadium secundum. — Hora 6 ¹ matut. Velamenta arte rumpuntur. Postea dolores vani et irriti superuenient, partum minime promouentes. — Tandem post H. 12 magis efficaces reddit, nunc fortiora in foetum agebant, ita vt non multum post (i.e. H. 22) partum enixa esset foemina.	6 ¹ liber.	22 ¹ pollic.	4 ¹ pollic.	3 ¹ pollic.	32 pollic.	Collo infantis femel circumvolutus.	Craffus.	1 libr.		
6.	P.	Status proceræ, fana, robusta, quadrata, toroïda.	Optima.	Vltima Maii 85, hebdom.	D. 25. Mart. 86.	Tribus primis menstribus appetitus carebat. Dolores mammarium dorso-perpetua est. Inde a primis Decembribus die vitam foetus fecit.									Iam inde a 10 Febr. dolores lumborum, appetitus defectum, cerebra ad lotum excentrum incitamenta, caeteraque partus proxire instantis signa conquesta est. Nihil minus protuberante vsque ad D. 23 Mart. horam primam mutuatum, qua post unum alternum dolor velorem rumpente rumpitur, aquae effluxere: idque fine vila eudentis causilla violenta accidit. De cetero omnia partus signa aderant. Ut orificium ita apertum, ut diutius medium tenuiter posse in futurice aperturam latus facilius habeatur, diutius medium tenuiter posse in futurice aperturam latus facilius habeatur, in loco statu p. 50 et quod occurserit horum remanent, orificium tunc vteri ad quatuor vel sex lineas magis expandit. — Meridie D. 23, opiatum illi porrigitur: vepera Veneficio infinitus. Tandem D. 25. H. 3. matut. dolorum vehementia augeatur, orificium magis magisque aprebeat. — H. 6 ¹ Caput magis depresso, Orific. Diam. = 1 ¹ 1. — H. 8. Caput unique Orific. vteri, circumdatum. — H. 9. Applicatio Enematis. — Autem nunc rufus dolorum vehementer, et orificio vteri magis dilatato, cum tamen partum adhuc diutius retardatum iri, si naturae sollem relinqueretur, nullum dubium esset, foriceps h. 11 ¹ applicabatur, infans, post difficiles trahitiones, numero 30 excedentes, magno quisem, fed mortuus extrahebatur, h. 12. — 50 minut. post, placenta expulsa. — In puerperio morbo fere nihil fecit mulier.	6 ¹ liber.	23 pollic.	5 ¹ pollic.	4 pollic.	20 ¹ pollic.	Pinguis.	1 ¹ libr.			
7.	M.	Parva, admodum iisqueis.	Bona.	Penulti- ma Iunii 85, hebdom.	D. 15 April. 86.	Nausea, Lipothymia crebrae. Dolor mamma- rum.									Iam ante tres dies praeterentes dolores perpetua est. Versus vespere diei 14 dolores primi stadii vteri aderant. — H. 7 ¹ Mucus sanguineus tintus. Abinde dolores parum efficaces. — Hora 12. noct. Velamenta digitis rotata, rupta difficultas, cum perpaucum aquarum effluxus. — 45 minut. post, quartum stadium irripit et H. 12 ¹ PARTVS, cum insequente copioso aquarum effluxu. — Breui post placenta sponte venit.	4 ¹ liber.	21 pollic.	4 pollic.	3 pollic.	—	Craffus varicibus distinctus.	1 libr.			
8.	M.	Status mediocris, robusta,	Bona.	Fine Aug. 85.	D. 12. Maii 86.	Vertigine, Lipothymia, doloribus lumborum quandoque affiebatur.									Partus iste tam subitanus erat, vt vix acceriti infans natus esset. Stadium pri- um et secundum vel vix ac ne vix fentebant, vel per femur tantum durarebant. Velamenta rotis dimidiis minutis spatio infans aderat. Post horae quadrantem etiam placentula folata, cum copiosissima, et tantum non nimis copiosa sanguinis deperditione.	6 liber.	21 pollic.	4 ¹ pollic.	3 ¹ pollic.	—	Pinguis.	—			
9.	P.	Virago, status proceræ, robusta, et crassa, toroïda.	Optima.	Penulti- ma Iunii 85, hebdom.	D. 13. Maii 86.	Nihil incommodi a grauiditate habuit. Inde a 3ta Xbris septimana vitam foetus fecit.									D. 2 Maii primis affiebatur doloribus. — Vespere, poiquam hora nona vomitus superueniunt, h. 10 stadium secundum aderat. Abinde dolorum efficacia immunita, vase ad medianum noctem, que velamenta disrumpentur. — H. 12 ¹ initium stadium quarti — 10 minutis post. PARTVS. — H. 1ma diei 3ii placentula folata, cum insequente copiosa aquarum effluxu. — Breui post placenta sponte venit.	7 ¹ liber.	21 pollic.	4 ¹ pollic.	3 ¹ pollic.	24 ¹ pollic.	Sanguis neus, col. lumen femel circumdat.	—			
10.	M.	Status medius.	Bona.	Prima Sept. 85, dubus	D. 27. Maii 86.	Pertotum grauiditatem semper fuit d. 25. Xbris primos infanti motus sensit.									D. 2 Maii primis affiebatur doloribus. — Vespere, poiquam hora nona vomitus superueniunt, h. 10 stadium secundum aderat. Abinde dolorum efficacia immunita, vase ad medianum noctem, que velamenta disrumpentur. — H. 12 ¹ initium stadium quarti — 10 minutis post. PARTVS. — H. 1ma diei 3ii placentula folata, cum insequente copiosa sanguinis deperditione.	7 liber.	22 pollic.	4 ¹ pollic.	3 ¹ pollic.	24 ¹ pollic.	Sanguis circa col. lumen fle-	1 ¹ libr.			
11.	M.	Status mediocris, robusta, fana.	Bona.	a Sept. 85.	D. 28. Maii 86.	Bene se habuit, excepta quadra latitudine.									Felice et repentina partu D. 27 Maii, hora 10 ¹ matutina, enixa est filius. — Tam repente et celeriter peperit, vt illa No. 8. — Puerperium felicissimum habuit.	6 ¹ liber.	22 ¹ pollic.	4 pollic.	3 pollic.	—	Craffus.	1 ¹ libr.			
12.	P.	Status proceræ bene conformata, robusta.	Bona.	a Sept. 85.	D. 8. Aug. 86.	Præter pallorem faciei, et tumore dextri pedis, nullum incommodum fecit.									Primis doloribus ad D. 8. Aug. versus vespere percussus est, symptomatibus fuit. — Sequenti die, hora 3 ¹ pomeric. stadium secundum ingredit. Hora 7 ¹ Velamenta rotata, et post stadium quartum. — H. 8. filiam ex ea est. — Mox placenta expellatur, cum anguis sanguinis factura.	6 ¹ liber.	22 pollic.	4 ¹ pollic.	4 pollic.	25 pollic.	Craffus.	1 libr.			
13.	M.	Status mediocris, fana robusta.	Bona.	A. mefornia 85, non potest tempus de terminare, et tempore immoderate incrementata fuisse.	D. 12. Aug. 86.	Nauseam, vomitus, Lipothymia; at primis tantum mensibus.									D. 11. h. 3. pomeric. ex inopinato aque infusigi copia effluxere, cum album deponebatur: deinde doloribus leibus et nullius momenti corripiebatur: inde ab h. 3. posta graviora accelerant. — H. 10 subinde inter virinas aquae effluxere, luculentef teflantes, caput noscum bene esse fitum. — H. 11 ¹ caput vnde orific. vt. circumdatum. — H. 12 ¹ stadium quartum . . . et 5 minutis post, PARTVS. Placentula iam postea expulsa erat. Puerperium felicissimum.	8 liber.	22 pollic.	4 ¹ pollic.	4 ¹ pollic.	—	—	1 libr.			
14.	M.	Vt supra.	Bona.	Nihil certi dicere possem.	D. 19. Aug. 86.	Solito modo affecta est. Tertia Februario hebdomada primis infanti motus fecit.									D. 18 versus vespere, dolores praesagiantes aderant. Versus noctis medium, stadium secundum. — Hora tandem 3ta matut. D. 19 velamenta praeter opinionem rum- pente, abinde doloribus leibus et nullius momenti corripiebatur: inde ab h. 3. posta graviora accelerant. — H. 10 subinde inter virinas aquae effluxere, luculentef teflantes, caput noscum bene esse fitum. — H. 11 ¹ caput vnde orific. vt. circumdatum. — H. 12 ¹ stadium quartum . . . et 5 minutis post, PARTVS. Placentula iam postea expulsa erat. Puerperium felicissimum.	7 ¹ liber.	22 pollic.	4 ¹ pollic.	3 ¹ pollic.	—	Craffus. Centrie insertus.	1 libr.			

PARTVS HISTORIA.

Scholia quaedam ad uraeedentem tabulam.

Scirpus quadratus ad praeoccidentem caputum.
Tabula ista ex observationibus prolationis fermeo conscripsis redditu, *principium* tantum momenta efficit, sed pars universalis historiarum pertinet. Nullus equum subito, quin eiusmodi conspicillae confici posset ex quo plus adhuc et graviora corollaria deduci possent; idemque in posterum ipse annis, ut ad maiorem eum perficiantur et mox conseruant symbolos. Ut rite aperatur, magno enim frustis redundare potest, subiuncit conseruata qualem, iuxta rannum propriam adumbrans, sive plena metra peccata. Ex ornibus 14 partem, ex Nro 4, sive quae tempore gradus intet a concubitis cum vero deficiuntur, certe omnes a superponere fluxus membrum comparant faciliat. Quam dubia sunt aquae fallax illa numerando ratio, quod quotidie fere edocetur. In tabula mea non quidam foecundis sunt, quare calceis inter se coeuntur a pterigio vero, duobus, tribus membris inter se differenti ut in modo fex habedamus octo, modo vel septimis tardius costis eis circa fit hoc vel illa. Id quod ex eo, si fallere, erit, quod gradus tunc at leastis fata annis mutationes in fundibulis suis occurrent, obstant. Dein ex eo quecumque, quod minime annibus latim poterit conceperimus metuenda plus celent, sed planitas vel aucta vel insimilatae quantitate pingu et frumento indecibus postulant. Hanc agit ut sem temporis gradus signa quidam omnes autem fallere posse, sed maxime a fluxu membrorum superponit, et a tempore primorum embryonum metuenda est definita: multo certius vero ex ea, quae sub et exploratio tam extima, quam interna initibus, nobis offerunt. ... His illi signis, in noscendo sapientibus patrum dieu considerata adeficiuntur. At quandoque enim, praecipue in multisparti, nos fideliter. Apud eam Nro 4, inde conseruata virga ad parum 42 habedamus eliptis et ita ut talis

Vitulam nonnulli pugnacis ferocissimis obliterat: *gas diutius duraverit primum et secundum partus fiduciam, eo citius et quartum finitur illi.* Quod autem, quam multis subiectum sit exceptionibus, iam ex ipso patet. Vix enim tenuis et quantum fiduciam minus tempore absoluuntur, quam dies prius. At ratione quando mutum fiduciam, noscere ex sexagesi calibus colligere poset, et raro tempore hanc magam reperiunt. Quintum tamen et quartum fiduciam eadem ratione qua et ad diutius durare vidimus. Secundum opinione mea itaque equum fore, si propositio non nullam faciemus, ne quasdam in applicatione eius ercent communias.

Quare tam multe circa *vifpram* colubri ad partum coniunxunt, ita et plerique partus inter lucem fecerant?

Florium fuscum luteo-oblacerrimum condensatum, s. omnes partibus hispidorum, quibus laterice ipsi conseruitur, methodo tabellari literis configurante. In eiusmodi aures isthmum specialiter iam memoriosos, sequentes tituli, n. falsos, necessaria efficiunt: Menus et mensurae Sutorum, Thermometri, Hygrometri pondus aquarum, latitudi humerorum; genos, valvulis intibus; finis pacienti et clausum membrum dico et cetera.

Ad Nutr. 4. Etsi speciem partus maxime mortalia, velamentorum figuram nulla si occasione tam bene formatum et in 310 et 410 studio defores tam efficaces, et tamen partum non simis precipitatum vihi quam in hoc eis.

Ad Nro. 6. Inter 40 fere monitos, hic videlicet in parte demotica est, qui nolle antīcū vīce resiliē posset,
Ad Nro. 7. Formis sibi 17 amorum, ceteris positione, quam vocant varijsim in comparatione habebit, viam in lucem edere infinitē deprehendi solet, atamen palla mollier erat. Neglige ostreum, se ante vocām concepīt; dubitandi anfam nobis etiam dedit
atque tias tuas iuuenies. Sed polles fertiles facti summi iam absumpti palla. Ambiguum reuocatur pergewimus accedentes; it circa etiam diffiducilissimum ruprūta erunt, antī opē facta, coniuncta erat.
Ad Nro. 8. Formis sibi 17 amorum, ceteris positione, quam vocant varijsim in comparatione habebit, viam in lucem edere infinitē deprehendi solet, atmen palla mollier erat. Neglige ostreum, se ante vocām concepīt; dubitandi anfam nobis etiam dedit
atque tias tuas iuuenies. Sed polles fertiles facti summi iam absumpti palla. Ambiguum reuocatur pergewimus accedentes; it circa etiam diffiducilissimum ruprūta erunt, antī opē facta, coniuncta erat.

Ad Nro. 9. Formica rufa, quamvis cibulis torofo, virgo fuerit, tamen dolores non admodum forces expedit fata. Sensibilitas et anima praejudicante immunitate tribuerunt ei felicitate, vita dubio.

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (310) 794-3000 or email at mhwang@ucla.edu.

Q.
West Clark.

