

# **Compendium institutionum chirurgicarum / [Joseph Jacob Plenck].**

## **Contributors**

Plenck, Joseph Jacob, Ritter von, 1738-1807

## **Publication/Creation**

Vienna : R. Gräffer, 1780.

## **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/xqe5g925>


## **License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



4 15 4 8 / 13

H. vii. Ple



Portrait of a Man in Profile

18th Century



*Doct. et Profri. Chir. J. J. Plenck.*

*posuit  
Mart. Lange N. Doctor.*

*d. p. Joh. Mart. Stock 1777.*

*g. p. Quir. Marck 1778.*

75392  
JOSEPHI JACOBI PLENCK,

*CHIRURGIÆ Doctoris, nec non Chirurgiæ, Anatomes, atque Artis obstetriciæ Professoris Cæsareo-Regii, publici, ac ordinarii in Cæsareo-Regia Universitate Budensi.*

COMPENDIUM  
INSTITUTIONUM  
CHIRURGICARUM.

P R O  
TIRONIBUS CHIRURGIÆ.

— ❧ —  
EDITIO SECUNDA, AUCTA, EMENDATA.  
— ❧ —



VIENNÆ,  
APUD RUDOLPHUM GRÆFFER, 1780.






## I N D E X

DOCTRINARUM, QUÆ SCIENTIAS PRÆPARATORIAS CHIRURGICÆ CONSTITUUNT.

1. *Anatome.*
2. *Hygrologia.*
3. *Physiologia.*
4. *Pathologia.*
5. *Pharmacologia.*
6. *Doctrina de fasciis.*
7. *Doctrina de instrumentis chirurgicis.*
8. *Notitia Authorum chirurgicorum.*



## I N D E X

SCIENTIARUM, QUÆ CHIRURGIAM PRACTICAM CONSTITUUNT.

### I. DOCTRINÆ COMMUNES.

1. *Doctrina vulnerum.*
2. ————— *ulcerum.*
3. ————— *tumorum.*
4. ————— *prolapsuum.*
5. ————— *herniarum.*
6. ————— *deformitatum.*
7. ————— *de morbis ossium.*
8. ————— *de operationibus chirurgicis.*

## II. DOCTRINÆ PECULIARES.

1. *Doctrina de morbis oculorum.*
2. ——— ——— *dentium.*
3. ——— ——— *cutaneis.*
4. ——— ——— *venereis.*
5. ——— *chirurgia forensi.*
6. ——— *arte obstetricia.*
7. *Casuistica*
8. *Historia chirurgiæ.*





## DE ANATOMIA GENERATIM.

*A*NATOMIA est scientia, quæ humani corporis structuram docet.

Hæc scientia in 7. dividitur *Doctrinas*.


1. est *Osteologia*, quæ de ossibus agit.
2. — *Syndesmologia*, quæ de ligamentis.
3. — *Myologia*, quæ de musculis.
4. — *Splanchnologia*, quæ de visceribus.
5. — *Angiologia*, quæ de vasis sanguiferis.
6. — *Nevrologia*, quæ de nervis.
7. — *Adenologia*, quæ de glandulis tractat.

### DE PARTIBUS SOLIDIS IN GENERE.

Corpus humanum partibus constat *solidis & fluidis*.

*Solidæ* partes in *duras & molles* dividuntur. Ossa & cartilagines partes vocantur duræ ; musculi , & omnes reliquæ sunt molles.

Omnes partes solidæ constant ex *minimis fibris*.



## O S T E O L O G I A

S E U

### DOCTRINA DE OSSIBUS.

*OSSA* sunt partium solidarum durissimæ, siccissimæ, & insensibiles.

*Compages* ossium totius corporis , in naturali situ  
connexorum, vocatur *sceletus*.

*Sceletus* est vel *naturalis* si ossa propriis adhuc liga-  
mentis, *artificialis* si ossa sine ligamentis ope filo-  
rum ferreorum connexa sunt.

## DIVISIO Sceleti.

*Sceletus* dividitur in *caput*  
*truncum*  
& *extremities*.

*Caput* dividitur in *cranium* &  
*faciem*.

*Facies* dividitur in *maxillam superiorem* &  
*inferiorem*.

*Truncus* dividitur in *spinam*  
*thoracem* &  
*pelvem*.

*Extremities* dividuntur in *superiores* &  
*inferiores*.

*Extremities superiores* dividuntur.

in *summitatem humeri*.

— *brachium*.

— *antibrachium* &

— *manum*.

*Manus* dividitur in *carpum*  
*metacarpum* &  
*digitos*.

*Extremities inferiores* dividuntur in *femur*  
*crus* &  
*pedem*.

*Pes* dividitur in *tarsum*  
*metatarsum* &  
*digitos.*

## NUMERUS ET NOMEN OSSIUM.

*Sceletus* adulti hominis constant ex 240 ossibus.

*Cranium* constat ex 8. ossibus.

1. *Os frontis.*

1. *Os occipitis.*

2. *Ossa parietalia.*

2. *Ossa temporalia.*

1. *Os sphænoideum.*

1. *Os ethmoideum.*

*Maxilla superior* constat 13. ossibus.

Duo ossa *maxillaria superiora.*

*jugalia.*

*lachrymalia.*

*nasalia.*

*palatina.*

*spongiosa inferiora.*

Unum os *vomer.*

*Maxilla inferior* constat uno osse.

*maxilla inferior.*

*Cavum oris* habet ossa propria 33.

32. *dentes.*

1. *os hyoides.*

*Cavum auris* habet ossa propria 4.

*Stapes.*

*Malleus.*

*Incus.*

*Os orbiculare.*

*Spina* dorſi ex 24 vertebris conſtat.

7. *vertebræ colli.*

12. *vertebræ dorſi.*

5. *vertebræ lumborum.*

*Thorax* habet offa 25.

24. *Coſtæ.*

1. *Os ſterni.*

*Pelyis* conſtat offibus 4.

2. *Oſſa innominata.*

1. *Os ſacrum.*

1. *Os coccygis.*

*Sumitas humeri* habet 2. offa

*Clavicula.*

*Scapula.*

*Humerus* conſtat offe uno.

*Os humeri.*

*Antibrachium* habet offa 2.

*Cubitus.*

*Radius.*

*Carpus* conſtat offibus 8. quæ duas ſeries formant.

*Metacarpus* conſtat 5. offibus.

4. *Oſſa metacarpi digitorum.*

1. *Os metacarpi pollicis.*

*Digiti* habent 14. officula.

*Pollex* 2. *phalanges.* Quilibet digitus 3. habet.

*Femur* habet unum os.

*os femoris.*

*Crus* conſtat 3. offibus.

*Tibia.*

*Fibula*

*Patella.*

*Tarsus* habet 7 ossa.

*Metatarsus* constat 5. Ossibus.

*Digiti*, pedis habent 14. *phalanges*.

Pollex 2. *phalanges*.

*Digiti* 3. *phalanges* habent.

## O S S I U M N E X U S.

*Tria* sunt connexiorum genera.

I. Nexus *mobilis* qui *articulatio* vocatur.

II. Nexus *immobilis*.

III. Nexus *mediatus*.

*Articulationum* seu nexus *mobilis*, sunt 5 species.

I. *Articulatio profunda* seu *Enarthrosis*.

II. *Articulatio plana* seu *Arthrodia*.

III. *Articulatio Gingliformis* seu *Ginglymus*.

IV. *Articulatio cardiniformis* seu *Trochoides*.

V. *Articulatio ambigua* seu *Amphiarthrosis*.

Nexus *immobilis* sunt 3. species.

I. *Sutura*.

II. *Harmonia*.

III. *Gomphosis*.

*Connexionis mediatae* seu *simphyfis* sunt 5. species.

I. *Synchondrosis* seu *simphyfis cartilaginea*.

II. *Syssarcosis* seu *simphyfis muscularis*.

III. *Synevrosis* seu *simphyfis ligamentosa*.

IV. *Syndesmosis* seu *simphyfis membranacea*.

V. *Synostosis* seu *simphyfis ossea*.

*Articulationum conditiones* sic se habent.

I. *Enarthrosis* est articulatio in omnem ambitum  
mobilis cum cavo profundo. Caput femoris

cum acetabulo ossium innominatorum unice sic articulatur.

II. *Arthrodia* est articulatio in omnem ambitum mobilis cum cavo fere superficiali. Caput humeri cum cavitate glenoidea scapulæ, & digitus index cum suo osse metacarpi sic articulatur.

III. *Ginglymus* est articulatio, quæ solummodo flexionis & extensionis motum admittit. Genu cum femore, cubitus cum humero sic movetur.

IV. *Trochoides* est articulatio in qua rotatio circa cardinem observatur. Sic caput & prima vertebra colli circa processum otondoideum vertebræ colli secundæ movetur.

V. *Amphyarthrosis* est ossium articulatio cum motu vix visibili. Sic ossa metacarpi & metatarsi articulantur & moventur.

Species *connexionum immobilium* sic constituuntur.

I. *Sutura* est ossium immobilis connexio ope marginum dentiformium. Sic ossa cranii connectuntur.

II. *Harmonia* est ossium immobilis connexio ope marginum asperorum non dentiformium. Sic plurima ossa faciei connexa sunt.

III. *Gomphosis* est ossium immobilis connexio, in qua os ossi adeo infixum est, ut clavus parieti. Sic radices dentium infiguntur alveolis maxillarum.

Species *connexionum mediante alio corpore* sic sunt constitutæ.

- I. *Synchondrosis* seu *symphysis cartilaginea* est ossium connexio ope cartilaginis intermediæ. Sic corpora vertebrarum, sic ossa pubis inter se connectuntur.
- II. *Syssarcosis* seu *symphysis muscularis* est ossium connexio per musculos. Sic os hyoides cum variis partibus connectitur.
- III. *Syndesmosis* seu *symphysis ligamentosa* est ossium connexio per ligamenta. Sic radius cum ulna, sic tibia cum fibula ope ligamenti interossei connectuntur.
- IV. *Synevrosis* seu *symphysis membranosa* est ossium cohæsi ope membranæ. Sic in fœtu ossa parietalia cum frontali cohærent.
- V. *Synostosis* seu *symphysis ossea* est ossium concretio ope substantiæ intermediæ osseæ. Sic maxilla inferior, quæ in fœtu ex duabus partibus constat, in sua medietate in adultis concrevit.

## O S S I U M   S U B S T A N T I A.

Hæc triplex invenitur.

*Substantia compacta* in corpore.

*spongiosa* in extremitatibus.

*reticularis* in cavo medullæ ossium est.

*Substantia compacta* ex latis & plurimis sibi invicem incumbentibus lamellis constat.

*Substantia spongiosa* ex brevibus sibi non incumbentibus sed sibi opposite locatis lamellis constat, quæ spongiæ fimiles cellulas format.

*Substantia reticularis* ex tenuibus filamentis ossis, quæ retis adinstar sibinectuntur, constat.

### COLOROSSIUM.

- I. In *substantia compacta* est albido-rubens.
- II. — *substantia spongiosa* est fusco-rubens.
- III. — *externa cranii tabula* est albido-cærulescens.

### USUSSIUM.

- I. *Fulciunt* totum corpus. II. *Formant* corporis staturam. III. *Defendunt* viscera. IV. *Dant* musculis *adhæSIONem* & *fitum*.

### DECRANIOINGENERE.

De cranio notari debet

*Divisio* in *calvariam* & *basim*.

*Compositio* ex 8. ossibus.

*Connexio*. Hæc 8. ossa connectuntur per *suturas*.

*Suturæ* cranii in 3. *veras* & 2. *spurias* dividuntur.

- I. *Suturæ veræ sunt* 3.

*Sutura coronalis*, quæ os frontis cum ossibus parietalibus.

*Sutura sagittalis*, quæ ossa parietalia invicem conjungit.

*Sutura lamdoidea seu occipitalis*, quæ os occipitis cum ossibus parietalibus & temporalibus colligat.

- II. *Suturæ spurie* sunt 2. *suturæ squamosæ seu temporales*, quæ os temporis ad marginem inferiorem ossis parietalis utrinque conjungunt.

*Substantia cranii*. Cranium constat ex *interna* & *externa* tabula compacta, inter quas substantia

spongiosa, quæ *Diploë* vocatur, intercedit. Interna cranii tabula etiam ob politam & fragilem superficiem *Vitrea* dicitur.

*Officula*, quæ *Wormiana* vocantur; inveniuntur præcipue in futura lamboidea.

8. *Fossæ* in basi cranii, quæ cerebrum & cerebellum continent, inveniuntur

2. *Fossæ anteriores*, quæ ab osse frontali & ethmoideo formantur

2. *Fossæ mediæ*, quæ ab osse sphænoideali & temporali.

2. *Fossæ occipitales superiores*, quæ ab osse occipitali.

2. *Fossæ occipitales inferiores*, quæ ab eodem & temporali formantur.

Foramina in basi cranii sunt.

10. *paria* &

2. *imparia*.

*Foraminum parium* sunt.

1. Foramina *cribrosa* in osse ethmoideo.

2. Foramina *optica* in osse sphænoideo.

3. *Fissuræ orbitales superiores*.

4. Foramina *rotunda*.

5. ————*ovalia*.

6. ————*spinosa* in eodem.

7. Canales *carotici* in parte petrosa ossis temporum.

8. Foramina *auditoria interna* in eadem parte.

9. Foramina *lacera* inter os temporis & os occipitis.

10. Foramina *condyloidea anteriora* in osse occipitis.

*Foraminum imparium sunt 2.*

1. *Foramen cæcum* inter os frontis & os ethmoideum.

2. *Foramen occipitale magnum* in osse occipitali.

I. Per *foramina cribrosa* transeunt nervi *olfactorii* ad cavum narium.

II. Per *foramina optica* transeunt nervi *optici* & per illos *arteria centrales*.

III. Per *fissuras orbitales superiores* tranfit *tertium, quartum, primus ramus quinti paris, & sextum par* nervorum cerebri, atque *arteria orbitalis interna*.

IV. Per *Foramina rotunda* tranfit *secundus ramus quinti paris*.

V. Per *foramina ovalia* tranfit *tertius ramus quinti paris*.

VI. Per *foramina spinosa* intrat in cranium *arteria spinosa* ad *duram matrem*.

VII. Per *canales caroticos* intrat *arteria carotis interna* & exit *nervus intercostalis magnus*.

VIII. Per *foramina auditoria* tranfit *portio dura & mollis nervi auditorii & arteria auditoria interna*.

IX. Per *foramina lacera* exit *vena jugularis interna, octavum par* nervorum, & *nervus accessorius*.

X. Per *foramina condyloidea anteriora* exeunt *nervi linguales* seu nonum par.

Per foramina imparia transeunt.

- I. Per *foramen cæcum* exit parva vena.
- II. Per *foramen occipitale magnum* exit *medulla spinalis* & intrant *arteriæ vertebrales*, atque *nervi accessorii medullæ spinalis*.

In cranio infantum neonatorum adnotari debet *fontanella* seu locus ille membranofus in *syncipice*, qui nondum ossificatus est.

## O S F R O N T A L E.

*Situs* in antica cranii parte.

*Figura* est ut media concha.

*Divisio* in *superficiem externam* & *internam*.  
in *basim* & *marginem*.

*Processus* in superficie externa sunt.

1. *Tubera frontalia*, quæ latera externæ superficiei constituunt.
2. *Arcus superciliares*, qui margines superiores cavorum orbitalium sunt.
3. *Spina frontalis externa* est apophysis cui ossa nasi incumbunt.
4. Duæ *apophyses orbitales externæ* &
5. Duæ *apophyses orbitales internæ*. Quæ angulos orbitarum constituunt.
6. *Spina fontalis interna*, quæ in basi ossis ante *foramen cæcum* in interna superficie est.

*Cavitates* in superficie externa.

1. *Cavitates duæ orbitales*, quæ orbitæ partem superiorem constituunt.

2. *Fovea glandulæ lachrymalis* in externo angulo orbitæ.
3. *Fovea pro trochlea musculi obliqui superioris bulbi* in interno angulo orbitæ.
4. *Foramen superciliare* quod nervum frontalem emittit.
5. *Duo sinus pituitarii frontis* in basi ossis inter dehiscentes tabulas ossis.

*Cavitates internæ.*

1. *Sulcus* in medietate pro sinu longitudinali duræ matris.
2. *Foramen cæcum* sub spina frontali interna.
3. *Excisura ethmoidea* pro receptione ossis ethmoidis.

*Connexio* cum 7. ossibus. 1. Cum ossibus *parietalibus*. 2. Cum ossibus *nasi*. 3. Cum ossibus *lachrymalibus*. 4. Cum ossibus *maxillaribus superioribus*. 5. Cum ossibus *jugalibus*. 6. Cum osse *ethmoideo*. 7. Cum osse *sphænoideo*.

*Usus.* Constituit frontem, partem superiorem orbitæ continet lobos anteriores cerebri.

## O S S A P A R I E T A L I A.

*Situs.* Sibi invicem accumbunt in parte suprema cranii.

*Figura* fornicata & quadrata fere est.

*Divisio* in *superficiem externam & internam*.

in 4. *Margines.*

*Superior* seu *sagittalis*.

*inferior* seu *temporalis*.

*anterior* seu *coronalis*.

in 4. *Angulos.*

Duo *anteriores* unus *superior* alter *inferior*.

Duo *posteriores* pariter *superior* & *inferior*.

*Cavitates externæ.*

*Foramen parietale*, quod in parte postica marginis sagittalis est, & arteriolam duræ matris emittit.

*Cavitates internæ.*

*Sulci* media pars in margine sagittali pro finu longitudinali duræ matris.

*Sulcus* pro arteria spinosa in angulo anteriori & inferiori.

*Connexio* cum 5. ossibus. 1. Cum suo *socio* per *futuram sagittalem*. 2. Cum osse *temporis* per *futuram squamosam*. 3. Cum osse *sphænoideo* per eandem *futuram*. 4. Cum osse *frontis* per *futuram coronalem*. 5. Cum osse *occipitis* per *futuram lambdoideam*.

*Usus*. Hæc ossa constituunt cranii partem superiorem.

## O S O C C I P I T I S.

*Situs* in parte cranii postica & inferiori.

*Figura* est quadrata oblonga.

*Divisio* in superficiem *externam* & *internam*.

*Prominentiæ externæ* sunt,

1. *Tuberculum occipitale externum* quod in medietate ossis est.
2. *Processus basilaris* qui a foramine occipitali magno ad os sphænoidale extensus est.

3. *Processus condyloidei*, qui ad latera foraminis occipitalis magni locantur, & foveis articularibus primæ vertebræ colli excipiuntur.

*Prominentiæ internæ.*

1. *Spina cruciata*, quæ in medietate interna ossis est, & in quatuor ramos dividitur.

*Ramus superior*, qui processui falciformi

*Rami duo laterales*, qui tentorio cerebelli

*Ramus inferior*, qui septo cerebelli dat adhæsiōnem.

*Cavitates externæ.*

1. *Duæ excisuræ* pro formando foramine lacero in marginibus inferioribus.
2. *Foramen occipitale magnum*, per quod *medulla spinalis* exit, & *arteriæ vertebrales*, atque *nervi accessorii spinales* intrant.
3. *Duo foramina condyloidea anteriora* ante processus condyloideos, quæ *nonum* seu *linguale par nervorum* emittunt.
4. *Duo foramina condyloidea posteriora* retro processus condyloideos per quæ *vena occipitalis* exit.

*Cavitates internæ.*

1. *Duæ fossæ occipitales superiores*, quæ posticos cerebri lobos excipiunt.
2. *Duæ fossæ occipitales inferiores*, quæ cerebellum excipiunt.
3. *Fossa medullæ oblongatæ*, quæ in processu basilari est.
4. *Sulcus superior spinæ cruciatæ*, in quo *sinus longitudinalis superior* locatur.

5. Duo *fulci laterales*, qui *sinus laterales* duræ matris excipiunt.

*Connexio* cum 4. ossibus. 1. Cum ossibus *parietalibus*. 2. Cum ossibus *temporum*. 3. Cum osse *sphænoideo*. 4. Condyli cum *foveis articularibus* primæ vertebræ colli connectuntur.

*Ufus*. *Constituit* partem posticam & inferiorem cranii. *Continet* lobos cerebri posteriores, cerebellum & medullam oblongatam. *Inservit* articulationi capitis.

## O S S A T E M P O R U M.

*Situs* ad latera & partem cranii inferiorem.

*Figura* irregularis est.

*Divisio* in tres partes.

in *squamosam*.

*mamillarem* &

*petrosam*.

*Processus externi* sunt.

1. *Apophysis zygomatica*, quæ ex parte squamosa emergit.

2. *Tuberculum articulare*, quod radix apophysis zygomaticæ est, & ante foveam articulare locatur.

3. *Apophysis styloidea* ex parte petrosa emergit.

4. *Apophysis mastoidea*, quæ in parte mamillari est, & cui musculus sternomastoideus adhæret.

*Cavitates externæ* sunt,

1. *Fovea articularis* in inferiore superficie.

2. *Orificium externum meatus auditorii*, quod in externa superficie ossis est.

3. *Foramen stylomastoideum*, inter processum styloideum & mastoideum, ex hoc foramine *portio dura nervi auditorii* in tempora exit.
4. *Canalis caroticus*, qui parti petrosæ insculptus est, *nervo intercostali magno* pro exitu & *arteriæ carotidi internæ* pro introitu inservit.
5. *Excisura* in parte petrosa, quæ cum ossis occipitalis excisura *foramen lacerum* constituit.
6. *Tuba Eustachiana*, quæ inter partem petrosam & squamosam e cavo tympani exit.

*Cavitates internæ sunt,*

1. *Meatus auditorius internus* in superficie postica partis petrosæ, qui *nervum auditorium mollem* transmittit.
2. *Orificium internum aquæ ductus Fallopii*, quod in meatus auditorii interni orificio est, & *nervum auditorium durum* recipit.

*Connexio cum 5. ossibus.* 1. Cum osse *parietali*. 2. Cum osse *occipitali*. 3. Cum osse *sphænoidali*. 4. Cum osse *jugali*. 5. Cum *maxilla inferiori*.

*Substantia.* Pars *squamosa* ex tabulis & diploe. Pars *mamillaris* ex cellulis. Pars *petrosa* ex substantia compacta constat.

*Usus.* Lobos cerebri medios & partem cerebelli, & organum auditus continet. Tempora & basim cranii constituit.

## O S S P H O E N O I D E U M.

*Situs* in medietate basis cranii.

*Figura* multiformis est, vespertilioni, cujus alæ expansæ sunt, comparatur.

*Divisio* in corpus & apophyses.

in *superficiem externam*, quæ extra cranium.

in *superficiem internam*, quæ intra cranium est.

*Prominentiæ externæ* sunt,

1. *Spina sphænoidalis*, quæ cum vomere nasi connectitur.
2. *Alæ majores*, quæ in partem *temporalem*, *orbitalem* & *cerebralem* dividuntur.
3. *Apophysis pterygoidea*, quæ radicem in parte superiori & duas *alas parvas* in parte inferiori habet.
4. *Hamulus* in ala interna.
5. *Apophyses spinosæ*, quæ penes foramina spinosa sunt.

*Prominentiæ internæ.*

1. *Alæ minores*, quæ partem superiorem fissuræ orbitalis internæ constituunt.
2. *Apophyses clinoidæ anteriores & posteriores*, quæ anguli sellæ turcicæ sunt.

*Externæ cavitates* sunt,

1. *Sinus pituitarii sphænoidales*, qui corpori ossis insculpti sunt.
2. *Foramina canalis pterygoidei*, quæ in radice apophysium pterygoidearum sunt, per quæ *ramus recurrens* quinti paris nervorum in cavum cranii redit.

*Cavitates internæ.*

1. *Sella turcica*, quæ fovea est inter quatuor apophyses clinoides.
2. *Foramina optica*, per quæ *nervus opticus* & in ejus medutulo *arteria centralis* transit.
3. *Rimæ orbitales superiores*, quæ *tertium*, *quartum*, *primum* ramum *quinti paris*, & *sextum* par nervorum atque *arteriam orbitalem internam* transmittunt.
4. *Foramina rotunda*, quæ *nervum maxillarem superiorem*.
5. *Foramina ovalia*, quæ *nervum maxillarem inferiorem* transmittunt.
6. *Foramina spinosa*, per quæ *arteria spinosa* in cavum cranii intrat.

*Connexio* cum 9. ossibus. 1. Cum osse *frontis*. 2. Cum osse *ethmoideo*. 3. Cum ossibus *parietalibus*. 4. Cum ossibus *temporalibus*. 5. Cum ossibus *jugalibus*. 6. Cum ossibus *maxillaribus superioribus*. 7. Cum ossibus *palatinis*. 8. Cum osse *vomere*. 9. Cum osse *occipitali* per *Synchondrosim ligamentosam*.

*Ufus*. *Format* basim cranii; *concurrit* ad formationem orbitæ & sinuum pituitariorum nasi.

## O S E T H M O I D E U M.

*Situs* anterior in basi cranii, & simul in suprema narium parte.

*Figura* cubiformis est.

*Divisio* in sex superficieses.

*Superficies superior* cavum cranii respicit.

*Superficies inferior* in cavum narium prominet.

—— anterior finibus frontalibus contigua est.

—— posterior ossi sphænoideo jungitur.

—— laterales ; *dextra* & *sinistra* orbitæ partem internam constituunt.

*Prominentiæ externæ & internæ* sunt,


1. *Crista galli*, quæ superficiem internam in duas partes discernit, & processui falciformi duræ matris pro puncto adhæfionis inservit.
2. *Lamina cribrosa*, quæ internam ossis superficiem format.
3. *Lamina perpendicularis*, seu *septum ethmoidale*, quod substantias cavernosas dividit, & in regione inferiori cum vomere connexum est.
4. *Substantia cavernosa* in utroque latere laminæ perpendicularis una, quæ ex cellulis ossæis constat, & ossa spongiosa suprema format.
5. *Plana papyracea*, quæ substantias cavernosas a latere tegunt, & orbitæ partem lateralem internam constituunt.

*Cavitates externæ & internæ.*

*Foramina cribrosa*, quæ plurima sunt juxta cristam galli in interna superficie, & transmittunt ramulos nervorum olfactoriorum.

*Connexio cum 7. ossibus.* 1. Cum ossæ *frontis*. 2. Cum ossibus *nasi*. 3. Cum ossibus *maxillaribus superioribus*. 4. Cum ossibus *lachrymalibus*. 5. Cum ossibus *palatinis*. 6. Cum ossæ *sphænoideo*. 7. Cum ossæ *vomere*.

*Ufus.* Constituit organum odoratus , partem nasi, cranii, & orbitæ.



## DE OSSIBUS FACIEI IN SPECIE.

### OSSA MAXILLARIA SUPERIORA.

*Situs* in parte anteriori & media faciei.

*Figura* est irregularis.

*Divisio* in corpus , quod pars media est, & multos processus.

*Prominentiæ externæ & internæ* sunt,

1. *Apophysis nasalis*, quæ partem lateralem nasi efficit.
2. *orbitalis*, quæ inferiorem orbitæ partem constituit.
3. *jugalis*, quæ asperitas est cum osse jugali connexa
4. *palatina*, quæ anteriorem palati partem constituit.
5. *Arcus alveolaris*, qui in utroque osse ex 8. alveolis constat.
6. *Tuberositas maxillaris*, quæ superficiem posticam facit.
7. *Spina nasalis*, quæ interius in nasi cavo a connexionione ossium maxillarum formatur.
8. *Margo orbitalis*, qui inferiorem marginem orbitæ constituit.

*Cavitates internæ & externæ.*

1. *Fossa lachrymalis*, seu *fulcus* in superiori & interna parte *processus nasalis* pro *situ facci lachrymalis*.
2. *Canalis nasalis*, qui a *fossa lachrymali* oblique parum descendit in *cavum narium*.
3. *Canalis infraorbitalis*, qui *apertus* in inferiori *orbitæ* parte incipit, dein *tectus* sub *apophysi orbitali* pergit, & sub *marginem orbitalem* inferiori in *faciem* aperitur; transmittit *nervum infraorbitalem*, qui *continuatio nervi maxillaris superioris* est.
4. *Foramen palatinum anticum*, quod in *spina nasali* est, & *arteriam palatinam anticam* transmittit.
5. *Foramen palatinum posticum*, retro *ultimum dentem molarem* in *tuberositate maxillari*, qui *nervum alveolarem* intromittit.
6. *Apertura sinus maxillaris*, quæ ab *osse ethmoideo*, *lachrymali*, *palatino*, & *spongioso inferiori* adeo tegitur, ut vix *calamum scriptorium* admittat.
7. *Sinus maxillaris pituitarius*, qui in *mediate ossis* est, & *Antrum Higmorei* vocatur. Magna est *cavitas*, quæ suo *orificio* seu *apertura* in *cavum narium* hiat.

*Connexio* cum II. ossibus partim per *suturas* partim per *harmonias*. 1. Cum suo *socio*. 2. Cum *osse frontali*. 3. Cum ossibus *nasi*. 4. Cum ossibus *lachrymalibus*. 5. Cum *osse ethmoideo*. 6. Cum ossibus *jugalibus*. 7. Cum ossibus *palatinis*.

8. Cum osse *sphænoideo*. 9. Cum ossibus *spongiosis inferioribus*. 10. Cum osse *vomere*. 11. Cum *dentibus*.

*Ufus*. Format partem faciei, palati, nasi, narium, & orbitæ. Est simul organum masticationis.

## O S S A J U G A L I A.

*Situs* ad latera faciei.

*Figura* fere quadrata.

*Divisio* in *superficiem externam & internam*.  
in *corpus* & 4. *apophyses*.

*Prominentiæ* sunt,

1. *Apophysis frontalis*, quæ cum osse frontali in externo orbitæ angulo conneditur.
2. ——— *orbitalis*, quæ partem orbitæ.
3. ——— *malaris*, quæ ossi maxillari contigua est.
4. ——— *zygomatica*, quæ cum processu zygomatico ossis temporalis connexa, *zygoma* constituit.

*Cavitates* sunt,

1. *Fovea zygomatica*, quæ retro os jugale est.

*Connexio* cum 4. ossibus. 1. Cum osse *frontis*. 2.

Cum osse *maxillari*. 3. Cum osse *sphænoideo*.

4. Cum osse *temporali*.

*Ufus*. Est pro formatione faciei & orbitæ.

## O S S A N A S I.

*Situs* in parte superiori & media nasi.

*Figura* quæ oblonga & quadrata est.

*Divisio in superficiem externam & internam; & in quatuor margines.*

*Margo superior* ossi frontali contiguus.

*Margo inferior* cum cartilagine nasi conjunctus.

*Margo internus* cum suo socio connexus est, & inferius apophysi perpendiculari ossis ethmoidei accumbit.

*Margo externus* apophysi nasali ossis maxillaris occurrit.

*Connexio* cum 4. ossibus. 1. Cum suo socio. 2. Cum osse frontali. 3. Cum osse maxillari. 4. Cum osse ethmoideo.

*Usus.* Constituit nasum, & tegit organum odoratus.

## O S S A L A C H R Y M A L I A.

*Situs* in angulo interno orbitæ.

*Figura* quadrata est.

*Divisio* in superficiem externam & internam, & in 4. margines.

*Margo superior* cum osse frontali

*Margo inferior* cum osse maxillari cohæret.

*Margo internus* cum apophysi papyracea ossis ethmoidei &

*Margo externus* cum apophysi nasali ossis maxillaris conjungitur.

*Cavitates.*

1. *Sulcus medius* in margine externo, qui cum sulco medio apophysis nasalis ossis maxillaris fossam lachrymalem constituit.

*Connexio* cum 4. ossibus. 1. Cum osse *frontali*. 2. Cum osse *maxillari*. 3. Cum osse *ethmoideo*. 4. Cum osse *spongioso inferiori*.

*Ufus*. Constituit partem orbitæ, ductus lachrymalis, & labyrinthum narium obtegit.

## OSSA SPONGIOSA INFERIORA.

*Situs* in parte laterali & inferiori narium.

*Figura*, quæ cochliidi fimilis fere est.

*Divisio* in *superficiem externam*, quæ concava finum maxillarem respicit.

in *superficiem internam*, quæ convexa septo nasi obversa est.

in duos *margines*.

*Margo superior* eminentiæ transversali ossis maxillaris adhæret.

*Margo inferior* liber in cavitate nasi pendet.

in duas *extremitates* in *anteriorem* & *posteriorem*.

*Connexio* cum 3. ossibus per *harmonias*. 1. Cum osse *maxillari*. 2. Cum osse *palatino*. 3. Cum osse *lachrymali*.

*Ufus*. Superficiem organi odoratus augmentat. Aperturam Antri hygmoriani angustare juvat.

## OSSA PALATINA.

*Situs* in posteriori parte nasi, ex qua lateraliter in orbitam usque ascendit.

*Figura* est irregularis.

*Divisio* in tres partes.

1. in partem *palatinam*, quæ palatum format.

2. in partem *nasalem*, quæ in naso ad orbitam ascendit.

3. in partem *orbitalem*, quæ in orbitam prominet.

*Prominentiæ.*

1. *Apophysis pterygoidea*, quæ ope incisuræ cum extremitate apophysis pterygoideæ ossis sphænoïdalis, & tuberositate ossis maxillaris conjungitur.

2. *Linea eminens*, in superficie partis nasalis cui extremitas posterior ossis spongiosi inferioris incumbit.

*Connexio* cum 6. ossibus. 1. Cum suo *socio*. 2. Cum osse *maxillari*. 3. Cum osse *sphænoïdali*. 4. Cum osse *ethmoideo*. 5. Cum osse *spongioso inferiori*. 6. Cum osse *vomere*

*Ufus*. Format palatum, cavitatem nasi, orbitæ partem.

V O M E R.

*Situs* in medietate cavi narium, quod in duas partes dividit.

*Figura* quæ speciem vomeris refert.

*Divisio* in duas *superficies* & 4. *margines*.

*Margo anterior*, cui cartilago septi narium ossis ethmoidei adnectitur.

*Margo posterior*, fauces respicit.

*Margo inferior*, qui in sulco ossium palati & maxillarium recipitur.

*Superficies dextra & sinistra*, cavitates narium respiciunt.

*Connexio* cum 4. ossibus & una cartilagine. 1. Cum osse *sphænoïdali*. 2. Cum osse *ethmoideo*. 3.

Cum osse *maxillari superiori*. 4. Cum osse *palatino*. 5. Cum *cartilagine septi narium*.

*Ufus*. Sustinet & dividit *cavum narium*.

## M A X I L L A I N F E R I O R.

*Situs* in inferiori & anteriori parte faciei.

*Figura* soleæ ferreæ equinæ similis dicitur.

*Divisio* in *superficiem internam* & *externam*.

*in marginem superiorem* & *inferiorem*.

*in corpus* seu partem mediam & *extremities*.

*Prominentiæ*.

1. *Apophysis condyloidea*, quæ fovea articulari ossis temporum excipitur.
2. *Apophysis coronoidea*, quæ acuminata est, atque tendini musculi temporalis pro adhæsiōe inservit.
3. *Symphysis maxillæ*, est linea eminens in medietate corporis.
4. *Margo alveolaris*, qui 16. alveolos habet.
5. *Margo inferior*, qui *labium externum* & *internum* format.
6. *Anguli maxillæ*, qui in extremitatibus marginis inferioris sunt.

*Cavitates*.

1. *Excisura semilunaris*, quæ inter apophysim condyloideam & coronoideam est.
2. *Foramen maxillare posterius*, in interna superficie.
3. *Foramen maxillare anterius*, in externa superficie.
4. *Canalis mentalis*, qui in ossis substantia, sub dentibus a foramine posteriori ad anterius per-

git, & *nervum maxillarem inferiorem* cum *arteria & vena maxillari* transmittit.

5. *Alveoli dentium* 16. in superiori margine *maxillæ*.

*Connexio* cum *fovea articulari ossis temporis* & cum *osse hyoideo* per *musculos*.

*Usus*. Est *masticationis organum*.

## DE CAVITATIBUS FACIEI IN SPECIE.

*Præter* *cavitatem cranii* quinque aliæ *cavitates* in *capite* ab *ossibus cranii & faciei* formantur.

1. *Orbitæ*.
2. *Cavitas narium*.
3. *Cavitas oris*.
4. *Cavitas faucium*.
5. *Cavitas auditus*.

## O R B I T Æ.

*Situs* sub *fronte* ad *latera radices nasi*.

*Figura* est *conoidea*.

*Divisio* in *introitum & fundum*.

*Introitus* dividitur

in *marginem superiorem & inferiorem*.

in *angulum externum & internum*.

*Anguli orbitæ* etiam *canthi* vocantur.

*Cavitates* in *orbita* sunt,

1. *Fovea glandulæ lachrymalis* in *externo*
2. *Fovea trochleæ orbitalis* in *interno angulo*.
3. *Fossa lachrymalis* pro *situ sacci lachrymalis*.
4. *Canalis nasalis lachrymarum* est *continuatio fossæ lachrymalis*, pergit *oblique* in *nares*, & ibi sub *osse spongioso inferiori* aperitur.

5. *Rima orbitalis superior.*
6. *Rima orbitalis inferior.*
7. *Foramen superciliare.*
8. *Canalis infraorbitalis.*
9. *Foramen opticum.*

*Compositio orbitæ ex 7. ossibus. Superius ex osse frontis. Inferius ex osse maxillari & jugali. Interius ex osse lachrymali, ethmoideo, & palatino. Exterius & in fundo ex osse sphænoideo.*

*Ufus.* Continet, & defendit oculum ejusque partes adjacentes.

## C A V I T A S N A R I U M.

*Situs* sub antica cranii parte in medietate faciei.

*Divisio* mediante septi ossis in *dextram* & *sinistram* *cavitatem.*

*Figura* pyramidalis est.

*Prominentiæ* sunt.

1. *Septum narium*, quod a vomere & lamina perpendiculari ossis ethmoidei constituitur.
2. Tria paria *ossium spongiosorum.*  
*Suprema* &  
*Media*, quæ ambæ sunt partes ossis ethmoidalis.  
*Inferiora*, quæ separata sunt.

*Cavitates* sunt,

1. *Sinum pituitariorum*, tria paria.  
*Sinus frontales* in osse frontali.  
 ——— *sphænoideales* in osse sphænoideali.  
*Sinus maxillares* qui etiam *Antra Higmore* vocantur, in osse maxillari sunt.

2. *Foramina*

2. *Foramina narium antica*, quæ ab osse maxillari & vomere.

3. *Foramina narium postica*; quæ ab ossibus palatinis & vomere formantur.

*Compositio nasi* ex 14. ossibus. 1. Ex osse *frontis*.  
2. Ex ossibus *maxillaribus*. 3. Ex ossibus *nasi*.  
4. Ex ossibus *lachrymalibus*. 5. Ex ossibus *spongiosis inferioribus*. 6. Ex osse *sphænoideo*. 7. Ex osse *vomere*. 8. Ex osse *ethnoideo*. 9. Ex ossibus *palatinis*.

*Usus est*, ut formetur organum odoratus atque sinus pituitarii narium.

### C A V U M O R I S.

*Situs* intra superiorem inferiorem maxillam.

*Figura* antè ovata postè transversim abscissa.

*Divisio* in maxillam superiorem & inferiorem.

*Compositio* ex 5. ossibus & 32. dentibus. 1. Ex ossibus *maxillaribus superioribus*. 2. Ex ossibus *palatinis*. 3. Ex *maxilla inferiori*.

*Usus* hujus cavi est pro masticatione.

### D E N T E S.

Sunt officula parva alveolis maxillarum infixæ.

*Numerus* ordinarie 32. sunt. In qualibet maxilla 16.

*Divisio* in tres species.

in 4. *medios* qui *incisivi* dicuntur.

— 2. *caninos*, quorum singulus, ad latus incisiorum est.

— 10. *molares*, quorum in singulo latere 5. sunt.

*Divisio* cujuslibet dentis est.

in *coronam*, quæ pars suprema dentis extra gingivas prominens est.

— *collum*, quod circulus sub corona est.

— *radicem*, pars inferior dentis alveolo abscondita.

*Differentia coronarum.*

*Coronæ dentium incisorum* sunt latæ, & habent marginem acuminatum.

*Coronæ dentium caninorum* sunt crassæ & apicem habent obtusum.

*Coronæ dentium molarium* sunt pluribus eminentiis accuminatæ.

*Differentia radicum.*

*Radices dentium incisorum* sunt simplices & tenues.

*Radices dentium caninorum* sunt etiam simplices, sed longiores & crassiores quam in incisibus.

*Radices dentium molarium* sunt in primo simplices, in cæteris autem duplices, triplices, quadruplices, quæ subinde concretæ sunt.

*Cavitas dentis.* In radice qualibet *foramen* est, quod in parvam *cavitatem*, quæ in dentis substantia interna est, ducit. Per hoc foramen intrat *nervus*, *arteria*, *vena alveolaris*, & *periosteum internum* dentis.

*Substantia* dentis in *radice* compacta est. *Coronæ* superficies externa peculiari substantia durissima & albissima, quæ *vitrea* vocatur, & loco periostei externi est, obducitur.

*Connexio.* Radices dentium alveolis per gomphosim seu inclavationem infiguntur.

*Ufus* est ad *masticationem*.

*Genesis* dentium. Fœtus duplicem seriem dentium in qualibet maxilla gingivis occultam habet.

*Tempus primæ dentitionis* est sexto vel septimo post partum mense. Hi dentes *dentium primariorum* seu *lactariorum* nomine insigniuntur.

*Tempus secundæ dentitionis*. Circa septimum ætatis annum lactarii dentes sensim excidunt, & sensim novi ex iisdem alveolis subnascuntur, hi vocantur, *dentes secundarii*, seu *perennes* quia per vitam durant.

*Ultimi* dentes molares admodum sero in adulta jam ætate prodeunt, ideo *dentes sapientiæ* etiam dicuntur.

## C A V I T A S F A U C I U M.

*Situs* sub basi cranii, intra corpora superiora vertebrarum colli & posticam narium partem.

*Figura* est superius quasi quadrata.

*Divisio* in sex partes.

in *supremam*, quæ a processu basilari ossis occipitis.

in *anticam*, quæ ab *apophysibus pterygoideis* ossis sphænoïdalis, ossibus *palatinis* & *vomere* formatur.

in *posticam* quæ a tribus supremis vertebrarum colli corporibus.

in duas *partes laterales*, quæ ab ossis temporis partibus petrosi formantur.

*Compositio* ergo est ex hisce 10. ossibus.

*Usus.* Est pro fitu faucium , laryngis , pharyngis ,  
offis hyoidei.

### O S H Y O I D E U M.

*Situs* in faucibus intra linguæ basim & laryngem.

*Figura* est semilunaris.

*Divisio* in corpus & 4. cornua.

*Prominentiæ* sunt ,

1. Duo *cornua majora* , quæ a lateribus corporis exeunt & cum cornubus cartilaginis scutiformis laryngis ope ligamentorum cohærent.
2. Duo *Cornua minora* , quæ etiam *officula triticea* vocantur & ad ortum cornuum majorum prominent.

*Connexio* cum sex partibus vel per musculos, vel per ligamenta. 1. Cum *lingua*. 2. Cum *laryngis* processibus. 3. Cum *processibus styloideis* offis temporis. 4. Cum *maxilla inferiori*. 5. Cum *scapula*. 6. Cum *sterno*.

*Usus.* Inservit linguæ pro adhæfione , & deglutitione.

### C A V I T A S A U D I T U S.

*Situs* est interne in parte petrosa offis temporis.

*Divisio* in *meatum auditorium externum*.

- *cavitatem tympani* , in qua 4. officula auditus locantur.
- *labyrinthum*.
- *meatum auditorium internum*.

### D E T R U N C O.

Truncus sceleti dividitur in *Spinam*.

*Thoracem* &  
*Pelvem*.

## S P I N A D O R S I.

Est columna ossea, quæ in postica trunci parte a foramine occipitali magno ad os sacrum usque extenditur.

*Compositio* ex 24. vertebrais.

*Divisio* vertebrarum est in 7. vertebrae colli.

12. vertebrae dorsi.

5. vertebrae lumborum.

*Divisio* singulae vertebrae est in corpus & 7. apophyses.

*Corpus* est pars crassa, quæ anticam partem vertebrae constituit.

*Apophyses* 7. sunt,

1. *Apophysis spinosa*, quæ in parte postica eminet.

2. Duæ *apophyses obliquæ superiores*.

3. Duæ *apophyses obliquæ inferiores*.

4. Duæ *apophyses transversæ*, quæ ad latera sunt.

*Cavitates* sunt,

1. *Specus vertebralis*, qui *medullam spinalem* continet, & ab occipite ad posticam superficiem ossis sacri usque extenditur.

2. *Foramina lateralialia vertebrarum*, quorum 24. sunt, in quolibet corpore vertebrali medium. Hæc *nervos spinales* emittunt.

*Connexio* vertebrarum est duplex.

1. *Corpora* invicem per *synchondrosim*.

2. *Apophyses obliquæ* unius vertebrae cum apophysibus vertebrae sociæ per *arthrodiam* connectuntur.

*Usus* spinæ dorsi est, ut sit fulcrum trunci & capitis, ut contineat & defendat *medullam spinalem*.

## VERTEBRA PRIMA COLLI.

Hæc vocatur etiam *Atlas*.

1. Nec corpus, nec apophysim spinosam habet.
2. Eorum loco *arcum* anteriorem & posteriorem format.
3. *Arcus anterior* processum dentiformem vertebræ secundæ circumdat.
4. Loco apophysium obliquarum superiorum duos *sinus articulares* habet, qui condylos ossis occipitis excipiunt.
5. Superius cum capite, inferius cum secunda vertebra colli ope apophysium obliquarum inferiorum, & processus odontoidei cohæret.

## VERTEBRA SECUNDA COLLI.

Hæc etiam *Axis* seu *Epistropheus* dicitur. Peculiare illi est.

*Apophysis odontoidea* seu *dentiformis* in parte superiori corporis, quæ intra arcum anteriorem atlantis ope ligamenti transversalis in situ retinetur, & alio ligamento ad foramen occipitale magnum firmatur.

## VERTEBRÆ COLLI.

Hoc peculiare habent.

Quod *apophyses transversæ* omnes peculiare habeant *foramen* pro ascendentibus arteriis vertebralibus.

## VERTEBRÆ DORSI.

Hoc peculiare in illis est.

1. Ad latera corporum *media fovea*, quæ corporibus duobus junctis *integram* constituunt pro capitulo major costarum.
2. *Superficialis fovea*, in apicibus apophysium transversarum pro capitulo minori costarum.

## VERTEBRÆ LUMBORUM.

Maxima spinæ dorfi *mobilitas* est inter ultimam vertebram dorfi, & primam lumborum.

## DE CAVITATE THORACIS.

*Compositio* ex 37. ossibus.

12. *vertebris* dorfi.

24. *costis*.

1. *sterno*.

*Ufus*. Continet & defendit viscera vitalia. Inservit respirationi.

## COSTÆ.

*Situs* est obliquus a vertebra dorfi ad sternum.

*Figura* est semicircularis.

*Numerus*; sunt 24. in quolibet latere 12.

*Divisio generalis* in 7. *veras*, quæ ad sternum nectuntur.

in 5. *spurias*, quæ ad sternum usque non pertingunt.

*Divisio singulæ costæ*.

in *corpus* & *extremities* unam *anterior*em alteram *posterior*em.

in *superficiem* *externam* & *internam*.

in *marginem* *superiorem* & *inferiorem*.

*Eminentia.*

1. *Capitulum majus*, quod foveis articularibus vertebrarum dorſi neſtitur.
2. *Collum*, quod intra duo capitula hæret.
3. *Capitulum minus*, quod apicibus apophyſium transversalium vertebrarum dorſi adhæret.
4. *Angulus coſtæ*, qui pars poſterior maxime convexa coſtæ eſt.

*Cavitates* ſunt in qualibet coſta.

1. *Sulcus longitudinalis* in margine inferiore cujuſlibet coſtæ, qui *arteriam intercoſtalem* recipit.

*Subſtantia.* Pars anterior *cartilaginea*, reliqua tota *oſſea & compacta* eſt.

*Connexio.* *Extremitas anterior* coſtarum verarum per *ſynchondroſim* cum ſterno neſtitur.

*Extremitates poſteriores* omnium 24. coſtarum ope capituli majoris & minoris vertebris dorſi per *gynglymum* alligantur.

*Uſus* coſtarum eſt formare thoracem, inſervire reſpirationi, defendere viſcera vitalia, mammis adhæſionem dare.

## S T E R N U M.

*Situs* in antica thoracis parte inter coſtas veras.

*Figura* pugioni aliquantùm ſimilis.

*Diviſio* in *ſuperficiem internam & externam*.

- *extremitatem ſuperiorem & inferiorem.*
- *margines duos lateres.*
- *portionem ſuperiorem, inferiorem & apendicem partis inferioris, qui Cartilago xyphoidea ſeu enſiformis vocatur.*

*Cavitates.*

1. *Sinus jugularis* in parte suprema & media cui trachea contigua est.
  2. Duo *sinus claviculares* ad latera partis supremæ, quibus claviculæ nectuntur.
  3. 7. *foveæ costales* in margine laterali pro costis.
- Connexio sterni.* 1. Cum *claviculis* per arthrodiam. 2. Cum *cartilaginibus* 7. costarum verarum per *synchondrosim*.

*Substantia* est admodum spongiosa.

*Ufus* est formare thoracem, mediastino dare adhæ-  
sionem.

## DE CAVITATE PELVIS.

*Situs* in infima trunci regione.

*Figura* aliquantum pelvi tonsoariæ similis.

*Divisio* in alas & cavitatem.

*Cavitas* in *introitum* & *exitum*.

*Compositio* ex 4. ossibus. Ex duobus ossibus *innominatis*. Ex osse *sacro* ex osse *coccygis*.

*Connexio* ossium pelvis est per *synchondrosim*.

*Ufus* pelvis est continere organa generationis, vesicam, intestinum rectum. Fulcire spinam dorsii.

## OSSA INNOMINATA.

*Situs* est ad latera pelvis.

*Figura* est irregularis.

*Divisio* in fœtu in tres portiones.

in os *ilei*, quod partem superiorem constituit.

in os *ischii*, quod inferius.

in os *pubis*, quod antèrius locatur.

*Divisio totius ossis in superficiem externam & internam.*

*Eminentia sunt,*

1. *Tuberositas ilei*, quæ in parte postica ossis ilei est, quo loco cum osse sacro cohæret.
2. *Crista ilei*, quæ marginem supremum & crassum ossis ilei format.
3. *Spina ilei posterior*, est initium cristæ ilei in parte postica.
4. *Spina ilei anterior & superior* est finis cristæ in parte antica.
5. *Spina ilei anterior & inferior* est statim sub priori spina.
6. *Crista ossium pubis*, quæ marginem superiorem ossium pubis constituit.
7. *Arcus ossium pubis*. Sunt in antica ossis innominati parte.
8. *Tuberositas ischii* est in inferiore margine ossis cui loco infidemus.
9. *Spina ischii* est retro tuberositatem ischii.

*Cavitates.*

1. *Cavitas iliaca externa*, quæ in externa ossis ilei superficie.
2. *Cavitas iliaca interna*, quæ in interna hujus ossis superficie est.
3. *Excisura inter spinas ilei anteriores*.
4. *Excisura ischiatica anterior*, quæ ante.
5. ————— *posterior*, quæ retro spinam ischii est.
6. *Acetabulum* quod ab omnibus tribus portioni-

bus ossis innominati formatur & caput ossis femoris excipit.

7. *Fovea acetabuli*, quæ in fundo acetabuli est, & *glandulam synovialem* atque *ligamentum teres* femoris continet.

8. *Foramen ovale*, quod ab arcu ossis pubis & ischii formatur.

*Connexio* ossium *pubis* inter se per symphysem cartilagineam. Ossium *ilei* cum esse *sacro* per synchondrosim. Cum capite ossis *femoris* per enarthrosim.

*Ufus* est constituere pelvim, uterum gravidum retinere in situ; pro femoribus acetabula parare.

## O S S A C R U M.

*Situs* est parte postica pelvis.

*Figura* est triangularis, antrorsum flexa.

*Divisio* in *superficiem anticam* & *posticam*.

— *basim* seu partem supremam.

— *latera* &

— *apicem*.

*Prominentiæ*.

1. *Dux apophyses obliquæ superiores*, in basi ossis prominent.

2. *Tubercula apophysium spinosarum*.

3. ————— *obliquarum*

4. ————— *transversalium*. Quæ

omnia in superficie postica sunt.

5. *Vestigia corporum vertebrarum* in superficie antica.

*Cavitates.*

1. 4. *paria foraminum externorum*, quæ in externa superficie inveniuntur.
2. 4. *paria foraminum internorum*, quæ nervos sacros emittunt, sunt in interna superficie.
3. 5. *Canalis longitudinalis medius*, qui nervos sacros continet, in postica superficie est conspicuus.

*Connexio* cum 4. ossibus. 1. Cum ultima vertebra lumbali. 2. Cum osse coccygis. 3. Cum ossibus innominatis.

*Substantia* est tota spongiosa, ex vertebra 5. quas *spurias* vocant, coalitis.

*Ufus* est constituere pelvim, sustinere spinam dorsi.

## O S C O C C Y G I S.

*Situs* est in apice ossis sacri.

*Figura* est triangularis.

*Divisio* in *basim*, *latera*, & *apicem*.  
in *superficiem externam* & *internam*.

*Compositio* ex 3. parvis vertebra *spuriis* cartilagine coalitis.

*Connexio* cum apice ossis sacri per *synchondrofim*. Cum osse *ischii* per *synevrosim* seu ligamenta ischio coccygea.

*Ufus* est constituere pelvim, sustinere intestinum rectum præcavere in partu rupturam perinæi.

## C L A V I C U L A.

*Situs* obliquus est in suprema & laterali thoracis parte inter sternum & scapulam.

*Figura* est litteræ S. similis.

*Divisio in corpus & extremitates*, unam *anterior*-  
*rem*, alteram *posteriorem*.

*in superficiem superiorem & inferiorem.*

*Cavitates.*

*Sulcus* vasorum *subclavium*, qui in inferiore su-  
perficie est.

*Connexio.* Extremitas *anterior* cum *sterno*. Extremitas  
*posterior* cum *acromio* scapulæ per *arthrodiam*.

*Ufus* est connectere scapulam & humerum cum tho-  
race, defendere vasa *subclavia*.

## S C A P U L A.

*Situs* est in parte *suprema* & *lateral*i *dorsi*.

*Figura* est *triangularis*.

*Divisio* in duas *superficies* quarum una *posterior* seu  
*externa*, altera *anterior* seu *interna* est.

*in tres margines in superiorem, externum*  
*& internum.*

*in tres angulos in superiorem externum.*

*in superiorem internum.*

*in inferiorem.*

*Prominentiæ.*

1. *Labia* marginis *externi*, qui etiam *basis* scapulæ  
vocatur.

2. *Collum* scapulæ, quod *angulum* *superiorem* ex-  
ternum format, & locus sub *cavitate* *articulari*  
est.

3. *Spina* est *processus*, qui *superficiem* *posticam*  
dividit.

4. *Acromium* est pars *anterior* *spinæ*.

5. *Apophysis coracoidea*, quæ in parte antica & superiori cavitatis articularis prominet.

*Cavitates.*

1. *Cavitas* articularis in collo scapulæ, quæ caput humeri excipit.
2. *Fovea acromii*, quæ cum clavicula cohæret.
3. *Cavitas supraspinata*, quæ supra spinam.
4. *Cavitas infraspinata*, quæ infra spinam scapulæ in superficie postica est.

*Connexio* cum 4. ossibus. 1. Cum *clavicula* per arthrodiam. 2. Cum *costis* & 3. Cum *osse hyoideo* per *syssarcofin* seu musculos. 4. Cum *humero* per arthrodiam.

*Ufus* est dorsum defendere, humero articulationem parare.

O S H U M E R I.

*Situs* est intra scapulam & antibrachium.

*Figura* est longa.

*Divisio* in corpus & extremitates. Unam superiorem, alteram inferiorem.

*Prominentiæ* sunt,

In extremitate superiori.

1. *Caput*.
2. *Collum* spatium sub capite.
3. *Tuberculum majus* quod posterius.
4. ——— minus quod anterius sub collo capitis est.

In extremitate inferiori.

3. *Condyli*. 1. *Condylus externus*.
2. ——— internus. Qui pro adhesionibus musculorum extensorum & flexorum digitorum sunt.

3. ——— *Condylus capitatus* pro articulo radii.

*Trochlea humeri* pro articulatione cubiti.

*Cavitates* sunt.

In *extremitate superiori*.

1. *Sulcus tuberculorum* pro tendine uno musculi bicipitis.

In *extremitate inferiori*.

2. *Fossa posterior*, pro processu ancone cubiti.

3. *Fossa anterior* pro apophysi coronoidea cubiti.

*Connexio* cum tribus ossibus. 1. Cum *scapula* per arthrodiam. 2. Cum *cubito* per ginglymum angularem. 3. Cum *radio* per ginglymum duplicem.

*Substantia* est triplex in corpore compacta, in extremitatibus spongiosa, interne reticularis.

*Usus* est ut constituat brachium.

## C U B I T U S.

*Situs* in interno antibrachii latere versus digitum minimum.

*Figura* est longa superius crassior quam inferius.

*Divisio* in corpus & extremitates, quorum una superior altera inferior.

*Prominentiæ* sunt sex.

In *extremitate superiore*.

1. *Olecranon* seu *processus anconeus* qui posterius.

2. *Apophysis coronoidea*, quæ antè est.

In *extremitate inferiore*.

4. *Capitulum inferius*, quod parum excavatum.

5. *Collum capituli*.

6. *Apophysis styloidea*, quæ juxta capitulum est.

*Cavitates.*

1. *Cavitas Sigmoidea*, quæ inter processum anconeum & coronoideum est, & trochleam humeri excipit.

*Connexio* cum 3. ossibus. 1. Cum *trochlea humeri* per *gynglymum*. 2. Cum ossibus *carpi* per *arthrodiam*. 3. Cum *radio* superius & inferius per *trochoidem*.

*Usus* constituit fulcrum primarium antibrachii.

## R A D I U S.

*Situs* est in externo antibrachii latere versus pollicem.

*Figura* est longa.

*Divisio* in *corpus* & duas *extremitates*. Unam *superiorem*, alteram *inferiorem*: quæ crassior, quam superior est.

*Prominentiæ* in extremitate superiore.

1. *Capitulum superius* seu *excavatum* quod cum condylo capitato humeri articulatur.
2. *Capitulum musculi bicipitis*, quod sub collo capituli superioris est.
3. *Apophysis styloidea*, quæ in inferiori extremitate est.

*Cavitates.*

1. *Cavitas glonoidea* in inferiore extremitate, quæ cum carpo articulatur.

*Connexio*. 1. Cum condylo capitato *humeri*. 2. Cum *cubito* superius & inferius. 3. Cum ossibus *carpi*.

*Usus* est, ut antibrachium constituere juvet, ut flexioni, supinationi, & pronationi ejus inserviat.

## CARPUS

## C A R P U S.

*Constituitur* ex 8. ossiculis, quæ sibi in duplici serie accumbunt.

*Situs* eorum est intra antibrachium & metacarpum.

*Divisio* ossium in duas series in superiorem, & inferiore.

in serie superiori sunt a pollice ad digitum minimum.

Os naviculare.

— semilunare.

— cuneiforme.

— subrotundum.

in serie inferiori sunt a pollice ad digitum minimum.

Os multangulare majus.

— — — minus.

— capitatum.

— unciforme.

## M E T A C A R P U S.

*Situs* est inter carpum & digitos.

*Compositio* ex 5. ossibus longitudinalibus.

1. Unum est pro pollice.

2. 4. sunt ossa metacarpi digitorum.

*Connexio* est duplex. 1. Cum carpo. 2. Cum digitis.

*Ufus* est constituere mediam partem manus.

## D I G I T I.

*Situs* in extremitatibus inferioribus metacarpi.

*Compositio*. Pollex ex duobus.

*Digiti* ex tribus ossiculis constant, quæ *phalanges* vocantur.

*Divisio phalangum in supremam mediam, extremam.*  
*Ufus* est constituere digitos, qui instrumenta tactus, defensionis, & laboris sunt.

## F E M U R.

*Situs* intra pelvem & tibiam.

*Figura* est longa.

*Divisio* in corpus & extremitates. Unam superiorem & alteram inferiorem.

*Prominentiæ* in extremitate superiore.

1. *Caput* est pars suprema semiglobosa.
2. *Collum* quod oblique a capite ad trochanteres pergit.
3. *Trochanter major* est tuberositas exterior.
4. *Trochanter minor* tuberositas est situ interior & posterior.

*Prominentiæ* in extremitate inferiore.

5. *Condylus* externus, qui minor est.
6. ——— internus, qui interno aliquantum major est.

*Cavitates* in extremitate superiore.

1. *Fovea* in capite pro ligamento terete.

*Cavitates* in extremitate inferiore.

2. *Sinus patellæ*, inter condylos, pro excipienda patella.
3. *Excisura* condylorum *postica*, quæ vasa subpoplitea continet.

*Connexio* cum 3. ossibus. 1. Cum acetabulo ossium innominatorum per enarthrosim. 2. Cum capite tibiæ & 3. Cum patella per ginglymum.

*Substantia* est in corpore compacta, in extremitatibus spongiosa, in cavo medullari reticularis.

*Ufus* est constituere partem extremitatis inferioris.

### T I B I A.

*Situs* in latere interno cruris inter femur & tarsum.

*Figura* est longitudinalis.

*Divisio* in corpus & extremitates. Unam superiorem, alteram inferiorem.

*Prominentiæ.*

1. *Caput tibiæ*, quod duobus sinibus articularibus excavatum est.

2. *Spina tibiæ* cui ligamentum patellæ, & tendo communis musculorum extensorum tibiæ adhæret.

3. *Crista tibiæ* est margo acutus anterior a spina descendens.

4. *Malleolus internus*, qui processus inferior tibiæ est.

*Cavitates.*

Duo *sinus articulares* in capite tibiæ, quibus condyli femoris insident.

*Cavitas articularis* in extremitate inferiore pro astragalo.

*Connexio* cum 4. ossibus. 1. Cum condylis ossis femoris 2. Cum patella & 3. Cum fibula per synovrosim. 4. Cum astragalo per arthrodiam.

*Ufus* constituit crucis fulcrum & inservit flexioni extremitatum inferiorum.

### F I B U L A.

*Situs* in extima cruris parte juxta tibiam.

*Figura* est longitudinalis.

*Divisio in corpus & extremitates, unam superiorem, alteram inferiorem.*

*Prominentiæ.*

1. *Caput fibulæ, quod in superiori extremitate est.*
2. *Malleolus externus, qui in extremitate inferiori est.*

*Connexio cum duobus ossibus. 1. Cum tibia. 2. Cum astragalo.*

*Usus est ut constituat tibię fulcrum, & crus formare juvet.*

### P A T E L L A.

*Situs est in sinu intra condylos femoris & supra tibiam.*

*Figura est cordiformis.*

*Divisio in superficiem externam & internam.*

*in basim, apicem, & latera.*

*Connexio cum duobus ossibus. 1. Cum sinu condylorum femoris. 2. Cum tibię spina per ligamentum.*

*Usus est ut firmet articulationem genu, & tendini muscutorum extensorum tibię communi sit trochlea.*

### T A R S U S.

*Situs est inter crus & metatarsum.*

*Figura est superius capitata inferius lata.*

*Compositio ex 7. ossibus, quæ in dupla serie locantur.*

*In prima serie, Astragalus, qui superius.*

*Calcaneus, qui inferius est.*

*In secunda serie. Os naviculare & juxta illud in latere interno.*

*Os cubiforme.*

Tria ossa *cuneiformia*, quæ juxta se invicem locantur.

*Prominentiæ* sunt,

1. *Caput astragali*, quod inter malleolos cum extremitate tibiæ cohæret.
2. *Tuberositas calcanei* cui *tendo Achillis* inseritur.

*Usus* est ut constituat basim pedis, ut serviat motui pedis extremi.

### M E T A T A R S U S.

*Situs* est inter tarsum & digitos pedis.

*Divisio* in superficiem superiorem & inferiorem.

*Compositio* est ex 5. ossibus longitudinalibus, quæ  
5. ossa *metatarsi* vocantur.

*Usus* est constituere dorsum & plantam pedis.

### D I G I T I P E D I S.


*Compositio*. Pollex ex duobus ossiculis.


*Digitus* quilibet ex 3. ossiculis, quæ *phalanges* vocantur, constat.

### O S S I C U L A S E S A M O I D E A.

Sunt ossicula parva pisa referentia.

*Situs* in junctura sub phalangibus pollicis, manus & pedis.





## SYNDESMOLOGIA

S E U

## DOCTRINA DE LIGAMENTIS.

## DE SYNDESMOLOGIA

## IN GENERE.

**P**ARTES, quæ in Syndesmologia considerantur, sunt: 1. *Periosteum externum*. 2. *Periosteum internum*. 3. *Medulla ossium*. 4. *Cartilagines*. 5. *Glandulæ articulares*. 6. *Synovia*. 7. *Vasa ossium*. 8. *Nervi ossium*. 9. *Ligamenta ossium*.

## PERIOSTEUM EXTERNUM.

Est membrana, quæ externam superficiem omnium ossium, solis coronis dentium exceptis, investit.

*Diversa denominatio.*

1. *pericranium*, in cranio.
2. *periorbita*, in orbita vocatur.
3. *perichondrium*, quod cartilagines obducit, ac
4. *peridesmium*, quod ligamenta investit.

*Substantia.* Est membrana fibrosa, arteriis, ac venis repleta.

*Cohæsiô.* *Inferior superficies* ope vasorum cum ossis poris & *superior superficies* cum membrana cellulosa & musculis cohæret.

*Usus* est ut ossis substantiam contineat & ut vasa nutritia ad ossis substantiam in bono ordine distribuat.

## PERIOSTEUM INTERNUM.

Est membrana, quæ internam superficiem in ossibus obducit. Est periosteo externo similis.

## MEDULLA OSSIUM.

Est substantia pinguedinosa, quæ in cavis medullari-  
bus ossium magnorum ac longorum continetur.

*Usus.* Ossium fragilitatem præcavet.

## CARTILAGINES.

Sunt substantiæ albicantes, ac elasticæ, ossibus accretæ.

*Divisio* in 1. *cartilagines obducentes*, quæ in ossium extremitatibus capita ac cava articularia obducunt.

2. in *cartilagines interarticulares*, quæ ossibus non accretæ sed libere intra articulationes hærent, ut in articulo maxillæ, claviculæ, ac genu.

3. in *cartilagines unientes*, quæ ossa immobili nexu nectunt, ut ossa pubis, corpora vertebrarum &c.

*Usus* cartilaginum obducentium est *articulationes* lubricas reddere. Et cartilaginum unientium, ossa quædam *nectere*.

## SYNOVIA.

Est humor muco similis, qui in cavis articulationum continetur. Secernitur a glandulis synovialibus.

*Usus.* Lubricat ossium mobilium extrema. Et impedit concretionem articulorum.

## GLANDULÆ ARTICULARES.

Sunt parvæ glandulæ, quæ in foveis articulationum ac ligamentorum capsularium locantur.

## V A S A O S S I U M.

*Vasa*, quæ ossa adeunt sunt *arteriosa* & *venosa*.

utraque distribuuntur in periosteio externo & interno atque intra lamellas ossium.

*Ufus* vasorum est *nutrire* os, ac *secernere* medullam ossium.

## N E R V I O S S I U M.

Pauci *nervi* intrant per parva foramina ad ossium medullam; quæ sensibilis est. Ossis autem substantia sensibilis non est.

## L I G A M E N T A.


Sunt membranæ elasticæ ac robustæ, quæ ossium mobilium extrema connectunt.

*Divisio* in ligamenta *capsularia*, quæ sacci membranosi adinstar articulationes ambiunt, in ligamenta *connectentia*, quæ instar funium ossa mobilia connectunt.

In acetabulo femoris est *ligamentum teres*. Et in genu *ligamenta cruciata* sunt, reliquæ articulationes ligamenta interna non habent.

*Ufus* ligamentorum. *Capsularia* ossium mobilium extrema neunt & simul effluxum synoviae impediunt. Ligamenta autem *connectentia* ossium mobilium extrema connectunt ac firmant.





## M Y O L O G I A.

S E U

## D O C T R I N A D E M U S C U L I S.

## D E M U S C U L I S I N G E N E R E.

*MUSCULUS* est lacertus fibrosus qui motui infervit.

*Divisio* musculi est in *caput* seu initium.

in *ventrem*, qui pars media.

in *caudam*, quæ finis musculi est.

*Adhæfio*. Caput & cauda utplurimum sunt ossibus accreta,

*Substantia* musculi est duplex,

*Carnea* in ventre.

*tendinea* in extremitatibus seu capite & cauda.

Quilibet musculus *multa vasa & nervos* habet.

*Aponevrosis* est tendinis in latam tendineam membranam expansio.

*Actio* musculi consistit in *contractione & relaxatione* fibrarum carnearum.

*Usus musculorum*. Musculi sunt *organa motus*, quibus membra moventur.

## M U S C U L I C R A N I I.

Tria *paria* musculorum cranium tegunt.

*Musculi frontales* qui a *marginibus superciliaribus* ossis frontis ad *capillitium frontis* in *aponevrosim* *cranii* pergunt,

*Musculi occipitales ab arcubus superioribus ossis occipitalis sub aponevrosi cranii in eandem abeunt.*

*Musculi temporales.* Oritur quilibet a regione temporali & definit suo tendine in processum coronoideum maxillæ inferioris. Maxillam inferiorem versus superiorem elevat & os claudit.

*Aponevrosis cranii.* Incipit a tuberculo occipitali ascendit & tegit totum cranium ad radicem nasi & arcus superciliares usque, lateraliter arcui zygomatico adhæret.

### M U S C U L I A B D O M I N A L E S.

Abdominis cavum a 5. paribus musculorum in omni dimensione contrahitur.

1. *M. obliquus externus* a crista ilei & osse pubis oritur, & ad 8. costas infimas abit.
2. *M. obliquus internus* a crista ilei & osse pubis ad marginem omnium costarum spuriarum, & ad cartilaginem ensiformem sterni abit.
3. *M. rectus* ab osse pubis juxta lineam albam ad cartilaginem ensiformem & ad ultimas tres costas veras ascendit.
4. *M. Piramidalis* a crista ossis pubis versus umbilicum in lineam albam abit.
5. *M. Transversalis.* Ab apophysibus transversis & spinosis 4. superiorum vertebrarum lumbarium ortus, transversim ad lineam albam abit.

*Inferius* ad cristam ilei & pubis. *Superius* ad internam superficiem costarum adnectitur.

*Usus* musculorum abdominalium est.

1. Parietes abdominis constituere.

2. Viscera abdominalia continere.
3. Cum diaphragmate prelum abdominale constituere.
4. Cujus actione *Respiratio*.

*Digestio* ciborum.

*Expulsio* excrementorum.

——— urinæ.

——— partus peragitur.

Partes quas muscoli abdominales *speciatim* formant, sunt sequentes.

1. *Linea alba*. Est linea tendinea, quæ in medietate abdominis a cartilagine eniformi ad symphifim ossium pubis descendit. Formatur a concursu trium parium musculorum nempe obliquorum externorum, internorum & transversalium.
2. *Linea semilunaris* est etiam linea tendinea, quæ ad latera lineæ albæ in musculis obliquis formatur.
3. *Anulus umbilicalis*, est rotunda tendinea apertura in medietate lineæ albæ, quæ in fœtu funiculum umbilicalem transmittit, post partum autem concrefcit.
4. *Anuli inguinales*. Sunt duo hiatus oblongi, & tendinei quorum unus in utroque inguine in inferiori margine musculi obliqui externi formatur. In *viris* per hos hiatus exeunt funiculi spermatici, in *feminis* autem ligamenta rotunda uteri.
5. *Ligamenta Pupartii*. Sunt margines tendinei musculorum obliquorum externorum, quorum


unus in utroque inguine est, qui a spina ilei anteriori & inferiori ad cristam ossis pubis extenditur. Sub his ligamentis transeunt vasa cruralia & nervi cruales.

### MUSCULI INTESTINI RECTI.

Orificium ani *dilatari & contrahi* potest.

Contrahitur a *spinctere ani*, qui finem intestini recti ambit.

Dilatatur a *levatoribus ani*, qui ab interna superficie ossium pubis, ischii & ilei oriuntur & in intestinum rectum terminantur.



## S P L A N C H N O L O G I A

S E U

### DOCTRINA DE VISCERIBUS.

#### DIVISIO CORPORIS HUMANI.

CORPUS humanum dividitur in *Caput*.

*Truncum &*

*Extremitates.*

*Caput* dividitur in *faciem & partem capillatam*.

*Pars capillata* capitis dividitur in *verticem*.

— *synciput*.

— *occiput &*

— *partes duas laterales.*

*Facies* dividitur in *frontem*.

— *tempora.*

— *nasum.*

*Facies* dividitur in — *oculos*,

— *Os*.

— *buccas*.

— *mentum*.

— *aures*.

*Truncus* corporis dividitur in *collum*.

— *thoracem*.

— *abdomen*.

*Collum* dividitur in *partem anticam* in qua *Pomum*

*Adamæ* seu *larynx* tangitur.

in *partem posticam*.

in *partes laterales*.

*Thorax* dividitur in *partem anticam* in qua *mammæ*

sunt, & fovea in parte infima  
thoracis, quæ *scrobiculus cor-*  
*dis* vocatur.

in *partem posticam*, quæ *dorsum* dicitur, &

in *partes laterales*.

*Abdomen* dividitur in *regionem anticam*.

in *regionem posticam*, quam *lumbos*  
dicunt, &

in *regiones laterales*.

*Regio abdominis antica* subdividitur in tres *Regiones*.

1. in *regionem epigastricam* cujus latera nominantur *hypochondria*.

2. in *regionem umbilicalem* cujus latera dicuntur *regiones lumbares*.

3. in *regionem hypogastricam* cujus latera vocantur *Ilia*.

*Pubis* est sub abdomine *regio pilosa*, cujus latera *inguina* vocantur.

Sub *pube* sunt *partes genitales*.

In *viris* *scrotum* & *penis*.

In *mulieribus* *labia* & *rima vulvæ*.

*Spatium* quod inter *partes genitales* & *aperturam*  
*ani* est, vocatur *Perinæum*.

*Extremities* dividuntur in *superiores* & *inferiores*.

*Extremitas superior* dividitur.

in *summitatem humeri* sub quo *fovea axillaris* est.  
in *brachium*.

in *antibrachium*.

in *manum*. Quæ *volarum* & *dorsum* habet.

*Manus* in *carpum*.

*metacarpum* &  
*digitos* dividitur.

*Digitus* dividuntur in *pollicem*.

— *indicem*.

— *digitum longum*.

— *digitum anulare*.

— *digitum auricularem*.

*Extremitas inferior* dividitur.

1. in *femur*.

2. in *crus* quod *genu*, *cavum subpopliteum*  
& *furcam* habet.

3. in *pedem extremum* in quo *dorsum* &  
*Planta pedis*.

*Malleolus externus* & *internus* est.

*Pes extremus* in *tarsum*.

*metatarsum*.

*digitos*.

Interna corporis *divisio* est in tria cava principalia.

— *Cavum cranii*, quod viscera animalia.

— *thoracis*, quod viscera vitalia.

— *abdominis*, quod viscera naturalia continet.

## INTEGUMENTA COMMUNIA CORPORIS.

Sub nomine integumentorum communium intelliguntur tres membranæ, quæ externam superficiem totius corporis investiant.

1. *Epidermis*.

2. *Cutis*.

3. *Membrana adiposa*.

### E P I D E R M I S.

Est tenuis & pellucida membrana, quæ totam externam superficiem corporis tegit.

*Divisio* in *superficiem superiorem*, quæ *ficca* est.

in *superficiem inferiorem*, quæ *mucosa* est,  
& *mucus Malpighianus* vocatur.

*Connexio* epidermidis est cum cute per *mucum Malpighianum*.

*Crassities* in facie admodum tenuis, in *vola* manus & *planta* pedis admodum crassa est.

*Color* in muco malpighiano sedet, qui albus in europeis, niger in æthiopibus, *fuscus* in hispanis est.

*Usus*. Sensiles pupillas cutaneas tegit, ne aere exsiccantur, & doleant.

### C U T I S.

Est membrana crassa, quæ inter epidermidem, & membranam adiposam locatur, & totam superficiem externam corporis tegit.

*Divisio in superficiem anteriorem, quæ cum epidermide.*

*in ————— internam, quæ cum membrana adiposa coheret.*

*Substantia.* Ex textura fibrosa, vasculosa & nervea constat.

*Arteriæ cutaneæ* exhalant perpetuo liquidum tenue.

*Venæ cutaneæ* inhalant seu absorbent illa quæ cuti applicantur.

*Nervi cutanei* in superficie superiori præcipue in digitorum apicibus *papillas nerveas* formant, quæ organum tactus constituunt.

In inferiori superficie cutis sedent *glandulæ subcutaneæ*, & *bulbi pilorum* e quibus pili excresecunt.

*Ufus.* Cutis est organum sensationis.

————— exhalationis.

————— inhalationis.

## U N G U E S.

Sunt laminæ corneæ, quæ apicibus digitorum manus & pedis inhærent.

*Divisio in marginem.*

— radicem.

— latera.

*Substantia* est cornea, sine vasis & nervis.

*Ufus.* 1. Ad defendendas papillas nerveas a contusione.

2. Ad res minutas colligendas.

## P I L I.

Sunt filamenta ex cute excrefcentia, elastica, ficca.

*Substantia.* Constant 1. *bulbo*, qui sub cute hæret,  
& qui vesicula vasculosa & nervea est.

2. Ex *trunco*, qui cutem & cuticulam perforat.

## M E M B R A N A A D I P O S A.

Est membrana ex *cellulis* exiguis membranaceis formata; vocatur etiam *tela cellulosa*.

*Situs.* Sub cute intra musculos, omnesque partes molles locatur.

*Substantia* ex tenui membrana, quæ cellulas exiguas, oleo repletas, format. Hæ cellulæ vasculis sunt plenæ, & peculiaribus aperturis inter se communicant.

*Ufus.* Superficiem corporis contegit, & omnes partes molles connectit.

## D E C A P I T E G E N E R A T I M.

Partes quæ caput constituunt dividuntur.

in *externas* &

in *internas*.

Partes *externæ* sunt,

1. *Integumenta communia cum capillis.*

2. *Expansio tendinea.*

3. Tria paria *musculorum* qui cranii ambitum tegunt.

2. *Musculi frontales.*

2. ——— *temporales.*

2. ——— *occipitales.*

4. *Pericranium.*

5. *Cranium* ipsum, quod ex duabus tabulis & intermedio diploe constat.

Partes *internæ* sunt,

1. Tria *Integumenta cerebri* nempe.

*dura mater.*

*membrana arachnoidea.*

*pia mater.*

2. *Cerebrum.*

3. *Cerebellum.*

4. *Medulla oblongata.*

5. 9. *paria nervorum.*

6. 4. *Arteriæ* 2. *Carotides internæ.*

2. *Vertebrales.*

7. 22. *sinus venosi.*

## D U R A M A T E R.

Est membrana crassa, quæ *internæ* superficiei cranii præcipue circa futuras fortiter adhæret.

*Processus externi* sunt, 3.

1. *Processus falciformis*, qui a crista galli ossis ethmoidei incipit, per medietatem ossis frontis, sub futura sagittali, ad medietatem ossis occipitalis progreditur, & in spina cruciata hujus ossis finitur. Figuram habet falcis, & cerebrum in duo hemisphæria dividit.

2. *Tentorium cerebelli*, processus membranofus est, qui a medietate ossis occipitalis ad margines superiores ossis petrosi, tentorii adinstar extensa est.

3. *Septum cerebelli*, processus parvus est, qui longitudinaliter inferiori medietati ossis occipitalis adhæret, & cerebellum aliquantum subdividit.

*Substantia.* Constat ex duplici lamina.

*Venæ.* *Sinus venosi* vocantur in dura matre. Numero sunt 22. quorum primi tres Chirurgo notabiles.

1. *Sinus longitudinalis superior*, qui supra foramen cæcum ossis frontalis incipit, dein redeundo ad medietatem ossis occipitalis finitur in duos *ramos laterales*, qui vocantur.
2. Duo *sinus laterales*, qui in osse occipitali arcus adinstar a finu longitudinali ad foramen lacerum pergunt, & ibi in *venas jugulares internas* exeunt.

*Ufus.* Periosteum internum cranii format.

#### MEMBRANA ARACHNOIDEA.

Est membrana tenuis, telæ aranæ similis, quæ intra duram & piam matrem locatur, & non solum cerebrum, sed etiam cerebellum, medullam oblongatam, & medullam spinalem singulatim circumvestit.

*Substantia.* Est tenuissimum textum filamentosum, quod sine vasis & nervis est.

*Ufus* hujus membranæ ignoratur.

#### P I A M A T E R.

Tenuis est membrana, quæ cerebro, cerebello, medullæ oblongatæ & medullæ spinali firmissime accreta est.

*Substantia* est fere penitus vasculosa.

*Ufus* hujus membranæ est, ut vasa in cerebrum distribuât, & substantiam cerebri contineat.

## C E R E B R U M.

Est magnum illud viscus quod in cranii cavo continetur.

*Figura* est fere ovalis.

*Divisio.* Superius a processu falciformi in duo hemisphæria.

Inferius a basi cranii in sex lobos dividitur.

*Substantia* cerebri dividitur in corticalem & medullarem.

*Substantia corticalis* exterior est, mere vasculosa & crisei coloris.

*Substantia medullaris* interior totum cerebri volumen facit, mere nervea est, albi coloris.

*Cava principalia* sunt 4. *ventriculi cerebri.*

1. Duo *ventriculi anteriores* seu *laterales*. Sunt duo cava semilunaria, quæ a mediis cerebri lobis ad primos excurrunt, & *septo pellucido* a se invicem separantur. Vapor aqueus & plexus choroideus piæ matris in illis continetur.

2. *Ventriculus tertius* est spatium quod inter thalamos nervorum opticorum relinquitur.

3. *Ventriculus quartus* est spatium quod intra cerebellum & medullam oblongam relinquitur.

*Prominentiæ principales cerebri*

1. *Corpus callosum* est prominentia oblonga me-

dullaris, quæ diductis anterioribus & mediis cerebri hemisphæriis conspicua est.

2. *Corpora striata* sunt duæ protuberantiæ coloris crisei, antè sub singulo ventriculo antico una locatur.

3. *Thalami nervorum opticorum* sunt protuberantiæ duæ posteriores ventriculorum cerebri, albicantes & desinentes in nervos opticos.

4. *Corpora quadrigemina*, quæ 4. prominentiæ medullares sunt. Anteriores vocantur *nates* posteriores autem *testes*.

5. *Glandula pinealis* est tuberculum cerebrinum natibus cerebri incumbens.

6. *Glandula pituitaria* non est prominentia cerebrina, sed vera glandula, quæ intra duplicaturam duræ matris in cavitate sellæ turcicæ hæret.

7. 2. *Crura cerebri*. Sunt duæ columnæ medullares, quæ ex basi cerebri progrediuntur & terminantur in pontem varolii.

*Arteriæ cerebrinæ* sunt rami *carotidum internarum* & *vertebraliū* arteriarum.

*Nervi*. Cerebrum nervos non habet, sed 9. paria emittit.

*Venæ* ex cortice cerebri redeunt se evacuant in 22. sinus venosos duræ matris.

*Ufus cerebri* est ut ex cortice vasculoso secernatur in tubulos medullæ tenuissimum liquidum, quod *liquidum nerveum* vocatur, quod sensibus internis & externis atque motui muscutorum inservit.

## C E R E B E L L U M.

Est cerebrum parvum in fossis occipitalibus inferioribus sub tentorio locatum.

*Figura* est rotunda.

*Divisio* a septo cerebelli in *lobum dextrum & sinistrum*.

*Substantia* externa corticalis, interna medullaris, ut in cerebro est.

*Prominentiæ. Crura cerebelli* sunt duæ columnæ ex medulla cerebelli exeuntes, & in pontem varolii terminatæ.

*Cavitates* seu ventriculos cerebellum nullos habet.

*Usus* cerebelli idem est ac cerebri.

## M E D U L L A O B L O N G A T A.

Est pars mere medullosa, quæ processui basilari ossis occipitis incumbit, facta ex concurrentibus cruribus cerebri & cerebelli. In ea notantur,

1. *Pons Varolii* est corpus convexum in superficie superiori medullæ oblongatæ.
2. *Corpora pyramidalia*, sunt duæ prominentiæ medullares internæ.
3. *Corpora olivaria*, sunt tales prominentiæ externæ, quæ omnes quatuor inferiorem medullæ oblongatæ superficiem & finem constituunt.

## M E D U L L A S P I N A L I S.

Est continuatio medullæ oblongatæ, quæ in specum vertebralem ex foramine occipitali magno ad tertiam vertebralem lumborum descendit.

*Figura* est cylindrica in fine definit in varios nervos, qui *caudam equinam* formant.

*Integumenta.* Habet vaginam ex dura matre, arachnoidea & pia matre.

*Substantia* est extus medullaris, intus corticalis.

*Ufus* est ut emittat paria 30. nervorum, qui *spinales* vocantur.

## O C U L U S.

*Partes*, quæ oculum constituunt, dividuntur in illas, quæ *extra*, & eas, quæ *intra* bulbum oculi locantur.

*Partes externæ sunt,*

1. *Supercilia.* Duo arcus pilosi supra orbitam locati.
2. *Cilia.* Pili tarsis palpebrarum accreti.
3. *Palpebræ.* Quarum una *superior*, altera *inferior* est.

Margines habent cartilagineos qui *tarsi* vocantur.

Ad marginem tarforum glandulæ locantur, quæ *Meibomianæ* dicuntur.

4. *Glandula lachrymalis*, quæ in externo orbitæ cantho in peculiari fovea ossi frontali insculpta locatur, ex hac glandula sex vel plures canales, qui *ductus lachrymales* vocantur, exeunt, & in interna superficie palpebræ superioris aperiuntur.
5. *Caruncula lachrymalis*, quæ in interno tarforum palpebrali angulo locatur.
6. *Puncta lachrymalia*, sunt duo orificia callosa, quæ in apicibus tarforum in interno palpebrarum angulo hiant. Unum in superiori, alterum in inferiori palpebra est.

7. *Canales lachrymales*, sunt duo canales tenues, qui a punctis lachrymalibus in saccum lachrymalem abeunt.
8. *Saccus lachrymalis*, est saccus membranaceus, qui in interno oculi cantho locatur.
9. *Ductus nasalis*, est canalis membranaceus, qui ab inferiori parte sacci lachrymalis per canalem osseum deorsum, ac paulo retrorsum in cavitatem narium abit, & sub inferiori osse spongioso in naribus aperitur.
10. *Membrana conjunctiva*, quæ a colore etiam *albuginea* vocatur, est membrana, quæ internam palpebrarum superficiem, & totam anticam superficiem bulbi obducit.

*Bulbus oculi constat ex octo membranis.*

*duabus cameris &  
tribus humoribus.*

*Membranæ bulbi sunt,*

4. in parte postica bulbi.

*sclerotica.*

*choroidea.*

*retina.*

*hyaloidea.*

4. in parte antica bulbi.

*cornea transparentis.*

*iris.*

*uvea.*

*capsula lentis crystallinæ.*

1. *Membrana sclerotica*, quæ est extima, a nervo optico incipit, cavum sphericum format, & ad marginem corneæ transparentis definit.

Pars anterior scleroticæ pellucida est, & *cornea transparent* vocatur.

2. *Membrana choroidea*, est media bulbi tunica nigri coloris, a nervo optico incipit, internam superficiem scleroticæ ad marginem corneæ transparantis usque obducit.

Hic loci a cornea secedit, & transversim introrsum deflectitur, & velum liberum, in medio foramine rotundo perforatum format. Hic membranaceus circulus choroideæ in anteriore superficie *Iris*, in posteriori superficie autem *Uvea* vocatur. Et foramen rotundum in medietate relictum dicitur *Pupilla*. Hoc foramen dilatari & angustari potest a fibris motricibus non visibilibus.

3. *Membrana retina*, intima bulbi tunica est albicantis coloris & mucosæ similis, a nervo optico, cujus propago medullaris est, incipit, intimam superficiem choroideæ usque ad marginem lentis crystallinæ obducit, ibique finitur.

*Camerae oculi* sunt,

1. *Camera anterior*, est spatium cavum, quod *anterius* a cava superficie corneæ transparentis & *posterius* a superficie iridis & pupillæ formatur.
2. *Camera posterior*, est spatium illud parvum, quod *anterius* a tunica uvea & pupilla: *posterius* autem a superficie anteriori lentis crystallinæ relinquatur. Utraque oculi camera humore aqueo plena est.

*Humores oculi sunt,*

1. *Humor aqueus* est humor, qui utramque oculi cameram implet.
2. *Lens crystallina* est corpus pellucidum lentem magnitudine referens, quod retro pupillam in peculiari fovea humori vitreo impressa & peculiari membranacea, pellucida capsula libere inclusa est. Hoc receptaculum vocatur *capsula lentis crystallinæ*.
3. *Humor vitreus*. Est corpus pellucidum, quod totam bulbi cavitatem, a fundo usque ad uveam fere explet, & sustinet. Extima ejus tota superficies membrana forti, pellucidissima tamen investitur, quæ *membrana hyaloidea* vocatur. In anteriori humoris vitrei parte fovea est, cui infidet lens crystallina.

*Bulbi connexio antrorsum* fit ope *conjunctivæ* membranæ cum *palpebris*; *postorsum* ope 6. musculorum bulbi & nervi optici cum *orbita* connectitur.

*Nervus opticus* in postica bulbi parte scleroticam & choroideam perforat, & dein tunicam retinam constituit.

*Usus oculi*. Est organum visus.

## A U R I S.

*Partes molles*, quæ aurem constituunt, dividuntur in *externas* & *internas*.

*Partes molles externæ* sunt,

1. *Auricula*.

2. *Meatus auditorius externus.*

3. *Membrana Tympani.*

*Partes molles internæ sunt,*

1. *Periosteum auris internæ.*

2. *Membrana communis auris internæ.*

3. *Tuba Eustachiana.*

*Glandulæ*, quæ cerumen secernunt, locantur sub cute  
meatus auditorii externi.

*Usus.* Auris est *organum auditus.*

### N A S U S.

Prominentia faciei, quæ *Nasus* vocatur, dividitur.  
in *radicem.*

— *dorsum.*

— *apicem &*

— *alas nasi.*

*Partes molles*, quæ ossa nasi tegunt, sunt.

1. *Integumenta communia.*

2. *Musculi*, qui alas narium movent.

3. *Cartilagines*, qui nasum constituunt, nempe  
*Pars antica septi & alæ nasi.*

*Partes molles narium seu nasi interni sunt,*

1. *Membrana pituitaria narium*, quæ nuco obli-  
nita, totam superficiem internam narium, fi-  
nuumque & ossa spongiosa narium investit.

*Usus* nasi est pro *odoratu &*  
*respiratione.*

### C A V I T A S O R I S.

*Partes*, quæ oris cavum constituunt sunt *externæ &*  
*aliæ internæ.*

*Partes oris externas faciunt,*

1. *Labia oris*, In his notanda veniunt *frenula*, quæ medietatem internam labii ad gingivas neclunt.

*Partes oris internas constituunt,*

1. *Palatum* quod crassa cute tectum est, & ad uvulam usque prolongatur.
2. Duo *arcus alveolares*, qui gingivis obducuntur.
3. *Gingivæ*, quæ substantia admodum vasculosa & elastica constant.
4. *Lingua*, quæ oris cavum in *supralinguale* & *infralinguale* dividit.
5. *Buccarum cavum*, quod intra buccas & dentes est.
6. Tria paria *glandularum salivalium*, nempe *Parotides*, *submaxillares* & *sublinguales*.
7. *Ossa*, quæ oris cavum constituunt.

*Membrana oris communis*, quæ omnes has partes molles investit, nerveo-vasculosa est, & cuti continua.

*Ufus oris est masticatio.*

*Loquela.*

## L I N G U A.

Est corpus musculosum, in omnem ambitum mobile, in oris cavo situm.

*Divisio linguæ est in basim.*

*corpus.*

*latera &*

*apicem.*

*Connexio.* *Basis* ope muscutorum ossi hyoidi adhæret.

*Superficies inferior*, ope plicæ cutanæ, quæ *frenulum* vocatur, fundo cavi infralingualis adnectitur.

*Substantia* linguæ carnea est, quæ crasso integumento investitur.

*Arteriæ linguales* sunt utrinque rami carotidis externæ, atque in inferiori linguæ superficie *raminæ* vocantur.

*Ufus.* Lingua inservit loquelæ.

*masticationi.*

*deglutitioni.*

*gustui.*

## C O L L U M.

Partes quæ collum constituunt, dividuntur in *externas & internas*.

Partes *externæ* sunt,

1. *Integumenta communia.*
2. *Musculi.*
3. 7. *Vertebræ colli.*
4. *Medulla spinalis colli.*
5. 8. *Paria nervorum cervicalium.*
6. 2. *Arteriæ carotides.*
7. 2. *Arteriæ vertebrales.*
8. 2. *Venæ jugulares externæ.*
9. 2. *Venæ jugulares internæ.*
10. *Glandulæ jugulares.*
11. *Glandula thyroidea.*
12. *Nervorum cerebri par octavum & intercostale magnum.*

Partes internæ sunt 1. *Fauces.*

2. *Pharynx.*

3. *Oesophagus.*

4. *Larynx.*

5. *Trachea.*

### F A U C E S.

Cavum quod retro linguam & velum palatinum est, sic vocatur.

*Pars suprema* formatur a processu basilari ossis occipitis.

*Pars antica* 1. a *foraminibus posticis* narium.

2. ab *uvula*, quæ pars glandiformis est, ab ossibus palatinis in fauces pendula.

3. ab *amygdalis*, quæ partes glandulosæ sunt & ad latera veli penduli hærent.

4. a *velo pendulo*, quod membrana est retro uvulam arcus adinstar ab ossibus palatinis dependens.

*Pars postica* faucium a corporibus vertebrarum colli.

*Pars infima* a larynge & pharynge formatur.

*Partes laterales* constituuntur a processu petroso ossis temporis, ex quo *tubæ Eustachianæ* in fauces hiant, & retro amygdalas aperiuntur.

*Ufus faucium.* Inserviunt *Deglutitioni.*  
*Respirationi.*

### P H A R Y N X.

Est *saccus* musculosus, qui infundibulo similis retro laryngem faucibus adhæret, & in œsophagum terminatur.

### O E S O P H A G U S.

Est *tubus* musculosus, qui a pharynge ad ventriculum descendit.

*Situs* est retro tracheam & ante corpora vertebrarum colli aliquantum sinistrorsum, dein in cavo postico mediastini per foramen sinistrum diaphragmatis in cardiam ventriculi abit.

*Substantia* est ex 4. *membranis* quarum

1. *Communis.*
2. *Muscularis.*
3. *Nervea.*
4. *Villosa est.*

*Ufus* est pro *deglutitione.*

### L A R Y N X.

Est *capsa cartilaginea*, quæ retro linguam in parte antica faucium locatur.

Constat ex 5. *cartilaginibus.*

*Variis musculis &*

*Interna membrana nervea.*

*Cartilagines* sunt,

1. *Cartilago annularis seu crycoidea*, quæ partem inferiorem constituit, & cui reliquæ infident.

2. *Cartilago thyroidea* seu *scutiformis*, quæ latissima est, annulari infidet, & partem anticam laryngis format.
3. *Epiglottis*, quæ potius membrana cartilaginea elastica est, supremæ parti cartilaginis scutiformis adhæret, & retroprimi potest.
4. Duæ *cartilagines arytenoideæ*, quæ margini postico & laterali cartilaginis annularis infident, & antrorsum flectuntur. Sic *rimam* intra se relinquunt, quæ *rima laryngis* vocatur seu *glottis*.

*Ufus* larynx est organum vocis, & simul respirationi inservit.

#### T R A C H E A.

Est *tubus* ex annulis cartilagineo-carneis constans, quæ ante œsophagum a larynge in thoracem descendit, & ibi in duos ramos, quos *bronchia* vocant, dividitur.

*Bronchia* pulmonum substantiam ingressa, in innumeros ramulos dividuntur, qui in *vesiculas pulmonales* ultimis finibus terminantur.

*Annuli cartilaginei* cum tracheæ tum bronchiorum non sunt integre cartilaginei, sed in parte postica carnei fiunt.

*Interna superficies* laryngis, tracheæ, bronchiorum, & vesicularum pulmonalium *membrana* nervea, glandulis muciparis plena, investitur.

*Anterior* tracheæ superficies tegitur musculis *sternohyoideis* & *sternothyroideis*.

*Ufus* est ad *respirationem* & *loquelam*.

#### THORAX.

## T H O R A X.

*Cavum* quod intra collum & abdomen locatur, thorax vel pectus vocatur.

*Figura* hujus cavitatis cavæ aviculari fimilis est, *inferius* latius & a diaphragmate convexo terminatur, *superior pars* angustior & obtusa est.

*Cavum* thoracis in 5. *cavitates* a mediastino dividitur.  
in *cavitatem thoracis dextram* & *sinistram*.

in *cavitatem pericardii*.

in *spatium mediastinum anticum*.

in *spatium mediastini posticum*.

*Partes*, quæ thoracem constituunt, dividuntur.

in *externas* &

in *internas*.

*Partes externæ* sunt,

1. *Integumenta communia*.

2. *Mammæ*.

3. *Musculi*.

2. *pectorales majores*.

2. ——— *minores*.

22. *intercostales externi*.

22. ——— *interni*.

4. *Ossa*.

24. *Costæ*.

12. *Vertebræ dorsi*.

1. *Sternum*.

5. *Pleura*.

*Partes internæ* seu *contentæ* sunt.

1. In utraque *cavitate thoracis* sunt *pulmones*.

2. In *cavo pericardii* est *cor cum auriculis, sinubus & initio magnorum vasorum.*

3. In *antico spatio mediastini*, est *glandula thymus & tela cellulosa.*

4. In *postico spatio mediastini* est.

1. *Oesophagus.*

2. *Ductus thoracicus.*

3. *Arcus aortæ.*

4. *Rami venæ cavæ.*

5. *Vena azygos.*

6. *Octavum par nervorum.*

7. *Par nervi intercostalis magni.*

*Inferior fundus thoracis a diaphragmate formatur, quod cavum thoracis a cavo abdominis discernit.*

#### M A M M Æ.

Sunt duo *hemisphæria mollia*, quæ *lateralis thoracis regioni* adhærent, & in *sexu præsertim fæmineo* magis conspicuæ sunt.

In *medietate papilla & circa eam orbiculus coloratus*, qui *discus papillæ* vocatur, *eminet.*

*Substantiam mammæ* constituunt.

1. *Integumenta communia.*

2. *Substantia adiposa*, quæ *ejus mollitiem & magnitudinem.*

3. *Glandulæ lacteæ*, quæ *ejus nucleum* constituunt, & in *unam massam collectæ* sunt.

4. *Vasa lactea*, quæ *etiam vasa galactophora* vocantur, hæc *ex glandulis lacteis oriuntur*, &

abeunt in papillam, in qua 10 tubulis extrosum aperiuntur.

*Ufus* est lactatio neonatorum.

### P L E U R A.

Est *membrana* internam superficiem thoracis inveſtiens, & ibi duos quaſi ſaccos formans.

Dividitur in *ſuperficiem internam*, quæ polita & ſemper humida eſt.

in ————— *externam*, quæ cellulosa eſt.

*Proceſſum* format magnum qui *mediaſtinum* dicitur.

Quod thoracis cavum in duas cavitates diſcernit. Naſcitur a corporibus vertebrarum dorſi, antrorſum per medietatem thoracis prolongatur, ac internæ ſterni ſuperficieſi aliquantum ſiniſtrorſum adhæret.

In hac duplicatura mediaſtini antrorſum ſub ſterno, & poſtrorſum circa corpora vertebrarum dorſi *ſpatium triangulare* relinquitur, quod vocant ſpatium triangulare *anticum* & *poſticum*.

*Partes* quæ in hiſ ſpatiis locantur, dictæ ſunt.

*Connexio* pleuræ eſt cum coſtis, muſculis intercoſtalis, ſterno & corporibus vertebrarum dorſi, inferius cum pericardio & diaphragmate.

*Ufus* eſt ut thoracis ſuperficiem politam reddat.  
thoracem dividat.

pulmonibus & pericardio extimam det  
membranam.

### D I A P H R A G M A.

Est *ſepimentum*, quod thoracis cavum a cavo abdominis diſcernit.

*Situs* est obliquus, ab apice sterni retrorsum & deorsum ad corpora vertebrarum lumbarium usque.

*Divisio* 1. in *superficiem superiorem*, quæ convexa in *superficiem inferiorem*, quæ concava est.  
2. in *Centrum*, quod tendineum & in *Ambitum*, qui carneus est.

*Adhæsiō.* *Antrorsum* processui ensiformi sterni, ultimis duabus costis veris, & margini cartilagineo omnium costarum spuriarum adhæret.

*Postrorsum* duo *crura carnea* format, quæ corporibus vertebrarum lumbarium adhærent.

*Substantia* est in centro tendinea, in ambitu carnea. *Superficies superior* pleura, *superficies inferior* peritoneo tecta est.

*Tres aperturæ.*

1. *Foramen dextrum*, quod in latere dextro & tendineum est. Transmittit venam cavam ascendentem, quæ ex abdomine in thoracem assurgit.
2. *Foramen sinistrum*, quod in sinistro latere diaphragmatis est, transmittit œsophagum ex thorace in abdomen.
3. *Hiatus posticus* diaphragmatis, qui inter crura postica formatur. Ille hiatus transmittit arteriam aortam, venam azygos, & ductum thoracicum.

*Usus.* Diaphragma inservit. 1. *respirationi.*

2. *situi cordis.*

3. *expulsioni* excrementorum & partus.

## P U L M O N E S.

Sunt duo viscera in cavitatibus thoracis locati, quibus respiramus.

*Divisio in dextrum & sinistrum pulmonem.*

*Dexter in 3.*

*Sinister in 2. dividitur lobos.*

*Connexio pulmonis cum collo ope tracheæ*

*Cum corde ope vasorum pulmonalium est.*

*Substantia pulmonis est triplex.*

1. *Vesicularis*, quæ cellulis formatur.

2. *Vasculosa*, quæ retis adinstar cellulas investit.

3. *Bronchialis*, quæ minimis tubulis in cellulas hiat.

*Membrana extima*, a pleura est, & externam superficiem pulmonum arcte circumvestit.

*Membrana interna* pulmonum, quæ superficiem aeream bronchiorum & vesicularium pulmonalium investit, nervea est, atque membranæ internæ tracheæ continua.

*Vasa pulmonum* dividuntur in *communia* & *propria* seu *pulmonalia* & *bronchialia*.

*Communia* sunt *arteria* & *vena pulmonalis*.

*Propria* sunt *arteria* & *vena bronchialis*.

*Usus* pulmonum est *respiratio*.

*sanguificatio.*

*vox.*

### C O R.

Est *viscus* musculosum in cavo pericardii locatum, quod sanguinis motui inservit.

*Divisio cordis externa* est

1. in *basim* & *apicem*.

2. — *superficiem superiorem &*  
       — — — — — *inferiorem.*  
 3. — *marginem anteriorem.*  
       — — — — — *posteriorem.*

*Divisio cordis interna est in dextrum & sinistrum ventriculum.*

*Situs cordis obliquus est non transversalis. Basis versus corpora vertebrarum dextrorsum & apex versus sextam costam finistrorsum oblique locatur adeo, ut sinister ventriculus fere posterior, dexter autem anterior sit. Superficies inferior diaphragmati incumbit.*

*Cava, quæ cordis basi adhærent, sunt*

*Auricula dextra, quæ saccus est muscularis, qui suo orificio in ventriculum dextrum.*

*Auricula sinistra, similis saccus est, qui suo orificio in ventriculum sinistrum hiat.*

*Sinus venosus dexter, qui a vena cava formatur, & in auriculam dextram aperitur.*

*Sinus venosus sinister, qui a venis pulmonalibus formatur, & in sinistram auriculam hiat.*

*Ipsa cordis cava ventriculi vocantur, hi a sepimento carneo, quod septum cordis dicitur, in dextrum & sinistrum discernuntur.*

*Quilibet ventriculus in sua basi duo orificia habet, unum auriculare, per quod sanguis intrat, alterum arteriosum per quod iterum exit.*

*Quatuor hæc orificia valvulas habent, quæ in orificiis arteriosis semilunares, in orificio auriculari dex-*

tro *mitrales* , in orificio auriculari sinistro *tricuspidales* vocantur.

*Substantia cordis musculosa* est.

*Pericardium* est peculiaris faccus membranaceus, qui cor cum auriculis, & finibus includit.

*Pericardium superius* mediastino, *inferius* diaphragmati accrescit.

*Vasa* cordis dividuntur in *communia* & *propria*.

*Communia* sunt *Aorta*, quæ e ventriculo sinistro

*Arteria pulmonalis*, quæ e ventriculo dextro oritur.

*Venæ pulmonales*, quæ in finum venosum sinistrum &

*Vena cava*, quæ in finum venosum dextrum se evacuat.

*Propria* cordis vasa sunt *arteriæ coronariæ* cordis, quæ ab aorta in cor abeunt.

*Venæ coronariæ*, quæ a corde redeuntes in auriculam dextram se evacuant.

*Nervi* cordis rami sunt ab *oſtavo* & a pare *intercostali magno*.

*Uſus* cordis. Est primarium motus sanguinis organum.

## DE ABDOMINE.

Est *cavitas* quæ thoracem inter & pelvim locatur.

*Divisio* est in tres cavitates.

in *cavitatem peritonei*.

in *cavitatem lumbalem*.

in *cavitatem pelvis*.

*Partes*, quæ abdomen constituunt, dividuntur in *externas* & *internas*.

*Partes externæ sunt.*

1. *Integumenta communia.*
2. 5. *Paria musculorum abdominalium* ut  
*Duo obliqui externi*  
*— — — interni.*  
*— recti.*  
*— transversales.*  
*— pyramidales.*
3. *Ossa abdominis.*  
*5. Vertebrae lumborum.*  
*4. Ossa pelvis.*
4. *Peritoneum.*

*Partes internæ seu contentæ sunt.*

*In cavitate Peritonei.*

1. *Omentum.*
2. *Ventriculus.*
3. *Intestina tenuia & crassa.*
4. *Hepar cum vesicula felle.*
5. *Mesenterium.*
6. *Lien.*
7. *Pancreas.*
8. *Vasa lactea*, quæ inter duplicaturam mesenterii locantur.

*In cavitate lumborum extra peritoneum continentur.*

1. *Renes.*
2. *Glandulae suprarenales.*
3. *Uretheres.*
4. *Receptaculum chyli.*
5. *Aorta descendens.*
6. *Vena cava ascendens.*

In *cavitate pelvis* extra peritoneum sunt.

In *Viris*. *Vesica urinaria*.

*Intestinum rectum*.

*Vesiculæ seminales*.

In *fæminis* præter vesicam & intestinum rectum.

*Uterus*.

4. *Ligamenta uteri*.

2. *Tubæ Fallopiæ*.

2. *Ovaria* &

*Vagina*.

### P E R I T O N E U M.

Est *membrana*, quæ internam superficiem abdominis investit, & magni sacci figuram refert.

*Divisio* in *superficiem internam* & *externam*.

*Substantia*. Simplex est membrana, cui exterius *textum cellulosum* adhæret.

*Ufus* est, ut viscera abdominalia in suo situ contineat, & ut eorum ligamenta, & membranam extimam constituat.

### O M E N T U M.

*Membrana* est adiposa, quæ anteriori intestinorum superficiei incumbit.

*Divisio* est in *omentum magnum* & *parvum*.

*Omentum magnum* ab arcu magno ventriculi ad regionem hypogastricam usque super intestina propendet.

*Omentum parvum* a minoris ventriculi arcu ad hepar extenditur.

*Usus* omenti est ut intestina *lubricet.*

*calefaciat.*

*a concretionē præservet.*

*pro bile oleum in venam*

*portæ mittat.*

## V E N T R I C U L U S.

*Est receptaculum* membranaceum quod ingesta ab  
œsophago excipit.

*Situs* est in regione epygastrica & quidquam in hy-  
pochondrio sinistro.

*Divisio.* Vacuus ventriculus deorsum pendet, & di-  
viditur.

*in Superficiem anteriorem & posteriorem.*

— *Curvaturam majorem seu inferiorem.*

— *Curvaturam minorem seu superiorem.*

— *Cardiam* seu introitum ex œsophago.

— *Pylorum* seu exitum ventriculi in duodenum.

— *Fundum* qui dilatatio ventriculi versus lienem est.

*Connexio.* Ventriculus cum œsophago, duodeno,  
omento majori & minori, atque pancreate con-  
nexus est.

*Substantia.* Constat *quatuor* membranis tenui tela  
cellulosa nexis.

*Extima* est *communis* a peritoneo.

*Secunda* est *muscularis.*

*Tertia* est *nervea* vasis & nervis constans.

*Intima villosa* est, holoserici adinstar te-  
nuibus villis hirta.

*Ufus* est ut ingesta ab œsophago *excipiat*,

*aliquantum retineat.*

*ea digerat &*

*demum expellat in duodenum.*

## I N T E S T I N A.

Sic vocatur *tubus* membranaceus, qui in cavo abdominis varie a pyloro ad anum usque flexus est.

*Divisio* intestinorum est in *tenuia & crassa.*

*Tenuia* sunt 3.

*Duodenum.*

*Jejunum.*

*Ileum.*

*Crassa* sunt etiam 3.

*Cæcum.*

*Colon.*

*Rectum.*

*Duodenum* 12. digitos transversos circiter longum est, 3. facit flexuras, retro ventriculum in regione *epygastrica* locatur, & inter primam & secundam flexuram a communi ductu canalis pancreatici & choledochi perforatur.

*Jejunum* est 15. palmas longum, locatur in regione *umbilicali*.

*Ileum* est etiam circiter 15. palmas longum, locatur in regione *iliaca sinistra* atque regione *hypogastrica* & finitur ad *valvulam Tulpii*.

*Cæcum* est saccus 4. digitos transversos longum, locatur in regione *iliaca dextra*, & ei extus adhæret *processus vermiformis*.

*Colon.* Incipit ab intestino cæco in regione iliaca dextra, affurgit recta ad hepar, ibi transversim sub ventriculo flectitur ad lienem, ab eo descendit in regionem iliacam finistram, & demum ad pelvim *flexu sigmoideo* finitur in intestinum rectum.

Ex his ergo patet colon dividi posse in partem *ascendentem*, in partem *transversam* & partem *descendentem*.

*Rectum* est palmam & mediam longum, ab ultima vertebra, ad sacrum & coccygis os descendit, & finitur in *anum*. Anus musculo orbiculari, qui *spincler ani* vocatur clauditur.

*Substantia* intestinorum ex *quatuor* membranis ut ventriculus, constat.

*Connexio.* *Intestina* generatim ope *mesenterii* in situ servantur.

*Usus* intestinorum est chymum e ventriculo *recipere*.

Succo enterico, pancreatico, & bile *miscere*.

Chylum in vasa lactea *propellere* &

Fæces per intestinum rectum *eliminare*.

### M E S E N T E R I U M.

Est *duplicatura membranacea*, quæ intestina ambit.

Duodenum & intestinum rectum autem non comprehendit.

*Divisio* mesenterii est in *tenuē* & *crassum* seu *mesenterium* & *mesocolon*, prius tenuia, alterum crassa continet intestina.

*Connexio* est cum tribus superioribus corporibus vertebrarum lumbarium.

*Substantia.* Est continuatio peritonei, quæ duplicaturam format, intra quam intestina, vasa sangui-

nea, lactea, nervi, glandulæ mesaraicæ & tela cellulosa continentur.

*Uſus* meſenterii eſt, ut inteſtina, vaſa, glandulas, & nervos in ordine ac ſitu firmer.


### H E P A R.

Eſt viſcus abdominale maximum, quod bilis ſecretioni inſervit, atque in hypochondrio dextro, & aliquantum in regione epygaſtrica locatur.

*Diviſio* in tres lobos.

in *magnum, parvum, & Spigelianum.*

in *ſuperficiem ſuperiorem*, quæ convexa.

in  *inferiorem*, quæ concava eſt.

Demum.

in *marginem anteriorem & poſteriorem.*

*Connexio* hepatis cum diaphragmate ope *ligamentorum.*

*Membrana* extima hepatis, quæ totam ſubſtantiam inveſtit, a peritoneo eſt.

*Subſtantia* vaſculoſa eſt.

*Acini bilioſi*, ſunt glandulæ in ſubſtantia hepatis diſperſæ, quæ bilem ſecernunt.

*Ductus hepaticus*, oritur tenuiſſimis ramulîs ab acinîs bilioſis hepatis, dein magnum ductum conſtituit, qui verſus inteſtinum duodenum abit, & ſe cum ductu cyslico in communem canalem unit.

*Uſus* hepatis eſt, ut bilem ſecernat.

### V E S I C U L A F E L L E A.

*Veſicula* oblonga membranacea ſub hepate in hypochondrio dextro ſita.

*Divisio in fundum.*

*corpus.*

*collum*, quod continuatur in

*Ductum cisticum*, qui paulo post cum  
*ductu hepatico* se unit, & dein vocatur  
*Ductus communis* cui inferitur demum *ductus pancreaticus*, qui dein communi  
orificio intestino duodeno intra primam  
& secundam ejus flexuram inferuntur.

*Substantia* constat ex tribus membranis.

*Ufus* vesiculæ est, ut bilem ex ductu hepatico regurgitantem retineat, ut sic mora spissior, amara, & acrior fiat.

#### L I E N.

Est *viscus* quod in hypochondrio sinistro juxta ventriculi fundum costis tectum, locatur.

*Figura* ovalis est.

*Divisio* in *superficiem externam*, quæ convexa, &  
*internam*, quæ concava est.

*in extremitatem superiorem & inferiorem.*

*Connexio* cum diaphragmate ope *ligamenti suspensorii*.

*Substantia* mere vasculosa est.

*Membrana* extima a peritoneo propago est.

*Ufus*. Inservit *attenuationi* sanguinis.

#### P A N C R E A S.

*Corpus glandulosum* est, quod in regione epygastrica sub ventriculo locatur.

*Figura* similis est linguæ caninæ.

*Divisio* est in *superficiem superiorem & inferiorem.*  
*in extremitatem dextram, quæ lata, &*  
*sinistram, quæ acuminata est. Demum*  
*in marginem anteriorem & posteriorem.*

*Pancreas parvum, Processus pancreatis est, qui duodeno accrescit.*

*Substantia* est ex innumeris glandulis facta.

*Ductus pancreaticus* minimis ramulis a glandulis pancreatis oritur, dein magnum canalem constituit, qui totam medietatem pancreatis decurrit, & demum intestinum duodenum, ductui choledochi junctus, perforat.

*Connexio pancreatis* est cum ventriculo & liene ope *membranarum.* Cum duodeno mediante *pancreate parvo & ductu pancreatico.*

*Usus* est ut humorem salivæ similem *secernat & in duodenum deferat.*

## V I Æ L A C T E Æ.

*Viæ* quæ chylum ab intestinis in sanguinem vehunt, sunt.

*Vasa lactea.*

*Receptaculum chyli.*

*Ductus thoracicus.*

*Vasa lactea* sunt parvæ venæ, quæ chylum vehunt.

Oriuntur ex intestinis tenuibus præsertim ex jejunum & ileo, paucissimæ ex intestinis crassis.

Dividuntur in vasa lactea primi & secundi ordinis.

*Vasa lactea primi ordinis,* ab intestinis orta intra duplicaturam mesenterii ad glandulas mesaraicas abeunt.

Vasa lactea *secundi ordinis* a glandulis mesaraicis orta, intra duplicaturam mesenterii ad receptaculum chyli abeunt.

*Receptaculum chyli*, est sacculus angustus, qui diaphragmati ad duo superiora corpora vertebrarum lumbarium incumbit.

*Ductus thoracicus*. Est canalis qui a receptaculo chyli, per posticum hiatus diaphragmatis, in postico spatio mediastini thoracis juxta corpora vertebrarum dorfi ad venam subclaviam finistram usque ascendit, & in eam se exonerat.

Ductus thoracicus in hoc itinere etiam in se recipit *vasa lymphatica* fere totius corporis.

*Usus*. Hæ viæ lactæ chylum ex intestinis in sanguinem vehunt.

## R E N E S.

Sunt duo *viscera*, quæ urinam fecernunt.

*Situs* est retro peritonei sacculus in lumbis circa corpora superiorum vertebrarum lumbarium.

*Figura* est phaseolo similis.

*Divisio* est in *superficiem anteriorem & posteriorem*.  
in *extremitatem superiorem & inferiorem*.  
in *marginem externum*, qui convexus,  
in *internum* qui concavus est.

*Substantia* renum triplex est.

*Corticalis* seu vasculosa, quæ extima est.

*Tubulosa*, quæ media est, tubulis constat.

*Papillosa*, quæ intima est.

*Integu-*

*Integumenta renis sunt.*

1. *Membrana adiposa*, quæ crassa est, & laxè renem involvit.
2. *Membrana propria*, quæ ipsam renis substantiam investit.

*Uretheres* sunt canales *membranacei*, quorum in utroque rene unus est, qui a rene in vesicam urinariam descendit. Initium uretheris amplius est, & *pelvis renalis* vocatur.

*Glandulæ suprarenales*, sunt duæ magnæ glandulæ, quæ supra renes adhuc intra membranam adiposam renum locantur.

*Usus renum.* Renes urinam *secernunt*, & uretheres illam a renibus in vesicam urinariam *deferunt*.

## V E S I C A U R I N A R I A.

Est *saccus membranaceus* sub peritonei sacco in cavitæte pelvis locatus.

*Situs* est in *viris* intra ossa pubis & intestinum rectum  
in *mulieribus* intra ossa pubis & uterum.

*Figura* est magnæ lagenæ pyriformi similis; hinc

*Divisio* in *fundum superiorem*.

in *corpus* quod est pars media.

in *collum* quod ex fundo inferiori emergit,

& *spindere musculo*so circumdatur.

*Substantia* constat ex 4. membranis, ut intestina.

*Usus* vesicæ est, ut urinam *recipiat*.

*retineat.*

*expellat.*

## PARTES GENITALES VIRORUM.

Partes virorum genitales constituunt.

*Penis.*

*Testiculi.*

*Vesiculæ seminales.*

## P E N I S.

Etiam *membrum* virile vocatur.

*Divisio* est in *radicem*.

*corpus* &

*caput*, quod *glans* vocatur.

*Glans* habet basim latam, quæ *corona* dicitur, & *apicem* qui orificio *urethræ* perforatus est.

*Mons veneris* est monticulus pinguedinosus, cute admodum pilosa tectus, qui synchondrosim ossium pubis tegit.

*Substantiam* membri virilis constituunt.

*Integumenta communia.*

Duo *corpora cavernosa penis*.

*Corpus cavernosum urethræ* & demum

*Urethra ipsa.*

Prolongatio cutis, quæ glandem tegit, *præputium* vocatur, quod in parte inferiori ope plicæ membranacæ, quæ *frenulum* vocatur, glandi adhæret.

Duo *corpora cavernosa* penis ex substantia spongiosa constant, ab arcubus ossis ischii utrinque incipiunt, dein in membro virili supra urethram sibi invicem incumbunt, & obtusis apicibus sub corona glandis finiuntur.

*Substantia cavernosa urethræ* ante collum vesicæ crasso principio quod *bulbus urethræ* vocatur, ab ambitu urethræ incipit; dein ambit totam urethræ longitudinem ad apices duorum corporum cavernosorum penis usque, supra hos demum *glandem* format, in qua finitur.

*Urethra* canalis membranaceus est, oritur a collo vesicæ urinariæ; descendit infra corpora cavernosa penis, & sub illis in apicem glandis pergit, atque in ea fissura longitudinali aperitur.

*Verumontanum* prominentia cutanea est, quæ in cavo urethræ ante collum vesicæ locatur.

*Glandulæ* penis sunt.

1. *Glandulæ muciparæ* urethræ, quæ sub tunica interna locantur.
2. *Glandulæ odoriferæ*, quæ circa & in corona glandis hærent.
3. *Glandula prostrata*, quæ solitaria est, circumdat inferius collum vesicæ.

*Usus* penis est ad *effusionem seminis* & urinæ.

## T E S T I C U L I.

Sunt duo corpora ovalia, quæ in cavo scroti continentur.

*Epididymis* seu *testiculus accessorius*, est appendix testiculo incumbens, in quo *caput* seu extremitas anterior & *cauda* seu extremitas posterior notari debet.

*Integumenta* testiculi sunt.

1. *Scrotum*, cavum membranaceum, *septo* intermedio membranaceo in duas cavitates divi-

lum ; constat *epidermide* , *cute* & *membrana fibrosa* , quæ *Darton* vocatur.

2. *Tunica vaginalis* , quæ *membrana cellulosa* est , ab anulo inguinali incipit , atque funiculum spermaticum & testiculum investit.

3. *Tunica albuginea* testiculi est albi coloris , & cum ipsa testiculi substantia concrefcit.

*Substantia testiculi & epididymis*. Ex tenuissimis albicantibus canalibus constant.

Omnes demum canaliculi epididymidis in unum magnum confluunt canalem , qui *vas deferens* vocatur.

*Vas deferens* oritur ex cauda epididymidis , per funiculum spermaticum & per anulum inguinalem ascendit & in pelvis cavo in vesiculas seminales terminatur.

*Funiculus spermaticus* ergo constat ex *vase deferente* , *arteria* , & *vena spermatica* , *nervis spermaticis* , *vasis lymphaticis* & *tunica vaginali* , quam *musculus cremaster* ambit.

*Usus* testiculorum est *seminis secretio* & *præparatio*.

## VESICULÆ SEMINALES.

Sunt duo receptacula membranacea , quæ semen a vasis deferentibus recipiunt , & continent.

*Situs* eorum obliquus est , intra intestinum rectum , & supra collum vesicæ.

*Ductus ejaculatorius* ex qualibet vesicula in urethræ cavum abit , & ibi in summitate verumontani peculiari orificio hiat.

*Ufus est , ut semen retineant &  
excernant in urethram.*

## PARTES GENITALES MULIERUM.

*Partes quæ in mulieribus generationi inserviunt, dividuntur in externas & internas.*

*Externæ sunt. Mons veneris.*

*Labia majora.*

*Labia minora.*

*Clitoris.*

*Hymen.*

*Internæ sunt. Vagina.*

*Uterus.*

*Tubæ Fallopiæ.*

*Ovaria.*

*Ligamenta uteri lata.*

*————— rotunda.*

*Urethra.*

*Mons veneris* est monticulus pinguedinosus , cute pilosa tectus, qui synchondrosi ossium pubis incumbit.

*Labia majora*, sunt duo monticuli pinguedinosi, qui sub monte veneris incipiunt, labia minora tegunt, & juxta latera orificii vaginæ ad perinæum abeunt, & ibi ope plicæ cutaneæ transversalis, quam *frenulum labiorum* vocant, sibi invicem uniuntur.

*Labia minora*, quæ etiam *nymphæ* vocantur. Sunt duæ plicæ cutaneæ, cristis gallinaceis similes, quæ ad latera orificii vaginæ locantur.

*Clitoris* est particula glandiformis, quæ sub anteriori labiorum majorum commissura hæret.

*Hymen* est membrana ut plurimum semilunaris, quæ orificio vaginæ in virginibus integerrimis adhæret.

*Vagina uterina* est tubus membranaceus, qui intra labia minora incipit, dein in cavo pelvis intra ossa pubis & intestinum rectum ad collum uteri ascendit.

Constat vagina *tribus membranis*.

*Extima cellularis* a peritonei tela cellulosa est.

*Media muscularis*, quæ fibris carneis constat.

*Intima rugosa* vocatur. *Rugæ* hæ *transversales* sunt.

*Urethra* canalis est membranaceus, amplior quam urethra virilis, & recta descendens a collo vesicæ urinariæ intra ossa pubis, & vaginam, atque orificio suo sub clitoride intra principia nympharum aperitur.

*Uterus*. Est *receptaculum* illud spongiosum, quod in cavo pelvis super vagina intra vesicam urinariam & intestinum rectum locatur.

*Figura* ejus pyro compresso similis est, hinc ejus

*Divisio* in *fundum*, qui pars suprema latissima est, *corpus* quod pars media

*collum* quod pars infima in acumen angustata est, & in

*Orificium uterinum*, quod rima transversalis in collo uteri est, quæ in vaginam prominet.

*Cavitas* uteri in virgine parva est, vix amygdalam excorticatam capit, tribus instructa est *aperturis*. Duæ sunt ad latera uteri, *orificia interna* tubarum fallopianarum vocantur. Tertia apertura est inferior, nempe ipsum *orificium uterinum*.

*Ligamenta uteri lata* a duplicatura peritonei, quæ utero externam membranam dat, originem habent. A lateribus uteri ad ossa Ilia protenduntur. Sustinent uterum, tubas & ovaria.

*Ligamenta uteri rotunda* oriuntur a lateribus uteri sub fundo, tendunt in anulos inguinales, & ibi in pinguedinem definunt.

*Tubæ Fallopiæ* sunt duo canales membranacei, qui a fundo uteri lateraliter oriuntur, atque in superiori margine ligamenti lati versus ovaria abeunt.

*Ovaria* sunt duo corpora plana, quæ in cavo pelvis ad latera uteri locantur.

*Substantia* eorum exterior *fibrosa* est, interna autem *vesicularis* saltem in virginibus. Hæ vesiculæ *ovula muliebria* vocantur, & in vetulis evanescent.

*Glandulæ genitalium* sunt.

1. *Glandulæ mucosæ vaginales*, quæ sub rugosa vaginæ tunica locantur.
2. *Glandulæ odoriferæ* labiorum & clitoridis.
3. *Glandulæ muciparæ urethræ*, quæ sub interna ejus membrana inveniuntur.

*Ufus genitalium est ad coitum.*

*conceptionem.*

*foetus nutritionem.*

*partum.*

*menstruationem.*

## PARTES UTERI GRAVIDI.

*Partes quæ in utero gravido continentur, sunt,*

1. *Placenta uterina.*

2. *Funiculus umbilicalis.*

3. *Ovum foetus.*

4. *Liquor amnii.*

5. *Foetus.*

## PLACENTA UTERINA.

*Est massa spongiosa placentæ similis, quæ ut plurimum fundo uteri gravidi adhæret.*

*Divisio in marginem & medietatem cui funiculus umbilicalis in inferiori superficie inseritur.*

*in superficiem superiorem, quæ inæqualis.*

*in ————— inferiorem, quæ polita est.*

*Substantia est cellulosa spongiæ similis, vasculis plenissima.*

*Ufus. Sanguinem ab utero recipit, pro foetu præparat, & ramis venæ umbilicalis tradit.*

## FUNICULUS UMBILICALIS.

*Est funiculus intestiniiformis, qui ab umbilico foetus ad medietatem placentæ pergit.*

*Longitudo est frequenter trium spitamarum.*

*Substantia* constat ex 4. partibus.

1. Ex *vagina cutanea*.
2. Ex *substantia cellulosa*, quæ vaginam umbilicalem implet.
3. Ex *vena umbilicali*, quæ ex substantia placentæ oritur, dein per funiculum umbilicalem, & anulum umbilicalem fœtus ad hæpar pergit, & ibi in venam portæ se evacuat.
4. Ex duabus *arteriis umbilicalibus*, quæ in fœtu ab arteriis hypogastricis ortæ juxta vesicæ urinariæ latera ad anulum umbilicalem ascendunt, dein per funiculum umbilicalem pergunt & innumeris ramulis in substantiam placentæ definunt.

*Ufus funiculi.* Vena *umbilicalis* fœtui sanguinem ex placenta adducit, & duæ arteriæ *umbilicales* sanguinem ex fœtu in placentam reducunt.

## OVUM MEMBRANACEUM FOETUS.

Fœtus in uteri cavitate magno ovo *membranaceo* inclusus est.

Hoc ovum ex *tribus membranis* constat.

Extima est *filamentosa*, ubique utero & placentæ accreta.

Media est membrana *chorion*.

Intima membrana *Amnios* vocatur.

*Ufus* hujus ovi est, ut liquorem amnii includat, ne ex utero effluat. Incipiente partu, pars inferior orificium uterinum dilatare juvat.

## L I Q U O R   A M N I I.

Est liquor lymphaticus, qui in cavo ovi penes fœtum includitur.

*Origo.* Secernitur ab exhalantibus arteriis membranarum ovi.

*Uſus.* Fœtum a preſſione uteri tuetur, illum nutrit, in partu orificium uteri dilatat, & vaginam humectando lubricat.

## F O E T U S.


*Primo* graviditatis *menſe* ovum magnitudinem ovi columbini habet, & fœtus in medietate liquoris amnii natans, *molliculam* repræſentat minimam.

*Partes internæ* quibus fœtus ab adulto differt, ſequentes ſunt.

1. *Foramen ovale*, quod in ſepto auricularum cordis invenitur.
2. *Canalis Botallii*, qui ex trunco arteriæ pulmonalis oblique ad truncum arteriæ aortæ fertur.
3. *Pulmo* fœtus eſt nigricans, collapsus, & in aquam projectus *fundum* petit, quam primum autem infans reſpiravit aquæ *innatat*.
4. Omnes *glandulæ* in fœtu majores ſunt.
5. *Urachus*. Eſt canalis membranofus, tenuis, qui a ſuperiori fundo veſicæ ad umbilicum uſque aſcendit. Subinde medius, ſubinde totus canalis cavus reperitur.
6. *Inteſtina craſſa*, viridi & viſcida materia, quæ *meconium* vocatur, in fœtu replentur.

Omnes in fœtu recensiti canales & fœtui peculiaria vasa post partum collabuntur, & in ligamenta concrefcunt.

*Processus* omnium fere offium in fœtu cartilaginei fere funt & ideo *epiphyses* vocantur.



## A N G I O L O G I A

S E U

### D O C T R I N A D E V A S I S.

#### D E V A S I S I N G E N E R E.

*VASA* funt longi canales membranaci, qui sanguinem vel alium humorem vehunt.

*Divisio* vasorum est in *arterias*, *venas*, & *vasa lymphatica*.

*Situs*. Præter epidermidem, membranam arachnoideam & ungues, omnes partes corporis vasa habent.

#### D E A R T E R I I S I N G E N E R E.

*Arteriæ* funt canales membranacei, qui pulsant, sensim angustiores fiunt, & sanguinem a corde ad alias partes vehunt.

*Venæ* funt etiam canales membranacei, sed qui non pulsant, qui sensim latiores fiunt, atque sanguinem a partibus ad cor revehunt.

*Origo omnium arteriarum est a ventriculis cordis ;  
nempe*

1. *Arteria pulmonalis*, a dextro &
2. *Arteria aorta* a sinistro cordis ventriculo incipit.

*Divisio unius arteriæ est in truncos, ramos, ramulos, & vasa capillaria.*

*Finis arteriarum est triplex.*

1. in *venas*. vel
2. in *vasa secretoria*. vel
3. in *alias arterias per anastomosim*.

*Substantia. Arteria ex tribus membranis constat.*  
*extima est communis.*  
*media — muscularis.*  
*intima — polita.*

*Ufus. Arteriæ sanguinem a corde ad partes vehunt.*

1. Pro nutritione.
2. Vitæ conservatione.
3. Calefactione &
4. Secretione variorum humorum.

## SYSTEMA ARTERIÆ AORTÆ.

*Aorta dat 1. duas arterias coronarias cordis.*  
*2. dein Arcum aortæ.*

*Arcus aortæ dat 3. ramos.*

1. *Arteriam innominatam ex qua Carotis dextra & Subclavia dextra.*
2. *Carotidem sinistram.*
3. *Subclaviam sinistram.*

*Carotis* dividitur in *carotidem externam & internam.*

*Carotis externa* dat 8. ramos in faciem.

*Carotis interna* dat in cavo cranii.

*ramos cerebrinos.*

*Subclavia* dat 4. ramos.

1. *Mammariam internam.*

2. *Cervicalem.*

3. *Vertebralem.*

4. *Intercostalem superiorem.*

*Subclavia* continuatur in *axillarem*, *axillaris* in *brachialem.*

*Brachialis* dat sub cubiti flexura 3. ramos.

1. *Cubitalem.*

2. *Radialem*

3. *Interosseam.*

*Aorta descendens* dat in pectore 4. ramos.

1. *Bronchialem.*

2. *Oesophageam.*

3. 10. *intercostales inferiores.*

4. *Diaphragmaticam inferiorem.*

*Aorta descendens* in abdomine dat 8. ramos.

1. *Cæliacam.*

2. *Mesaraicam superiorem.*

3. *Renales.*

4. *Spermaticas.*

5. *Mesaraicam inferiorem.*

6. *Lumbales.*

7. *Sacrales.*

8. *Iliacas.*

*Iliacæ* dividuntur in *internam* & *externam*.

*Iliaca interna* dat 5. ramos in pelvem.

*Iliaca externa* dat *epigastricam* & continuatur in *crurali*.

*Cruralis* sub poplite vocatur *poplitea*.

*Poplitea* dat sub poplite 3. ramos.

1. *Tibialem anticam*
2. ———— *posticam*. &
3. *Peroneam*.

## A O R T A.

Oritur ex sinistro cordis ventriculo, *arcum* facit versus dorfi vertebrae, dein descendit per hiatus diaphragmatis in abdomen, in quo juxta finis-  
trum latus spinæ dorfi ad ultimam vertebra-  
lumborum pergit, ibi in duas *arterias iliacas*  
dividitur.

In tota hac via sequentes oriuntur rami.

*Arteriæ coronariæ cordis*. Ex aorta sub arcu ejus  
oriuntur, & in substantiam cordis, & auricula-  
rum distribuuntur.

*Arcus aortæ* dat 3. ramos.

1. *arteriam innominatam*.
2. *carotidem sinistram*.
3. *subclaviam sinistram*.

*Arteria innominata* ex arcu aortæ oritur & statim  
iterum in duos ramos nempe in *arteriam sub-*  
*claviam dextram* & *carotidem dextram* divi-  
ditur.

*Arteriæ carotides* ad laryngem usque recta ascendant, & ibi in duos ramos, in *carotidem externam* & *internam* dividuntur.

*Carotis externa* juxta aurem ad temporalem regionem ascendit, & in hoc itinere 8. ramis dispergitur in collum & faciem.

*Carotis interna* per canalem caroticum ossis temporis cavum cranii ingreditur, & in ramos *cerebrinos anticos* & *posticos*, qui in cerebri corticem abeunt, dividitur.

*Arteriæ subclaviæ*, juxta claviculam arcus instar flexuntur extrorsum in cavum subaxillare, in quo *arteriæ subaxillares* vocantur.

*Arteria subclavia* dat 4. ramos.

1. *Mammariam internam*, quæ juxta sternum descendit.
2. *Cervicalem*, quæ in musculos colli distribuitur.
3. *Vertebralem*, quæ per foramina 7. processuum transversalium colli ascendit & per foramen occipitale magnum cavum cranii intrat.
4. *Intercostalem superiorem*, quæ in 3. ramos dividitur, qui in margine costarum inferiori ad sternum usque decurrunt.

*Arteria axillaris* continuatur in *brachialem*, quæ ad internum marginem musculi bicipitis ad flexuram cubiti decurrit & sub ea in 3. ramos dividitur.

1. *Arteria radialis* penes radium descendit in volam manus.

2. *Arteria interossea*, quæ in *externam* & *internam* se dividit, quarum una supra, altera infra ligamentum interosseum in musculos antibrachii se distribuit.

3. *Arteria cubitalis* penes cubitum decurrit & sub ligamento carpi ad volam manus pervenit, in hac dat

*Arcum palmarem*, ex hoc oriuntur 4. *arteriæ digitales*, quæ circa primam phalangem in duos ramos se dividunt, qui ad apices digitorum decurrunt.

Circa medietatem arteriæ brachialis vasa lateralía descendunt, & a cubitali & radiali vasa lateralía ascendunt in brachium & se invicem anastomosant. Hæc vasa vocantur *vasa anastomosantia*.

#### AORTÆ DESCENDENTIS RAMI.

*Aorta descendens* ab arcu ad diaphragma usque 4. dat ramos.

1. *Arterias bronchiales*, quæ ad vesiculas pulmonales & bronchia
2. *Arterias œsophageas*, quæ ad inferiorem partem œsophagi
3. 8. *Paria arteriarum intercostalium inferiorum*, quæ in inferiore margine 8. costarum inferiorum ad sternum usque decurrunt.
4. *Arterias diaphragmaticas inferiores*, quæ ad diaphragma abeunt.

*Aorta descendens* in abdomine dat 8. ramos.

1. *Arteriam celiacam*, quæ solitaria est & sub ventriculo in tres ramos dividitur.

in

in *arteriam stomachicam*, quæ ad ventriculum  
 in *arteriam splenicam*, quæ ad splenem  
 in ——— *hepaticam*, quæ ad hepar abit.

2. *Arteriam mesaraicam superiorem*, quæ intestino  
 jejuno, cæco, & colon dextro ramos dat.
3. *Arterias renales*, quæ ad renes abeunt.
4. *Arterias spermaticas*, quæ in lumbis descen-  
 dunt & per annulos inguinales ad testiculos  
 abeunt, in mulieribus autem ad ovaria distri-  
 buuntur.
5. *Mesaraicam inferiorem*, quæ ad colon fini-  
 strum decurrit, & intestino recto dat *arteriam*  
*hæmorrhoidalem internam*.
6. *Arterias lumbares*, quæ ad musculos lumbo-  
 rum & abdominis distribuuntur.
7. *Arterias sacras*, quæ juxta os sacrum descendunt.
8. *Arterias iliacas*, in quas aorta descendens di-  
 viditur circa ultimam vertebam lumbarem.

#### A R T E R I Æ I L I A C Æ.

*Arteriæ iliacæ* se dividunt in *externam* & *internam*.

*Arteria iliaca interna*, quæ etiam *hypogastrica* vo-  
 catur, se dividit in fœtu in 6. in adulto in 5.  
 ramos, qui intra & circa pelvem dividuntur.

*Arteria iliaca externa*, egreditur e cavo pelvis sub  
 ligamento *Pupartii*, & in interna femoris parte  
 deorsum pergit ad cavum subpopliteum. In hoc  
 itinere *arteria cruralis* seu *femoralis* vocatur &  
 in cavo subpopliteo *arteria poplitea*.

Arteria iliaca externa sub exitu ex pelvi dat  
*Arteriam epigastricam*, quæ sub musculo recto in  
abdomine usque ad sternum ascendit.

*Arteria cruralis*, dat multos ramos *musculares*, qui  
ad musculos femoris abeunt, & *arterias latera-*  
*les*, qui cum arteriis *genualibus recurrentibus* a  
tibiali anastomosant.

*Arteria poplitea* ad duos pollices sub poplite in *ti-*  
*bialem anticam* & *posticam* atque *peroneam* di-  
viditur.

1. *Arteria tibialis antica* ligamentum interosseum  
perforat, super illo antè descendit ad dor-  
sum pedis usque ibi penes pollicem pedem per-  
forat, & in plantam pedis egreditur.
2. *Peronea* retro fibulam descendit, inferius perfo-  
rat ligamentum interosseum & ad dorsum pedis  
egreditur.
3. *Tibialis postica* autem in interna & postica parte  
tibiæ descendit, & retro malleolum internum in  
plantam pedis egreditur, in qua *arcum planta-*  
*rem*, ex qua *arteriæ digitales* oriuntur, format.

## SYSTEMA ARTERIÆ ET VENÆ PULMONALIS.

*Arteria pulmonalis* ex dextro cordis ventriculo ori-  
tur, recta assurgit ex pericardio, & illico in  
*duos ramos* dividitur.

*Ramus dexter* in dextrum pulmonem,

*Ramus sinister* in finistrum pulmonem abit. Uter-  
que in pulmonis substantia in innumeros ramos

& ramulos retis adinstar in vesiculis pulmonalibus distribuitur, & in venulas pulmonales finitur.

*Venæ pulmonales* oriuntur ab extremitatibus arteriarum pulmonalium, demum 4. formant *ramos*, qui in *sinum venosum sinistrum* cordis se evacuant.

## DE VENIS IN GENERE.

*Venæ* sunt canales longi ac membranacei, qui perpetuo latiores fiunt, non pulsant, atque sanguinem a partibus ad cor revehunt.

*Origo* venarum est duplex.

1. Ab *extremitatibus* arteriarum per anastomosim.
2. A *superficie externa & interna* totius corporis per *venas absorbentes*.

*Finis* venarum est in sinus cordis, seu

1. in *venam cavam*, quæ in dextrum,
2. in *venam pulmonalem*, quæ in sinistrum sinum cordis se evacuat.

*Figura* venarum ramosa est ut arteriarum.

*Substantia* ex tribus membranis, quæ vero tenuiores, quam in arteriis sunt, constat.

*Valvulæ* venarum sunt membranulæ semilunares, quæ reditum sanguinis in vena impediunt.

*Usus* venarum est reducere sanguinem a partibus ad cor; absorbere tenues humores a superficie interna & externa totius corporis.

## RAMI VENÆ CAVÆ.

*Vena cava* dat *superiorem & inferiorem*.

Rami venæ cavæ superioris sunt.

*Subclaviæ.*

*Jugulares externæ.*

————— *internæ.*

*Vena azygos.*

Rami jugularis externæ sunt.

*Frontalis.*

*Angularis.*

*Temporalis.*

*Auricularis.*

*Sublingualis.*

*Occipitalis.*

Rami jugularis internæ sunt.

*Sinus laterales duræ matris.*

*Laryngea.*

*Pharyngea.*

Rami venæ azygos sunt.

*Vertebrales.*

*Intercostales.*

*Bronchiales.*

*Diaphragmatica.*

Rami venæ subclaviæ sunt.

*Mammariæ.*

*Axillares.*

Rami venæ axillaris sunt.

*Brachialis.*

*Cephalica.*

*Basilica.*

*Mediana.*

*Salvatella.*

*Cæphalica pollicis.*

*Digitales.*

Rami venæ cavæ inferiores sunt.

*Hepaticæ.*

*Renales.*

*Spermatica dextra.*

*Lumbares.*

*Sacrales.*

*Iliacæ.*

Venæ iliacæ dividuntur in *iliacam internam* &  
*externam.*

Rami iliacæ internæ sunt.

*Obturatoria.*

*Pudenda dorsalis.*

*Hæmorrhoidales externæ.*

Rami iliacæ externæ sunt.

*Epigastrica.*

*Cruralis.*

Rami venæ cruralis seu femoralis sunt vena poplitea.

Rami popliteæ sunt,

*Tibialis antica &*

*Tibialis postica.*

*Peronea.*

*Cephalica pollicis.*

*Saphena.*

*Dorsales pedis.*

*Plantares.*

*Digitales pedis.*

## S Y S T E M A V E N Æ C A V Æ.

*Vena cava incipit seu se evacuat in dextrum finum  
venosum cordis, statim autem dividit se  
in venam cavam superiorem.  
in venam cavam inferiorem.*

*Vena cava superior, recipit omnem sanguinem,  
qui redit a capite, collo, thorace, & extremitatibus superioribus.*

*Vena cava inferior, recipit omnem sanguinem ex  
abdomine, & extremitatibus inferioribus redeuntem.*

## V E N Æ C A P I T I S.

Sanguis ex cerebro, facie, & collo redit per 4. venas;  
per 2. *Venas jugulares externas.*  
per 2. *Venas jugulares internas.*

*Venæ jugulares internæ incipiunt a foramine lacero  
cranii, revehunt sanguinem omnem a cerebro  
& cerebello in venas subclavias.*

*Venæ jugulares externæ ad latera colli statim sub  
integumentis communibus colli locantur, etiam  
in venas subclavias se evacuant & reducunt sanguinem a partibus externis capitis & colli, hinc  
in eas se evacuant vena frontalis, venæ angulares, temporalis, auricularis, sublingualis, occipitalis.*

## V E N Æ E X T R E M I T A T U M S U P E R I O R U M.

Ex *venis digitalibus* redit sanguis  
in *cephalicam pollicis*, quæ juxta pollicem &

in *venam salvatellam*, quæ juxta digitum minimum locatur.

In flexura cubiti sunt tres venæ notabiles.

1. *Basilica*, quæ in inferiore,
2. *Cephalica*, quæ in superiore parte antibrachii decurrit &
3. *Mediana*, quæ a medietate antibrachii ad basilicam & cephalicam ascendit.

Omnes hæ venæ in *venas brachiales*, hæc in *axillarem*, hæc in *subclaviam* se evacuat.

### VENA CAVA SUPERIOR.

Venæ axillares sub claviculis decurrunt & *subclaviæ* vocantur. Utraque subclavia in unum truncum unitur, qui *vena cava superior* dicitur.

### VENA CAVA INFERIOR.

*Vena cava inferior* ab ultima vertebra lumborum in dextro latere spinæ dorfi ascendit, dextrum diaphragmatis foramen perforat, atque cum *vena cava superiori* se unit, & definit cum eadem in sinu venoso dextro cordis.

In cavo abdominis recipit *venas hepaticas, renales, spermaticam dextram, lumbares, sacrales & iliacas.*

### VENÆ EXTREMITATUM INFERIORUM.

*Venæ digitales* pedis se evacuant

in *cephalicam*, quæ a pollice

in *saphenam*, quæ a digito minimo &

in *dorsalem*, quæ in dorso pedis decurrit.

Hæ cum *venis plantaribus* in *malleolares* & *surales*,  
hæ in *venam subpopliteam* se evacuant.

*Subpoplitea* ascendit & *femoralem* seu *venam cruralem* format. Hæc sub ligamento *Pupartii* in cavum pelvis ingreditur, atque cum *vena iliaca interna*, quæ *venas hæmorrhoidales externas* & *hypogastricas* recipit, se unit. Utraque *vena iliaca* demum in inferiorem partem *venæ cavæ inferioris* circa ultimam *vertebram lumborum* se evacuat.

### SYSTEMA VENÆ PORTÆ.

*Vena portæ* vocatur magna illa *vena*, quæ sanguinem a visceribus abdominalibus, in substantiam hepatis ducit.

*Pars abdominalis* a tribus ramis venosis componitur nempe

a *vena splenica*.

a *vena mesaraica*.

a *vena hæmorrhoidali interna*.

### CIRCULATIO SANGUINIS IN FOETU.

Fœtus recipit sanguinem a matre per *venam umbilicalem* & illum matri remittit per 2. *arterias umbilicales*.


### DE VASIS LYMPHATICIS.

Sunt tenuissima vasa, quæ *lympham* a partibus revehunt.

*Origo est* a cavitatibus majoribus, vel a visceribus.

*Finis* omnium vasorum lymphaticorum, colli, thoracis, abdominis, extremitatum superiorum & inferiorum, est in ductum thoracicum.

*Ufus* vasorum lymphaticorum, est reductio lymphæ a partibus.



## NEUROLOGIA

S E U

### DOCTRINA DE NERVIS.

#### DE NERVIS IN GENERE.

*NERVI* sunt longi, albicantes funiculi, qui sensationi inserviunt.

*Origo* nervorum est duplex.

1. a *cerebro* vel
2. a *medulla spinali*.

*Finis* est in *organa sensuum*, in *viscera*, in *vasa*, in *musculos*.

*Figura* nervi est ramosa.

*Substantia* nervi est duplex.

*Vagina nervi*, quam dura & pia mater dat.

*Pulpa nervea*, quæ ex tenuissimis canalibus, qui *liquidum nerveum* continent, constat.

*Ufus*. Nervi inserviunt.

1. *Sensationi* partium sensilium.
2. *Sensibus* 5. externis ut *tactui*, *visui*, *auditui*, *odoratui*, *gustui*.
3. *Motui* musculorum.

Anatomici nervos dividunt in *cerebrinos* & *spinales*.

*Cerebrini* vocantur, qui a cerebro orti per foramina cranii exeunt.

*Spinales* dicuntur, qui a medulla spinali orti per foramina lateralia vertebrarum exeunt.

*Numerus* nervorum. 9. *Paria* sunt nervorum cerebrinorum. 30. *Paria* nervorum sunt spinalium.

9. *Paria nervorum cerebrinorum* sunt.

1. Par. nervi *olfactorii*.
2. — — — *optici*.
3. — — — *oculos motorii*.
4. — — — *pathetici*.
5. — — — *trigemini*.
6. — — — *abducentes*.
7. — — — *auditorii*.
8. — — — *vagi*.
9. — — — *linguales*.

30. *Paria nervorum spinalium* dividuntur

1. in 8. *paria nervorum cervicalium*.
2. — 12. — — — *dorsalium*.
3. — 5. — — — *lumbarium*.
4. — 5. — — — *sacrorum*.

## DE NERVIS CEREBRI IN SPECIE.

### I. PAR. NERVI OLFACTORII.

A corporibus striatis cerebri oriuntur, & per foramina cribrosa ossis ethmoidei in cavum narium abeunt, & ibi plurimis ramulis in membranam

pituitariam narium distribuuntur, inserviunt odorari.

## II. PAR. NERVI OPTICI.

A thalamis nervorum opticorum in cerebro orti, per foramina optica ossis sphænoidei in orbitam abeunt, ibi bulbum oculi perforant, & in eo tunicam retinam, quæ visus est organum, formant.

## III. PAR. NERVI OCULOS MOTORII.

Abeunt per *rimam orbitalem superiorem* in orbitam, & ibi in musculos bulbi dividuntur.

## IV. PAR. NERVI PATHETICI.

Per *rimam orbitalem superiorem* in orbitam abeunt, in qua in musculum obliquum superiorem distribuuntur.

## V. PAR. NERVI TRIGEMINI.

Hi adhuc in cavo cranii in tres ramos dividuntur, nempe

1. in *ramum orbitalem*.
2. — — — — *maxillarem superiorem*.
3. — — — — *inferiorem*.

1. *Ramus orbitalis* per *rimam orbitalem superiorem* in orbitam abit, in qua in 3. dividitur ramos.

1. in *ramum frontalem*, qui per foramen superciliare ex orbita in frontem exit.
2. in *ramum lachrymalem*, qui ad glandulam lachrymalem
3. in *ramum nasalem*, qui per foramen orbitale nasi in cavum narium abit.

2. *Ramus maxillaris superior* per foramen rotundum e cavo cranii egreditur, tranſit canalem infraorbitalem, & per foramen anticum hujus canalis in faciem ſeu maxillam ſuperiorem emérgit.
3. *Ramus maxillaris inferior* per foramen ovale e cavo cranii egreditur & dein dato ramo ad linguam per canalem mentalem maxillæ inferioris pergit.

## VI. PAR. NERVI ABDUCENTES.

Per fiſſuram orbitalem ſuperiorem in orbitam egreditur, in qua in muſculum abducentem ſeu rectum externum abit.

## VII. PAR. NERVI AUDITORII.

Hi in ramum *mollem* & ramum *durum* dividuntur.

Uterque ramus in orificium meatus auditorii interni abit.

*Ramus mollis* per foraminula meatus auditorii in labyrinthum auris internæ diſtribuitur & primarium auditus organum conſtituit.

*Ramus durus* in meatu auditorio interno aquæductum fallopii ingreditur, & ex eo per foramen ſtylomastoideum in regionem temporalem emérgit.

## VIII. PAR. NERVI VAGI.

Per foramina lacera cranii in collum, thoracem, & abdomen egrediuntur, & omnibus viſceribus in collo, thorace & abdomine dant nervos.

## IX. PAR. NERVI LINGUALES.

Per *foramina condyloidea anteriora* ad linguam abeunt.

## NERVI MEDULLÆ SPINALIS.

Nervi, qui a medulla spinali oriuntur, *spinales* vocantur & exeunt per foramina lateralìa vertebrarum & ossis sacri.

## NERVI CERVICALES.

*Nervorum cervicalium* sunt 8. paria.

*Primum par* vocatur *nervi occipitales*, hi intra os occipitis & primam vertebra collī exeunt, & distribuuntur ad occiput & collum.

*Reliqua 7. paria nervorum cervicalium* distribuuntur ad musculos collī: ab his nervis oriuntur

1. *Nervus accessorius Willisii.*
2. *Nervus phrenicus seu diaphragmaticus.*
3. *Plexus brachialis.*

*Nervi accessorii* ascendunt per foramen occipitale magnum in cavum cranii, & iterum ex eo per foramina lacera exeunt in musculum trapezium.

*Nervi phrenici* descendunt ad cavum thoracis, in quo penes pericardium ad diaphragma abeunt.

*Plexus brachialis* formatur a 5. infimis paribus cervicalibus & primo pare dorsali & distribuitur in 6. ramos, qui in extremitates superiores abeunt.

1. *Nervus articularis*, qui in articulo humeri distribuitur.
2. *Nervus medianus* cum arteria brachiali descendit in volam manus usque, ibi pollicis, indicis

& digito medio duos dat ramos *digitales* dictos  
& digito anulari ramum *digitalem* unum.

3. *Nervus ulnaris* a plexu brachiali descendit penes condylum internum brachii in volam manus, in qua digito anulari unum & digito auriculari duos dat ramos *digitales*.
4. *Nervus radialis* penes externum brachii & anti-brachii latus ad dorsum manus descendit, in quo itinere ubique in musculos distribuitur.
5. *Nervus cutaneus externus* penes venam medianam descendit in antibrachio ad pollicem.
6. *Nervus cutaneus internus* in interno brachii & antibrachii latere descendit fere usque ad digitum minimum.

#### N E R V I D O R S A L E S.

Nervorum *dorsalium* sunt 12. paria, quæ sub inferiore margine costarum ad sternum decurrunt, & nervi *costales* vocantur. Distribuantur in musculos & cutem dorsi atque thoracis.

#### N E R V I L U M B A L E S.

Nervorum *lumbalium* sunt 5. paria, quæ distribuuntur ad musculos & cutem lumborum atque abdominis.

#### N E R V I S A C R I.

Nervorum *sacrorum* sunt etiam 5. paria, quæ a cauda equina medullæ spinalis oriuntur, & per foramina interna ossis sacri exeunt, & in cavo pelvis distribuuntur in vesicam urinariam, vesicu-

lās feminales, penem, uterum, vaginam & intestinum rectum.

Nervi *extremitatum inferiorum* a lumbalibus & sacris formantur, & numero 3. sunt.

1. *Nervus obturatorius*, per incisuram superiorem foraminis ovalis e cavo pelvis exit, & in musculos circa pelvem distribuitur.
2. *Nervus cruralis* cum vasis cruralibus sub ligamento Pupartii ex cavo abdominis exit, distribuitur in musculos & cutem femoris & cruris, ad dorsum pedis usque.
3. *Nervus ischiaticus* e cavo pelvis per excisuram ischiaticam egreditur, dein intra tuberositatem ischii, & trochanterem majorem femoris, in exteriori & postica femoris parte descendit in cavum popliteum, sub quo in ramum tibiale & peroneum dividitur.

*Ramus tibialis* juxta malleolum internum in plantam pedis descendit, in qua nervum plantarem *internum* & *externum* a quibus *nervi digitales* formantur, abit.

*Ramus peroneus* multis ramis in musculos cruris & dorsum pedis distribuitur.

## N E R V I I N T E R C O S T A L E S M A G N I.

*Nervus intercostalis magnus* oritur in cavo cranii a ramo sexti paris, & ramo quinti paris, conjunctus in unum truncum per canalem caroticum e

cavo cranii egreditur, & juxta latera corporum vertebraliū colli, thoracis, lumborum & ossis sacri descendit.

In hoc itinere ab omnibus 30. paribus nervorum spinalium duos *ramulos accessorios* acquirit, & sequentes ramos nerveos format.

In Collo dat 3. *ganglia cervicalia.*

*supremum.*

*medium.*

*infimum.*

Ab his oriuntur *nervi cardiaci*, qui ad cor & *nervi pulmonales*, qui ad pulmones abeunt.

In *thorace* dat *nervum splanchnicum* seu *intercostalem anteriorem*, qui diaphragma perforat & in abdomine circa renes *ganglia semilunaria* format, ex quibus nervi ad omnia viscera abdominalia exeunt.

*Nervus intercostalis posterior* circa spinam dorsi, & lumborum, atque os sacrum & coccygis descendit, & demum ibi finitur.



---

# A D E N O L O G I A.

S E U

## DOCTRINA DE GLANDULIS.

---

### DE GLANDULIS GENERATIM.

**G**LANDULA est parva machina, quæ secretioni alicujus humoris inservit.

*Divisio glandularum est in tres species.*

1. in *folliculosas*, quæ ex folliculo cavo constant.
2. in *globatas*, quæ ex glomere vasorum lymphaticorum constant, & ductum excretorium non habent.
3. in *glomeratas*, quæ ex glomere vasorum constant & ductum excretorium habent.

*Ductus excretorius glandularum* est canalis tenuis, qui e glandula exit, & succum a glandula secretum excernit.

*Secunda glandularum divisio* est a liquido, quod secernunt in glandulas *sebaceas*, *muciparas*, *lymphaticas*, *lachrymales*, *salivales*, *biliosas*, *lacteas* &c.

*Ufus glandularum* est, secernere aliquem humorem. In *infantibus* sunt glandulæ majores, quam in adultis.

GLANDULÆ IN CAVITATE CRANII.

*Glandulæ duræ matris* , quæ in dura matre juxta finum longitudinalem locantur.

*Glandula pituitaria* , quæ in sella turcica locatur.

GLANDULÆ OCULORUM.

*Glandulæ Meibomianæ* sunt glandulæ *sebaceæ* , quæ juxta tarfos palpebrarum locantur.

*Glandula lachrymalis* in externo angulo orbitæ.

*Caruncula lachrymalis* in interno angulo palpebrarum.

GLANDULÆ ORIS.

*Glandularum salivalium* sunt 3. paria.

*Glandulæ parotides* , quæ sub auribus locantur , eorum ductus *stenonianus* dicitur , & pergit ab aure per buccam , ubi circa tertium dentem molarem superiorem in cavum oris aperitur.

*Glandulæ maxillares* , sub angulo maxillæ ,

*Glandulæ sublinguales* , sub lingua ,

*Glandulæ mucosæ oris* , in tonsillis , uvula & faucibus inveniuntur.

GLANDULÆ NARIUM.

*Glandulæ mucosæ* , quæ in membrana pituitaria narium sunt.

GLANDULÆ AURIUM.

*Glandulæ ceruminosæ meatus auditorii externi* , quæ sub cute meatus auditorii externi locantur , & *cerumen* secernunt.

## GLANDULÆ COLLI.

*Glandulæ jugulares*, quæ in laterali parte colli,

*Glandulæ submaxillares*, quæ sub cute sub maxilla inferiori locantur.

*Glandula thyroidea*, est magna & supra cartilaginem thyroidem laryngis locatur.

## GLANDULÆ THORACIS.

*Glandulæ externæ.*

*Glandulæ mammariae*, sub pinguedine in mammis sunt.

*Glandulæ internæ.*

*Glandulæ bronchiales*, quæ in bronchiis pulmonum sunt.

*Glandula Thymus*, in antico spatio mediastini est.

## GLANDULÆ ABDOMINIS.

*Glandulæ gastricae*, quæ in ventriculo,

———— *intestinales*, quæ in intestinis,

———— *mesaraicae*, quæ in mesenterio sunt.

*Glandulæ hepaticæ*, quæ etiam *acini biliosi* vocantur, & in substantia hepatis locantur.

———— *suprarenales*, quæ magnæ sunt & supra renes locantur.

## GLANDULÆ GENITALIUM VIRILIIUM.

*Glandulæ mucosæ urethræ*, quæ sub interna urethræ membrana,

———— *sebaceæ præputii*, quæ circa glandem locantur.

*Glandula prostatica*, quæ sub collo vesicæ est.

GLANDULÆ GENITALIUM MULIEBRIUM.

*Glandulæ odoriferæ labiorum*, sub cute labiorum,  
*Glandulæ mucosæ urethræ*, sub membrana interna  
urethræ,  
————— *vaginales*, sub membrana interna  
vaginæ locantur.

GLANDULÆ EXTREMITATUM.

*Glandulæ inguinales*, sub cute in inguinibus,  
————— *subaxillares*, sub cute in cavo subaxillari,  
————— *synoviales*, in cavo articulationum inve-  
niuntur.

GLANDULÆ CUTIS.

*Glandulæ subcutaneæ*, sub cute locantur & *sebum*  
*oleosum* secernunt.

F I N I S.



HYGROLOGIA

*S E U*

DOCTRINA DE HUMORIBUS

CORPORIS HUMANI.

LIBRARY OF THE

UNIVERSITY

OF CALIFORNIA

BERKELEY



# HYGROLOGIA

SEU

## DOCTRINA DE HUMORIBUS CORPORIS HUMANI.

---

**L**IQUIDÆ nostri corporis partes *humores* vocantur. Hi *dividuntur* in humores *secretos* & non *secretos*.

### HUMORES NON SECRETI.

1. *Chylus*. Est humor albus, lacti similis, qui ex cibis in ventriculo & intestinis tenuibus digestis oritur, & per vasa lactea intestinorum, per receptaculum chyli, atque per ductum thoracicum in sanguinem fluit.

2. *Sanguis*. Est humor rubicundus, qui in corde, arteriis & venis continetur.

*Dividitur* sanguis ex vena emissus in *cruorem*, qui ex globulis rubris & — *serum*, quod ex gelatina, pauca terra & sale, at maxime ex aqua constat.

3. *Lympha* est aqua gelatinosa, quæ in vasis lymphaticis continetur.
4. *Succus nutritivus*, qui gelatina subtilissima est, & in omnibus partibus atque humoribus, solis excrementitiis exceptis, continetur.

## HUMORES A SANGUINE SECRETI.

### IN CAVO CRANII ET SPECU VERTEBRALI.

1. *Liquidum nerveum*. Est humor tenuissimus, qui a substantia corticali in medullam cerebri, cerebelli, & medullam spinalem secernitur, atque exinde in omnes nervos totius corporis fluit.
2. *Vapor aquosus*, qui in cavo cranii, in 4. ventriculis cerebri & in specu medullæ spinalis continetur, atque a vasis exhalantibus secernitur.

### IN CAVO NARIUM.

*Mucus narium*, qui a glandulis membranæ pituitariæ in naribus secernitur.

### IN CAVO ORIS.

*Saliva*, est humor, qui a tribus paribus glandularum salivalium in cavum oris pro masticatione ciborum secernitur.

### IN CAVO FAUCIUM.

*Mucus faucium & œsophagi*, qui a glandulis muciparis pro faciliiori deglutitione secernitur.

## I N O C U L I S.

Sunt tres humores bulbi.

1. *Humor aqueus*, qui in camera antica & postica oculi continetur.
  2. *Lens crystallina*, quæ in antica parte humoris vitrei, &
  3. *Humor vitreus*, qui in postica bulbi parte locatur.
- Extra bulbum sunt,

1. *Lachrymæ*, quæ in glandula lachrymali feceruntur, & per ductus excretorios hujus glandulæ, intra superiorem palpebram, in anticam superficiem bulbi effunduntur.

Lachrymæ a punctis lachrymalibus iterum absorbentur, atque per canales lachrymales in sacculum lachrymale, & ex eo, per ductum nasalem, in cavum narium ducuntur.

2. *Succus glandularum Meibomianarum*, qui in tarsis palpebrarum a glandulis sebaceis seu *Meibomianis* secernitur.

## I N A U R I B U S.

1. *Cerumen aurium*, quod in meatu auditorio externo a glandulis sebaceis secernitur.
2. *Aqua auditoria*, quæ in vestibulo & canalibus semicircularibus auris internæ continetur.

## I N C O L L O.

*Succus glandularum submaxillarium, jugularium & glandulæ thyroideæ*, qui lymphæ gelatinosa est.

## I N M A M M I S.

*Lac mammarum*, quod in puerperis a glandulis mammariis secernitur, & per vasa galactophora, seu lactea mammarum, in papillam fluit.

## I N T H O R A C E.

*Mucus laryngis, tracheæ & bronchiorum*, qui a glandulis harum partium secernitur, & sæpe per tussim ejicitur.

*Succus glandulæ thymus*, qui albicans est.

*Vapor pericardii & cavitatum thoracis*, qui ab arteriis exhalantibus secernitur.

*Materia perspirabilis pulmonum*, quæ ex pulmonibus exhalat.

## I N A B D O M I N E.

1. *Succus gastricus*, qui in ventriculo, &

2. *Succus entericus*, qui in intestinis ab arteriis exhalantibus secernitur.

3. *Succus pancreaticus*, qui a glandulis pancreatis secernitur, & per ductum pancreaticum in intestinum duodenum pro digestionem ciborum fluit.

4. *Bilis* est succus flavus & amarus, qui in substantia hepatis secernitur, atque per ductum hepaticum, partim in intestinum duodenum fluit, partim in vesiculam felleam regurgitat.

*Bilis* in vesicula fellea, spissior & acrior evadit, atque sub digestionem per ductum choledochum in duodenum iterum effluit.

5. *Mucus ventriculi & intestinorum* a glandulis muciparis secernitur, & has partes oblnit.

6. *Chymus* est massa cineritia, quæ a cibis nondum digestis in ventriculo & intestino duodeno continetur, ex quo dein *chylus* elaboratur. V. *chylus*.

7. *Fæces intestinorum* sunt massa fætida, quæ a digestionem ciborum remanet, in intestinis crassis continetur, ac tandem per anum eliminatur.

## IN VESICA URINARIA.

1. *Urina* est humor aquosus & acris, qui in renibus secernitur, & per uretheres in vesicam urinariam defluit, ac tandem ex vesica per urethram expellitur. Constat aqua, terra & sale microcosmico.
2. *Mucus* vesicæ urinariæ, qui internam vesicæ superficiem illinit.

## IN GENITALIBUS VIRORUM.

1. *Semen* seu *sperma* est liquor, qui ab arteriis spermaticis in testiculis secernitur, atque ex testiculis per vas deferens in vesiculas seminales defertur, & tempore coitus ex vesiculis seminalibus per ductus ejaculatorios in urethram ejicitur.
2. *Mucus urethræ*, qui e glandulis urethræ secernitur.
3. *Succus glandulæ prostaticæ*, qui albicans est, & tempore coitus cum semine in urethram effluit.
4. *Succus glandularum odoriferarum glandis*, qui circa coronam glandis secernitur.
5. *Vapor tunicæ vaginalis* testiculorum, qui aquosus est.

## IN GENITALIBUS MULIERUM.

1. *Mucus vaginæ & urethræ*, qui a glandulis harum partium secernitur.
2. *Succus glandularum odoriferarum*, quæ in labiis locantur.
3. *Sanguis menstruus*, qui ex vasis arteriosis in cavo uteri omni mense secernitur.
4. *Sanguis lochialis*, qui post partum ex cavo uteri per aliquot dies exit.

5. *Liquor amnii*, qui tempore graviditatis penes fœtum in ovo membranaceo uteri continetur.

## I N F O E T U.

*Meconium* seu fæces nigræ, quæ in intestinis crassis fœtus continentur.

## I N A R T I C U L A T I O N I B U S.

1. *Synovia* seu liquor articularis, qui in articulorum cavitatibus secernitur.
2. *Succus vaginalum tendinum*, qui mucosus tenuis similis est.

## I N O S S I B U S.

1. *Medulla ossium* seu substantia pinguedinosa, quæ in medietate ossium longorum continetur.
2. *Succus medullaris* est humor oleosus, qui in substantia cavernosa ossium locatur.

## I N I N T E G U M E N T I S C O M M U N I B U S.

1. *Mucus Malpighianus*, qui sub epidermide in cellulis locatur, atque in Europæis albus, in æthiopicis niger est.
2. *Succus glandularum subcutanearum*, qui pinguis est, atque per ductus harum glandularum in cutem exit.
3. *Succus pilorum*, qui in cavo celluloso pilorum continetur, & a quo pili suum colorem habent.
4. *Materia perspirabilis*, quæ sub forma vaporis invisibilis per vasa exhalantia arteriosa ex tota superficie cutis perpetuo exhalat; quando hicce vapor in guttas visibiles super cute colligitur, tunc *sudor* vocatur.
5. *Oleum membranæ adiposæ*, quod ubique in cellulis telæ cellulosæ & in omento a poris lateralibus arteriarum secernitur.

PHYSIOLOGIA

*S E U*

DOCTRINA DE ACTIONIBUS


CORPORIS HUMANI.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO


LIBRARY

OF THE EAST ASIAN LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO



# I N D E X.



DE Physiologia generatim.

De natura & viribus corporis animati.

De actionibus corporis animati.

*Actiones vitales.*

Circulatio sanguinis.

Actio cordis.

—— arteriarum.

—— venarum.

Calor.

Respiratio.

*Actiones animales.*

Anima.

Sensatio generatim.

Sensus externi.

Tactus.

Gustus.

Olfactus.

Auditus.

Visus.

Sensus interni.

Irritabilitas.

Actio musculorum.

Vox & Loquela.

Vigiliæ.

Somnus.

*Actiões naturales.*

Fames.

Sitis.

Masticatio.

Deglutitio.

Digestio ciborum.

Chylificatio.

Transitus chyli in sanguinem.

Sanguificatio.

Nutritio , incrementum & decrementum  
corporis.

Secretio humorum.

Excretio humorum excrementitiorum.

Expulsio fæcis.

Excretio urinæ.

Transpiratio.

Inhalatio.

*Actiões sexuales.*

Se - &amp; excretio feminis.

Menstruatio.

Conceptus.

Evolutio embrionis.


Graviditas.

Partus.

Puerperium.


Hominis ætates.

Mors.





# DE PHYSIOLOGIA GENERATIM.



*PHYSIOLOGIA* est scientia actionum & virium corporis animati.

Homo *vivus* constat Corpore & Anima.

*Corpus* est machina, quæ ex partibus solidis & fluidis componitur.

*Anima* est ens incorporeum, quo mediante corpus vivum cogitat, & actiones animales exercet.

## DE NATURA ET VIRIBUS CORPORIS ANIMATI.

Cum homo machina non solum mechanico-hydraulica, sed simul animata sit: hinc vires non solum *Physicas* omni machinæ mechanico-hydraulicæ communes, sed etiam vires *animales*, solis animalibus animatis proprias, exercet.

*Vires* corporis nostri *physicæ* sunt.

1. *Vis gravitatis*, qua corpora in linea ad solum perpendiculari descendunt, vel descendere conantur.
2. — *inertiæ*, qua corpora quieti & motui resistunt.

3. *Vis elasticitatis*, qua corpora vi quadam extensa ad pristinam figuram sponte redeunt vi extendente ablata.
4. — *motrix*, qua corpora impresso motu moventur, donec vis motus non remittit.
5. — *attractionis*, seu *affinitatis*, qua duo corpora sponte sua ad se mutuo tendunt.
6. — *repulsionis*, qua duo corpora se sponte repellunt.

*Vires animalitatis* nostri corporis sunt.

1. *Vis irritabilitatis*, qua fibræ quædam nostri corporis stimulo irritatæ se contrahunt.
2. *Vis sensitivitat*, qua fibræ quædam stimulo irritatæ in anima sensationem causant.
3. — *animæ*, qua voluntate animæ pars quædam se movet.
4. — *nervea*, qua anima etiam nollente, mutatio fit in quadam parte, ut erectio penis, aut rubor genarum in verecundia.
5. — *consolidans* qua partes vulneratæ consolidantur.
6. — *fermentativa*, qua humores animales motu intestino mutantur ex una in aliam indolem.

*Aggregatum* omnium harum virium\*, quas corpus animatum exercet, *natura corporis humani* vocatur.

## DE ACTIONIBUS CORPORIS

### ANIMATI.

Naturâ corporis animati ope suarum virium, quas a  
 • CREATORE infinitas habet, & ope partium soli-


darum & fluidarum, quibus corpus exstructum est, varias peragit actiones, quæ *corporis animati functiones*, vocantur.

Hæ actiones dividuntur.

1. In *Actiones vitales*, quæ vitam faciunt.
2. ————— *animales*, quæ sensum & motum peragunt.
3. ————— *naturales*, quæ corpus conservant.
4. ————— *sexuales*, quæ speciem sui indivi-  
dui propagant.
5. ————— *publicas*, quæ toti corpori,
6. ————— *privatas*, quæ uni solummodo parti  
inserviunt.
7. ————— *Fætus*, quæ ipsi privatæ sunt.

Has actiones physiologia considerat, privata autem singulæ partis actio in *anatomia*, *hygrologia*, *physica*, &c. explicatur.

His ergo scientiis bene imbuti sint oportet, qui studio physiologico incumbere ambiunt.



## DE ACTIONIBUS VITALIBUS GENERATIM.

*VITALES* dicuntur actiones, quæ vitam in corpore faciunt.

*Vita* nostri corporis consistit in *circulatione sanguinis*; hac enim cessante cessat vita.

Ad *circulationem* autem requiritur

*Actio cordis.*

—→ *arteriarum.*

—→ *venarum.*

*Respiratio*, saltem in homine nato, &

*Calor* nostri corporis.

## CIRCULATIO SANGUINIS.

Sanguis perpetuo movetur

1. Ex cordis ventriculis in arterias.
2. Ex arteriis in venas.
3. Ex venis iterum in ventriculos cordis.

Nempe sanguis ab universo corpore redux per venas cavas.

1. In finum dextrum & simul in auriculam dextram cordis,
2. Ex auricula dextra in ventriculum dextrum impellitur.
3. Ex eo in arteriam pulmonalem ejicitur.
4. Ex ea in venas pulmonales transit.
5. Ex quibus in finum finistrum & auriculam finistram simul &
6. Ex auricula finistra in ventriculum finistrum pellitur, ex quo
7. In aortam projicitur, ex qua per totum corpus defertur.

Tota massa humorum, quæ 50. libris circiter æqualis est, spatio unius horæ *decies* circiter integrum circulum absolvit.

*Ufus* circulationis est, ut omnes partes

1. Vivant & calefiant.

2. Ut nutriantur.
3. Ut humores pro corpore necessarii secernantur.
4. Ut sanguis servetur fluidus & non putrescat.
5. Ut Chyli elaboratio in sanguinem fiat.

## A C T I O C O R D I S.

Cordis actio consistit in alterna *dilatatione* & *contractione* suarum auricularum & ventriculorum. Dilatatio cordis *diastole*, contractio ejus *sistole* dicitur. Cor *contrahitur* ope suarum fibrarum muscularium. *Causa disponens* ad contractionem, est summa cordis irritabilitas.

*Causa irritans* ad contractionem est 1. stimulus ab irruente sanguine venoso, & 2. influxus liquidi nervei per nervos cardiacos in fibras cordis.

Cor omni hora 4500. pulsat. Hinc

Cor intra 24 horas 108000ies alterne contrahitur, & relaxatur.

*Ufus* cordis est sanguinis receptio a venis, expulsio in arterias, & motus totius sanguinis.

## A C T I O A R T E R I A R U M.

Arteriæ ab impulso sanguine dilatantur & simul irritantur: atque ope fibrarum suarum muscularium iterum se contrahunt, & sic sanguinem usque in venas propellunt.

Dilatatio & contractio arteriæ *pulsus* dicitur. Hæc pulsatio in truncis & ramis manifesta est, in vasis capillaribus autem, absente inflammatione, pulsus nec percipi, nec microscopio videri potest.

*Ufus* arteriarum ergo est propulsio sanguinis in venas & in organa secretoria.

### A C T I O V E N A R U M.

Sanguis, qui cordis & arteriarum contractione in venas pulsus est, refluit per illas ad cordis auriculas, & ex his in cordis ventriculos.

*Vires*, quæ sanguinis *refluxum* in venis adjuvant, sunt.

1. *Sanguinis arteriosi & arteriarum pressio in sanguinem venosum.*
2. *Contractio musculorum.*
3. *Pressio atmosphæræ.*
4. *Respiratio.*

*Valvulæ* venarum regressum sanguinis venosi in venis impediunt.

*Ufus* venarum est reductio sanguinis & omnium humorum ad cor.

### R E S P I R A T I O.

Aeris ingressus in pulmones *inspiratio*, & ejus egressus *expiratio* vocatur.

*Respiratio* dividitur in *spontaneam*, quæ in somno atque insciis nobis peragitur, & in *voluntariam*, quæ voluntate hominis augeri vel minui potest.

*Potentia* quibus cavum thoracis & cavum aereum pulmonis, sub inspiratione dilatantur, sunt

1. *Musculorum intercostalium & diaphragmatis contractio*, quæ cavum thoracis dilatant.
2. *Aeris elastici pressio*, quæ pulmones expandit.

*Potentia* aerem e pulmonum cavo *expellentes* sunt

1. *Cessans actio* muscutorum intercostalium & diaphragmatis.
2. *Elasticitas cartilaginum costalium* remittente actione muscutorum intercostalium se restituens.
3. *Contractio muscutorum abdominalium.*

*Causa* ad inspirandum *excitans*, est aeris elementum in pulmonum cavum irruens & nervos eorum irritans. Sic per consensum nervi diaphragmatis & muscutorum intercostalium ad contractionem coguntur.

Aer autem inspiratus, suo elemento in pulmonibus privatus, ad stimulum ineptus evadit, hinc illico potentia inspirantes cessant, & contingit exspiratio.

*Effectus* inspirationis ergo est.

1. *Vasorum pulmonalium* serpentis adinstar contortorum explicatio.
2. Hinc *facilior transitus* sanguinis ex arteriis pulmonalibus in venas pulmonales & in cor.

*Vsus* primarius respirationis videtur esse *absorptio elementi* cujusdam *aerei*, ex inspirato aere, a quo principio absorpto, liquidi nervei compositio & caloris generatio, fieri videtur.

Principium quod ex aere absorbetur, est *aer igneus*, nam *aer fixus* ex inspirato aere atmosphaerico e pulmonibus redit.

*Utilitates* respirationis *secundariae* sunt

1. Chyli miscela cum sanguine.
2. Sanguinis attenuatio.

3. Sanguinis venosi, chyli, & lymphæ motus.
4. Materiæ perspirabilis expulsio ex pulmone.
5. Vox & loquela.
6. Deglutitio & suctio.
7. Olfactus.
8. Expulsio urinæ, fœcum, partus.

### CALOR CORPORIS HUMANI.

Corpus vivum calet, mortuum friget.

Calor hominis sani, juxta thermometrum *Fahrenheitianum* ad 94. aut ad 100. gradum ascendit.

Nec in fervidissima febre 109. gradum *thr. Fahr.* superat.

In embrione minor est calor, ætate crescit, in senio decrescit.


Motu animali calor intenditur, quiete torpet.

Evolutio phlogisti videtur *causa proxima* caloris esse.

*Materia caloris* est phlogiston aere igneo combinatum; aer igneus absorbetur pulmonibus.

Non solum attritu humorum & solidarum partium, sed multiplici modo materia calorifica extricari potest, ut fermentatione, putredine &c.

*Usus* caloris est, ut omnes humores attenuentur, a frigore non coagulentur, sed fluidi servantur.



## DE ACTIONIBUS ANIMALIBUS GENERATIM.

---

**A**CTIONES *animales* vocantur, quæ ope animæ peraguntur.

Huc pertinent.

1. *Sensus externi.*
2. ——— *interni.*
3. *Actio musculorum voluntaria.*
4. *Vox & loquela.*
5. *Vigilia & somnus.*

### A N I M A.

Est *ens*, quod intra nos cogitat & sentit.

Ens est incorporeum, incorruptibile & sui generis, oritur cum embrione, & deserit corpus momento, quo morimur.

*Sedes* animæ in medulla cerebri est, hæc sedes *Sensorium commune* vocatur.

Anima agit in corpus & corpus in animam

*Instrumenta*, quorum ope anima in corpus, & corpus in animam agit, sunt *nervi*.

*Nervi* dividuntur in 3. classes.

1. In *nervos motores*, qui musculis voluntariis prospiciunt.
2. ——— *sensorios*, qui organa sensoria formant.
3. ——— *vitales*, qui in cor & vasa abeunt.

Per nervos motorios agit anima in musculos voluntarios.

Per nervos sensorios agit corpus in animam.

In nervos autem vitales & eos, qui viscera naturalia adeunt, anima nullam habet vim. Id ganglia nervorum vitalium impedire videntur.

Sed *violentis animi affectibus* etiam ultra ganglia agere valent.

## DE SENSATIONE GENERATIM.

*Sensatio* est perceptio alicujus rei, quæ nervos sensorios afficit.

Præter *pulpam nervorum* nulla pars in nostro corpore sentit.

*Partes insensiles* sunt ideo, quæ nervos non habent ut *epidermis, ossa, Cartilagine, periosteum, tendines, aponevroses, ligamenta, dura mater, cortex cerebri, pleura, peritoneum, membrana adiposa.*

*Partes obtuse sentientes* sunt, quæ paucos nervos habent, ut *medulla ossium, glandulæ, vasa, viscera mere vasculosa, membrana cellulosa* in aliquibus locis.

*Partes acute sentientes*, quæ multos nervos habent, sunt *cutis, ventriculus, intestina, pulmonum superficies aerea, vesica, uterus, urethra, renes, & omnes muscoli.*

Anima simul plures, quam unam sensationem distinguere non potest, hinc sensatio major minorem obscurat: hinc duobus oculis unam imaginem, & duabus auribus unum percipimus sonum.

Anima licet in cerebro sedeat, tamen in *foto nervo* sentit.

Quomodo autem anima ope nervorum sentiat, & an in nervis sensoriis liquidum nerveum sub sensatione sursum, & sub motu muscutorum deorsum fluat, ignoratur.

Sensationes in *gratas*, in *ingratas* & in *adiaphoras* dividuntur.

*Usus*. Ope sensationum 1. sensus interni & externi peraguntur. 2. Animi pathemata excitantur. 3. Sensationes dolorosæ de periculo monent, ad medelam quærendam cogunt.

## DE SENSIBUS EXTERNIS GENERATIM.

Horum sensuum sunt 5.

1. *Tactus*.
2. *Gustus*.
3. *Olfactus*.
4. *Visus*.
5. *Auditus*.

### T A C T U S.

Est sensatio, quam anima percipit, si corpus aliquod cutem præcipue in digitorum apicibus afficit.

*Primarium* ergo *organum* tactus sunt *papillæ nerveæ*, quas cutis in apicibus digitorum habet.

*Cutis* dat nervis situm, *epidermis* nimiam sensationem moderatur, simulque ab exsiccatione aeris papillas defendit, & *ungues* apprimunt papillas objecto tangendo.

*Ufus.* Ope tactus corporum nos ambientium 1. Molitiem vel duritiem. 2. Calorem vel frigus. 3. Figuram. 4. Magnitudinem. 5. Distantiam. 6. Numerum. 7. Lævitatem vel asperitatem. 8. Pondus. 9. Motum vel quietem percipimus.

### G U S T U S.

Est sensatio, qua corporum saporum percipimus sapores.

*Organum primarium* saporis sunt *papillæ nerveæ*, quæ in apice & marginibus linguæ inveniuntur.

*Objectum* saporis sunt omnia corpora, quæ salem vel aliud principium acre, saliva solvendum continent.

*Genera* saporum sunt sapor falsus, acidus, lixiviosus, urinosus, dulcis, amarus, acris, terreus, metallicus, rancidus, hinc simplex vel compositus, gratus, vel ingratus vel insipidus.

*Diversitas* saporis a diversa irritatione salium pendet.

*Partes subsidiales* gustus sunt.

*Lingua*, quæ papillis nerveis aptum fitum dat, & sua mobilitate illas corporibus sapidis applicat.

*Epidermis* linguæ, quæ nimium saporem moderatur.

*Saliva & mucus oris*, quibus principium sapidum solvitur, corpora enim sapida non sapiunt, nisi soluta.

*Ufus* 1. Gratia saporis allicimur ad ingerendum cibum, & potum. 2. Gratia saporis noxia a salutaribus distinguimus. 3. Varia medicamenta noscimus.

## O L F A C T U S.

Est sensatio, qua corporum odores percipimus.

*Organum olfactus* sunt papillæ nervæ, quæ in membrana pituitaria narium distribuuntur.

*Objectum* odoratus sunt omnia corpora, e quibus principium volatile, inspiratione naribus attrahendum, exhalat.

Odorum genera sunt: aromaticus, urinosus, acidus, putridus, cadaverosus, stercoreus &c.

Adminicula odoratus sunt,

1. *Membrana pituitaria*, quæ aptum situm papillis nerveis dat.
2. *Inspiratio*, qua odores in nares attrahuntur.
3. *Piramidalis figura* narium, quæ odores concentrat, & retinet, ne in fauces avolent.
4. *Mucus* narium, quo papillæ nervæ molles servantur.

*Usus*. Olfactus recreat mentem, corrigit errores in gustu committendos, docet vim noxiam & medicatam.

## V I S U S.

Est sensatio, qua corpora nos ambientia & eorum qualitates visibiles percipimus.

*Organum visus* est membrana retina nervi optici.

*Objectum visus* sunt radii lucis, a corpore lucido, vel illuminato emanantes, & per bulbum oculi in retinam incidentes.

*Lux* est materia subtilissima & solidissima, quæ vel a sole, vel alio corpore lucido emanans, motu

rapidissimo, & in lineis rectis, quas *radios lucis* vocant, in nostros oculos defertur.

*Proprietates Lucis* sunt,

1. Radii corpora *opaca* non transeunt, sed ab illis *reflectuntur*.
2. ———— *pellucida* transeunt quidem, sed in transitu refringuntur.
3. Corpora *pellucida convexa* radios transmissos retro se in *focum*, seu in lineas convergentes, coadunant.
4. Corpora *pellucida concava*, radios transmissos retro se magis dispergunt, seu in lineas divergentes explicant.
5. Radii a corporibus coloratis reflexi in 7. radios coloratos diffiliunt.

*Visus* ergo fit dum,

1. Radii lucis, ab objecto visibili emanantes, in *corneam pellucidam & convexam* oculi incurrun, a cujus densitate & convexitate in focum adunantur.
2. *Focus* radiorum transit *humorem aqueum & pupillam iridis*, atque in lente *crystallina* magis adhuc concentratur.
3. *Focus* sic concentratus per *humorem vitreum*, vix mutatus, transit ad *retinam*, in qua
4. *Focus* imaginem objecti externi depingit, quæ menti per nervum opticum repræsentatur.

*Partes visus subsidiales* sunt,

1. *Supercilia & cilia*, quæ delabentem sudorem ab oculo derivant.

2. *Palpebræ*, quæ corneam a fordibus abstergunt, & nimiam lucem excludunt.
3. *Lachrymæ*, quæ corneæ pellucidatem conservant.
4. *Pupilla*, quæ in luce nimia constringitur, & in luce nimis pauca dilatatur.
4. *Choroideæ pigmentum nigrum*, quod focum visorium suffocat, ne ultra retinam pergat.
6. *Musculi bulbi*, qui bulbum objecto videndo obvertunt.

*Utilitates visus.* Hujus sensus beneficio videmus objectorum nos ambientium 1. Præsentiam. 2. Magnitudinem. 3. Figuram. 4. Colorem. 5. Distantiam. 6. Numerum. 7. Motum vel quietem. 8. Situm.

## A U D I T U S.

Est sensatio, qua sonum corporis sonori percipimus.

*Sonus* est motus tremulus aeris, a percussione corporis sonori excitatus; sine aere enim non audimus.

Sola corpora elastica *sonora* sunt, si a corpore sonoro percutiantur.

Sonus a puncto sonoro lineis rectis, quas *radios sonoros* vocant, ad enormem distantiam in atmosphæra propagatur.

*Radii lucis* citius tamen, quam radii sonori, atmosphæram percurrunt.

Corpora *mollia* sonum minuunt vel suffocant,  
 ——— *elastica* illum augment.

*Organum* auditus est nervus auditorius mollis, cujus pulpa in vestibulo, canalibus semicircularibus, & cochlea distribuitur.

*Auditus* ergo fit sequenti modo

1. Radii sonori a sonante corpore emanantes, ad auriculam appellantur. *Auricula* sua *elasticitate* sonum auget, & sua *figura eliptica* radios sonoros in *focum* quasi unit, qui per meatum auditorum externum ad membranam Tympani dirigitur, & hanc contremiscere facit.
2. *Tympanum* tremens suos tremores *malleo* sibi adnexo, *malleus incudi*, *incus ossi orbiculari*, hoc *stapedi* communicat. *Stapes fenestræ ovali* adhærens, hanc tremere cogit.
3. *Fenestra ovalis* tremens communicat suos tremores *aquæ auditoriæ* in vestibulo & canalibus semicircularibus contentæ.
4. *Aqua auditoria* leviter tremens minimas facit in *pulpa nervea*, quæ in vestibulo in canalibus semicircularibus expansa est, motiones; hæ per *liquidum nerveum* nervi auditorii ad *sensorium commune* cerebri deferuntur.

Præterea tympanum tremens non solum ossicula *auditus*, sed simul etiam aerem in cavitate tympani contentum contremiscere cogit, hinc

5. *Aer tympani* tremens, facit tremere laminam, quæ *fenestram rotundam cochleæ* obducit.
6. *Lamina fenestræ rotundæ* tremens, cogit tremere aquam, quæ *cochleæ* cavitatem replet.
7. *Aqua cochleæ* tremens, suo tremore afficit *pulpa* auditorii, quæ in cavitate *cochleæ* est.

Anima demum judicat de soni *præsentia* & ejus *diversitate*.

*Discrimina*

*Discrimina sonorum sunt sonus gravis, acutus, intensus, debilis, gratus, ingratus, harmonicus, disharmonicus,*

*Gravitas & acuties soni pendent a vibrationum numero eodem tempore dato.*

*Utilitas auditus.*

1. Loquelam, linguas & scientiam boni & mali solo auditu addiscimus.
2. Musica & cantu delectamur.
3. Strepitu de rebus, quas non videmus, mone-  
mur.
4. Auditu alius hominis ideas percipimus.

## DE SENSIBUS INTERNIS.

Sensus interni sunt *ideæ*, quas sibi anima format.

*Ideæ* autem sunt perceptiones rerum in mente.

Oriuntur *ideæ*.

1. a *Sensibus externis*.
2. a *Causa interna* sensorium commune afficiente.
3. vel sua sponte a *mente* excitatæ.

*Causa proxima* idearum videtur esse liquidi nervei *motus* in quodam sensorii communis loco.

Anima, non cerebrum cogitat.

Sunt autem sensuum internorum quinque

1. *Memoria* ideas jam olim habitas repræsentat.
2. *Imaginatio* objectum absens sistit præsens.
3. *Conscientia* nos attentos & conscios idearum & sensationum reddit.
4. *Animi pathemata* odium vel amorem, seu voluntatem aut noluntatem rei pariunt.

5. *Ratiocinium* plures inter se comparat ideas, ut similia a dissimilibus, vera a falsis, bona a malis discernat.

*Ufus.* Excellentia sensuum internorum homo a bruto differt.

## DE IRRITABILITATE.

*Irritabilitas* est vis, omni fibræ musculari innata, qua hæc a stimulo se contrahit.

*Causa* irritabilitatis non est nota, neque ab elasticitate, nec ab anima, nec a nervis solum pendet, sed fibris muscularibus infita est.

*Partes* nostri corporis, quæ fibras musculares habent, *irritabiles* vocantur, ut cor, arteriæ & venæ. Omnes muscoli, diaphragma, ventriculus & intestina. Vesica urinaria, uterus, vagina, viæ lacteæ.

*Partes*, quæ fibras musculares non habent, etiam irritabiles non sunt, ut nervi, integumenta communia, membranæ omnes non musculosæ.

Cor est pars irritabilissima, dein ventriculus & intestina, tandem diaphragma, & ceteri muscoli in scala irritabilitatis sequuntur.

Diversus est quoque irritabilitatis *gradus* quoad ætatem, sexum, temperamentum, vitæ genus, clima, statum sanitatis, idiosyncrasiam, & naturam animalis.

Etiam *stimulus* admodum differt, quoad partem, cui applicatur, & quoad indolem, quam habet.

*Usus irritabilitatis,*

1. Ab ea pendet motus omnium muscutorum voluntariorum & involuntariorum.
2. Actio cordis & vasorum.
3. Motus peristalticus ventriculi & intestinorum.

## A C T I O M U S C U L O R U M.

Actio musculi consistit in *contractione*, & *relaxatione* fibrarum carnearum.

Causa *disponens* ad motum, est irritabilitas fibrarum muscularium.

Causa *excitans* ad contractionem, est *influxus liquidi nervei* ab animæ voluntate impulsus.

Id musculi nervorum *irritatio* & nervi *ligatura* docent.

Cessat musculi contractio, si nerveus influxus, & animæ voluntas definit.

Tunc fibrarum contractarum *relaxatio* sequitur.

*Motus muscutorum* dividitur.

1. In *voluntarium*, quem animæ voluntas excitat, &
2. In *involuntarium*, in quem animæ vis agere non valet, ut in cor, vasa, ventriculum, & intestina.
3. In *mixtum*, qui cum & sine animæ voluntate peragitur, ut respiratio.

Muscutorum *voluntariorum* causa excitans est vis animæ.

———— *involuntariorum* causa excitans est stimulus peculiaris.

*Cor & vasa* ab influxu sanguinis. *Ventriculus & intestina* ab ingestis & a bile, *vesica urinaria* ab urina, *musculi inspiratorii* ab aere inspirato ad motum irritantur.

*Utilitates* motuum muscularium sunt,

1. Actio omnium membrorum, & partium mobilium totius corporis.
2. Locomotio corporis, ut ingressus.
3. Sanguinis venosi motus acceleratio.
4. Sanguinis, chylique attenuatio.
5. Humorū secretio multum adjuvatur.

## V O X.

*Vox* est sonus aeris ex rima laryngis erumpens.

*Objectum* vocis aer tremens ergo est: nam aer sub expiratione laryngem percutiens, hanc tremere, & hæc vicissim aerem tremere facit.

*Organum* vocis est larynx, præsertim ejus rima.

*Acuties & gravitas* vocis pendet a majori, vel minori diametro rimæ laryngeæ, vel ipsius laryngis amplitudine, elasticitate, mobilitate, lubricitate, & vi expirationis.

*Susurrus* est aer absque tremore ex larynge exiens.

*Utilitas* vocis est pro loquela, & cantu.

## L O Q U E L A.

*Loquela* est vox in cavo narium, faucium, oris vel labiorum varie flexa.

Omnis loquela consistit in pronuntiatione litterarum; hæc in vocales & consonantes distinguntur.

*Vocales* sunt litteræ, quæ voce unice per os expressa, absque linguæ adlisione ad ullam partem oris pronuntiantur.

*Consonantes* vero fiunt a linguæ adlisione ad aliquam partem oris, labia, dentesve.

Litteræ ergo distinguuntur in orales, nasales, gutturales, linguales, dentales, labiales, palatinas, & compositas, ut orenasales &c. sunt.

Species loquelæ est *cantus*, qui vox per varios gradus acutiei & gravitatis modulata, ex tremante & suspensa larynge, dicitur.

*Utilitas* loquelæ. Soli homini inter animalia loquela data est, ut

1. Homo homini suas ideas & sensationes communicare possit.
2. Ut homo artes necessarias, linguas, scientiasque addiscere, & eas alios homines docere possit.
3. Ut cantu se ipsum & alios recreare possit.

## VIGILIA.

Aptitudo, actiones animales, nempe sensus & motus voluntarios musculorum libere exercendi, *vigilia* vocatur.

*Causa proxima* vigiliæ est fluxus liquidi nervei abundantis, & facile meabilis per cerebri & nervorum medullam, qui ad organa sensuum & musculos voluntarios abeunt.

*Causæ remotæ* hujus influxus sunt irritatio quæcunque sensuum externorum vel internorum.

## S O M N U S.

Est status corporis, in quo ineptitudo exercendi sensus internos, externos & motus voluntarios adest.

*Causa proxima* somni ergo, est aliquantum deficiens vel lentior fluxus liquidi nervei per cerebri & nervorum medullam, qui ad organa sensuum & musculos voluntarios abeunt.

*Causæ remotæ* somnum *naturalem* inducentes, sunt vigiliæ protractæ, & labor, quibus liquidum nerveum exhalando multum consumitur. Et

Defectus *irritationis*, ut quies animi, & sensuum, præsertim in loco tenebricoso.

Renata per somnum copia liquidi nervei aut irritatio quæcunque, est causa naturalis redeuntis vigiliæ.

Phænomena *ingruentis somni* sunt; muscoli corpus erectum tenentes debiles evadunt, oculi palpebræ clauduntur, & maxilla inferior pendet, caput antrorsum nutat, oscitatio ingruit, objecta externa vix nos afficiunt. Denique turbantur ideæ, tandem desinunt, & somnus adest.

*Insomnia* sunt somni imperfecti status, in quo quædam sensorii communis pars irritari, hinc vigilare videtur.

Fortis idea; & irritatio ventriculi a cibis, stimulus alvi vel urinæ, situs minus opportunus insomnia faciunt, quæ in somno sano non observantur.

*Ratio* cur actio cordis, vasorum, respiratio & motus ventriculi, atque intestinorum tempore somni perpetuo pergant, est ingens harum partium ir-

ritabilitas, ingens gangliorum & nervorum copia, atque stimulorum perpetua actio in has partes.

*Utilitas somni.*

1. Quies *actionum animalium*, nempe sensuum & motuum voluntariorum.
2. Moderamen *actionum vitalium*, unde minor corporis destructio.
3. Perfectius exercitium *actionum naturalium*; ut digestionum, secretionum & nutritionis.
4. Renata per somnum copia liquidi nervei, quæ ad omnes actiones requiritur.

---

## DE ACTIONIBUS NATURALIBUS GENERATIM.

---

**A**CTIONES, quibus corpus nostrum conservatur, ne pereat, vocantur *naturales*. Huc referuntur.

### F A M E S.

Est sensatio assumendi cibos.

*Sedes* hujus sensationis est in ventriculo.

*Causa* videtur esse affricus rugarum ventriculi vacui & irritatio ventriculi vacui a succo gastrico.

*Effectus* diu toleratæ famis sunt acrimonia acerrima humorum, unde animi deliquia, dolores acer-

rimi ventriculi, oris fœtor, dentium vacillatio, convulsiones, febris acuta, deliria & rabies.

*Utilitas.* Cogit fames hominem ut alimenta ingerat.

### S I T I S.

Est sensatio assumendi potum.

*Sedes* hujus sensationis in faucibus vel in ventriculo esse videtur.

*Causa* est faucium *siccitas* vel *acrimonia* in ventriculo.

*Effectus* diu toleratæ fitis est humorum *spissitudo* & *acrimonia*.

*Usus.* Cogit ad ingerenda liquida, quibus humores diluuntur.

### M A S T I C A T I O.

Est ciborum comminutio inter dentes.

*Organum* hujus actionis sunt maxillæ dentatæ, lingua, buccæ & labia.

*Potentia* hoc organum moventes sunt,

1. *Musculi*, qui maxillam inferiorem a superiori deducunt, & iterum adducunt.
2. *Lingua*, quæ cibos dentibus perpetuo interponit.
3. *Buccæ & labia*, quæ impediunt ne cibi masticati extra dentes cadant.

*Effectus* masticationis sunt,

1. Ciborum *morsus*, *laceratio*, *comminutio*.
2. *Affusio salivæ*, quæ cibos diluit — resolvit — fermentationem excitat — cibos in bolum pro deglutitione compingit — humectando fauces sitim exstinguit.

3. *Admixtio muci oris & faucium*, qui cibos masticatos in bolum pro deglutitione conglutinat — viam pro deglutitione lubricat — aerem cum cibus intricatum in bolo retinet — oleosa cum aquosis miscet.
4. *Admixtio aeris atmosphærici*, qui sub masticatione cum cibus intricatus fermentationem adjuvat.

*Ufus.* Masticatio est incipiens *digestio* & actio necessaria ad deglutitionem & ad digestionem ciborum in ventriculo.

## D E G L U T I T I O.

Est boli masticati delatio ex oris cavo,

1. In cavum *faucium*.
2. Ex eo in *œsophagum*.
3. Ex *œsophago* in *ventriculum*.

*Potentia*, quæ bolum ex oris cavo in cavum faucium deprimunt, sunt

1. *Clausura maxillarum*, ne cibi ex oris cavo elabantur.
2. *Appressio linguæ ad palatum*, qua bolus, linguæ dorso incumbens, ad *cavum faucium* premittitur.
3. *Dilatatio pharyngis*, quæ bolo viam facit, ut illabi possit.

*Dilatatur* pharynx non solum suis musculis dilatatoriis, sed etiam, quia linguæ radix, os hyoides & larynx antrorsum & deorsum a suis musculis sub deglutitione trahuntur.

*Potentia*, quæ impediunt ne bolus deglutiendus e  
cavo faucium in *postica foramina narium* vel  
— *orificia tubarum Eustachiana-*  
*rum*, aut

— *rimam laryngis* illabatur, sunt

1. *Epiglottis*, quæ a bolo deglutiendo rimæ laryngis apprimitur.
2. *Musculi*, qui rimæ laryngeæ partem posteriorem contrahunt.
3. *Musculi*, qui *uvulam* & *velum pendulum* versus postica foramina narium elevant.
4. *Musculi*, qui orificia tubarum obturant.

Bolus in cavo pharyngis dilatata hærens, ex eo in *cavum œsophagi* defertur.

1. Proprio *pondere*, quo deorsum cadit.
2. *Vi premente pharyngis*, se contrahentis ab irritatione boli in ejus cavum illabentis.

Bolus e cavo œsophagi in *ventriculi cavum* premitur vi & actione fibrarum muscularium œsophagi.

Peracta deglutitione *cardia ventriculi* suis fibris se claudit.

Phænomena, quæ in *assumptione liquidorum* observantur, sunt sequentia,

1. Vas liquido plenum *labio inferiori* apprimitur, & caput retroflectitur.
2. *Labium superius* fluido imergitur, ut aer atmosphæræ ab oris cavo arceatur.
3. *Linguæ dorso* liquidum ex vase affunditur.
4. Liquidum, linguæ affusum, ab ea palato applicata retropremitur versus cavum faucium.

5. Fluidum in fauces pressum, in exstantem *epiglottidem* incurrens, in duos funditur rivulos, quorum singulus ad latera laryngis rimam præterfluens, in faucibus denuo confluens facile ruit in *œsophagum*, cujus actione in ventriculum deferitur.

*Ufus* deglutitionis est delatio ciborum in ventriculum pro digestionem.

### DIGESTIO CIBORUM IN VENTRICULO.

*Digestio* est ciborum mutatio in *chymum*, quæ cibus in ventriculo contingit.

*Instrumenta*, quæ cibos in chymum mutant, sunt 6.

1. *Calor humidus* ventriculi, qui cibos emollit, & macerat.
2. *Aer deglutitus* & qui cibus *intricatus* est, calore expansus particulas ciborum expandit, & massam ciborum rarefacit.
3. *Saliva* perpetuo deglutita, & *succus gastricus* ab arteriis exhalantibus ventriculi secretus, cibos perpetuo diluunt, emolliunt, solvunt.
4. *Mucus* oris deglutitus & *mucus* a glandulis ventriculi secretus oleosam ingestorum partem, cum aquosa parte succi gastrici & salivalis unit.
5. *Motus peristalticus ventriculi*, quo cibi perpetuo commiscentur, & moventur.
6. *Motus præli abdominalis*, quod diaphragma & muscoli abdominales formant, quo cibi perpetuo aliquantum conteruntur.

7. *Spontanea fermentatio ciborum*, quæ a saliva, succo gastrico, calore & aere excitatur.

Ex his ergo liquet digestionem seu mutationem ciborum in chymum peragi

1. *Trituratione.*
2. *Solutione.*
3. *Fermentatione.*

*Effectus* digestionis ergo est mutatio ciborum in *chymum* seu pulticulam fermentantem, gryseam, nauseosi odoris & saporis.

Hujus pulticulæ pars tenuior perpetuo ex ventriculo per pylorum in intestinum duodenum expellitur

1. *Suo pondere.*
2. *Motu peristaltico* se contrahentis ventriculi &
3. *Motu præli abdominalis.*

Pars autem crassior, indissolubilior diutius retinetur.

Cibi, qui his adminiculis mutari non possunt, sunt *indigestibiles*, ut tenaces membranæ, ossa, pulticulæ leguminosæ, & quorundam fructuum. Hæc immutata expelluntur.

*Ufus digestionis* est incepta mutatio ciborum in chylum.

## C H Y L I F I C A T I O.

Est mutatio chymi in chylum.

*Organum*, in quo chylicatio peragitur, sunt intestine tenuia.

*Causæ*, quæ chymum in *chylum* mutant, sunt

1. *Continua* contritio chymi ope motus peristaltici & antiperistaltici intestinorum & ope præli abdominalis.

2. *Copiosa chymi dilutio* per salivam, succum gastricum, succum entericum, & pancreaticum.
3. *Validius excitata fermentatio chylosa* per calorem intestinalem, aerem & affusos mox nominatos humores.
4. *Bilis cystica & hepatica* chymo affusa, qua oleum cum mucō ventriculi digestionē unitum, ex chymo extricatur, quod cum succis secretis unitum *chylum* constituit.

*Effectus* chylicationis sunt, ut chymi color, sapor, & odor mutetur in humorem album, subdulcem, acescentem & inodorum, lacti similem.

Chylicationo *citius* quam chymificatio peragitur, utrumque intra tres horas finitur.

*Usus* chylicationis est productio chyli.

## TRANSITUS CHYLI IN SANGUINEM.

Peracta chylicatione absorbetur chylus in vasa lactea, & pars chymi, quæ in chylum mutari non potest, sub nomine fecum in intestina crassa propellitur.

Pars autem humorum in primas vias secretorum sine chylo per *venas mesaraicas* ad hepar pergit.

*Vires* chylum in vasa lactea propellentes sunt,

1. *Vis absorbens* vasorum lacteorum.
2. — *adhærens* chyli ad oscula horum vasorum.
3. *Motus peristalticus* intestinorum, & *motus præli abdominalis*, quibus intestinorum interna superficies contrahitur, & chylo se immergit.

Maxima chyli *absorptio* in intestino jejuno & ileo contingit, pauca in duodeno & intestinis crassis.

*Iter chyli* ex intestinis est,

1. In *vasa lactea*, ex illis,
2. — *receptaculum chyli* & ex eo
3. Per *ductum thoracicum* in *venam subclaviam sinistram* cui guttatim influit.

*Vires chylum* moventes per *vias lacteas* sunt

1. *Pressio* vasorum lacteorum a contractione præli abdominalis.
2. *Pulsatio* arteriarum mesaraicarum vasis lacteis contiguarum.
3. *Contractilitas* valida venarum lactearum, & ductus thoracici; nec non *vis* premens a tergo propulsi chyli.
4. *Respirationis* organorum *motus*.

*Retrogressus* chyli versus intestina, vel in ductu thoracico impeditur.

1. A *valvulis* copiosis vasorum lacteorum & ductus thoracici.
2. A *diametro* vasorum lacteorum perpetuo *incre-scente*.
3. A *vi chyli a tergo* influentis.

Tempore, quo chylus absens est, humores in primas vias secreti transeunt vias chyliferas,

*Ingressus sanguinis* venæ subclaviæ in ductum thoracicum impeditur a valvula, quæ in ostio hujus ductus est.

*Mutationem chyli in itinere ad sanguinem faciunt.*

1. *Dilutio* major chyli a lymphâ vasorum lymphaticorum, quæ se ex toto fere corpore in receptaculum & ductum thoracicum evacuant.
2. *Imprægnatio* chyli cum gelatina nutriente, quam glandulæ mesaraicæ & vasa lymphatica admiscunt,
3. Hinc major *animalisatio* chyli, qua ejus cruditas, immutatur.

*Utilitates chyli.*

1. Ope chyli sanguini advehuntur *principia constitutiva*, ex quibus sanguis & reliqui humores atque partes solidæ constant. Nempe *plurima aqua, oleum, salia, gelatina, mucus, aer fixus* & pauca *terræ* portio.
2. Ope chyli recentis & acescentis ad sanguinem affusi putredo sanguinis & aliorum humorum arceatur.

## S A N G U I F I C A T I O,

*Est mutatio chyli in sanguinem.*

Chylus sanguini mixtus ad 12. horas suam naturam integre non deponit, sed intra hoc tempus cum sanguine 120<sup>ties</sup> per vasa pulmonum & totius corporis trajicitur.

*In hoc itinere.*

1. *Adeps* chyli partim in *cellulosam* deponitur, partim in *globulos rubros* mutari videtur.
2. *Gelatinosa* chyli pars in *serum* sanguinis abit.
3. *Aquosa* chyli pars sanguinem omnesque humores diluit.

4. *Terrea chyli pars* in nutrimentum ossium & partium solidarum consumitur.

*Sanguificatio* exigit, ut globuli chylosi, qui albi, leviores & majores globulis sanguineis sunt, fiant rubri, densiores, graviores & minores.

*Rubor* videtur fieri, si globuli chylosi cum terra martiali & alcali fixo in vasis rubris pulmonis & musculorum per longum attritum misceantur.

*Densitas major* globuli chylosi a longa & repetita *compressione* in vasis minimis oritur.

*Gravitas major* a densitate & admixta terra martiali est.

*Diminutio voluminis* ab *attritu* globulorum chyli & *compressione* eorum in vasis minimis pendere videtur.

*Ufus sanguificationis* est generatio sanguinis, qui vaporum sanguineorum impletioni, cordis & articularum irritationi, generando calori, secretioni humorum & vitalium actionum exercitio inservit.

## NUTRITIO INCREMENTUM ET DECREMENTUM CORPORIS.

*Nutritio* est *appositio* succi nutrititii ad loca detrita partium solidarum.

*Solidæ* nostri corporis partes per vitæ actiones perpetuo deteruntur, & *fluida* nostri corporis perpetuo ex corpore eliminantur.

*Causæ*, quæ *solida* deterunt, sunt.

1. *Motus* violentus *humorum* per *vasa majora & minora*, quo interna eorum superficies deteritur.

2. *Motus perpetuus musculorum*, qui telam cellulofam, & vafa perpetuo deterit.
3. *Motus perpetuus omnium viscerum.*
4. *Affricus vestimentorum & aeris corpus allambentis.*
5. Demum *pili & ungues* sæpius abfcinduntur.

Hifce caufis *elementa terrea* fibrarum & *gluten*, hæcce neceffens, destruitur, deteritur, liquidis præterfluentibus mifcetur & demum cum fuccis excrementitiis evacuatur.

*Caufæ*, quæ *fluida* cum solidis detritis diffipant & e corpore eliminant, funt.

1. *Transpiratio & fudor.*
2. *Urina.*
3. *Fæces alvinæ.*
4. *Sputum & narium mucus.*
5. *Menstrua*, fubinde & *femen*.

Hifce evacuationibus humores fuo vehiculo aqueo privantur, hinc craffi, putridi, & acres evadunt.

Hinc nifi quantitas & qualitas eorum, quæ quotidie amittuntur, per nutritionem quotidie reftituatur, brevi machina noftra *periret*, ut fames diu tolerata docet.

Partes autem, quæ amiffæ fuere, funt solidæ & fluidæ; hinc datur.

*Nutritio solidorum &*

*Nutritio fluidorum.*

*Nutritio seu reparatio fluidorum facile refarcitur.*

1. Pars chyli *butyracea* cum terra martiali unita *cruorem* constituit.
2. Pars *aquosa* chyli aqueum sanguinis & *seri* vehiculum format.
3. Pars vero *plastica* chyli, quæ maxime nutriens est, in *gelatinam* seri & lymphæ tranfit.
4. Pars denique *oleosa* in chylo superabundans, quæ cum terra martiali uniri non potest, in *te- lam cellulofam* secedit & *adipem* corporis auget vel restituit.
5. Cum chylus præterea *terram elementarem*, *aerem fixum* atque *salia* omnis generis contineat, hinc facile pro omnibus humoribus secretis adfert sanguinis massæ *principia constitutiva*.

*Reparatio autem fibrarum* exigit appositionem *detritæ terræ & glutinis elementaris*. Pars chyli *caseosa* ossibus reddit *terram* & chyli pars *oleosa* ope *aeris fixi* cum *aqua* conjungitur, & format *gluten fibrarum*.

*Succus nutritius* ergo partium solidarum videtur gluten, terra plus minus imprægnatum, esse. Pro ossibus valde terreus, pro partibus mollissimis vix terreus requiritur.

An succi nutritii terra & glutem vi attractionis in lacunes detritas attrahantur, vel an vi alia nutritio fiat non constat.

Cum omnes nostri corporis humores, solis excrementitiis, nempe *urina*, *materia transpirabili* & *fec-*

ce alvina exceptis, gelatina seu succo nutritio imprægnati sint, & fibris omnium partium interponantur, hinc patet omne punctum corporis succo nutritio esse perpetuo præditum.

Partes quædam, ut *ungues & pili* in radice per appositionem succi nutritii nutriuntur, quod nutritio per *protrusionem* vocatur.

### INCREMENTUM CORPORIS.

Quo homo suæ origini est propior, eo celerius incrementum accipit. Sic embrio ex invisibili molecula spatio 9. mensium ad pondus 8. librarum excrescit.

Post partum incrementum corporis durat ad annum 21. at perpetuo lentius fit. Fæminæ citius quam mares incrementi finem attingunt.

*Causæ*, quæ incrementum corporis in embrione & infante adeo accelerant, sunt:

1. Laxitas seu facilior extensibilitas omnium vasorum.
2. Plurimarum partium vasa nondum evoluta.
3. Majus cordis volumen & robur. Nec non cordis & arteriarum major irritabilitas.
4. Celerior & validior humorum motus.
5. Victus mollis, copiosus & nutriens. Hinc abundantia humorum gelatinosorum.
6. Ossium extrema adhuc cartilaginea & extensilia.

*Causæ*, quæ incremento finem imponunt, sunt.

1. Omnium vasorum evolutio.

2. Omnium vasorum nactum robur extensioni ulteriori resistens.
3. Crustarum cartilaginearum tanta extenuatio, ut ossibus amplius cedere nequeant.
4. Victus crassior, quo succus nutritius magis terreus in fibrarum interstitia deponitur. Hinc omnium fibrarum majus robur.
5. Cordis incrementum aliis partibus minus, & irritabilitas diminuta, hinc motus humorum minor & debilior.

Menses in fæminis celeriozem incrementi finem imponere videntur.

*Status incrementi* adesse dicitur, quando corpus neque increfcit, neque manifeste decrefcit.

Post annum 30. corporis *obefitas* nascitur in aliquibus hominibus, quæ ab adipis abundantia in telam cellulofam depofita oritur.

## DECREMENTUM CORPORIS.

*Causæ*, cur corpus in feneftute iterum decrefcant, funt

1. Omnes fibræ fenfim adeo fucco nutritio terreo indurantur, ut fenfim rigidæ & exsuccæ evadant.
2. Vafa minora a majoribus dilatatis compreffa, fenfim concrefcunt.
3. A plurimis vafis lacteis confolidatis minor chyli copia fanguinem ingreditur.
4. Humores ob imminutas excretiones, acres & terrei fiunt, hinc.
5. Omnes actiones naturales, quæ fuccum nutritium elaborant, depravantur.

Ex his ergo patet : cur corpus in juventute increseat ,  
in adulta ætate persistat , in senio decreseat ,  
nempe.

In *juventute* plus succi nutritii fibris interponitur,  
quam deperditum est , unde *corporis incrementum* ; in *senectute* minus , unde *corporis decrementum* ; in *vigore ætatis* tantum , quantum deperditum est , quotidie restituitur , unde *acme*,  
seu *status incrementi* observatur.

*Usus* nutritionis est ergo.

1. *conservatio* nostri corporis , quod deficiente nutritione exsuccum & detritum brevi periret.
2. Demum affusione novi chyli temperatur humorum alcaliscentia & putriditas , quæ ab inedia oritur.
3. Tandem incitatur & roboratur totum corpus , quod ex inedia languet.
4. In juventute nutritione copiosiore increscit corpus.

## SECRETIO HUMORUM.

Secretio est separatio seu secessus alicujus humoris a sanguine.

*Organa secretoria* sunt *extremitates arteriarum* & *pori laterales* vasorum.

Omnes secretiones ab arteriis peraguntur , sola *bilis* a vena , sed arteriosa facta , secernitur.

*Massa secretionis* per arterias fluens *sanguis* est , ab eo enim omnes humores secreti secernuntur.

Sanguis omnium humorum secretorum *principia constitutiva* continet, nempe *aquam, gelatinam, oleum, salem, terram.*

*Humores a sanguine secreti* dividuntur in 4. *Classes.*

1. *Humores aquosi* sunt, qui acore minerali non coagulantur, ut *materia perspirabilis, humor aqueus oculi, lachrymæ, saliva, succus pancreaticus & urina.*
2. *Humores gelatinosi* sunt humores tenues, qui acore minerali coagulantur, ut *vapor ventriculorum cerebri, pericardii, pleuræ, peritonei, tunicæ vaginalis testiculi, liquor amnii, articulationum, glandularum lymphaticarum, gastricus, entericus, uteri, lympa vasorum lymphaticorum, vaginalium nervearum, albumen ovi.*
3. *Humores mucosi* vocantur humores viscidi, qui ab acore minerali non coagulantur, sed solummodo in fila contrahuntur, huc pertinet *mucus viæ aeræ, faucium, primarum viarum, viæ urinaræ & vaginæ muliebris.*
4. *Humores pingues* vocantur humores, qui exsiccati ad ignem flammam concipiunt, ut *oleum membranæ adiposæ, bilis, cerumen aurium, medulla ossium, lac, vitellus ovi.*

*Causa proxima* secretionis. Constanti lege sunt vasa secretoria angustiora, quam arteriæ, e quibus hæc vasa oriuntur, & venæ in quas arteriæ desinunt, hinc omnes humores secreti, nec muco nec semine exceptis, sunt sanguine *tenuiores*, nempe statim post secretionem.

*Diversitas secretionis pendet a diversa indole humorum, qui organo secretorio adducuntur, & a diversa figura pororum & arteriarum secernentium. Ideo vasorum secernentium extremitates stellatæ, penicillatæ, tortuosæ &c. inveniuntur.*

*Organa succos secretos præparantia sunt.*

1. *Glandulæ folliculosæ*, in quibus succi secreti stagnando aliquantum spissiores evadunt, ut *mucus*, sebum *glandularum*.
2. *Receptacula*, quæ aliquamdiu humores secretos retinent, ut bilem vesicula felle, ut *semen* vesiculæ feminales.
3. *Vasa absorbentia horum receptaculorum*, quæ partem tenuiorem a liquidis contentis auferunt.
4. An non etiam *fermentatio peculiaris* in aliquibus saltem humeribus secretis in receptaculis contingit?

*Vis* humores secernendos e suis vasis secretoriis expellens, est humorum a tergo motorum impetus.

*Vis* humores jam secretos e suis receptaculis expellens, est.

1. *Contractio fibrarum muscularium receptaculi continentis*, ut in vesica urinaria & vesiculis feminalibus observatur.
2. *Musculi adjacentes*, sic saliva a musculis maxillarum, *semen* ab acceleratoribus, *bilis* a turgente ventriculo & *succus pancreaticus* a prælo abdominali expellitur.

3. *Stimulus* humoris secreti, qui sua abundantia, pondere vel acritate receptaculum ad contractionem irritat.

Hæc sufficiant de secretione *generatim*, de secretionem autem *singuli* cujuslibet humoris, vide *Doctrinam de humoribus*.

## EXCRETIO HUMORUM.

Est humorum eliminatio ex corpore.

*Humores excrementitii* sunt *materia perspirabilis, urina & fæces*.

His excretionibus natura se liberat ab humoribus nocituris & inutilibus.

## EXPULSIO FOECUM.

Est fæcis eliminatio ex ano.

*Fæx* est alimentorum, potulentorum & humorum in intestina confluentium pars, quæ in chylum mutari & osculis vasorum lacteorum aut venarum mesaraicarum absorberi non potuit.

Hæc massa in intestinis crassis *fætorem* peculiarem a fermentatione stercoracea contrahit. Propellitur motu peristaltico intestinatorum crassorum & motu musculorum abdominalium atque diaphragmatis in cavum intestini recti.

Intestinum rectum a mole, vel quod rarius acrimonia fæcis irritatum, *tenesmus* ad emittendas fæces excitat.

Hoc *stimulo* relaxant se sphincteres ani , simulque se contrahunt fibræ intestini recti ; sic fœx deorsum per apertum anum protruditur.

Expulsionem simul juvat contractio sphincteris interni & levatores ani, nec non prælum abdominale.

Sic fœx electuarii instar mollis ad 4 vel 5 uncias eliminatur, & per rotundam & arctam ani aperturam exiens, in *cylindrum* figuratur.

Simul ac omnis fœx dejecta est, cessat tenesmus & actio præli abdominalis.

Anus iterum contrahitur per suos sphincteres & levatores.

*Ufus.* Sic liberatur corpus a fœce, corpori nocitura, & putredine infectura, si non eliminaretur.

## SECRETIO URINÆ.

Est urinæ separatio a sanguine.

*Organum secernens* sunt extremitates arteriarum renalium, quæ in renum substantia in tubulos renales hiant.

Urina ex tubulis renalibus in papillas renales, ex iis in pelvim renalem, & ex eo per prætheres in vesicam urinariam guttatim defluit.

Urina aliquot horis retinetur in vesica per naturalem contractionem cervicis vesicæ.

Urina diu collecta, sua mole vel sua acrimonia tenesmum ad emittendum excitat. Hoc stimulo relaxatur cervix vesicæ & contrahitur tunica muscularis ejusdem, sic urina propellitur per urethram.

Expulsionem juvat contractio lenis muscutorum abdominalium & diaphragmatis. In Viris ultimæ guttæ urinæ projiciuntur ex urethra contractione muscutorum acceleratorum, qui urethram premunt.

*Mucus*, qui internam vesicæ & urethræ superficiem illinit, illam ab urinæ acrimonia defendit.

*Usus*. Mictio liberat sanguinem a superflua aqua, a salibus, detrita a solidis terra & corrupto oleo, aliisque inutilibus humoribus.

## T R A N S P I R A T I O.

Est vaporis insensibilis exhalatio.

Dividitur 1. in *transpirationem cutaneam*, quæ ex tota externa superficie corporis

2. ————— *pulmonalem*, quæ ex pulmonum superficie aerea

3. ————— *internam*, quæ in cava interna nostri corporis exhalat.

*Organa transpiratoria* sunt extremitates arteriarum in cutem, superficiem aeream pulmonum & in cava interna nostri corporis hiantium.

*Materia transpirabilis* cutanea & pulmonalis, aqua est, in vaporem resoluta, cum paucis oleo attenuato & sale volatili.

*Quantitas* materiæ perspirabilis tempore æstivo nostris in regionibus ad libras V. fere intra 24. horas æstimatur. Differt hæc tamen pro diversitate viæ, aeris, climatis, motus & quietis.

*Transpiratio interna* est vapor aqueus aliquantum gelatinosus.

*Usus.* *Transpiratio cutanea* sanguinem a superflua aqua & subtilioribus recrementis liberat, atque cutem perpetuo humectat, ne aere exsiccet.

*Transpiratio interna* facit, ut viscera in suis cavitatibus mollia maneant.

*Sudor* est adeo aucta transpiratio, ut vapor cutaneus evadat visibilis. Ex iisdem vasis ac transpiratio secernitur; eliminat ex sanguine non solum aquam sed etiam particulas salinas, terrestres, & oleosas.

## I N H A L A T I O.

Est absorptio vaporum, qui in cava nostri corporis exhalant, & eorum, quæ externæ superficiei corporis applicantur.

*Organa absorbentia* sunt

1. *Extremities venarum*, quæ in externam cutis superficiem & in superficies cavitatum internarum & viscerum hiant.
2. *Venæ lymphaticæ*, quæ ex his cavitatibus, & ex tela cellulosa ubique oriuntur.

*Materia absorpta* per venas absorbentes in massam sanguineam, per vasa autem lymphatica in ductum thoracicum vehitur.

*Usus.* Absorptio *interna* præcavet, ne hydrops in cavitatibus nostri corporis fiat, & lymphæ absorptæ diluit chylum in ductu thoracico. Absorptio au-

tem *cutanea* medicamenta cuti applicata & forsan *principium* nobis adhuc incognitum ex aere absorbet.

---

DE ACTIONIBUS SEXUALIBUS  
G E N E R A T I M.

---

Actiones, quæ propagationi hominis inserviunt sic dicuntur. Huc referuntur.

In *Viris*      *Excretio seminis.*

In *fæminis*    *Menstruatio.*

*Conceptus.*

*Evolutio embrionis.*

*Graviditas.*

*Partus.*

*Puerperium.*

*Usus.* Si homo speciem sui individui propagare non posset, tunc genus humanum unius solummodo ætatis fuisset,

EXCRETIO SEMINIS.

*Organa semen excernentia* sunt extremitates arteriarum spermaticarum, e quibus semen in vascula serpentina, quæ testis substantiam pulposam formant, deponitur.

Semen ex vasculis serpentinis testis in *epididymidem*, ex ea in *vas deferens* & ex eo in *vesiculas seminales* defertur.

Propellitur autem semen tum successione novi seminis,

tum contractione musculi cremasteris, qui funiculum spermaticum ambit.

Semen in vesiculis seminalibus collectum, sua mole vel stimulo ad sui emissionem organa genitalia incitat.

Sic venæ substantiarum cavernosarum penis *vi nervea* contrahuntur, ex hac contractione sanguis arteriosus in cellulas hujus substantiæ exire cogitur, inde penis intumescere, calere, rigere, & ad coitum prurire incipit.

Tandem pene penitus erecto contrahuntur vi convulsiva vesiculæ seminales, sic semen summa vi per ductus ejaculatorios in urethram, & ex urethra actione musculorum acceleratorum extra illam ad magnam distantiam projicitur.

Sub seminis projectione a summo erectionis gradu glandis membrana nervea violentam patitur extensionem, a qua *æstus venereus*, seu *libidinis sensatio* oritur.

Demum sub exitu seminis simul glandulæ *prostatæ* *sucus* cum semine mixtus simul ejicitur.

Sic sub *coitu* semen in uteri cavum projicitur. Ex quo pars volatilis seminis per tubas Fallopianas ad ovaria muliebria abire videtur.

*Emissio semine* remittit vis nervea, hinc detumescit penis, collabitur & toto in corpore sentitur languor.

*Usus.* Semen continet in se principium, quo embrio in ovulo materno delitescens vivificari & animari videtur.

## M E N S T R U A T I O.

Est sanguinis secretio ex utero, quæ fæminis omni mense contingere solet.

*Organa* sanguinem menstruum *secernencia* videntur esse extremitates arteriarum, quæ in fundo uteri sunt.

*Causa* hujus fluxus vel latet, vel topica uteri plethora est. Hæc ex uteri structura fieri videtur.

*Incipit* hæc evacuatio in nostris regionibus utplurimum ætatis anno 14. & *desinit* 49. vel 50.

Sanguinis menstrui indoles vix corrupta censerî potest, si fæmina sana & munda est.

Differt autem sanguinis menstrui *quantitas*, *periodus*, *duratio*, *initium* & *finis* atque *sumptomata*, quæ præcedunt, aut concomitantur, pro ætate, temperie, habitu corporis, climate, tempestate anni, victus ratione, exercitatione, aliisque.

*Usus.* Menstrua mulieres conceptioni & nutritioni fœtus idoneas reddunt.

## C O N C E P T U S.

*Coitus* est congressus viri cum fæmina, quo vir ope penis erecti & in fæminæ vaginam immissi semen suum in uteri cavum projicit.

In coitu eriguntur fæminis vi nervea nymphæ & clitoris; uterus sanguine turget, tubæ Fallopiæ rigent, ampliantur, fimbriis suis in orbem explicatis ovarium amplectuntur, & osculo suo ovarii vesiculæ eminentiori applicantur.

Fæminis in summo erectionis gradu cum maxima *voluptatis sensatione* profluit subito magna *muci* copia, qui autem falso pro semine muliebri habetur; hoc mucro excusso omnes partes cretæ detumescunt, solæ tubarum fimbriæ ovario per aliquot dies applicatæ manent.

Simul etiam in ovario *vesicula* præ aliis eminentior & maxime matura turget, tandem rumpitur, & ex ea elabatur ovulum, tunc adhuc inconspicuum, quod ab ostio tubæ excipitur, & motu peristaltico tubæ ad uteri cavum devolvitur.

Ovulum vivificatum sic in uterum defertur, ubi ulterius evolvitur & increfcit.

*Ufus.* Coitu fæcundo ergo ovulum vivificatur, & in uteri cavum defertur.

## EVOLUTIO EMBRIONIS.

Ovulum vivificatum & ex vesicula ovarii in uteri cavum delatum, videtur jam ex tribus membranis, liquore amnii, placenta, funiculo umbilicali & embione constare.

Omnes autem hæ partes adeo parvæ & pellucidæ sunt, ut primis diebus videri non possint.

Semen videtur corculum embrionis in motum incitare, sic illud sensim humores in aorta, & omnibus

vasis incipit movere, sic ex vena cava & pulmonali humor in cordis cava intrat, & *prima humorum circulatio* incipit.

Ovulum demum in uteri, conceptione clausi, humore primis diebus natans, suis poris hunc liquorem attrahit. Sic liquor amnii augetur & ovulum grandescit adeo, ut uteri cavum expleat.

Demum ovuli superficies externa cum interna uteri concrescit, ope texti fibrosi ex ovulo & utero evoluti. Plaga ovuli superior, quæ placentam continet cum uteri vasis concrescit, adeo ut vasa utriusque partis anastomosi jungantur.

Sic sanguis matris ex utero in placentam & ex ea per *venam umbilicalem* funiculi in embrionem influit, nutritioni autem embrionis ineptus, vel superfluous sanguis per *arterias umbilicales* embrionis iterum in placentam reducitur.

Hoc sanguinis itu & reditu omnia embrionis vasa elongantur, dilatantur, nutriuntur, & evolvuntur. Sic fœtus & omnes ejus partes perpetuo crescunt ad tempus partus usque.

Diversitas *faciei* embrionum in diversitate stimuli seminalis consistere videtur, at modus quo hoc fit ignoratur.

*Nutritio* embrioni tum per venam umbilicalem, tum per liquorem amni deglutitum advehitur.

*Excretio* embrionis. Toto tempore nec alvum nec urinam deponit, nec perspirat.

*Respi-*

*Respiratio* embrionis ; quamdiu utero inclusus est , non respirat , cum aere non fruatur.

*Circulatio sanguinis* in embrione. Sanguis venæ umbilicalis partim venæ portarum , partim canali venoso , qui ex vena portarum in venam cavam pergit , infunditur. A pulmonibus autem contractis , collapsis & otiosis sanguinis maxima pars per canalem arteriosum & foramen ovale avertitur ; minima pars pulmones transit. Pars demum sanguinis maxima per arterias umbilicales in placentam abducitur.

*Somnus & vigiliæ* embrionis. Perpetuus embrionis motus & causa somni in embrione absens , eum perpetuo vigilare suadent.

*Situs.* Embrio primis graviditatis mensibus capite sursum & facie antrorsum spectat , ultimis mensibus ob capitis auctum pondus capite deorsum & facie simul retrorsum se *vertit*.

*Externa* totius embrionis *superficies* smegmate pingui ex glandulis cutaneis excreto oblinitur. Quo mediante vim liquoris amnii macerantem eludit & facile vias partus transit.

*Cranium* embrionis futuras membranaceas habet & ossa ex pluribus portionibus constant , ut caput in partu facile comprimi & volumine diminui possit.

*Vita* embrionis in circulatione sanguinis consistit , hæc primo conceptionis momento contingit.

*Animatio* autem embrionis in consociatione mentis cum corpore consistit , hinc & hæc primo conce-

ptionis momento contingere debet; cum nulla vita *animalis* sine anima existere possit.

Pro diversa ovulorum maturorum multitudine uno ex coitu *gemelli*, *trimelli*, vel *quadrimelli* concipiuntur.

*Superfætatio* est impregnatio fæminæ jam gravidæ; hæc utplurimum utero duplici vel biloculari præfente contingere solet.

*Monstra* a præternaturali rudimento embrionis oriri videntur.

## GRAVIDITAS.

Mox a conceptu orificium uterinum se contrahit, atque humore admodum viscoso, obturatur.

Uterus inde quotidie major & gravior factus, descendit primo mense aliquantum in pelvim, cæteris autem mensibus aucto volumine ventrem fere totum occupat.

*Menstrua* emanent, *mammæ* aliquantum intumescunt, non raro vomunt gravidæ & alia incommoda patiuntur. Hæc a compressione viscerum, aucta irritabilitate corporis, retentis menstribus & stimulo embrionis oriuntur.

Tertio Mense *abdomen* supra ossa pubis intumescere incipit, omni mense ad 8vum usque magis ac magis. Quinto mense embrionis percipitur motus. Orificium uterinum perpetuo mollius & tenuius & brevius evadit, ultimo mense sacci carthacei adinstar explanatur.

*Crassities uteri* fere eadem manet. *Cartilagines pelvis* fiunt molliores, *vagina* muco abundat.

*Tempus graviditatis*, a natura definitum, spatium novem mensium solarium est, subinde plus minus differt.

*Ufus graviditatis* est, ut fœtus commode evolvi & maturescere, ut dein aeris injurias ferre possit, propriamque vivere vitam.

## P A R T U S.

Finito graviditatis spatio partus sequitur ex *causa* nondum penitus cognita.

*Phænomena*, quæ partum præcedunt, comitantur & eum sequuntur, sunt hæc

1. Aliquot ante partum dies sentit gravida leves lumborum *dolores*; venter aliquantum descendit, *orificium* fere abolitum, facci tenuis ad instar explanatum, tangitur declivius in pelvi locatum, & Gravida frequentius stimulatur ad mejendum, difficilius progreditur; effluit ex vagina humor viscosus.

Hæc sunt phænomena partum instare præsagentia.

2. Quum partus re vera incipit, doloribus circa lumbos afficitur parturiens, qui per intervalla validiores redeunt, uterum & abdomen contrahunt, orificium uterinum sensim plus & plus aperiunt, vesicam liquore aqueo plenam ex illo protrudunt, verticem fœtus in illo

liquore deorsum premunt, & parturientem ad validas inspirationes cogunt. Pulsus fit plenior & frequentior, facies rubet, & sudat, pudenda tument.

3. Hæc omnia sensim vehementiora evadunt, tandem parturiens contremiscit tota, maxime in genibus, humor viscosus e vulva promanans sanguineis striis tingitur, vehementissimum sentit tenesmum, quo sub doloribus spiritum validissime cohibet, totoque corpore utitur ad exprimenda uteri contenta, sic subito ex ruptis, quæ capiti præviæ sunt, membranis, projicitur liquoris amnii portio. Non diu post caput embrionis magis magisque a doloribus vehementissimis extra ostium vaginæ propellitur, quod tandem totus sequitur infans cum subsequente liquoris amnii parte restante.

4. Sic subito omnia phænomena cessant, reditque diu optata quies. Brevis autem hæc est, paulo enim post novis abortis doloribus expellitur *placenta* cum ovi membranis & *funiculo umbilicali*, qui adjutrice manu sub exitu attrahi potest. Exitum placentæ sanguinis sinceri fluxus per aliquot horas sequitur, qui dein serosus vel lacteus fit, & nomine *lochiorum* denotatur.

*Causa proxima*, quæ nono mense dolores excitat, nota non est, an extricatio fibrarum uteri &

summa extensio , an molimina menstrualia? an pondus fœtus?

Partes , quæ ad peragendum partum concurrunt in *activas* & *passivas* dividi possunt.

Partes *Activæ* sunt 1. *uterus* , qui vi muscolari fundum & corpus suum contrahit, sic orificium *dilatatur* & contenta uteri per orificium & *vaginam*, in qua nulla vis reprimens est, exprimuntur.

2. *Musculi abdominales & diaphragma*, quæ inflar præli se contrahunt, & omnia, quæ utero continentur validissime deorsum premunt, atque caput in pelvis aperturam pressum cunei adinflar acuminant.

Sic liquor amnii & fœtus partes sunt *passivæ*, hæ vero agunt in segmentum inferius ovi membranacei, quod in formam vesicæ liquore amnii plenæ ex orificio protrudunt, ac demum rumpunt.

Vesica liquoris amnii prævii & caput acuminatum fœtus dilatant magis & magis orificium uteri & *vaginam*; ex hujus dilatatione introrsum ducuntur *labia majora*, *coccyx* autem ab exeunte capite aliquantum reprimitur. Atque ne perinæum rumpatur, curvatura ossis sacri caput intra ossa pubis antrorsum ducitur.

## P U E R P E R I U M.

Fœtu excusso sensim cavitas uteri se fere tota contrahit ; hinc placenta & ei adhærentes membranæ ovi separantur, & expelluntur.

Fluunt *lochia* potissimum ex arteriis uteri in loco, cui placenta adhæserat, sensim vero & hæc vasa graviditate dilatata se contrahunt magis, uterus demum & abdomen & pelvis brevi tempore pristinam magnitudinem recipiunt, quamvis non plene.

Circa tertium a partu diem mammæ, sub finem graviditatis jam aliquantum tumentes, ab affluente lacte magis tumere, indurescere & dolere incipiunt, supervenitque *febricula* quam *lacteam* dicunt. Papillæ eriguntur.

A suctu infantis mammæ deplentur. Suctus infantis matri gratus est, incommoda tumidarum mammarum aufert & mala symptomata a lacte regurgitante timenda præcavet.

Post aliquot menses lactatio matri molesta fit, & infans firmiores & plures appetens cibos, mammas respuere incipit, & tunc est tempus infan-tem ab lactandi.

## H O M I N I S Æ T A T E S.

Hominis vita rarius ultra 70 annos durare solet. Hoc vitæ humanæ consuetum stadium in 7. dividitur *ætates*, quarum qualibet suam patitur metamorphosim.

I. *Embrionatus* est hominis ætas, quam in utero materno spatium 9. mensium vivit. Embrio, in sua origine muco est similis, in quo sensim linea alba, quam *carinam* MALPIGHII dicunt, & quæ systema cerebrinum esse videtur, atque punctum rubrum, *punctum saliens* nominatum, quod cor embrionis est, evolutum observatur. Hicce homuncio a tam exigua magnitudine intra 9. menses in 8. librarum molem excrescit.

II. *Infantia*, quæ a 1. ad 7. annum extenditur. *Phænomena prima* infantis mox in lucem editi, sunt sequentia; mox quum nascitur infans

1. *Respirat & clamat* ob aerem pulmones irriterantem.
2. *Clamore meconium* dejicit & *urinam*.
3. Mammis maternis admotus papillas inter labia comprimit & *lac* ex illis fugit.
4. Plurimum tempus *dormit*.
5. Oculos quidem aperit, at non *videt* ob tunicam pupillarem nondum penitus evanidam.
6. Neque *audit* ob auditorii meatus coarctationem, neque *olfacit* ob sinus pituitarios nondum formatos.

*Mutationes*, quæ in corpore infantis post partum contingunt, sunt,

1. *Funiculus umbilicalis* non procul a ventre ligatus, post aliquot dies ex ipso umbilico exsiccat, & cicatricem relinquit.

2. *Pulmones* in fœtu parvi, atro rubentes, solidi, in aqua fundum petentes, a respiratione evadunt leves, spongiosi, magni, aquæ innatantes, subalbidi & aere pleni.
3. *Canalis arteriosus Potali*, & *foramen ovale* in septo auricularum sensim concrescunt, cum sanguis facilius recta sursum in dilatatas & molles arterias pulmonales ruat.
4. Sic etiam in abdomine *vena umbilicalis* & *arteriæ umbilicales*, nec non *urachus* vesicæ sensim concrescunt, cum nullo perfluente humore distendantur.
5. *Hepar* in fœtu tumidum sensim minuitur, & sub costas se recipit. *Ventriculus* in longitudinem extenditur, *crassaque intestina* dilatantur, & *cæcum intestinum* a pondere fœcis nascitur.
6. *Ossa* prope sunt cartilaginea; apophyses vix formatae. Omnes ossium *epiphyses* & *apophyses* ab actione muscutorum sensim magis educuntur.
7. *Cor* irritabilius, & majus, vasis validius, unde pulsus celerior & frequentior infantibus. *Vasa* plurima in omnibus partibus.
8. *Cerebrum* & *nervi* majores unde *sensibilitas* & *irritabilitas* infantum major.
9. *Suturæ* & *fonticulus crânii* sensim coalescunt.
10. *Glandulæ* omnes majores, *humores* multi & gelatinosi sunt.
11. *Cutis* nitida, plana, lævis; multa pinguedo.

12. Sexto mense primi prodeunt *dentes*, qui in alveolis hucusque latitarunt. Tertio anno perfecta est *prima dentitio*.
13. Altero anno firmatis musculis solus *progredi* incipit, & initio tertii anni *loqui* valet & sensum informari.
14. Dentitione prima finita, ubera matris *respuit*, cibos molles *manducat*. Ridiculus & pro ætate *ingeniosus* evadit.
- III. *Pueritia* a 7. ad 14. annum durat. Septimo anno *dentes primarii* excidunt, ac sensum *secundarii* succedunt. Ciborum frequens desiderium, nugarum, motionis & garrulitatis amor ingens. *Humores* majori copia ad caput ruunt.
- IV. *Juventus*, quæ ab anno 14. ad annum 21. extenditur. *Puellis* post 14. annum *mammæ* fororiare, *sinus pudoris* aperiri & *catamenia* profluere incipiunt.

*Juveni* autem tempore pubertatis *vox* flebilis in graviolem mutatur, *lanugo* pubis proserpit, *semen* in testibus fecernitur, *igniculi* venerei sentiuntur & timido puero *audacia* juvenilis in mentem venit. *Ingenium* & *memoria* excellunt. Atque 21 anno uterque sexus in longitudinem *ex- crescere* definit. *Barba* erumpit in mento & axillis.

- V. *Adulta ætas* ab anno 21. ad 30. durat. Omnia membra evadunt perfectiora & firmiora. Nec

non dentes ultimi molares, quos *dentes sapientiae* dicunt, protruduntur. In sexu masculino anni nubiles adfunt, qui in sexu faemineo jam fine ætatis juvenilis aderant.

VI. *Virilitas*, quæ ab anno 30. ad 50. seu ad *canitiem* durat. Hoc vitæ stadio summum corporis & mentis robur adest. Multis *abdomen* anno 35. intumescere incipit. *Fæminis* anno 49. *catamenia* cessant & hæ *steriles* evadunt.

VII. *Senectus*. Ab anno 50. ad 60. incipit senescere homo, *Capilli* evadunt cani. *Visus* & *auditus* debilitatur. Nomina propria difficulter *memoria* retinentur. Languet *venus*. Multi senes anno 63. moriuntur.

VIII. *Decrepita ætas* ab anno 60. ad 70. & ultra. Hac ætate.

1. *Corpus* macrum, rigidum & curvatum evadit.
2. *Cutis* opaca, & præsertim circa frontem rugosa.
3. *Capilli* canescunt, & caput *calvum* fit.
4. *Genæ* pallidæ.
5. *Musculi* tenaces, duri & tendinei fere, *ligamenta* rigida, *ossa* fragilia, *cranium* in futuris consolidatum. *Cartilagines* & *tendines* ossescunt.
6. *Dentes* vacillantes, elevati & rari.
7. *Cor* proportionè minus, & debilius & minus irritabile. *Vasa* minora pauca, & majora dilatata.
8. *Cerebrum* & *nervi* ficci, hebetes & minus sensibiles.

9. *Oculi* planiores fiunt, hinc *Senum* presbyteria.
10. *Glandulæ, testiculi & ovaria* contabescunt.
11. *Actiones vitales* fiunt tardiores. *Pulsus* qui in infante intra minutum 130. ultimo vix 50. sunt. *Calor* decrescit.
12. *Actiones animales.* *Vires musculares* diminutæ & rigidæ. *Artus* tremuli, *genua* titubant, *pedes* sæpe in obvia offendunt. *Sensus externi* hebetes, *interni* minuti. *Memoria* debilis. *Mens* obliviosa.
13. *Actiones naturales.* *Appetitus* vix ullus. *Digestio* tarda, ob pauciora vasa lactea parvus chylus transit in sanguinem, hinc nutritio exigua, *secretiones* omnes diminutæ. Hinc *decrementum* corporis, *marasmus* senilis, *humores* pauci, acres, atque terrej.
14. *Actiones sexuales* penitus cessant. *Mas* semen non amplius conficit, nec erigit. *Fæminæ* nec menstruant, & steriles sunt.

## M O R S.

*Naturalis mortalitas* hominum est, ut generatim unus ex 36. omni anno moriatur.

*Præternaturalis* autem mortalitas quoad ætatem, sexum, clima, morbos, & quasdam res accidentales admodum differt.

*Causa proxima* mortis *naturalis* est sensim ingruens fibrarum rigiditas, qua cordis irritabilitas, & sanguinis motus sensim cessat.

*Anima* tunc suum corpus deferit, ac eo abîr, quo  
DEUS jussit.

*Signa mortis.* Cordis & arteriarum pulsus, atque  
respiratio absunt, sensilitas & irritabilitas par-  
tium omnium adeo perit, ut nulla arte revocari  
possint; frigus & tandem rigor totius corporis  
ingruit. Paulo post peculiaris fœtor ex cadavere  
exhalat.

*Fata cadaveris.* Mortui hominis cadaver sepulturæ  
traditur, in hac per putredinem in sua, quibus  
constat principia, solvitur.

Partes humidæ brevi avolant, aut humo se admi-  
scent, ossa autem, quæ difficilior suo glutinæ  
privantur, tardius dilabuntur.

F I N I S

P A R T I S P R I M Æ.

P A T H O L O G I A

C H I R U R G I C A

*S E U*

D O C T R I N A G E N E R A L I S

*D E*

M O R B I S C H I R U R G I C I S.

PATRICIA

CHURCH

DOCTRINE

CHRISTIANITY

JOSEPHI JACOBI PLENCK,

*CHIRURGIÆ Doctoris, nec non Chirurgiæ, Anatomes, atque Artis obstetriciæ Professoris Cæsareo-Regii, publici ac ordinarii in Cæsareo-Regia Univer-  
sitate Budensi.*

COMPENDIUM  
INSTITUTIONUM  
CHIRURGICARUM.

P R O

TIRONIBUS CHIRURGIÆ.

P A R S S E C U N D A.

— — — — —  
EDITIO SECUNDA, AUCTA, EMENDATA.  
— — — — —



V I E N N Æ,  
APUD RUDOLPHUM GRÆFFER, 1780.

JOHN W. PIERCE

JOHN W. PIERCE, JR.  
JOHN W. PIERCE, JR.  
JOHN W. PIERCE, JR.


COMPTON  
INSTITUTION  
OF THE

THE COMPTON  
INSTITUTION  
OF THE

THE COMPTON  
INSTITUTION  
OF THE



JOHN W. PIERCE  
JOHN W. PIERCE  
JOHN W. PIERCE

  
**C O N S P E C T U S**  
**P A T H O L O G I Æ C H I R U R G I C Æ.**

**D**E Pathologia generatim.

**N O S O L O G I A.**

De Nosologia generatim.

*Morbi simplices partium solidarum.*

Morbi cohæſionis.

——— elasticitatis.

——— irritabilitatis.

——— ſenſitivitatis.

*Morbi organici partium solidarum.*

Morbi numeri.

——— diametri.

——— magnitudinis.

——— figuræ.

——— fitus.

——— nexus.

——— continuitatis.

——— conſiſtentix.

——— ſubſtantix.

——— coloris.

——— caloris.

——— planitiei.

——— gravitatis.

*Morbi partium fluidarum.*

Morbi quantitatis.

——— cohærentix.

Morbi acritatis.

——— degenerationis.

——— miscellæ.

——— erroris loci.

——— retentionis.

——— excretionis.

——— secretionis.

——— motus.

De Divisione & differentia morborum generatim.

### Æ T I O L O G I A.

De causis morborum generatim.

Causæ proximæ morborum.

——— excitantes.

——— prædisponentes.

### S Y M P T O M A T O L O G I A.

De symptomatibus generatim.

Symptomata externa.

——— interna.

### S E M I O T I C A.

De signis morborum generatim.

Diagnos.

Anamnesis.

Prognosis.

### T H E R A P I A.

De curatione morborum generatim.

——— speciatim.

Hygiene.

Pharmaceutica.

Chirurgia.



D E

# PATHOLOGIA CHIRURGICA

## G E N E R A T I M.

---

*P*ATHOLOGIA chirurgica est scientia, quæ doctrinam de morbis externis tradit.

Dividitur in *generalem*, quæ morbos generatim, &  
— *specialem*, quæ singulos morbos speciatim considerat.

Pathologia generalis in V. discernitur partes.

1. *Nosologia*, de morborum nomine, divisione & differentia.
2. *Ætiologia* de causis morborum.
3. *Symptomatology* de symptomatibus morborum.
4. *Semiotica* de signis morborum.
5. *Therapia* de curatione morborum agit.

Therapia iterum in 3. partes subdividitur.

1. *Hygiene* victu & regimine rerum naturalium.
2. *Pharmaceutica*, medicamentis.
3. *Chirurgia* manu & instrumenti morbos curare docet.

---

## N O S O L O G I A.

---

**N**OSOLOGIA est scientia, quæ morborum denominationem, differentias, & divisiones tradit.

*Morbus externus* est præternaturalis alicujus partis constitutio.

Morbi suas *denominationes* vel a sua indole, aut suo primario symptomate, aut a sua causa proxima habent.

*Primaria* morborum divisio est,

1. in morbos *simplices partium solidarum.*
2. ————— *organicos* —————
3. ————— *partium fluidarum.*

---

## MORBI SIMPLICES PARTIUM SOLIDARUM.

---

**S**UNT præternaturales *virium*, quas fibræ nostri corporis exercent, constitutiones.

Primariæ nostrarum partium vires sunt,

1. *Cohæfio.*
2. *Elasticitas.*
3. *Irritabilitas.*
4. *Sensitivitas.*

## MORBI COHÆSIONIS.

Cohæfio elementorum, quæ fibram constituunt, tribus modis peccare potest.

1. Cohæfione *deficiente*.

2. ————— *excedente*.

3. ————— *soluta*.

Cohæfio elementorum fibrilium nimis parva, seu deficiens in partibus *mollibus* dicitur *laxitas fibrarum*, in *ossibus* autem *mollities*.

Cohæfio elementorum fibrilium nimis magna, seu excedens in partibus *mollibus* vocatur *rigiditas fibrarum*, in *ossibus* autem *fragilitas*.

Cohæfio fibrarum soluta, in partibus mollibus *tabum*, in ossibus *pulverem* constituit.

## MORBI ELASTICITATIS.

Elasticitas partium elasticarum *excessu*, vel *defectu* peccat.

Elasticitatis excessus *æstuat* *fibrarum*.

Elasticitatis defectus *inertia fibrarum* dicitur.

## MORBI IRRITABILITATIS.

Irritabilitas fibrarum muscularium *excessu* vel *defectu*, aut *motu* vel *immobilitate* peccare potest.

Irritabilitas excedens; *mobilitas fibrarum muscularium nimia*.


Irritabilitas deficiens; *torpor fibrarum muscularium* dicitur.

Contractio fibræ muscularis præternaturalis; *spasmus*,

Immobilitas fibræ muscularis præternaturalis; *paralyfis fibræ* vocatur.

## MORBI SENSITIVITATIS.

Sensitivitas excedens, *sensatio ingrata* vel *dolor*  
 ———— deficiens, *insensibilitas* vel *anodynia* dicitur.



## MORBI ORGANICI PARTIUM SOLIDARUM.

SUNT præternaturales *qualitatum visibilium* constitutiones in partibus solidis nostri corporis.

Qualitates visibiles organorum nostri corporis sunt.  
*Numerus, diameter, magnitudo, figura, situs,*  
*nexus, continuïtas, consistentia, substantia,*  
*color, calor, planities, gravitas.*

### MORBI NUMERI.

Numerus alicujus partis vel *excessu* vel *defectu* peccat.  
*Numerus excedit*, si 6. digiti, vel 3. testiculi,  
 duplex penis, vel duo capita adfint.

*Numerus deficit*, si digitus, crus, brachium, penis, vel nasus deest.

### MORBI DIAMETRI.

Vasorum & reliquarum partium continentium *diameter excessu* vel *defectu amplitudinis* peccat.

Diameter partium continentium auctus, *amplitudo morbofa*.

Diameter partium continentium diminutus aut abolitus, *angustia morbosa* dicitur.

Morbosæ *amplitudinis* sunt 7. species.

1. *Eurisma* seu præternaturalis vasorum, aliorumque cavorum *dilatatio*. Ut in *anevrismate* vero, *varicibus* & *ascite* observatur.
2. *Phlogosis* seu præternaturalis vasorum sanguiferorum, vel decolorium *dilatatio*, quæ ruborem & calorem inducit, ut in omni *inflammatione* & *erythemate* videri potest.
3. *Anastomosis* seu præternaturalis orificiorum vel ostiorum *dilatatio*, qualis videre est in quibusdam *hæmorrhagiis*, & in annulis *herniarum inguinalium*.
4. *Diapedesis* seu præternaturalis pororum in lateribus vasorum vel cavorum *dilatatio*, quæ textilis adinstar transsudare finit, quos continere deberet humores. Talis *transsudatio* in omni valida *inflammatione* & in valde distentis cavis contingit.
5. *Diæresis* seu *vulnus* vasorum aut cavorum, ut vulnus vasorum vel cavitatum cranii, thoracis, abdominis.
6. *Rixis* seu *ruptura* vasorum, aut cavorum. Ut ruptura *umbilici* in *ascite*, *ligamentorum capsularium* in luxatione, *venarum* in varicibus, *arteriæ* in aneurismate.
7. *Diabrosis* seu cavi alicujus *erosio* ab *acrimonia*, *caustico* vel *ulcere*.

Morbosæ *angustiæ* sunt etiam 7. species.

1. *Emphraxis* seu vasorum aut meatuum *obstructio* ab humore extremitatem arteriæ vel meatus permeare non potente.
2. *Stenochoria* seu viarum *obstipatio* ab intumescente pariete, qui cavum format. Sic intumescencia internæ membranæ stenochoriam parit œsophagi, urethræ vel vaginæ.
3. *Thlipsis* seu vasis aut cavitatis compressio a causa extra illam fita. Sic scirrhus subaxillaris arteriam brachialem comprimendo *ariduram* brachii facit.
4. *Contractilitas cavitatis* seu præternaturalis alicujus vasis vel meatus *contractio a vi contractili spontanea*. Sic urethra sensim contracta *ischuriam* causat.
5. *Sinizesis* seu præternaturalis vasorum aut meatuum *collapsus* vel *subsidentia*. Sic vasa umbilicalia post partum collabuntur.
6. *Symphisis* seu præternaturalis vasorum aut meatuum *coalitus* vel *concretio*, ut in vasis & aliis meatibus in senio contingit.
7. *Angustia aperturæ*, est ostii nimis exigua *amplitudo*, ut in phymosi præputii, vel arctura intestini recti videre est.

## MORBI MAGNITUDINIS.

Partium magnitudo *excedere* vel *deficere* potest.

Magnitudo aucta alicujus partis, *tumor* vocatur.

Huc ergo omnes tumores tum *frigidi*, tum *calidi* referuntur.

Magnitudo diminuta alicujus partis, *macritudo* dicitur. Ut *aridura* brachii vel cruris.

### M O R B I F I G U R Æ.

Figura alicujus partis *dimensione*, *crassitie* vel *forma* peccare potest.

Dimensionis excessus *longitudo*, ut caput oblongatum.

Dimensionis defectus *parvitas*, ut capitis parvitas.

Crassitie excessus *crassitudo*, ut collum crassum.

—— defectus *gracilitas*, ut crura gracilia.

Recessus a forma *deformitas* partis vocatur, ut collum obstipum, gibbus spinæ dorsi, crura valga.

### M O R B I S I T U S.

Situs alicujus partis *loco*, *dimotione* & *directione* peccare potest.

Situs in loco alieno *error loci* dicitur, ut dens e palato excrescens, vulva sub umbilico.

Situs partis e sua sede dimotæ vocatur *ectopia*. Huc omnes herniæ, prolapsus, luxationes & diastases ossium referri debent.

Situs e sua directione divergens dicitur *obliquitas*, ut obliquitas uteri, dentis, capitis.

### M O R B I N E X U S.

Nexus alicujus partis vel nimis *debilis* vel nimis *fortis* est.

*Nexus* nimis *debilis* in præternaturali mobilitate articuli.

*Nexus nimis fortis in præternaturali immobilitate articuli seu in anchylofi observatur.*

### MORBI CONTINUITATIS.

Continuitas partis vel *solutione continui* vel *continuitate soluti* peccat.

*Solutio continui* præternaturalis est in partibus mollibus, *vulnus*, *ulcus*, *labium leporinum*, in partibus duris, *fractura*, *caries*, *fissura*.

*Continuitas* præternaturalis in parte, quæ soluta esse deberet, est *concretio ani*, *vulvæ*, *articuli*.

### MORBI CONSISTENTIÆ.

Consistentia partis vel nimia *mollitie*, vel nimia *duritie* peccare potest.

*Consistentia* nimis *mollis*, est in *œdemate*, *abscessu*, *gangræna*.

*Consistentia* nimis *dura*, est in tumoribus *induratis* & *osseis*.

### MORBI SUBSTANTIÆ.

Substantia naturalis alicujus partis ex naturali in præternaturalem mutari potest.

Substantia partium mollium in *cartilagineam*, *osseam*, *terream*, *cavernosam*, *callosam*, *fungosam*, *steatomatosam*, *scirrhosam*, *putridam*, & dura ossium substantia in *fungosam* seu *carneam* mutata huc pertinet.

### MORBI COLORIS.

Color naturalis alicujus partis vel *defectu* vel *alienatione* peccat.

Coloris naturalis defectus observatur in *pallore vulneris* vel *ulceris* vel *aliarum partium*.

Coloris naturalis alienatio, est color ruber in *inflammatione*, lividus in *gangræna* & *ecchymosi*, niger in *necrosi* & *carie*.

### M O R B I C A L O R I S.

Calor naturalis alicujus partis *excessu* vel *defectu* peccare potest.

Caloris excessus in *inflammationibus*.

—— defectus in *sphacelo* adest.

### M O R B I P L A N I T I E I.

Superficies alicujus partis *glabritie* vel *scabritie* peccare potest.

*Glabrities* morbosa est in *calvitie*.

*Scabrities* *superficie*i nascitur a *pustulis*, *vesiculis*, *papulis*, *squamis*.

### M O R B I G R A V I T A T I S.

Gravitas naturalis alicujus partis *excessu* vel *defectu* peccat.

*Gravitas* *major* in parte *inflammata* & *indurata*,

—— *minor* in *emphysemate* totius corporis percipitur, hinc *cadavera putrida aquæ innatant*.



## M O R B I P A R T I U M F L U I D A R U M.

---

**H**UMORES nostri corporis peccare possunt.

1. *Quantitate.*
2. *Cohærentia.*
3. *Acritate.*
4. *Degeneratione.*
5. *Miscella.*
6. *Errore loci.*
7. *Retentione.*
8. *Excretionē.*
9. *Secretione.*
10. *Motu.*

### M O R B I Q U A N T I T A T I S.

Quantitas sanguinis *excessu* vel *defectu* peccare potest.

*Excessus Plethora*, defectus *Keneangia* dicitur.

*Plethora* seu boni sanguinis abundantia dividitur,

1. in *universalem*, quando sanguis in toto corpore, & in *partialem*, quando in una solummodo parte abundat.
2. in *veram*, quando veri sanguinis abundantia, in *spuriam*, quando solummodo sanguinis expansio, quæ *rarefactio* dicitur, adest.

*Keneangia* seu boni sanguinis defectus, etiam *universalis* vel *partialis* esse potest.

## MORBI COHÆRENTIÆ.

Cohærentia principiorum, quæ humores constituunt, *excessu vel defectu*, vel *secessu* peccat. Cohærentiæ excessus *spissitudo*; cohærentiæ defectus *Tenuitas* vocatur.

Spissitudo humorum est duplex.

1. Spissitudo *simplex*, quæ ex solo aquæ defectu nascitur.
2. Spissitudo *composita*, quæ vel *glutinosa*, vel *inflammatoria* vel *atrabilaria* vel *coagulata* vel *venerea* est.

Tenuitas humorum est etiam duplex.

1. Tenuitas *simplex*, quæ, a solius aquæ abundantia pendet, &.
2. Tenuitas *composita*, quæ acrimoniam sibi junctam habet.

*Secessus* sunt nimis faciles particularum a particulis cum quibus cohærere deberent, secessiones. Sic si a communi massa cruoris, sola *aqua*, vel *sal*, vel *oleum*, vel *mucus*, vel *terra*, vel *gelatina* facile secedit, variæ oriuntur *discrasie* humorum & tumores a secessu.

## MORBI ACRITATIS.

*Acritates* sunt humorum imprægnationes cum principio quodam irritante.

*Acritates* humorum in *vulgares* & *specificas* dividuntur.

*Acrimoniæ vulgares sunt,*

1. *Acrimonia acida*, seu falis acidi abudantia in humoribus.
2. ——— *alcalina*, seu falis alcalini volatilis abundantia.
3. ——— *ammoniaca*, seu falis, qui nostris humoribus natus inest, abundantia in humoribus.
4. ——— *muriatica*, seu falis culinaris abundantia.

*Acrimoniæ specificæ sunt*

1. *Acrimoniæ morborum chronicorum* ut  
*Acrimonia venerea, scorbutia, arthritica, podagrica, rheumatica, scrophulosa, scirrhusa, cancrosa, ulcerosa, cariosa, scabiosa, tineosa, leprosa, elephantiaca, herpetica, plicosa.*
2. *Acrimoniæ morborum acutorum* ut  
*Acrimonia variolosa, morbillosa, miliaris, scarlatina, erysipelacea, petechialis, pestilentialis, carbunculosa, gangrænosa, putrida, febris intermittens, vel continuæ.*

## MORBI DEGENERATIONIS.

Humorum spontaneæ mutationes ex naturali in morbosam indolem, huc referuntur.

Hæ degeneraciones vel in *primis viis* vel in *humoribus* ipsis contingunt; in primis viis *saburræ*, in humoribus *cacochymia* vel *cachexia* vocantur, huc pertinent.

1. *Rancescentia* seu olei degeneratio in humorem acrem, qualis in butyro corrupto percipitur.
2. *Putrescentia*, seu sanguinis & humorum gelatinosorum degeneratio in humorem tenuem & fœtidum qualis in cadavere observatur.
3. *Purulescentia* seu humoris gelatinosi degeneratio in *pus* seu in humorem blandum & albicantem, qualis in vulneribus invenitur. Pus autem dividitur.

1. in *pus bonum*, quod saporem blandum, odorem nullum, consistentiam cremoris lactei, colorem stramineum, gravitatem aqua majorem habet, ad ignem flagrat, & ex prægressa inflammatione vel vulnere vel ulcere oritur.

2. in *pus malum*, quod tenue, fœtidum, acre & viridescens, nigrescens, aut fuscum est. Hoc pus etiam *sanies* vel *ichor* dicitur.

3. in *pus spurium*, quod mucus flavus est, qui sine prægressa inflammatione, vel vulnere oritur & non flagrat. In *corryza*, *gonorrhœa*, *fistula lachrymali spuria* & *fluore albo* hic mucus puriformis sæpe observari potest.

*Pyogenia* seu puris generatio adhuc obscura est; feri *gelatina* in vulnere, ulcere vel in tumore inflammatorio e vasis inflammatis transsudans & cum oleo membranæ adiposæ mixta, videtur materiam puris constituere. Pus *spurium* sine oleo est, hinc non flagrat.

4. *Crusta inflammatoria* est gelatinæ sanguinis vel feri degeneratio in humorem albicantem &

tenacem, qui superficiem sanguinis, e vena missi in morbis inflammatoriis tegere solet.

5. *Cancrescentia* est degeneratio materiæ scirrhosæ in specificam acrimoniam, qualis in cancro observatur.
6. *Acrefcentia bilis*, est bilis peculiaris degeneratio, quæ multum cum rancescentia convenit.
7. *Atra bilis*, quæ in melancholicis & maniacis observatur.
8. *Acrimonia materiæ perspirabilis*, quæ ex hujus liquidi retentione.
9. *Acrimonia urinæ*, quæ ex diuturna urinæ retentione.
10. *Acrimonia stercoracea*, quæ a diu retentis fæcibus intestinalibus nascitur. Et
11. *Acrimonia ulcerum*, quæ ex ulceris superficie resorpta, humoribus communicatur.
12. *Saburra primarum viarum*; hæc degeneratio est multiplex; *acida*, *putrida*, *biliosa*, *rancida*, *glutinosa*, *salina*, *cruda*, *aromatica*, *acerba*, *terrea*, *flatulenta*, *venenata*, *verminosa*.
13. *Degeneratio liquorum in materiam melli*, *pulvi*, *sevo*, *cartilagini*, *ossi*, *terræ similem*.

### MORBI MISCELLÆ.

Sunt malæ humorum mixtiones, quoad principia constitutiva humorum. Huc ergo pertinent sequentes *diatheses* & *discrasie* humorum.

1. *Aquositas* si aqua ut in hydrope.
2. *Oleositas* si oleum, ut in obesitate.

3. *Chy-*

3. *Chylositas*, si lac, ut in puerperis.
4. *Cruoritas*, si globuli rubri ut, in temperie sanguinea.
5. *Glutinositas*, si gluten, ut in temperie pituitosa.
6. *Gelatinositas*, si gelatina, ut in infantibus.
7. *Terrestritas*, si terra abundat, ut in senio, podagra, calculosis.
8. *Acritas*, si principium acre quaecunque in humoribus abundat. V. *acritates*.

### MORBI EX ERRORE LOCI.

Transitus humorum a suis in aliena vasa, *error loci* vocatur. Transitus sanguinis e rubris in vasa *serosa*, seu *decoloria*, ut in inflammatione & in erythemate contingit, huc refertur.

### MORBI EX RETENTIONE HUMORIS.

Humoris, qui excerni deberet, retentio in corpore *Retentio* dicitur. Huc revocatur retentio *materiae perspirabilis*, *urinæ*, *foecum intestinalium*, *lactis*, *sanguinis menstrui*, *lochialis*, *hæmorrhoidalis*, *puris*, aut qualiscunque *materiei morbosæ*.

### MORBI EX EXCRETIONE HUMORIS.

Exitus humoris extra corpus vocatur *Excretio*. *Excretio sanguinis* e vulnere, *puris* nimia excretio ex ulcere, *seri* vel *lymphæ* ex ulcere lymphatici tumoris, huc pertinet.

## MORBI EX SECRETIONE HUMORIS.

*Secretio morbosa*, est humoris sani *effusio* seu *extravasatio* e suis vasis in cellulas membranæ cellulosaë, vel in magnas corporis cavitates.

Huc pertinet *sanguinis* extravasatio in ecchy-mosi, *aquæ* in tumoribus hydropicis, *aëris* in emphysemate, *lactis* in tumoribus lacteis.

*Metastasis* est humoris morborum secretio in quemdam locum, huc ergo pertinent omnes tumores *metastatici* & *critici*.

## MORBI EX MOTU HUMORUM.

Motus humorum *excessu*, *defectu* & *directione* peccare potest.

Motus humorum major in toto corpore, *excessus in motu*

————— in aliquam partem directus, *congestio* humorum.

————— *nullus* in quadam parte, *stagnatio* humorum dicitur.

Demum *influxus* & *effluxus* humorum in quadam parte esse potest *impeditus*.



## DE DIVISIONE ET DIFFERENTIA MORBORUM.

**S**INGULI morbi *decurfus totalis* in 5. *stadia* dividi solet.

1. *Principium*, stadium est, quo morbus incipit.
2. *Augmentum*, quo morbus perpetuo augetur.
3. *Status*, quo nec augetur, nec decrefcit.
4. *Decrementum*, quo morbus decrefcit.
5. *Finis*, quo morbus penitus ceflat.

Morborum differentia dividitur in *effentialem* & *accidentalem*.

Differentia *effentialis*, est diverfitas indolis, qua morbus a morbo differt.

———— *accidentalis*, est diverfitas, qua ejusdem morbi species inter fe differunt.

A differentia effentiali dividuntur morbi in *claffes*, *genera*, *species* & *varietates*. De his vide meam *pathologiam specialem*.

Accidentalis morborum differentia petitur ab origine, tempore, fede, decurfu, indole, vitæ genere, sexu, ætate, climate, eventu.

### DIFFERENTIÆ MORBORUM AB ORIGINE.

Refpectu *originis* feu *caufæ* dividuntur morbi.

1. In *hæreditarios*, *congenitos* & *adventitios*.

*Hæreditarii*, qui a morbo parentum in infantibus oriuntur, hi morbi ergo *paterni* vel *materni* effe poffunt. Sic lues venerea, calculus, fero-

phulæ , catarracta sæpe a parentibus in proles transeunt.

*Congeniti* , quos prolis in utero contrahit , at non a parentibus , alias hæreditarii essent , sed ab alia causa. Nævi materni , hydrocephalus , spina bifida & omnes deformitates huc referuntur.

*Adventitii* , vocantur omnes morbi , qui vel jam sub partu , vel post partum ad mortem usque contrahuntur. Præter morbos hæreditarios , & congenitos , omnes cæteri huc pertinent.

2. In *primarios & secundarios*.

*Primarii* seu *protopathici* , qui non ab alio morbo , sed a sua propria causa oriuntur ; ut vulnus , contusio , fractura.

*Secundarii* seu *deuteropathici* , qui ex alio præsentis vel prægressi morbo oriuntur , ut luxatio a tumore interno articuli , ulcus ab inflammatione , catarracta post operationem orta.

3. In *pandemios , endemios , epidemicos & sporadicos*.

*Pandemii* , qui sine contagio multos homines in eodem loco aggrediuntur. Sic milites , in vento pulverulento iter facientes , fere omnes ophthalmia corripuntur , sic aer humidus plurimis odontalgiam rheumaticam causat.

*Endemii* , qui regioni vel populo cuidam proprii sunt. Sic gentibus alpinis strumæ , maritimis scorbutica ulcera , polonis plica polonica est endemia.

*Epidemici* sunt morbi , qui multos homines in eodem loco & tempore aggrediuntur. Sic carbun-

culi, bubones pestilenciales, anginae gangrænosæ, subinde epidemice grassantur.

*Sporadici*, qui ubique locorum & omni tempore inter homines observantur. Etiam morbi epidemici subinde sporadice observantur. Sic subinde unus ex populo afficitur carbunculo, vel angina gangrænosa.

4. In morbos *veros*, *fictos*, & *arte factos*.

*Veri*, qui a natura excitantur.

*Artificiales*, qui arte producuntur, ut ulcera per setaceum, fonticulum, vesicatorium procurata.

*Ficti*, qui arte finguntur, ut claudicatio, elephantiasis, maculae pigmento inducæ.

5. In morbos *legitimos* & *spurios*.

*Legitimi* sunt, qui veram indolem morbi habent.

*Spurii*, qui alium morbum simulant & genericam indolem morbi non habent. Inde herniæ in *veras* & *spurias*, inde aneurismata in *vera* & *spuria* dividuntur.

6. In morbos a causa *externa* vel *interna*.

*Morbi a causa interna* seu *spontanei* sunt, qui vitio humorum vel solidorum sine causa externa nascuntur, ut ulcera ab acrimonia scorbutica, vel alia.

*Morbi a causa externa* seu *violentii*, qui a vitio externo oriuntur, ut ulcus a vesicatorio, inflammatio a contusione.

## DIFFERENTIÆ MORBORUM A SEDE MORBI.

Respectu *sedis* dicuntur morbi.

1. *Externi*, qui in externa corporis superficie sedent, ut vulnus, ulcus, tumor.
2. *Interni*, qui in quadam corporis cavitate resident, ut vulnus visceris, effusio sanguinis, ascites, hydrocephalus, hydrothorax, caries articulationis.
3. *Vagi*, qui ex parte in partem migrant. Sic habetur erysipelas vagum.
4. *Fixi*, qui in loco, quem aggrediuntur, perpetuo morantur, ut fere omnes morbi solent.
5. *Retrogradi*, qui cum aliquamdiu partem externam obsiderunt, hac derelicta introrsum pergunt. Sic erysipelas subinde in parte externa subito evanescit, & cerebrum, aut pulmones summo cum periculo petit.
6. *Idiopathici*, quorum causa in eadem parte, in qua morbus se monstrat, residet.
7. *Sympathici* seu *consensuales*, quorum causa in alia parte residet, quam in qua morbus se monstrat. Ut amaurosis a saburra ventriculi, odontalgia a graviditate, vomitus a capitis læsione.
8. *Symptomatici*, qui alius morbi symptomata sunt. Quilibet fere morbus alius symptoma esse potest.
9. *Universales*, qui totam corporis superficiem obsident, ut anasarca, pneumatosis, ambustio universalis, si quis in balneum calidum incidit.

10. *Partiales*, qui integram partem occupant, ut œdema crurum, emphysema capitis, erysipelas faciei.

11. *Topici seu locales*, qui solummodo locum in parte quadam obsident, ut vulnus, tumor cysticus: multi morbi videntur ratione suæ sedis *locales*, qui tamen *universales* respectu suæ causæ sunt, ut carcinoma, scrophula.

12. *Morbi partium*, qui singulis partibus sunt proprii. Sic habetur anatomica divisio morborum, ut morbi capitis, colli, thoracis, abdominis, artuum, vel morbi cutanei, oculares, dentium, ossium, glandularum &c.

#### DIFFERENTIÆ MORBORUM A DECURSU.

Respectu *decurfus*, quem morbi habere solent, vocantur morbi.

1. *Breves*, qui celeriter decurrunt, ut tumores inflammatorii, vulnera, fracturæ.

2. *Longi*, qui diutius durare solent antequam curari possunt, ut ulcera, herniæ, prolapsus.

3. *Chronici*, qui per multos annos durare solent, ut cancer, ulcera antiqua, spina ventosa, caries.

4. *Continui*, qui a prima invasione ad finem usque eodem tenore decurrunt.

5. *Remittentes*, qui per intervalla vel remittunt, vel exacerbantur, sed non penitus cessant.

6. *Intermittentes*, seu *periodici*, qui certo tempore infestant, & iterum desinunt. Sic datur ophthalmia periodica, quæ omni altero die infestat.

Morbi periodici, qui certum servant *typum* vocantur *typici*, qui vero typum certum non servant, dicuntur *erratici*.

Tempus inter duos *insultus*, vocatur *apyrexia*, tempus autem ipsius insultus, *paroxysmus* dicitur.

7. *Præcedentes*, qui alium morbum præcedunt, sic inflammatio est morbus præcedens abscessus, fissura ossis morbus præcedens cariei.

8. *Accessorii*, qui ad morbum præsentem accedunt: ut gangræna vulneri, mammæ scirrhosæ contusio.

9. *Successorii*, qui morbo jam finito succedunt: sic variolas sæpe furunculi, leucomata corneæ, abscessus cariosi sequuntur.

#### DIFFERENTIÆ MORBORUM AB INDOLE.

Respectu *indolis*, quam morbi habere solent, dantur morbi.

1. *Magni*, qui gravibus & magnis symptomatibus cursum suum absolvunt: ut hernia incarcerata, læsio nervi.

2. *Parvi*, qui levia & non periculosa symptomata habent: ut vulnus leve, ulcus simplex.

3. *Benigni*, qui nec periculum nec symptomata gravia habent, ut tumor cysticus, scirrhus vel polypus benignus.

4. *Maligni*, qui periculum apparens vel occultum habent, ut scirrhus malignus, carcinoma, morsus a cane rabido, aut vipera venenata.
5. *Refractarii*, qui expertorum remediorum vim eludunt, aut curatione consueta magis exacerbantur: ut cancer, caries occulta.
6. *Contagiosi*, qui per contactum ex homine in hominem transeunt, ut lues venerea, bubo pestilentialis.
7. *Regulares*, qui consueta symptomata habent.
8. *Irregulares seu anomali*, qui consueta symptomata non habent.
9. *Simplices*, qui solitarii in parte sunt, ut fractura simplex, luxatio simplex.
10. *Compositi*, qui in parte bis vel sæpius adsunt, ut fractura duplex vel triplex in uno ossè.
11. *Complicati*, qui cum alio morbo in eadem parte adsunt, ut luxatio complicata cum vulnere vel cum carie, vel cum fractura articulationis.

#### DIFFERENTIÆ MORBORUM AB EVENTU.

Respectu *exitus*, quem morbi habere solent, dividuntur.

1. In *sanabiles*, qui arte vel natura sanari possunt.
2. — *insanabiles*, qui hucusque nec arte, nec natura sanari potuerunt.
3. — *lethales*, qui in mortem abeunt. Morbi lethales iterum subdividuntur.
1. In *absolute lethales*, in quibus nec ars, nec natura mortem avertere potest.

2. — *per se lethales*, in quibus ars, non autem natura mortem avertere potest.
3. — *per accidens lethales*, qui per se non lethales sunt, per errorem chirurgi autem vel abusu rerum non naturalium lethales evadunt.
4. In *incipites*, quorum exitus in vitam vel mortem incertus est.
5. — *recidivos*, qui jam curati sæpius redire solent, ut cataracta, amaurosis.
6. — *salutares* seu *salubres*, qui ab alio morbo graviore hominem præservant vel curant. *Ulceræ & tumores critici* huc pertinent.
7. — *insalubres* seu *detrimentosos*, qui a nullo alio morbo præservant, vel curant.

#### DIFFERENTIÆ MORBORUM A VITÆ GENERE.

A *vitæ genere* dividuntur morbi in morbos *artificum, militum, rusticorum, litteratorum, ecclesiasticorum, divitum, pauperum, peregrinantium & sedentariorum.*

#### DIFFERENTIÆ MORBORUM A TEMPERAMENTO.

A *temperamento* dividuntur morbi in morbos *temperamenti sanguinei, biliosi, pituitosi, atrabilarii.*

#### DIFFERENTIÆ MORBORUM A SEXU.

A *sexu* dividuntur morbi in *masculinos & fæmininos*. Fæminini iterum subdividuntur in morbos

*virginum, gravidarum, parturientium, puer-  
perarum, vetularum.*

#### DIFFERENTIÆ MORBORUM AB ÆTATE.

Ab *ætate* dividuntur morbi in morbos *embrionales, infantiles, juveniles, viriles, seniles.*

#### DIFFERENTIÆ A CLIMATE.


A *climate* dividuntur morbi in morbos *climatum calidorum, frigidorum, temperatorum, humidorum, siccorum.*

#### DIFFERENTIÆ MORBORUM A TEMPORE.

A *tempore* dividuntur morbi in *vernales, æstivos, autumnales, & hyemales.* In *novilunares & plenilunares.* In *diurnos & nocturnos.*

A *duratione* morbi dividuntur morbi in *recentes & inveteratos.*

Tandem a *stadio* morbi, singulus morbus dividi potest in morbum *incipientem, progredientem, stantem, declinantem & finientem.*



---

# Æ T I O L O G I A.

S E U

## DOCTRINA DE CAUSIS MORBORUM.

---

### DE CAUSIS MORBORUM GENERATIM.

**C**AUSA morbi est ens, quod morbum producit.

Generatim morborum causæ dividuntur.

1. In *causas proëgumenas* seu *prædisponentes*.
2. — — — *procatarcticas* seu *occasionales*, aut *excitantes*.
3. — — — *proximas* seu *morbum constituentes*.

*Causa proëgumenta* seu *prædisponens* est illa dispositio, corpori inhærens, vi cuius id aptum redditur, ad morbum suscipiendum.

Non omnes morbi habent causam prædisponentem.

Hæc *prædispositio* est certa fluidorum vel solidorum vel utrorumque constitutio: atque jam ante morbum natum in corpore præsens est.

*Causa procatarctica* seu *occasionalis*, est illud ens, quod corpori applicatum, morbum in corpore prædisposito excitat.

Hæc causa etiam *remota* dicitur, atque dividi solet.

1. in *externam*, quæ extra corpus existens, corpori applicatur.
2. in *internam*, quæ intra corpus existens morbo causam dat.

*Causa proxima* est ipsa solidorum vel fluidorum mutatio, quæ morbum præsentem constituit, seu causa proxima est *morb*us ipse.

Causarum studium chirurgo perneceffarium est, cum morbi curatio in causæ morbificæ ablatione consistat.

### CAUSÆ PROXIMÆ MORBORUM.

Causæ proximæ sunt morbi simplices fibrarum vel humorum e quibus partes, morbo affectæ, constant.

### MORBI A MORBIS SIMPLICIBUS PARTIUM SOLIDARUM.

*Laxitas* distorsionem, luxationem, aneurismata vera, varices, hernias facit.

*Mollities ossium* curvaturas membrorum, gibbositatem, partium deformitates.

*Rigiditas* anchylosim articulorum. Et *fragilitas ossium*, fracturas causat.

*Tabida partium solutio* humorem putridum, gangrænosum, vel cariosum producit.

*Elasticitas excedens.* Sic cartilaginum pelvis nimia elasticitas causa partus difficilis in fæminis seniculis est.

*Elasticitas deficiens.* Sic inertia cartilaginum pelvis diastasim ossium pelvis sub partu admittit. Inertia cartilaginum intervertebraliū gibbum facit.

*Irritabilitas aucta;* stimulus in *nervis sensoriis*, dolorem in *nervis motoriis*, spasmus vel convul-

fionem. In *nervis vitalibus* inflammationem vel febrem facit.

*Irritabilitas imminuta* brevi gangrænam inducit.

*Spasmus* ischuriam spasmodicam vel anginam spasmodicam.

*Paralysis* anginam paralyticam & ischuriam ex paralyfi vesicæ causat.

*Sensitivitas aucta* sensilitatem nimiam & dolorem facit.

*Sensitivitas deleta*: inde oritur anodynia gangrænae; sensitivas deleta in nervo optico amaurosim, in nervo auditorio surditatem facit.

### MORBI A MORBIS HUMORUM.

A *Plethora* oriuntur hæmorrhagiæ ex locis consuetis, & non consuetis, inflammationes veræ & spuria.

A *Keneangia* fiunt tumores œdematosi.

A *spissitudine* obstructions & tumores.

A *tenuitate* inflammationes, maculæ, hæmorrhagiæ & extravasationes.

Ab *acrimonia* varii oriuntur morbi. Sic

— *Acrimonia acida* ossium mollitiem universalem vel particularem, tumores cariosos & gangrænosos facit.

— *alcalina* tenuitatem acrem humorum causat, inde inflammationes, ulcera, hæmorrhagiæ.

— *muriatica*, rigiditatem, ulcera cacoetha inducit.

— *venerea* gonorrhæam, fluorem album, bubones, ulcera, ophthalmiam, condylomata, arthritidem nocturnam, tophos, & gummata.

*Acrimonia scorbutica*, ulcera fungosa, gingivas cruentas, maculas, indurationes crurum, & strepitum ossium causat.

———— *arthritica*, tumores arthriticos & ulcera faniem nigricantem plorantia.

———— *podagrica*, tumores podagricos & nodos terreos facit.

———— *rheumatica* musculorum & articulorum tumores dolorosos, testiculorum dolores, ulcera cacoetha, cariem, membrorum ariduram & contracturam, anginam, ophthalmiam & odontalgiam rheumaticam facit : inflammationes rheumaticæ vix rubent.

———— *scrophulosa*, scrophulas in collo, mesenterio, inguinibus, ophthalmiam, nasi & labii superioris intumescentiam, cariem ossium, articulorum tumores albos producit.

———— *Scirrhusa & cancrosa* scirrhus & cancos.

———— *carbunculosa & pestilentialis* carbunculos, & bubones pestilenciales.

———— *putrida*, gangrænam tumorum & vulnerum causat.

———— *rancida* erysipelas, ossium cariem.

———— *tiliofa* etiam erysipelas, herpetem.

———— *ulcerum* absorpta febrem lentam, tumores metastaticos.

*Saburra primarum viarum* sæpe ophthalmiam, odontalgiam, erysipelas, vulnerum & ulcerum inflammationem facit.

Ab *errore loci* oriuntur inflammationes veræ, & spuria seu rubores cum vel sine dolore & calore.

A *retentione materiæ perspirabilis* tumores serofi, hydrocele, rheumatismi.

A *retentione urinæ*, ischuria, vesicæ gangræna, ruptura, cystocele, calculus.

A *retentione fæcum intestinalium*, intestini recti extensio, intumescencia extra anum, hæmorrhoides, ophthalmia, angina ob congestionem sanguinis versus caput.

A *retentione lactis* mastodinia, inflammatio, induratio mammarum, tumores lactei extremitatum.

A *retentione sanguinis menstrui* vel hæmorrhoidalis, hæmorrhagiæ in variis locis, & tumores sanguinei.

A *retentione seminis* spermatocele, sarcocoele, inflammatio testis.

Ab *excretionem nimiam sanguinis* mors vel tumores œdematosi.

Ab *excretionem feri, puris* vel *lymphæ* febris hectica, tabes, mors.

Ab *excretionem seminis*, amblyopia, cæcitas, gonorrhæa feminalis.

Ab *extravasatione sanguinis*, ecchymosis, aneurisma spurium, trombus.

Ab *extravasatione feri*, œdemata, tumores serofi, hydropes.

Ab *extravasatione lymphæ*, tumores lymphatici.

— — — — — *aeris*, emphysemata.

A *metastasi materiæ morbosæ* oriuntur tumores metastatici, vel critici.

A *congestione* seu motu sanguinis violento in quamdam partem, hæmorrhagiæ, ophthalmiæ, amaurosis.

A *stagnatione* humorum putredo, vel degeneratio varia humoris stagnantis, ut in tumoribus cysticis & hydropicis videre est, a stagnatione urinæ calculus oritur.

A *secessione principiorum* varii fiunt morbi: a secessione *aquæ* œdemata vel hydropes, a *secessione olei* lypomata vel obesitas, a secessione *chyli* tumores lactei, a secessione *terræ* calculi vel tumores terrei, a secessione *glutinis* tumores œdematosi, a secretionem *succi nutritii* oriuntur sarcomata, polypi.

### CAUSÆ EXCITANTES MORBORUM.

Sunt conditiones, quæ causas proximas excitant, seu sunt causæ causarum proximarum.

*Frequentissimæ* morborum causæ excitantes sex sunt, quas nomine *rerum naturalium*, vel *non naturalium* insignire solemus, nempe

1. *Aer.*
2. *Cibus & potus.*
3. *Motus & quies.*
4. *Somnus & vigilia.*
5. *Excreta & retenta.*
6. *Animi pathemata.*

## A E R.

Aer atmosphæricus, nostrum corpus ambiens, generatim omnes partes epidermide nudatas irritat, inflammat, corrumpit, vel subito exsiccat. Hinc vulneribus, ulceribus, ossibus denudatis nocet. Potest demum aer peculiariora, quibus morbos creat, habere vitia.

1. *Aer calidus* humores rarefacit, solida relaxat, systema nerveum nimis irritabile reddit, bilem & reliquos humores ad putredinem disponit. Hinc ab aeris calore vulnerum ingens suppuration, gangræna, vermium exclusio, caro fungosa, tetanus.
2. *Aer frigidus* humores condensat, solida contrahit, *materia* autem *glacialis* humores nostros in glaciem vertit, inde perniones, gangræna, sphacelus partium congelatarum, præsertim si his calor admoveatur. Frigus ad vulnus admissum suppurationem impedit, & subinde tetanum causat.
3. *Aer ficcus* sua siccitate ulcerum, & vulnerum sanationem impedit, vel retardat, ophthalmias & anginas producit.
4. *Aer humidus* perspirationem cutaneam impediendo & solida relaxando ophthalmias chronicas, dolores dentium, rheumaticos tumores causat.
5. *Aer heterogeneis repletus*, huc pertinet præsertim aer putridus & pulverulentus.

6. *Aer putridus*, talis evadit aer. nosocomiorum a transpiratione putrida ægrotorum, aut ab exhalatione ulcerum putridorum, præsertim gangræno-  
forum. Vulnera in aere putrido persæpe fiunt gangræno-  
sa. Hinc in putridis nosocomiis omnes  
fere amputati vel trepanati pereunt.
7. *Aer epidemicus*, qui miasma quoddam foveat,  
facit bubones pestilenciales, carbunculos, subinde  
anginam gangrænosam.
8. *Aer pulverulentus* ruborem oculorum & non  
raro anginam, atque raucedinem facit.
9. *Aer ventosus* seu *ventus*, tempestate ventosa per  
decussas de domibus tegulas contingunt multa, &  
gravia capitis vulnera, præsertim in civitatibus  
populosis. Ventus demum epidermidem ficit,  
hinc fissuræ labiorum aere ventuoso.
10. *Aer ablatus* ut sub antlia & sub ventosa contin-  
git, enormem intumescenciam in parte vel in  
toto corpore producit, submersi a defectu aeris  
moriuntur.
11. *Aer fœtore* vel *exhalatione acris* oculis est no-  
cuis, ophthalmiam infert, ab exhalatione aquæ  
fortis catarracta est observata. *Aer mercurialis* in  
cubiculo salivantium scorbuticis pessimam saliva-  
tionem & alia symptomata movit.
12. *Aer ex nostris partibus extricatus*. Aer nostra-  
rum partium solidarum & fluidarum putredine  
extricatur: inde emphysema partis gangrænosæ,  
inde cadaverum intumescencia.

*Aer nostris partibus insinuatus.* Sic aer vulneribus angustis inflatus totum corpus emphysematosum reddit. Sic etiam aer e pulmonibus, fracta costa læsis, elapsus in telam cellulosa[m] emphysema facit totius corporis.

### I N G E S T A.

Sic vocantur, quæcunque titulo *cibi, potus, medicamenti*, aut *veneni* in primas vias per os ingeruntur.

*Cibi ingesti vel quantitate vel qualitate* morbos inferunt.

*Quantitas vel excedens vel deficiens* est.

*Quantitas ciborum excedens* chylum male elaboratum producit : ideo a nimia voracitate, vulnorum & ulcerum suppuratio nimia, vel pus malum, caro fungosa, vulneris inflammatio.

Voracitas in puerperis lactis depositiones ad extremitates vel mammarum intumescen[t]iam, atque inflammationem causat. In ventriculi & intestinorum vulneribus sola voracitas mortem & in herniosis incarcerationem facere potest.

*Quantitas ciborum deficiens* seu *jejunium* humores putridos reddit, inde subinde vulnorum, ulcerum mala suppuratio, gangræna, mors. Inde a nimis stricta diæta subinde fracturarum insanabilitas.

*Qualitas ingestorum* varia habere potest vitia.

1. *Ingesta spirituosæ* faciunt *congestionem* in caput, hinc in capitis vulneribus, atque in com-

motione cerebri, nocent : longus spirituum ardentium usus glandulas indurat, & œsophagum adeo angustat, ut deglutitio evadat impossibilis.

2. *Ingesta pinguia* relaxando primas vias & peritoneum, herniis dant ansam. Corrupta in ventriculo saburram rancidam generant, ex qua chylus rancidus in sanguinem delatus adipem & medullam ossium inficit, inde inflammationes, erysipelata, herpes, ulcera maligna, gangræna, spina ventosa.
3. *Ingesta glutinosa* saburram glutinosam & simul acescentem in primis viis faciunt, ex qua chylus glutinosus & acescens in sanguinem transit. Unde glandularum obstructions, articulationum tumores, anchyloses spurix, œdemata.
4. *Ingesta salsa* acrimoniam muraticam & scorbutum producant.
5. *Ingesta alcalina* gelatinam sanguinis solvunt, hinc vulnerum, ulcerum & fracturarum insanabilitas, ob sanguinis tenuitatem variæ hæmorrhagiæ & maculæ lividæ.
6. *Ingesta acida* pruritum, morbos cutaneos, osfium mollitiem, rachitidemque generant.
7. *Ingesta dulcia*, longo abusu aciditatem humorum, hinc dentes nigros & rhachitidem in infantibus causant.
8. *Ingesta acris & aromatica* vulnerum, & ulcerum inflammationem, diu *masticata* dentium nigredinem & cariem efficiunt.

9. *Ingesta flatulenta* herniosis sæpe incarcerationem herniæ faciunt.
10. *Ingesta frigida* non raro anginam catarrhalem, atque dentium dolorem & *ingesta calida* dentium fissuras & nigredinem causant, *Nimis vero calida*, oris, faucium & œsophagi ambustionem faciunt, quæ lethalem œsophagi angustiam relinquit.
11. *Ingesta venenata* pro diversitate veneni varios producunt morbos. Sic panis ex corrupta farina gangrænam siccam in omnibus extremitatibus causavit. Ab ingesto arsenico gangræna partium genitalium visa fuit.
12. *Ingesta dispepta* saburram crudam faciunt, inde sæpe herniarum incarcerationio.
13. *Ingesta corpora heterogenea*. In faucibus, vel in cardia vel in pyloro vel circa valvulam Tulpii, vel in exitu intestini recti morari & retineri solent. Per errorem deglutitionis in tubam Eustachianam, in rimam laryngis, in tracheam vel in bronchia se insinuant. In his locis si non illico ægrotum suffocant, inflammationem, abscessum, fistulas & mirum sæpe sibi exitum parant.

### MOTUS MUSCULORUM EXCEDENS.

*Motus muscularis excessus* motum sanguinis accelerat, hinc tumores inflammatorios auget, frigidos inflamat, hæmorrhagiæ obnoxiiis nocet. Vulneris, ulceris, fracturæ, luxationisque jam

repositæ dimotionem causat, & sanationem impedit.

Huc etiam pertinent *motus singulares* quarundam partium, ut

1. *Nixus*, qui in partu, exoneratione alvi vel urinæ, lucta &c. adhibetur, inde bronchocele, herniæ, prolapsus, ophthalmiæ.
2. *Inspiratio valida*, quæ in inflatione tubarum adhibetur, hernias, & ophthalmias causat.
3. *Vomitus & tussis* ruborem oculorum, ecchy-  
mosim oculorum, hernias, & *vomitus* ruptu-  
ram œsophagi, causare valet.
4. *Sternutatio* hernias & in trepanatis cerebri ex-  
pressionem e loco trepanato.
5. *Risus immodicus* strumam colli, congestionem  
sanguineam in cerebrum & oculos.
6. *Oscitatio valida*, luxationem maxillæ.
7. *Vociferatio* hernias, *cantus* ruborem oculo-  
rum, & anginam.
8. *Saltus* fracturam cruris, luxationem, vel distor-  
sionem pedis, genu vel femoris, rupturam he-  
patis, vel lienis, vel aortæ; commotionem ce-  
rebri, rupturam tendinis Achillis.
9. *Ingressus diuturnus* genuum rigiditatem & an-  
chylosim facit.
10. *Divaricatio femorum* herniam.
11. *Bajulatio* distorsionem spinæ dorsi, varices  
crurum.
12. *Elevatio ponderum* dolorem lateris, hernias,  
pulmonocalem, prolapsum.

13. *Lucta* tendinum, & musculorum distortionem, ligamentorum armillarium rupturam, distortionem vel luxationem manus, digitorum, cubiti, humeri, producere potest.

### QUIES MUSCULORUM EXCEDENS.

Ligamentorum, ac musculorum rigiditatem, & anchylosim facit.

Huc referuntur *posituræ singulares* quorundam membrorum, ut,

1. *Status* ultra modum protractus, œdemata, varices & ulcera crurum causat.
2. *Situs ineptus* membrorum curvaturas, & gibbositatem procurat.
3. *Sessio*, idem facit, & simul rigiditatem genuum.
4. *Genuflexio* diuturna lupiam in genu producit.
5. *Decubitus* diuturnus inflammationem, excoriationem, & gangrænam in osse coccygi & osse sacro, aut in calcaneo causat, atque calculum in renibus & vesica.

### VIOLENTIA EXTERNA.

Violentiæ, quæ morbos infligere solent, sunt,

1. *Scissura*, quæ vulnus scissum.
2. *Punctura*, quæ vulnus punctum facit.
3. *Contusio*, quæ ecchymosim vel vulnus contusum causat.
4. *Morsus*, quo vulnus contusum infertur.
5. *Ruptura*, qua tota membra sæpe e suis articulis evelluntur.

6. *Amputatio*, vel cultro vel globo tormentario facta, defectum membri inducit.
7. *Lapsus*, præsertim a loco altiori ossium fracturas, luxationes, partium mollium contusiones, & cerebri aut medullæ spinalis commotionem facit.
8. *Globus tormentarius prætervolans* licet partem non tangat, ossa frangit, luxat, partes molles ambustione, vel ecchymosi afficit, cerebrum commovet.
9. *Globus tormentarius partem tangens* utplurimum illam aufert, raro solummodo illam in mollem pulvem carneam convertit.
10. *Globus sclopetarius* nostro corpori immissus partem, vel mediatim vel integre transit, vel solummodo tangit. Inde varia vulnere & contusiones sclopetariæ oriuntur.
11. *Terebratio* foramen lacerum.
12. *Sculptura* excoriationem sanguineam, dein purulentam, præsertim in cachecticis, & in cruribus senum facit.
13. *Tritura*. Huc refertur excoriatio volæ manus a labore, aut plantæ pedis ab itinere, femorum ab equitatione, excoriatio cruenta papillarum mammæ à suctione violenta infantis.
14. *Extensio partis*. Hæc vel *subitanea* vel *lenta* est. Subitanea extensione ingens dolor, laceratio vasorum & nervorum fit, inde ecchymosis, inflammatio, tetanus. Lenta extensio sæpe sine

gravibus symptomatibus fertur, sed si causa extendens subito aufertur, ut aqua in hydrocele, œdemate, ascite, inde sæpe gangræna, vel effusiones sanguinis sequuntur.

15. *Contorsio* membri luxationes, fracturas & fractis vasis ecchymosim causat.
16. *Compressio* partis integræ facit gangrænam, arteriæ compressio ariduram, venæ compressio œdema, nervi compressio paralyfim, ariduram producit.
17. *Commotio* est concussio violenta totius corporis vel unius solummodo partis. Sic a saltu violento ex magna altitudine totum corpus, a contusione capitis solum caput commovetur. Inde a cerebro commoto varia sequuntur symptomata. Vomitus, abolitio sensuum internorum & externorum; a commotione auris surditas; a commotione oculi cæcitas observata fuit.

## FORINSECUS ADMOTA.

Huc referri possunt.

1. *Vestimenta*, quæ vel compressione vel materia, qua construuntur, nocent.

Caput *vittis pelliceis* tectum nimium calefit, hoc tegmen congestionem sanguinis in id causat, hinc favet pediculorum proventui.

Collum *collari* nimis constrictum ruborem oculorum, hæmorrhagiam narium.

*Pectus thoracibus ineptis* compressum gibbositatem, axillarum excoriationem, brachiorum intumescentiam causat.

*Crura a tibialibus lineis* ulcera &

*Pedes a calceis angustis* vel nimium latis clavos contrahunt.

2. *Fasciæ inepte applicatæ*. Partes inflammatæ fasciis nimium constrictæ in gangrænâ & sphacelum abeunt. Id in facturis sæpe observatur.
3. *Venena externe applicata*. Sic ab arsenico aut sublimato ulceribus insperso partis gangrænâ, & mors observata fuit; a venenatæ viperæ morfu partis gangrænâ, emphysema, non raro mors: a morfu canis rabidi hydrophobia sequitur. Ab unguento ex hyosciami radice ano indito sagarum delirium provenit.
4. *Contagium*: est materia morbosa, quæ ex corpore ægroti in sanum hominis corpus transit. Tale virus in cancro, in lue venerea, in carbunculo in peste observatur.
5. *Medicamenta incongrua*. Sic a rancidis unguentis vulnera recentia in ulcera cacoetha degenerant. A calidis pernioni applicatis, gangrænâ; a pinguibus erysipelati applicatis, ulcus fordidum, vel gangrænosum oritur.
6. *Insecta*. Quædam morfu suo inflammationem latam, vel tubercula inflammatoria excitant, ut vespæ & culices: *pediculi* phtyriasis, *muscæ carnariæ* in vulnera & ulcera suas larvas

deponere solent. *Furia infernalis* cutim perforat, & enormes dolores, atque mortem creare potest. V. meam *doctrinam de morbis cutaneis*.

7. *Res alienæ corpori immissæ* irritant, hinc inflammationes & suppurationes faciunt, quibus sæpe mirum sibi exitum procurant.
8. *Frigus* seu *materia glacialis* facit perniones. V. morbos ab aere frigido.
9. *Ignis* inflammationem, suppurationem & gangrænam producit: ignis ficcus gangrænam ficcā, ignis humidus, ut aqua ebulliens, vesicas aqua plenas, vel gangrænam humidam facit.
10. *Fulmen*, quod ignis electricus concentratus esse videtur, facit miras ambustiones, fugillationes, fracturas ossium, commotiones cerebri, & nervorum, atque non raro ipsam mortem sine apparente læsione externa vel interna.
11. *Lux nimia* feriendo retinam amblyopiam, & amaurosim producit.
12. *Radii solis*. Ab insolatione forti lentigines, ephelides, subinde bullæ magnæ in facie oriuntur.
13. *Sonus*. Sonum ingentem explosi tormenti bellici sanguinis profluvium ex aure, auditus difficultatem, & surditatem intulisse vidi. Sonus ingratus stuporem dentibus inducit.
14. *Odor gravis* oculis ruborem, vel inflammationem causat.

## A R T I F I C U M.

*Fontes* unde artificum morbi promanant, sunt,

1. *Materia*, quem quilibet artifex tractat, qua inquinatur, quave aerem sibi circumfufum inquinat.
2. *Posituræ, motus aut manipulationes*, quibus in opere suo artifex utitur.

*Rustici & Hortulani* per totam æstatem soli urenti expofiti ab *insolatione* nigram faciem, & ephelides contrahunt.

Ab *affiduo* labore manuali volas manuum *callosas* sibi reddunt; si rustici *panaritio* in digitis afficiuntur, & si non cito profunda incisio fiat, tunc sæpe gangræna, aut caries phalangum digitalium oritur, epidermis etenim crassa, & callosa tumentes partes subjacentes ossibus violentissime apprimat, hinc compressis nervis, & vasis gangræna fit, & ob inclusam saniem caries.

*Litterati* ab objectis albis, ut papyro *myopes* fiunt.

*Medici & Chirurghi* a conversatione cum ægris, morbis afficiuntur *contagiosis*.

*Docimastæ* a fusione metallorum *caliginosi* & a probatione ferri, illud in aqua extinguendo, *amaurotici* evadunt.

*Cerussarii*, qui plumbum vapore aceti in carcerato solvunt, corripiuntur *contractura* digitorum, manuum, brachiorum, totius denique corporis cum arthritide fixa.

*Cuprarii*, sæpe procedente ætate *virides crines*, ac *dentes*, obtinent, atque communiter ab ictibus mallei *surdaſtri* ſunt.

*Ferrarii* pariter a mallei ictibus ſunt *surdaſtri*, a ponderibus elevandis *rigidi* & *hernioſi*; & ab igne violento & lucido *lippi* & *cæci*.

*Chalibearii* a ſedendo ad uſtrinam sæpe *caliginof* ſunt.

*Mercurii foſſores* dentium *vacillatione*, & *lapſu* laborant.

*Jatraliptæ* antiquitus *tremorem* ſentiebant *manuum*, unde nunc chirurgi ægrotantes venereos ipſos *illitiones* mercuriales inſtituere jubent.

*Inauratores* in amalgamatione, qua argentum obducunt, a mercurio igne aſcendente *paralytici* ſurdi & *muti* evadunt.

*Typiſuſores*, ex fumo antimonii, & ſaturni *manuum ſtupore* & *contraſtura* vexantur.

*Lapicidæ*, a pulvillis lapideis oculo, & auribus illatis *ophtalmiam*, & *cophofim* incurrunt. Veſica in officinis eorum ſuſpenſa, & arte clauſa totum sæpe pulveris pugillum continet, inde conſtat hunc pulverem eſſe penetrantiſſimum.

*Gypſarii* five *calcarii* *labia ulcerofa*, cum calx exſtinguatur, & *manus* habent *rugofas*, ſed vix unquam ſcabioſas.

*Figuli* affliguntur *contraſtura* manuum a calcinatione plumbi pro vitrificatione, & *rheumatici* evadunt in manibus pedibusque a calcando argillam frigidam.

*Salinarii* ſunt *ſcorbutici*, & *lippi*.

*Coqui* a foco demum laborant *amblyopia*, & tandem *cæcitate*.

*Foricarii* fere omnes a fœtore summo, *lippi* & *cæcutientes* evadunt, atque præ dolore oculorum vix quatuor horas de die laborando transigere queunt, sedentque postea per totum diem in loco obscuro; tepida oculos aqua abluentes. Fœtor enim adeo est corrosivus, ut vasa inde argentea, atque cuprea nigrescant, vixque purgari inde queant. Hinc patet cur matula impura adeo oculis noceat.

*Lotrices* sunt *lippientes* a lixivii noxio odore, *œdema* a stando in aquis, *paronychiam* a calore & frigore digitorum alterno, & *rhagades manuum* a sapone habent.

*Candelarii* a liquefacto sebi pessimo fœtore obnoxii sunt *lippitudini*.

*Molitores* a rotarum sono & farina volatili *surdastri* evadunt.

*Pistores* a farina volatili *rauci* fiunt, *manus* plerumque habent *maiores*, exercitium enim membrum magnificat.

*Artifices crinium adscititiorum* a pulvere *caliginosi* fiunt.

*Cribratores* e pulvere, mota fruge, exsurgente *caliginosi* & ab acaris farinæ *phthiriasim* & *scabiem* contrahunt.

*Ædiles* a labore ponderoso *curvi*, a dorso labore fracto *dolor dorsi* & *femorum*; a ponderibus

presso sanguine minimorum vasculorum *ischia-*  
*dici*, a summis ponderibus elevandis *herniosi*.

*Bajuli*, portando onera, a curvato in fornicem corpore evadunt *curvi*, ut a ponderibus *herniosi*.

*Sutores* a curvato corpore *curvi*, & *gibbosi* & genibus inflexis *claudicantes* fiunt a continua flexione: his brachia crassa & thoracis muscoli robusti; labor enim præcordia firmat.

*Sartores* incedunt gressu gradatorio, a compressis pedibus sub sedendo, dorsoque *curvi* sunt. Sed etiam puellæ ad arcum acuminatas lacinias consuendo sedentes omoplatis distentis *gibbosæ* evadunt.

*Cursores* sæpe fiunt *herniosi*.

*Equisones* evadunt *calculosi* ab exagitatis renibus, *libidinosi* a concussione genitalium, *hæmorrhoidarii* a frictione & concussione ani.

*Cantores* fiunt *herniosi*, ut infantes multum ejulantes, & musici bassum inflantes; *oculi rubri* a vociferatione fiunt, *raucedo* & *angina* a labore laryngis.

*Æditui* apud Indos, qui stentoria voce horas proclamant, plerumque evadunt *cæci*.

*Statarii artifices* quemadmodum etiam cubicularii regii, & veterum Haruspices, qui per totum diem stabant, pedes *varicosos* & demum *œdematosos* habent.

*Artifices sedentarii* ut & *litterati* ab obstipatione alvi, uti etiam ab angulo recto vasorum iliacorum sub sedendo *hæmorrhoidarii* fiunt.

Omnes

Omnes demum artifices , qui *atmosphæræ foetidæ* exponuntur , *lippientes* sunt & *cachectici* , hinc in his ulcera difficulter sanantur.

### ANIMI PATHEMATATA.

Sunt summa cum violentia animo impressæ ideæ , quas involuntarii in corpore sequuntur motus.

Has ideas non *adiaphoria* sed *gaudium* vel *odium* summum excipit. Animi pathemata hinc dividuntur.

in *grata* , quæ fieri cupimus , ut *gaudium* & *amor*.

— *ingrata* , quæ averſamur , ut *ira* , *odium* , *invidia* ; *mæror* , *metus* , *terror* , *pudor*.

1. *Gaudium* augendo motum sanguinis , nocet partibus inflammatis & ubi arteria major læsa est : præ nimio gaudio mors contingere potest.
2. *Amor* seu *veneris desiderium* , in utroque sexu congestionem sanguinis versus genitalia causat. Hinc penis & testiculorum inflammationem vel spermatocelelem facere vel augere potest.
3. *Ira* augendo motum sanguinis , vulneris inflammationem , hæmorrhagiam ex eo , febrem vulnerariam vehementiorem facere potest. Morsus hominis vel animalis irati rabiem cum hydrophobia induxit. Ira bilem corrumpendo sæpe erysipelas excitat.
4. *Mæror* ; nervorum & vasorum imbecillitatem inducendo scirrhus producit & tumores œdematosos.

5. *Metus*, omnes fibras musculares subito reddit laxas, hinc ob sphincterum resolutionem facit involuntariam mictionem, a metu ante operationem jam sensiles ægroti animi deliquiis & post operationem majori inflammatione vulneris afficiuntur.
6. *Terror* producit spasmos musculorum, hinc præfertim in vulneratis tetanum causare potest: cum vasa terrore contrahantur, hinc pauca sub operationibus chirurgicis sæpe hæmorrhagia, quæ aliquot post operationem horas sæpe primum se exhibet. Terror non raro scirrhus producit vel eos in cancrum mutat. Terror demum vulnera levia *per accidens lethalia* reddere potest, cum homines præterrore a levissimo vulnere observati fuerint mortui.
7. *Pudor* genas rubere facit, hinc sanguinis congestionem in faciem causat.

### IMAGINATIO GRAVIDÆ.

Adhuc sub judice lis est, an violenta gravidæ imaginatio *nævum* in fœtu producere possit: Novam etenim partium organicarum non præexistentium formationem, aut earum jam formatarum abolitionem, ab imaginationis vi fieri posse non censeo: etiamsi omnem imaginationis vim in fœtum negare non possimus. Videntur nævi a præternaturali evolutione embrionis formari.

### EXERCITATIO NIMIA SENSUUM.

Exercitatio sensuum *externorum vel internorum excessu vel defectu* peccare potest.

Omnis nimia cerebri exercitatio ut in studio acriori contingit, debilitatem nervorum & congestionem sanguinis ad cerebrum facit. Hinc in vulneribus capitis & morbis oculorum nocet.

Nimia organi sensorii exercitatio debilitatem relinquit in organo, & congestionem sanguinis in illud facit. Sic a visu nimis intenso debilitas visus, rubor oculorum & amaurosis. A longo auditu soni nimis streperi surdastri evadimus.

### S O M N U S.

Somnus *excedens* fibras relaxat & pituitosam humorum diathesim inducit, hinc ad œdemata disponit.

### V I G I L I Æ.

Nimis protractæ oculis nocent, inde rubor eorum.

### V I S D I V I N A.

Antiqua omnium fere populorum est opinio, ab irra-  
to numine exitiosos morbos proficisci. Durum  
autem est D E U M optimum, qui salutem omnium  
quærit, *generatim* morborum Authorem facere.

### V I S D I A B O L I seu F A S C I N I.

*Magos & sagas*, sive homines dari, qui mediante pa-  
cto, quod cum diabolo ineunt, morbos homini-  
bus pro libitu facere possunt, mera fabula est. Mor-  
bos enim, quos malevoli homines subinde fa-  
ciunt, naturalibus venenis & artibus inducunt.

## MORBI PRÆGRESSI EXTERNI.

Sic a vulneribus vel abscessibus sæpe fistulæ , sic ab erysipellate sæpe gangræna oritur.

## MORBI PRÆGRESSI INTERNI.

Morbi interni sæpe suam materiam ad varia loca externa deponunt , inde varii tumores critici vel metastatici oriuntur.

---

CAUSÆ PRÆDISPONENTES  
MORBORUM.

---

**F**REQUENTISSIMÆ morborum causæ prædisponentes sunt.

## MALA EVOLUTIO EMBRIONIS.

*Evolutio embrionis* adhuc in utero existentis variis morbis organicis ansam præbet , prout illa vel nimis præcox , vel nimis tarda vel erronea est. Inde origo deformitatum & nævorum.

## TEMPERAMENTUM.

*Temperamentum* seu *temperies* est peculiaris constitutio quoad humores : Huc ergo pertinet.

1. *Temperamentum sanguineum* in quo sanguis abundat : Inde inflammationes veræ & spurie aut hæmorrhagiæ.

2. *Temperamentum phlegmaticum* in quo serum & mucus abundat, inde tumores œdematosi & aquei.
3. *Temperamentum cholericum* in quo bilis abundat, unde erysipelas, herpes.
4. *Temperamentum melancholicum* in quo sanguis nigricans picis adinstar spissus est, unde scirrhus & carcinoma atrabilarium.
5. *Temperamentum obesum* in qua oleum ubique abundat, unde facilis suppuratio.
6. *Temperamentum gelatinosum* in quo gelatina in omnibus humoribus abundat, ut in fœtu & infantibus. Inde nævi & excrefcentiæ.
7. *Temperamentum spirituosum* in quo liquidum nerveum abundat, hinc facile oriuntur spasmi & convulsiones ab illatis vulneribus.
8. *Temperies cacochymica* seu *chachectica*, in qua humores quadam acrimonia infecti sunt, vel discrasia laborant. V. *acrimonias* & *discrasias*.

### IDIOSYNCRASIA.

Est propria cuivis corpori constitutio, qua homo aliter sese ad quasdam res externas habet, quam alii homines. Pertinet huc lipothymia a conspectu vulneris, vel felis. Inflammatio cutis ab applicatione medicamenti, quod aliorum hominum cutis sine noxa fert.

### HABITUS CORPORIS.

Est peculiaris constitutio corporis quoad partes solidas; huc revocatur.

1. *Habitus sensibilis*, in quo nerveum systema admodum *sensibile* & musculosum admodum *irritabile* est. Inde facilis inflammatio, & in vulneratis facilis tetanus aut convulsio.
2. *Habitus insensibilis*, in quo nerveum systema *parum sensibile* & muscoli *parum irritabiles* sunt, ut in phlegmaticis & melancholicis.
3. *Habitus robustus*, in quo fibræ fortes & elasticæ sunt, ut in viris & rusticis.
4. *Habitus debilis*, in quo fibræ teneræ sunt ut in infantibus.
5. *Habitus rigidus*, in quo fibræ jam rigidæ sunt, ut in senibus & decrepitis.
6. *Habitus mollis*, in quo fibræ molles, laxæ, parum elasticæ sunt, ut in fœminis, & infantibus.
7. *Habitus macilentus*, in quo fibræ fortes at fine multa tela cellulosa sunt.
8. *Habitus pinguis*, in quo fibræ molles & multa pinguedine involvuntur.
9. *Habitus morbosus* idem est, ac *temperies cacochymica*.

#### Æ T A S.

Quælibet hominis ætas suos sibi proprios patitur morbos.

1. *Ætas infantilis*. Morbi, qui ab ætate infantili provenire censentur, sunt aphthæ, ranula, umbilici inflammatio vel exulceratio, hydrocele, hernia umbilicalis vel inguinalis, scabies capitis, crusta lactea, intertrigo, manationes aurium vel oculorum, gingivarum pruritus vel inflam-

matio , dentitio difficilis , spina ventosa , scrophulæ.

2. *Ætas juvenilis* , ob sanguinis abundantis motum versus caput , hæmorrhagia narium , angina sanguinea , & oculorum rubores in juventute observantur. Circa tempus *pubertatis* bubones crescentium & spermatocele.
3. *Ætas virilis* , hæc vitæ periodus parit incommoda hæmorrhoidalia , calculum , podagram.
4. *Ætas senilis* ob rigiditatem omnium fibrarum , humores acres , atque terrestres , inducit articulorum rigiditatem , spinæ dorsi gibositatem , auditus gravitatem , visus hebetudinem , vel cæcitatem , ossium fragilitatem , vulnerum & contusio-  
num , præsertim in tibia , degenerationem in ulcera cacoetha.

## S E X U S.


*Sexus masculinus* morbos peculiare patitur in genitalibus , ut hernias scrotales veras & spurias , phymosim , paraphymosim , testiculorum inflammationes , indurationes , parorchidium.

Morbi *sexus fæminei* etiam a diversis genitalibus , a mammis & ab actionibus huic sexui propriis , ut a menstruatione & partu pendent. In *genitalibus* prolapsus , ruptura uteri , vel perinæi : in *mammis* mastodinia , inflammatio , induratio , cancer.

## STRUCTURA PARTIS.

Quælibet nostri corporis pars ob *suam fabricam* ad peculiare morbos , magis quam alia pars , dispo-

fira est. Sic scirrhus est glandularum, abscessus membranæ adiposæ frequentissimus morbus; sic ob pinguedinem & putritatem intestini recti sæpe in ano fistulæ oriuntur.



# SYMPTOMATOLOGIA.

S E U

## DOCTRINA DE SYMPTOMATIBUS MORBORUM.

**S**YMP TOM A est effectus vel phænomenon morbi. Omne morbi symptoma est ergo vel læsio actionum nostri corporis, vel læsio qualitatum visibilium in quadam nostri corporis parte.

Dividuntur symptomata respectu *originis*.

1. in symptomata *morbi*, quæ a morbo ipso
2. -- -- -- -- *causæ morbi*, quæ a causâ morbi
3. -- -- -- -- *symptomatum*, quæ a symptomatibus morbi.
4. -- -- -- -- *epigenomena*, quæ a novo morbo superveniente oriuntur.

Demum a *tempore apparitionis* dividuntur symptomata.

1. in *præcedentia*, quæ morbum præcedunt.
2. -- *concomitantia*, quæ ipsum morbum concomitantur.

3. in *subsequentia*, quæ morbum jam finitum sequuntur.

Tandem a *sede* dividuntur symptomata

- in *externa*, quæ in qualitate visibili læsa,  
 -- *interna*, quæ in actione læsa consistunt.

Demum quilibet morbus habet

1. symptomata *propria*, quæ morbo propria sunt, hinc etiam *characteristica* & *pathognomica* dicuntur. Et
2. Symptomata *communia*, quæ pluribus morbis communia sunt.
3. Symptomata *periculosa*, quæ vitæ periculum faciunt, &
4. Symptomata *non periculosa*, quæ vitæ periculum non faciunt.

## SYMPTOMATA EXTERNA.

Externa morborum symptomata sunt qualitatuum visibilium læsiones.

Huc referuntur fere omnes morbi externi, qui symptomata alius morbi externi esse possunt.

*Dolor.* Ingrata sensatio in quadam parte est symptoma inflammationis, carcinomatum, tumorum rheumaticorum, spinæ ventosæ, vulnerum dum infliguntur, præsertim nervi læsi, quandoque ulcerum.

*Anodynia.* Insensibilitas partis sensilis dum dolere deberet, est symptoma gangrænæ, nervi ligati vel abscissi, vel compressi.

*Calor.* Sensatio ardoris in quadam parte est symptoma inflammationis, & nervi læsi.

*Frigus.* Sensatio frigoris in quadam parte est symptoma sphaceli.

*Color morbosus.* Color præternaturalis est varius, *livor* est symptoma ecchymosis, aneurismatis spurii varicum, gangrænæ, atque sphaceli. *Nigredo* in necrosi: *Rubor* in inflammatione. *Pallor* in œdemate observatur.

*Fætor* est symptoma cancrofi, putridi, vel cariofi ulceris, & gangrænæ, huc pertinet etiam *fætor oris* a dente carioso, tartaro dentium, scorbuto oris, carbunculo linguæ. *Fætor aurium* ab ulcere, *fætor narium* ab ozena, *Fætor genitalium* ab incontinentia urinæ & alvi.

*Pruritus.* Sensatio ad scalpendum cogens est symptoma acrimoniæ scabiosæ, ulcerum, & quandoque fracturarum diu deligatarum.

*Durities.* Consistentia *dura* est symptoma scirrhi, & topi. *Consistentia tensa* in tumoribus inflammatis & *durissima* in exostosi observatur.

*Mollicies.* Consistentia mollis est symptoma melliceridis. Consistentia *passacea* in œdemate & gangrænâ. *Elastica* in tumoribus serosis & enterocele. *Fluctuans* in abscessu observatur.

*Intumescencia* est symptoma omnium tumorum tum *calidorum* tum *frigidorum*.

*Aridura* est symptoma læsarum arteriarum & nervorum principalium alicujus membri, digiti, spinæ ventosæ & luxationum non repositarum.

*Inflammatio* est symptoma vulnerum, ulcerum, fracturarum, luxationum, contusionum.

*Emphysema* est symptoma vulnerum, gangrænæ, fracturæ costarum; morsus viperæ venenatæ.

*Erythema* est symptoma ulcerum antiquorum, pericranii læsi, cariei latentis.

*Ophthalmia* est symptoma omnium fere morborum ocularium, læsionum capitis. *Rubor* oculorum læso cerebro 7. vel 8. die superveniens, cerebrum suppuratum & mortem indicat. *Rubor* oculorum in cancro mammæ vel alius loci, indicat virus cancrösium jam per universum corpus esse dispersum.

*Gangræna* est symptoma nervorum multum contusorum, fracturæ comminutæ, luxationis vertebrarum, morsus viperæ venenatæ, arteriæ vel nervi principalis abscissi, quorundam vulnerum, ulcerum, tumorum, herniarum.

*Suppuratio* est symptoma vulnerum contusorum, ulcerum, quorundam tumorum ut phlegmones, furunculi.

*Gravitas.* Gravitas major est symptoma tumorum induratorum, & inflammatorum.

*Levitas.* Levitas naturali major observatur in emphysemate.

*Siccitas* est symptoma ophthalmiæ ficcæ.

*Humiditas* est symptoma ophthalmiæ humidæ.

*Pulsatio* est symptoma inflammationis in suppurationem abeuntis, at præcipue aneurismatis veri.

*Pulsus abolitio.* Pulsus in quodam membro abolitus est symptoma sphaceli, arteriæ dissectæ, compressæ, vel ligatæ ut post operationem aneurismatis observatur.

*Strepitus* articulorum est symptoma scorbuti, distorsionis manus & pedis atque emphysematis.

*Hæmorrhagia* Est symptoma vulnerum, ulcerum scorbuticorum, putridorum, canceri aperti.

*Hæmorrhagia narium* est symptoma nasi contusi, cerebri commoti, evulsi polypi.

*Hæmorrhagia aurium* est symptoma cerebri commoti.

*Stomacace.* Cruentatio gingivarum est symptoma scorbuti gingivalis.

*Lymphæ fluxus* est symptoma lymphatici vasis læsi & tumoris lymphatici aperti.

*Seri fluxus* est symptoma vulnerum recentium & ulcerum quorundam fungosorum.


*Puris vel saniei fluxus.* Est symptoma ulcerum & vulnerum. *Coryza purulenta* est symptoma ozenæ, & morbi scrophulosi : *aurifluxus* est symptoma auris ulcerosæ, capitis contusi.

*Synoviæ fluxus* est symptoma penetrantium vulnerum vel ulcerum articularium.

*Proctorrhæa* est symptoma fistulæ internæ ani & hæmorrhoidum internarum.

*Contractura* musculorum & ligamentorum est symptoma fracturarum, vulnerum & tumorum articularium.

*Atonia* seu musculorum, & ligamentorum ingens laxitas est symptoma distorsionis, subinde luxationis repositæ.



---

DE SYMPTOMATIBUS  
INTERNIS.

---

**S**YMP TOMATA interna sunt actionum vitalium, animalium vel naturalium læsiones.

SYMPTOMATA ACTIONUM  
VITALIUM.

Hæc sunt læsiones pulsus, motus cordis aut respirationis.

SYMPTOMATA PULSUS.

*Pulsus parvus, tardus & intermittens* est symptoma hæmorrhagiæ internæ vel externæ, gangrænæ, mortis.

*Pulsus crebrior & durior* est symptoma febris & inflammationis. Hinc symptomata *febrilia & inflammatoria* huc pertinent.

*Symptomata febrilia.*

1. *Febris inflammatoria* est symptoma, quod tumores inflammatorios vel præcedit vel comitatur, vel sequitur. Demum sub nomine *febris vulnerariæ* vel *suppuratoriæ* est symptoma vulnorum, contusionum validarum & fracturarum inflammatione complicatarum.
2. *Febris putrida*, est febris a tabo putrido absorpto. Est symptoma gangrænæ, ulceris putridi, vel cariosi. Vulnerati & ulcerosi in aere putrido

nosocomiorum facilius quam sani febre putrida corripuntur.

3. *Febris biliosa*, a bile putrida oritur, hinc eripelatis, vulneratorum, & ulceratorum sæpe comes est.
4. *Febris lenta*, quæ corpus lente emaciat. Est symptoma abscessuum diu clausorum, magni vulneris vel ulceris, multum puris quotidie fundentis, ac præcipue canceri atque tumoris lymphatici aperti.
5. *Febris intermittens*, quæ periodice quotidie, vel omni altero aut tertio die recurrit, non est symptoma morbi externi. At cum vulnerati a vitio diætæ facilius quam sani febre intermittente afficiantur, hinc subinde morbi externi symptoma epigenomenum est.

#### *Symptomata inflammatoria.*

1. *Phrenitis*. Inflammatio membranarum cerebri, quæ ex febre inflammatoria & feroci delirio noscitur, est symptoma capitis contusi, vulnerati, subinde auris inflammationem, vehementem odontalgiam, ac panaritium sequitur.
2. *Cephalitis*. Cerebri inflammatio est symptoma cerebri contusi, vulnerati aut cranio compressi.
3. *Cynanche*. Pharyngis vel laryngis inflammatio corpora heterogenea in faucibus vel larynge diu hærentia comitatur.
4. *Pleuritis*. Inflammatio musculorum intercostalium ac pleuræ est symptoma, quod thoracis contusiones, fracturas costarum vel sterni sequi solet.

5. *Peripneumonia*. Pulmonum inflammatio, vulnera hujus visceris, atque fracturas costarum non raro excipit, subinde cynanche in inflammationem pulmonum transit.
6. *Diaphragmaticis*. Diaphragmatis inflammatio vulnera & contusiones diaphragmatis excipit.
7. *Carditis*. Cordis inflammatio est symptoma vulnerum superficialium cordis.
8. *Gastritis*. Ventriculi inflammatio est symptoma contusionum, vulnerumque ventriculi, gastroceles incarceratæ, & subinde aciculæ deglutitæ.
9. *Enteritis*. Intestinorum inflammatio est symptoma contusionum, atque vulnerum intestinalium, enteroceles incarceratæ, nec non deglutitorum corporum acutorum.
10. *Epiploitis*. Omenti inflammatio est symptoma contusionum ac vulnerum omentalium, epiploceles incarceratæ & omenti per vulnus elapsi vel compressi aut arte ligati.
11. *Hepaticis*. Hepatis inflammatio est symptoma hepatis contusi, rupti, vel vulnerati, sub in cerebri commotionem & vulnera cerebri sequitur.
12. *Splenitis*. Splenis inflammatio est symptoma splenis contusi, vel vulnerati, etiam aliquando cerebri vulnera sequitur.
13. *Nephritis*. Renum inflammatio est symptoma renis contusi vel vulnerati.
14. *Cystis*. Vesicæ urinariæ inflammatio est symptoma vesicæ contusæ, vel vulneratæ, & non

raro ischuriæ, rudis lithotomiæ, atque cystocelles incarceratæ.

15. *Metritis*. Uteri inflammatio est symptoma uteri contusi, vulnerati, aut in partu rupti, nec non operationis cæsareæ.
16. *Myositis*. Musculorum inflammatio est symptoma contusionum, vulnerum fracturarum, & amputationum.

### SYMPTOMATA ACTIONIS CORDIS.

1. *Lipothymia* vel *syncope* seu actionum vitalium apparens cessatio est symptoma hæmorrhagiæ externæ vel internæ, timoris ante venæsectionem vel operationem chirurgicam, gangrænæ; ulceris antiqui sanati, cordis læsi.
2. *Asphyxia*, mors apparens est symptoma suspensorum, congelatorum, aquæ immerforum, partu difficili natorum.
3. *Palpitatio cordis*. Est symptoma cordis læsi & dein aneurismatici, subinde ex metu sub operationibus chirurgicis misere ægrotis cor palpitat.

### SYMPTOMATA RESPIRATIONIS.

*Orthopnæa*. Respiratio suffocativa est symptoma hydrothoracis, empyematis, semideglutiti boli vel corporis heterogenei in œsophago, vel trachea hærentis, strumæ magnæ colli, vulnerum penetrantium thoracis cum effusione sanguinis vel aeris complicati, pulmonis, diaphragmatis, nervi phrenici læsi, impressæ cartilaginis ensiformis, ascitis, gibositas.

*Empyema*.

*Empyema.* Puris effusio in cavum thoracis est symptoma abscessus thoracici, læsi vel contusi pulmonis.

---

SYMP TOMATA ACTIONUM  
ANIMALIUM.

---

**S**UNT læsiones sensuum externorum, internorum, somni & motus voluntarii musculorum.

SYMP TOMATA SENSUUM  
EXTERNORUM.

*Amaurosis* est symptoma læsi nervi superciliaris, cerebri vel oculi contusi, aut vulnerati, atque morborum finuum frontaliū.

*Amblyopia* est omnium fere morborum ocularium symptoma.

*Photophobia* seu intolerantia lucis, est symptoma ophthalmiæ præsertim internæ.

*Cophosis.* Surditas & auditus difficultas, contusionis aurium & omnium fere morborum organi auditorii est symptoma.

*Agheusia.* Gustus abolitus, est symptoma linguæ paralyticæ.

*Anosmia.* Odoratus abolitus, est symptoma ozenæ, polypi.

*Anæsthesia.* Tactus abolitus seu *insensibilitas*, est symptoma nervi sensorii abscissi, ligati, compressi, aut gangræna destructi.

*Stupor.* Sensatio imminuti tactus, est symptoma præcedens gangrænam, necrosim, oritur etiam a nervo ligato vel compresso.

*Formicatio* seu sensus formicationis, eorundem morborum, ut stupor, est symptoma.

*Dolores & sensationes ingratae.*

*Cephalalgia.* Capitis dolor, est symptoma contusionum capitis, topi & cariei in cranio.

*Hemicrania.* Dolor dimidii capitis, est symptoma ophthalmiæ, odontalgia & morborum qui in sinibus pituitariis ossis frontis locantur.

*Pleurodine.* Thoracis dolor non inflammatorius, est symptoma empyematis externi, contusi thoracis, nixus vehementis.

*Cardialgia.* Dolor ventriculi, est symptoma gastrocelles, cartilaginis ensiformis impressæ, epigastrii contusi.

*Colica.* Dolor intestinorum, est symptoma herniæ incarceratæ, adominis contusi.

*Hepatalgia.* Dolor in regione hepatis, est symptoma intumescens vesiculæ felleæ, aut abscessus in hepate.

*Nephralgia.* Dolor in rene, est symptoma calculi renalis, qui subinde per abscessum in lumbis erumpit.

*Hysteralgia.* Dolor in utero, est symptoma calculi, polypi, canceri in utero vel vagina latentis.

*Mastodinia.* Dolor mammæ est symptoma canceri vel inflammationis, aut lactis abundantis in mamma.

*Arthritis.* Dolor articuli est, symptoma tumorum, vulnerum, ulcerumque articularium.

*Ostocopus.* Dolor in ipso osse, est symptoma spinæ ventosæ, cancri, tophi, sarcoctosis.

*Rheumatismus.* Dolor musculorum, est symptoma præcedens necrosim.

*Anxietas.* Est symptoma morsus venenatæ viperæ.

*Lassitudo.* Sensatio ingrata debilitatis, est symptoma vulneratorum, scorbuti & morborum a contagio, ut luis venereæ.

*Pruritus.* Sensatio ad scalpendum cogens, est symptoma ulcerum, impetiginis, fracturarum diu fasciis non denudatarum.

*Frigus* est symptoma hæmorrhagiæ, supurationis & gangrænæ.

*Calor* est symptoma febris, quæ tumores calidos comitatur.

## SYMPTOMATA SENSUUM INTERNORUM.

Sunt depravationes, imaginationis aut memoriæ abolitiones.

1. *Delirium* est symptoma hæmorrhagiæ magnæ, cerebri læsi, & ingentis doloris.
2. *Rabies* seu desiderium mordendi, est symptoma morsus ab animali rabido infligti.
3. *Hydrophobia* seu potulentorum immanis aversatio, est frequens symptoma vulnerum a cane rabido infligtorum.
4. *Tarantismus* seu effræne saltandi desiderium, dicitur symptoma quod morsum tarantulæ sequi-

tur. At nondum experimenta docuere idum tantulæ hoc symptomata facere.

5. *Vertigo*. Apparens gyratio objectorum, est symptomata hæmorrhagiæ magnæ & cerebri commoti.
6. *Stupiditas* est symptomata læsionum capitis.
7. *Amnesia* seu oblivio omnium fere idearum, est symptomata cerebri læsi.

### S Y M P T O M A T A S O M N I.

*Sopor*. Somnus vix excitabilis, est symptomata cerebri ab effuso sanguine vel impresso cranio affecti, hydrocephali interni, ischuriæ, ulceris subito exsiccati.

*Typhomania*. Somnus apparens cum delirio, est symptomata cerebri a læsione irritati, etiam morsum scolopendræ martinicanæ sequitur.

*Agrypnia*. Pervigilium immodicum, omnis ingratae ideæ & vehementis doloris, præsertim nocturni est symptomata.

*Panophobia*. Pavor in somno, est symptomata, quod osium fracturas, hydrocephalum internum, & morsum canis rabidi sæpe comitatur.

### S Y M P T O M A T A M O T U S M U S C U L A R I S.

Musculorum actio spasmo vel paralyfi, vel depravatione peccare potest.

Spasmi dividuntur in *tonicos* & *clonicos* seu *spasmos* & *convulsiones*.

*Spasmi* sunt involuntariæ & constantes musculorum contractiones: *convulsiones* sunt involuntariæ & reciprocae musculorum agitationes.

*Spasmi.*

*Tetanus.* Est musculorum universi corporis contractio tonica, qua corpus totum statux adinstar lignex extensum manet, aut vel antrosum vel postrosum, vel ad latus curvatur.

Est symptoma cerebri vel musculi temporalis læsi, nervi contusi, ligati, extensi, vellicati, aut caustico tacti. Hinc capitis contusiones, vulnera, amputationes, ligaturas funiculi spermatici, undationes nervorum, cariosos dentes, & luxationes cum articulis ruptis complicatas sæpe sequitur, præsertim in hominibus valde irritabilibus, climatibus calidis, atque nosocomiis putridis.

*Crampus* seu spasmus cruris, est symptoma varicum in cruribus.

*Spasmus maxillæ*, est symptoma anginx tonsillaræ & prodromus fere perpetuus appropinquantis tetani universalis.

*Spasmus faciei* seu *risus sardonius*, subinde læsionem nervi diaphragmatici sequitur.

*Convulsiones.*

*Convulsio* est agitatio involuntaria musculorum totius corporis.

Est symptoma, quod vulnera cerebri, medullæ spinalis & puncturas nervorum sequitur: nec non hæmorrhogias magnas, & acerbissimos dolores: ut odontalgiam, otalgiam, dentitionem, calculum, demum cariem internam cra-

nii, vertebræ, spinam bifidam digito pressam; hydrocephalum internum. Vulnerati, aeri nimis frigido expositi, facile tetano vel convulsione corripiuntur.

*Nystagmus* seu convulsio palpebrarum & bulbi ocularis; est symptoma ophthalmiæ.

*Trismus* seu stridor dentium, est symptoma acerbissimi doloris.

*Epilepsia*. Est convulsio periodica totius corporis: est symptoma exostosis vel cariei internæ cranii, vel vertebræ, cerebri commoti, ulceris antiqui subito sanati.

*Horror* est symptoma inflammationis incipientis, & in suppurationem abeuntis.

*Tremor*. Est symptoma capitis contusi & terroris, quo ægroti jam ante & sub operatione afficiuntur.

*Sternutatio*. Est symptoma ophthalmiæ catarrhalis, evulsi polypi.

*Oscitatio* est symptoma ophthalmiæ periodicæ, hæmorrhagiæ.

*Singultus* est contractio invita diaphragmatis cum inspiratione sonora subito interrupta: est symptoma hæmorrhagiæ, ischuriæ, gangrænæ, anginæ aphtosæ, cerebri, diaphragmatis, ventriculi vel intestini vulnerati, aut contusi, herniæ incarceratæ, vertebræ fractæ, cartilaginis ensiformis impressæ.

*Tussis* est concussio sonora pectoris. Est symptoma corporis heterogenei in tracheam illapsi, puris

vel faniei ex ulcere absorpti & ad pulmones depositi.

*Paralyfes.*

*Apoplexia.* Est paralyfis omnium muscutorum voluntariorum cum respiratione stertorosa & sopore non excitabili. Est symptoma cerebri læsi, extravasato sanguine vel impresso cranio compressi.

*Paralyfis.* Est membri unius laxa immobilitas, est symptoma nervi dissecti, compressi, ligati, vel cerebri commoti, aut compressi.

*Hemiplegia.* Paralyfis in uno tantum latere; dextro vel sinistro, est symptoma cerebri commoti vel compressi.

*Paraplegia.* Paralyfis totius corporis infra caput, vel artuum inferiorum, est symptoma vertebræ luxatæ, fractæ, medullæ spinalis læsæ vel commotæ.

*Debilitas* membrorum totius corporis, est symptoma hydrocephali interni, spinæ bifidæ, morsus venenati & contagii qualiscunque, ut veneriei, scorbuti, gangrænæ.


V O C I S S Y M P T O M A T A.

*Aphonia.* Impotentia loquendi, est symptoma nervi recurrentis laryngei abscissi, compressi, vel nimium distracti, ut in suspensis fit, demum vulneratæ trachæ, thoracis, linguæ penitus abscissæ, tetano affectæ.

*Psellismus.* Est impotentia quasdam syllabas recte pronuntiandi; est symptoma linguæ deformis, defi-

cientis linguæ, uvulæ, veli palatini, dentium, labii leporini, palati fissi, ranulæ, capitis contusi.

*Cacophonia.* Est vocis insuavitas. Vox *nasalis*, est symptoma polypi nasalis, ozenæ, angustiae foraminum posticorum nasi, deficientis uvulæ. Vox *sibilans*, est symptoma anginae polyposæ ac laryngeæ. Vox *rauca*, est symptoma anginae catarrhalis, coryzæ, uvulæ relaxatæ.



## SYMPTOMATA ACTIONUM NATURALIUM.

**S**UNT læsiones appetitus, fitis, masticationis, deglutitionis, chylicationis, sanguificationis, nutritionis, secretionum & excretionum.

## SYMPTOMATA APPETITUUM NATURALIUM.

*Anorexia.* Appetitus deficiens, est symptoma gravis doloris, febris vulnerariæ, hæmorrhagiæ, vesiculæ felleæ vel ventriculi læsi.

*Nausea.* Ciborum fastidium, est symptoma cerebri commoti.

*Adipsia.* Sitis defectus, est symptoma anginae paralyticæ.

*Polydipsia.* Ingens bibendi desiderium, est symptoma vulneratorum, inflammationum, gangrænæ.

*Satyriasis.* Ingens coeundi cupiditas cum libidinosa penis erectione, est symptoma gonorrhææ virulen-

tæ, hydrophobiæ, fufpenforum, cantharidum applicatarum.

*Anaphrodisia.* Abolitio libidinis cum impotentia membrum erigendi, eft symptoma lapfus in lumbos vel os facrum, testiculorum induratorum.

*Tenesmus alvi*, eft frequens alvum deponendi defiderium: eft symptoma calculi, veficæ inflammatae, vel intestini recti inflammati, hæmorrhoidis dolentis, fistulæ ani, præsertim post operationem.

*Tenesmus veficæ* seu frequens mingendi cupiditas: eft symptoma dysuriæ. V. *dysuria*.

## SYMPTOMATA DIGESTIONIS.

*Masticatio læsa*, eft symptoma maxillæ luxatæ, fractæ, dentium vacillantium, deficientium, dolentium, paralyfis & tetani maxillæ, musculorum buccarum & maxillæ vulneratorum, ulceratorum, palati fissi, labii leporini, ranulæ.

*Deglutitio læsa*, seu *Dysphagia*, eft symptoma tetani, hydrophobiæ, œsophagi paralytici, tumorum intra vel extra œsophagum locatorum & illum comprimantium, corporum deglutitorum in œsophago hærentium, œsophagi rupti, ossis hyoidis luxati, bronchoceles, polypi œsophagei vel e naribus in fauces pendentis. Demum anginæ inflammatoriæ, suppuratoriæ, scirrhusæ, venereæ, scorbuticæ, œdematosæ, aneurismaticæ, paralyticæ, spasmodicæ, catarrhalis.

*Dyspepsia* seu digestio ciborum impedita vel imminuta, eft symptoma malæ digestionis, ventriculi vul-

nerati, herniæ ventricularis & intestinalis, vulneratæ veficulæ felleæ, aut ductus hepatici.

### SYMPTOMATA SANGUIIFICATIONIS.

*Cachexia* seu mala sanguificatio, est symptoma hæmorrhagiæ, ulcerum, omnium acrimoniarum, scrophularum, scorbuti, luis venereæ, necrosis & dispepsiæ.

*Icterus* seu cachexia *biliosa*. Est symptoma iræ, morfus viperæ vel animalis rabidi.

*Anasarca*. Aquosa corporis intumescencia, est symptoma hæmorrhagiæ prægressæ; ulcerum subito exsiccatorum vel nimis fluentium, urinæ diu retentæ.

### SYMPTOMATA NUTRITIONIS.

*Tabes* seu macies totius corporis cum febre lenta, at sine tussi & anacatharsi puris. Est symptoma omnis magni ulceris, scrophularum, canceri, herniæ ventricularis, læsionis ductus thoracici, magnæ hæmorrhagiæ prægressæ.

*Phthisis*. Macies totius corporis cum febre lenta, tussi & anacatharsi puris. Est symptoma contusi vel ex vulnere suppurati pulmonis, ulcerum subito sanatorum, quorum materies ad pulmones deponitur, abscessus diu non aperti.

### SYMPTOMATA SECRETIONIS.

Huc pertinent profluvia & retentiones excretionum.

*Profluvia sanguinea.*

*Hæmoptysis*. Sanguinis spumosi expectoratio, est symptoma vulnerati pulmonis, contusi thoracis.

*Hæmatemesis.* Vomitus cruentus, est symptoma ventriculi vulnerati, contusi, hirudinis deglutiti.

*Hæmaturia.* Mictus cruentus, est symptoma vesicæ aut renis vulnerati, contusi, elevati ponderis, calculi vesicæ, hæmorrhoidum.

*Metrorrhagia.* Hæmorrhagia uterina est symptoma uteri vulnerati, contusi, præsertim in gravidis, polypi uterini.

*Diarrhæa cruenta* est symptoma intestinorum vulneratorum, abdominis contusi.

*Fluxus hæmorrhoidalis* est symptoma tuberculi hæmorrhoidalis, polypi & canceri intestinalis.

*Profluvia non sanguinea.*

*Vomitus* est symptoma cerebri commoti, diaphragmatis vulnerati, herniæ incarceratæ, ventriculi contusi, ischuriæ renalis.

*Ileus* seu vomitus fæcum intestinalium cum obstructio-  
ne alvi, est symptoma herniæ incarceratæ, intestini recti coarctati.

*Diarrhæa.* Frequens alvi dejectio, est symptoma abscessus diu clausi, ulcerum, abscessuum, vuln-  
rum, e quibus pus absorbetur, ischuriæ, essentia aloes externe vulneri diu applicatæ.

*Ptyalismus.* Salivæ copiosa excretio, est symptoma maxillæ luxatæ, fractæ, ductus salivalis læsi, ulceris in ore, dentis acuti irritantis, ischuriæ, applicatorum externe mercurialium. *Ptyalismus purulentus*, est symptoma ulceris in auribus, naribus, faucibus.

*Anacatharsis.* Expectoratio puris e pulmonibus, est symptoma vulnerati pulmonis, contusi thoracis, empyematis.

*Diabetes.* Nimia urinæ dejectio, fuit symptoma contusionis lumborum.

*Enuresis.* Involuntaria urinæ emissio, est symptoma vertebræ luxatæ, polypi uterini vel vaginalis, uteri prolapsi, cystoceles, fistulæ vesicæ urinariæ, lithotomiæ, partus difficilis.

*Incontinentia alvi* est symptoma vertebræ lumbalis luxatæ, vel fractæ, medullæ spinalis læsæ vel commotæ, canceri vel nodorum in intestino recto, sphincteris ani, in lithotomia vel operatione fistulæ ani dissecti.

*Pyuria.* Mictio materiæ purulentæ vel mucosæ, est subinde symptoma calculi, hæmorrhoidum, renum vel vesicæ vulneratæ, vel contusæ, puris ex abscessu absorpti.

*Leucorrhæa.* Fluor albus ex vagina vel utero, est symptoma ulceris vel canceri in utero vel vagina, polypi vaginalis, prolapsus uteri.

*Gonorrhæa.* Fluor mucii puriformis ex urethra, est interdum symptoma calculi vesicæ, cereoli in urethram applicati, ulceris in urethra, phymosis.

*Flatulentia.* Aeris oberratio in intestinis, ructus & flatus est symptoma herniosorum.

*Ædopsia* seu flatus emissio per urethram vel vaginam, est symptoma fistulæ ani in vesicam vel vaginam penetrantis.

## RETENTIONES EXCERNENDORUM.

*Ischuria.* Urinæ retentio vel in urethra vel in renibus.


*Ischuria urethralis* est symptoma calculi, vel carunculæ in urethra hærentis, tumoris in perinæo, vel intra vesicam & intestinum rectum, urethræ contractæ, inflammatae, cervicis vesicæ spasmo contractæ, vesicæ paralyticæ, penis œdematosi, præputii concreti.

*Ischuria renalis* est symptoma renis inflammati, contusi, ob vesicam læsam spasmo affecti, ut post lithotomiam interdum videre est.

*Dysuria.* Dolorifica vel ardens mictio, est symptoma calculi, hæmorrhoidis inflammatae, gonorrhææ virulentæ recentis, subinde cantharidum externe applicatarum.

*Dysmenorrhagia* seu suppressio menstruorum est symptoma orificii uterini, vel vaginæ vel vulvæ concreta.

*Obstipatio alvi* est symptoma intestini recti concreti; polyposi, intestini aut vesiculæ felleæ vulneratae, herniæ incarceratae.



## S E M I O T I C A

S E U

## DOCTRINA DE SIGNIS MORBORUM.

**S**IGNUM est phænomenon seu apparitio, qua morbi præsentis vel præteriti vel futuri conditionem noscimus.

*Dividuntur signa morborum*

1. in signa *diagnostica*, quæ morbi statum præsentem.
2. — — — *anamnestica*, quæ morbi statum prægressum.
3. — — — *prognostica*, quæ morbi statum futurum indicant.

Signa diagnostica iterum subdividuntur in *propria*, *communia* & *epigenomena*.

Signa prognostica dividuntur in *bona*, *æquivoca* & *mala*.

## DIAGNOSIS MORBORUM.

Est scientia, quæ signa tradit, quibus morbus præsens nosci & ab aliis distingui possit. Sic

Signa morbi præsentis, adminiculo sensuum externorum, sano ratiocinio, & analogia, eruuntur.

1. *Tactu*, qui vel digito vel instrumentis, ut stilo aut cathetere exercetur, noscimus vulnorum & ulcerum profunditatem, directionem, latentem calculum in vesica, luxata & fracta ossa, tumorum duritiem, mollitiem, fluctuationem, pulsationem, calorem vel frigus &c.
2. *Auditu* percipimus strepitum ossium in fracturis, strepitum aeris in emphysemate.
3. *Odoratu* noscimus putredinem gangrænosam, & in vulnere intestinorum crassorum aut vesicæ, fæcum urinæque fœtorem.
4. *Gustu*. Sic amarus humor e vulnere abdominali effluens indicat vesiculam bilis esse læsam.

5. *Visu* externam morborum faciem noscimus, ut vulnerum & ulcerum magnitudinem: tumorum colores & volumen. Ex visu humorum e vulnere fluentium de internarum partium læsione reddimur certi. Sic ex fœce per vulnus abdominis effluente judicamus de læsione intestini crassi.
6. *Ratiocinio*, quo ex symptomatibus morbi, ex actione causarum morbificarum & ex actione juvantium & nocentium naturam morbi indagamus.
7. *Analogia* morbos minus cognitos cum cognitis comparamus.
8. *Motus* demum *automaticus* & *dolor* in plurimis morbis sedem mali monstrant.

Cujuslibet morbi signa in *propria*, *communis* & *epigenomena* dividuntur.

*Proprium* morbi *signum*, quod etiam *pathognomicum* & *characteristicum* dicitur est illud morbi signum, quo morbus ab omnibus aliis differt. Sic pulsatio est aneurismatis veri, fovea digiti impressi est œdematis, strepitus telæ cellulosæ, est emphysematis signum pathognomicum.

Subinde ex uno subinde ex pluribus simul sumptis signis eruimus signum pathognomicum morbi. Dantur demum casus, qui nullum signum pathognomicum habent, hinc nulla arte humana detegi possunt: sanguis sub cranio effusus quandoque tale exemplum exhibet.

*Commune* morbi *signum* vocatur illud, quod pluribus morbis commune est: sic dolor plurium tum calidorum tum frigidorum tumorum signum est.

*Epigenomenum* vocatur *signum*, quod alium morbum præfenti vel supervenientem vel præcedentem adesse indicat. Sic febris intermittens vulnere superveniens exhibet symptoma epigenomenum.

### ANAMNESIS MORBORUM.

Est scientia, quæ signa tradit, quibus morbi causam detegimus.

*Causa proxima* morbi eruitur 1. ex morbi indole, 2. ex nota actione causæ excitantis seu remotæ, 3. ex præsentia causæ prædisponentis.

*Causa excitans*, si morbus violentiæ vel aliæ causæ externæ originem debet, ex ægroti relatione patet; si vero morbus a causâ interna, quam ægrotus ignorat, ortum habet, examinet chirurgus oportet omnes causas internas, quæ alias morbo huic ansam dare valent.

Hinc examen 6. rerum nonnaturalium & morborum prægressorum, anamnesim morborum pro maxima parte constituit.

### PROGNOSIS MORBORUM.

Est scientia, quæ signa tradit, quibus futurus morbi status prædicitur.

Signa prognostica dividuntur

in *bona*, quæ vitæ & sanationis spem faciunt.

— *æquivoca*, quæ nec periculum nec sanationis difficultatem


— *mala*, quæ periculum vitæ vel sanationis difficultatem indicant.

Ex his signis prædicatur.

1. *Morbi exitus* vel in sanitatem, vel in alium morbum, vel in mortem.
2. *Morbi sanatio* vel difficilis vel facilis, vel impossibilis.

Sapientis est viri in casibus dubiis non certo, sed probabiliter prædicere.

Exitus, & sanatio cujuslibet morbi in *pathologia speciali* traditur.



## T H E R A P I A.

S E U

### DOCTRINA DE CURATIONE MORBORUM.

---

#### DE CURATIONE MORBORUM GENERATIM.

*CURATIO* est ablatio causæ proximæ morbi.

Ablatio causæ vel viribus naturæ vel adminiculis artis peragitur, hinc morbi curatio vel *naturalis* vel *artificialis* est.

*Vires naturæ medicatrices*, sunt potentiæ solidis & fluidis insitæ, quibus natura morbos impedire, vel curare valet. Huc maximæ pertinet.

1. *Vis consolidans*, quæ vulnera, ulcera & fracturas sanat.

2. *Vis suppuratoria*, quæ cruda, obstructa, acris, gangrænosa, cariosa, heterogenea, a partibus sanis separat.
3. *Vis absorbens*, quæ effusum sanguinem; serum, lympham, & alios humores in vasa absorbentia trahit, & sic ecchymoses, hydropes, & alios tumores feliciter curat.
4. *Vis excernens*, quæ humores per cutem, renes, intestina, ulcera artificialia vel tumores metastaticos, & criticos eliminat.
5. *Vis motus vitalis aucta*, qua sæpe tumores ab obstructione nati sua sponte resolvuntur.
6. *Vis motus vitalis imminuta*, qua sæpe hæmorrhagiæ periculossimæ, inducto animi deliquio, sponte sistuntur.
7. *Appetitus demum peculiaris* non raro medicamen salubre indicavit, quo morbus profligatus fuit.

*Plurima* autem *pars* virium medicatricium nobis adhuc ignota est.

Multi demum morbi sine medicamentis a *vi rerum naturalium*, ut aere, cibo, potu, animi pathemate, quiete, motu, demum ab ætate, consuetudine, mutata temperie, climate &c. sine medicamentis sanantur.

Adminicula, quibus *ars* morbos sanat, sunt triplicia: *Diæta*, *Medicamenta*, & *instrumenta*, hinc artificialis therapia dividitur.

1. in *hygienem*, quæ victu & regimine rerum naturalium.

2. — *pharmaceuticam*, quæ medicamentis externis & internis.

3. — *chirurgiam*, quæ manu, fasciis & instrumentis morbos curat.

Cum denique omnis morbus vel præcaveri, vel integre curari, vel solummodo pro parte curari possit, hinc dividitur curatio morborum.

1. in curationem *prophylacticam*, quæ morbos præcavere,

2. — — — — — *palliativam*, quæ morbi symptomata minuere,

3. — — — — — *radicalem*, quæ morbum integre sanare docet.

*Methodus medendi*: est norma, quæ regulas tradit, quibus curatio morbi fieri possit.

Ut autem hæc norma, seu *methodus medendi* inveniat, bene inquirat chirurgus, quale in morbo, quem curandum suscipit, fit

1. *Indicans*, quod morbi ablationem petit,

2. *Indicatio*, qua morbus auferri possit,

3. *Indicatum*, quod morbum auferre valet: & an non adfit

4. *Contraindicans*, seu conditio, quæ indicatum adhibere prohibet.

*Indicans*, est causa proxima morbi, quæ auferri debet.

*Indicatio*, est actio remedii, qua morbus aufertur.

*Indicatum*, est remedium ipsum seu instrumentum, quod indicatam vim morbum auferendi habet.

*Contraindicatio*, est conditio morbi, vel indicati curationi contraria.

Dividitur demum omnis methodus medendi seu curatio morbi.

1. in *curationem rationalem*, quæ juxta indicationes instituitur.
2. ————— *empyricam*, quæ sine indicatione peragitur.

Curatio *rationalis* solummodo in morbis, quorum indoles nota est, institui potest.

————— *empyrica* in illis morbis, quorum indoles nondum innotescit, adhiberi debet. Hinc in his medicamenta specifica empyrice damus.

## DE CURATIONE MORBORUM

### SPECIATIM.

Morbi seu causæ proximæ morborum sequentibus remediis, & instrumentis auferuntur.

## CURATIO MORBORUM SIMPLICIUM

### IN PARTIBUS SOLIDIS.

1. *Laxitas fibrarum*, & *mollities ossium* aufertur medicamentis roborantibus, adstringentibus, aqua frigida, compressione cum fasciis.
2. *Rigiditas fibrarum*, & *fragilitas ossium* curatur emollientibus, mucilaginosiis, oleosis.
3. *Irritabilitas aucta* curatur ablatione stimuli, narcoticis, emollientibus, subinde roborantibus.
4. ————— *imminuta* irritantibus, & roborantibus curatur.
5. *Spasmus* aufertur narcoticis, opio, mercurio gummoso.

6. *Paralysis* exigit nervina, irritantia, præsertim cantharides.

7. *Sensitivitas aucta*, ut irritabilitas aucta, & *sensitivitas deleta*, ut irritabilitas deleta curatur.

Curatio morborum organicorum in *pathologia speciali* traditur.

## CURATIO MORBORUM IN PARTIBUS FLUIDIS.

*Plethora* curatur venæsectione, & victu paucio.

*Keneangia* nutrientibus, & cardiacis.

*Spissitudo* solventibus, antiphlogisticis, potu aquoso.

*Tenuitas* inviscantibus, & roborantibus.

*Acrimonia acida* curatur absorbentibus terris, salibus alcalinis, amaricantibus.

———— *alkalina* curatur acidis.

———— *muriatica* obvolventibus, diluentibus.

———— *venerea* mercurialibus.

———— *scorbutica* succo citri, aurantium, & herbis recentibus.

———— *arthritica* specificis, ut antimonio, aconito.

———— *podagrica* aqua frigida, & specificis.

———— *rheumatica* antimoniatas, & specificis.

———— *scrophulosa* cortice peruviano, cicuta, sapone veneto.

———— *scirrhusa*, & *cancerosa* cicuta, & aliis specificis.

———— *carbunculosa*, & *pestilentialis* aceto ruta-  
ceo, camphora, & specificis.

———— *putrida*, & *gangrænosa* antisepticiis, cor-  
tice peruviano, camphora, arnica, ruta.

———— *rancida* purgantibus, mellitis.

———— *ulcerosa* nitro, salibus mediis, camphora,  
cortice peruviano.

*Acrimonia cariosa* curatur cortice peruviano, asa-  
fœtida.

*Saburra primarum viarum* emeticis, & purgantibus.

*Error loci* repellentibus, & aqua frigida.

*Materia perspirabilis retenta* sudoriferis.

*Urina retenta* ablatione causæ, quæ ischuriam in-  
ducit.

*Fœx alvina retenta* curatur purgantibus, & enema-  
tibus.

*Lac retentum* extractione ope antliæ mammaræ.

*Retentio sanguinis menstrui* restitutis menstruis.

———— ————— *hæmorrhoidalis* hirudinibus.

*Excretio nimia sanguinis*, vel *alius humoris* reme-  
diis fistentibus.

*Extravasatio*, & *stagnatio humorum*, fomentis resol-  
ventibus, internis evacuantibus, vel facta aper-  
tura.

*Metastasis* facta apertura.

*Congestio*, & *phlogosis*, seu *inflammatio* curatur  
antiphlogisticis, evacuantibus, revellentibus, ob-  
volventibus, ablatione stimuli, venæsectione,  
aqua frigida.

---

H Y G I E N E,  
S E U  
DOCTRINA DE REGIMINE  
Æ G R O T I.

---

**V**ICTUS, & rerum naturalium a chirurgo præscripta methodus, quæ sub curatione morborum chirurgicorum ab ægroto observari debet, *hygiene* vocatur.

Hæc regimen tradit 6. rerum naturalium, quarum usu sanitas conservari, & morbi curari possunt, nempe huc pertinent.

1. *Aer.*
2. *Cibus, & potus.*
3. *Motus, & quies.*
4. *Animi affectus.*
5. *Retenta, & excreta.*
6. *Somnus, & vigiliæ.*

A E R.

Circa vulneratos, ulcerosos, fit calidus, purus, & serenus. Evitetur aer nosocomii putridus, aut humidus, frigidus & nimium calidus. Nec aeri, licet puro, diu exponantur vulnera, aut ulcera. Horum deligatio, accenso fumo aromatico, & cito peragatur.

## C I B U S.

Sit qualitate, & quantitate bonus. Nempe facile digerendus, & nec excessu nec defectu peccans.

*Diæta triplex est; plena  
mediocris &  
tenuis.*

*Diæta crassa*, seu *plena* est, quæ non solum vires corporis conservare, sed etiam robur earum augere potest. Hinc

*Cerealia cum jure carniū.*

*Carnes juniorum animalium castratorum.*

*Vegetabilia tenera.*

*Caro assata animalium juniorum, vel pullorum.*

*Diæta plena* convenit hominibus robustis, leviter vulneratis, aut a morbo penitus reconvalescentibus.

*Diæta mediocris* vires conservat, at non auget. Ut  
*Juscula cerealia, vel farinacea.*

*Carnes pullorum coctæ.*

*Fructus cocti bene maturi.*

Convenit hæc *diæta* vulneratis, & aliis morbis laborantibus si inflammatio, & febris abest.

*Diæta tenuis*, quæ vires nonnihil imminutas conservat, ut

*Jura cerealia aut farinacea.*

*Fructus cocti aciduli.*

Convenit hæc *diæta* graviter vulneratis, atque si febris vulneraria, aut inflammatio adest. Hinc etiam *diæta antiphlogistica* dicitur.

Sed semper in ordinanda diæta, ætati, consuetudini,  
& tempori aliquid dandum est.

### P O T U S.

*Aqua* bona consuetis est optima. *Vinum* vel bona *cerevisia* absente febre, & inflammatione debilibus, & reconvalescentibus datur. *Limonada*, vel *decoctum hordei* cum *oxymelle*, aut *emulsio* tenuis amygdalarum cum *nitro*, in morbis inflammatoriis pro potu ordinario exhibetur.

### M O T U S, E T Q U I E S.

Motus convenit mediocris, quibus nec febris, aut inflammatio, aut membrum fractum est. His quies præscribitur. *Situs* membri aliquantum flexi in omnibus fere fracturis convenit. *Decubitus* ossis sacri sub longa mora in lecto impediatur, quod præsertim in curatione fracturæ cruris, vel femoris exigitur.

### A N I M I A F F E C T U S.


*Spes*, & mediocre *gaudium* profunt, cætera animi pathemata, & ingenii labores, atque violentæ sensuum exercitationes evitentur.

### R E T E N T A, E T E X C R E T A.

*Excretio* alvi, urinæ, atque transpiratio cutanea quotidie procedant, & promoveantur *retenta*, alvus enemate, urina, & transpiratio potu, vel diuretico, vel diaphoretico.

## S O M N U S , E T V I G I L I Æ .

Somnus fit moderatus, vigiliæ evitentur.



## P H A R M A C E U T I C A

S E U

## D O C T R I N A D E C U R A T I O N E

M E D I C I N A L I .

**I**LLA therapiæ pars, quæ medicamentis morbos chirurgicos curare docet, *Pharmaceutica* dicitur.

Medicamenta sunt entia ex regno animali, vegetabili, vel minerali deprompta, quæ vim morbos auferendi habent. Hinc *primaria* medicamentorum divisio est in medicamenta *vegetabilia*, *animalia*, *mineralia*.

Medicamenta ad sanandos morbos externos, vel corpori applicantur; vel in ventriculum ingeruntur, hinc *secunda* medicamentorum divisio est in *medicamenta externa*, & *in interna*.

Cum demum omnia medicamenta, vel cruda, vel arte pharmaceutica aliquantum immutata, vel manu pharmacopæi ex simplicibus pluribus commixta adhibeantur: hinc *tertia* medicamentorum divisio est in *simplicia*, *præparata*, & *composita*.

Cum demum *actio* medicamentorum a principiis constitutivis pendeat, & juxta horum diversitatem, hæc varia sit, hinc medicamenta ab *indole*, seu *qualitate* principiorum constitutivorum dividuntur.

In mucilaginosæ, oleosæ, gelatinosæ, gummosæ, resinosæ, bituminosæ, balsamicæ, austere, aromaticæ, saponaceæ, acriæ, catusticæ, narcoticæ, acidæ, alcalinæ falsæ, spirituosæ, æthereæ, terrea, metallicæ, aquosæ, mechanicæ.

Ab *actione* autem medicata dividuntur medicamenta in emollientia, adstringentia, roborantia, stiptica, ficcantia, humectantia, obvolventia, anodyna, suppurantia, attrahentia, repellentia, corrodentia, corrigentia, detergentia, consolidantia, cicatrisantia, calefacientia, refrigerantia, resolventia, deplentia, specifica.

Ultimum demum est ut sciat Chirurgus *formam*, qua adhiberi medicamenta debeant, hinc a *forma applicationis* dividi solent medicamenta.

1. In *formulas præparatorum*, ut sunt aquæ destillatæ, aceta, spiritus, tincturæ, essentia, elixiria, extracta, olea, decocta, infusa, mella, liquores, mucilagines, saponæ, pulpæ, resinæ, succi, sassa, axungia, seba, spongiæ præparatæ, præparata terrea, & metallicæ.
2. In *formulas compositorum* ut sunt, aquæ compositæ, tincturæ compositæ, liquores, balsama,

olea composita, mucilagines, spiritus compositi, species, fomenta humida, fomenta sicca, cataplasmata, gargarismata, collutoria, injectiones, clysmata, lavatoria, balnea artificialia, vaporationes, embrocationes, suffitus, pulveres, emplastra, cerata, unguenta, linimenta, electuaria, suppositoria, trochisci, lapides, globi, pastæ, candelulæ.

Ex his ergo patet *Pharmaceuticam chirurgicam* subdividi debere.

1. in *materiam chirurgicam*.
2. — *pharmatiam chirurgicam*.
3. — *methodum præscribendi formulas externas*.

Has tres doctrinas in mea *materia chirurgica* & in mea *pharmacia chirurgica* sufficienter doceo.



---

# CHIRURGIA

S E U

## DOCTRINA DE CURATIONE MANUALI.

---

**I**LLA therapiae pars, quæ morbos ope manum, fasciarum vel instrumentorum sanare docet, strictissimo sensu *chirurgia* vocatur.

Curatio manualis adhibetur si nec diæta, nec medicamenta sufficiunt.

Adminicula *chirurgiæ manualis* sunt *manus, fasciæ, instrumenta*; hinc dividitur *chirurgia manualis*.

1. in *doctrinam de faciis*, quæ compositionem & applicationem deligationis & fasciarum docet.
2. in *doctrinam de instrumentis*, quæ instrumentorum figuram, materiem, divisionem, structuram, applicationem & usum tradit.
3. in *doctrinam de operationibus*, quæ indicationem, contraindicationem, locum, ægroti præparationem, apparatus deligationis, & instrumentorum, situm ægroti & chirurgi pro operatione, operationis manipulationem ipsam, demum deligationem & infortunia, quæ in, vel post operationem contingere possunt, docet.

A *veteribus* dividebantur operationes juxta effectum, quem producunt, in sequentia 7. genera.

1. est *Synthesis* quæ unit præternaturales solutiones continui.
2. — *Taxis* quæ reducit loco dimota.
3. — *Diorthosis* quæ male formata reformat.
4. — *Diæresis* quæ separat unita.
5. — *Exeresis* quæ heterogenea e corpore tollit.
6. — *Prostesis* quæ deficientia restituit.
7. — *Aphræsis* quæ superflua demit.

*Recentiores* dividunt operationes.

1. in *manuales* quæ manu nuda peraguntur , ut repositio herniæ vel luxationis est.
2. in *instrumentales* quæ manu instrumentis armata perficiuntur , ut venæsectio , trepanatio , amputatio , &c.

De operationibus vide ultimam *chirurgiæ practicæ* doctrinam , quæ operationes tradit.



PHARMACOLOGIA

*S E V*

DOCTRINA

DE MEDICAMENTIS.

PHARMACOLOGIA

DOCTRINA

DE MEDICAMENTIS



# PHARMACOLOGIA

S E U

## DOCTRINA DE MEDICAMENTIS:

---

MEDICAMENTA dividuntur,

1. in *externa*, & *interna*.
  2. in *simplicia*, *præparata*, & *composita*.
- 

## MATERIA CHIRURGICA,

S E U

## CLASSES MEDICAMENTORUM EXTERNORUM.

---

### DIGESTIVA.

SUNT remedia, quæ in vulneribus, & ulceribus  
Suppurationem promovent.

Balsamus Arcæi.

Unguentum digestivum.

Unguentum basiliconis.

Digestivum liquidum.

### VULNERARIA.

*Quæ ad vulnera, & ulcera sananda adhibentur.*

Aqua vulneraria simplex.

— Thediana.

— Phagedænica.

Spiritus vini mastichinus.

Balsamus Arcæi.

### UNIENTIA.

*Emplastra tenacia, quibus vulnera scissa uniuntur, sunt.*

Emplastrum anglicanum.

— stipticum.

— de minio.

### DETERGENTIA.

*Quæ ulcera lardacea detergunt, & purificant.*

Unguentum digestivum acre.

— Ægyptiacum.

Aqua phagedænica.

Mercurius præcipitatus ruber.

### EXSICCANTIA.

*Quæ vulnera, & ulcera exsiccant, seu cicatrisant.*

Extractum Saturni.

Linteum carptum ficcum.

Bolus armena.

Alumen ustum.

Aqua Thediana.

### STIPTICA.

*Remedia , quæ hæmorrhagiam sistunt.*

Alcohol vini.

Spiritus terebinthinæ.

Aqua Thediana.

Vitriolum cæruleum.

Fungus agaricus.

Linteum carptum.

### ADSTRINGENTIA.

*Quæ partes relaxatas adstringendo roborant.*

Species adstringentes in vino rubro coctæ.

Aqua Thediana.

Alumen.

Saccharum saturni.

Aqua calcis.

Vinum rubrum.

### ROBORANTIA.

*Quæ partes relaxatas leni stimulo roborant.*

Species cephalicæ.

Vinum rubrum.

Spiritus vini camphoratus.

—— anthos seu rorismarini.

—— lavendulæ.

RESOLVENTIA TUMORUM  
CALIDORUM.

*Quæ inflammationem, & tumores calidos resolvunt.*

Oxycratum.

Vinum aquatum.

Aqua vegetomineralis.

Fomentum ex herbis resolventibus.

Fomentum ex fæcibus vini.

———— ex farinis resolventibus.

RESOLVENTIA TUMORUM  
FRIGIDORUM.

*Quæ tumores frigidos resolvunt.*

Sapo venetus in lacte solutus.

Solutio balsami vitæ externi.

Gummi ammoniacum aceto solutum.

Fomentum, vel cataplasma cicutæ.

Spiritus saponaceus.

Emplastrum de cicuta.

———— saponatum.

EMOLLIENTIA.

*Quæ tumores induratos, & inflammatos emolliunt.*

Emplastrum diachilon simplex.

Cataplasma emolliens.

Fomentum ex herbis emollientibus.

Unguentum de althea.

MATURANTIA.

*Quæ tumorum inflammatoriorum suppurationem  
promovent.*

Emplastrum de galbano.

———— diachilon cum gummatibus.

Unguentum basiliconis.

Cataplasma maturans.

Fermentum ex farina mellita.

Caricæ in lacte coctæ.

ANODYNA.

*Quæ dolorem mitigant.*

Cataplasma ex foliis hyosciami.

Crocus.

Opium.

Linimentum anodynum.

REPELLENTIA.

*Quæ humores in vasis stagnantes repellunt seu discu-  
tiunt, ut in ophthalmia.*

Aqua frigida.

—— vegetomineralis.

—— vitriolata.

CAUSTICA.

*Quæ partes, quibus applicantur, corrodunt.*

Lapis causticus adhibetur ad aperiendos abscessus.

Lapis infernalis . . ad carnem fungosam papillarem.

Alumen ustum . . ad carnem fungosam latam.

Oleum camphoræ causticum . . *ad sarcomata fungosa magna.*

Pulvis flammulæ jovis vel

Pulvis sedi acris . . *ad cancrum fungosum.*

Butyrum antimonii . . *ad callosos margines ulcerum & fistularum.*

Præcipitatus ruber . . *ad ulcera lardacea venerea.*

Aqua fortis mercurialis . . *ad cariem nigram.*

Aqua caustica mercurialis . . *ad condylomata venerea.*

Pulvis vitrioli cærulei . . *ad vasa lymphatica læsa.*

Pasta ad nævos . . *ad nævos maternos.*

Spiritus salis concentratus . . *ad verrucas.*

Viride æris cum cæra . . *ad clavos pedis.*

Unguentum Saintyvianum . . *ad pterygia oculi.*

Pulvis cantharidum . . *ad vulnera cane rabido inflata.*

#### ANTISEPTICA.

*Quæ putredini & gangrænæ resistunt.*

Cortex Peruvianus.

Camphora.

Ruta.

Unguentum de styrace.

#### ANTIVENEREA.

*Quæ ulcera venerea sanant.*

Aqua phagædenica.

Balsamum mercuriale.

Solutio sublimati corrosivi.

Gargarisma mercuriale.

ANTICANCROSA.

*Quæ in cancro & indurationibus applicantur.*

Cicuta.

ANTICARIOSA.

*Quæ in carie applicantur.*

Essentia mastichina,

—— myrrhæ.

—— euphorbii.

---

FORMULÆ CONSUETISSIMÆ  
MEDICAMENTORUM  
COMPOSITORUM.

---

SPECIES EMOLLIENTES.

Hb. malvæ.

—— althææ.

—— verbasci.

SPECIES RESOLVENTES.

Flores chamomillæ.

—— sambuci.

—— arnicæ.

Hb. marrubii.

SPECIES CEPHALICÆ.

Hb. menthæ.  
— melissæ.  
— rorismarini.  
— salviæ.

Flores lavendulæ.  
— rofarum.  
— arnicæ.

SPECIES ADSTRINGENTES.

Rad. tormentillæ.  
— bistortæ.  
Fol. plantaginis.

SPECIES VULNERARIÆ.

Hb. rutæ.  
— alchimillæ.  
Flor. hypericonis.

FARINÆ RESOLVENTES.

Farina fabarum.  
— hordei.  
— fecalis.

FARINÆ EMOLLIENTES.

Farina seminum lini.  
— fænugræci.

SPIRITUS MASTICHINUS.

Gummi mastix in spiritu vini solvitur.

AQUA VULNERARIA SIMPLEX,

Herbæ balsamicæ cum spiritu vini destillantur.

AQUA VULNERARIA THEDIANA.

Ex aqua , spiritu vini , spiritu vitrioli , & saccharo albo constat.

AQUA PHAGEDÆNICA.

Mercurius sublimatus corrosivus in aqua calcis solvitur.

AQUA ALBA SEU VEGETOMINERALIS.

Una drachma extracti saturni & spiritus vini in mensura aquæ diluitur.

AQUA OPHTHALMICA VITRIOLATA.

Aliquot grana vitrioli albi in aliquot unciiis aquæ rosarum solvuntur.

UNGUENTUM DIGESTIVUM SIMPLEX.

Terebinthina cruda cum vitello ovi subigitur, dein additur myrrha & oleum hypericonis.

UNGUENTUM DIGESTIVUM ACRE.

Ex unguento digestivo simplici & mercurio præcipitato rubro constat.

DIGESTIVUM LIQUIDUM.

Digestivum simplex cum ovi vitello & melle in aqua diluitur.

BALSAMUS ARCÆI.

Ex terebinthina, gummi elemi, cera, sevo hircino, & oleo hypericonis constat.

BALSAMUS MERCURIALIS.

Ex balsamo Arcæi, unguento neapolitano, & mercurio dulci componitur.

UNGUENTUM NEAPOLITANUM SEU  
MERCURIALE.

Ex mercurio vivo, & axungia porcina constat.

MERCURIUS GUMMOSUS.

Mercurii vivi ℥j & gummi arabici ℥iij cum syrupo aliquo in marmoreo mortario conteruntur in mucum.

CATAPLASMA EMOLLIENS.

Mica panis albi, ovi vitellus, crocus & butyrum cum lacte coquuntur.

CATAPLASMA RESOLVENS.

Herbæ & farinæ resolventes cum aqua alba coquuntur.

## FOMENTUM ADSTRINGENS.

Species adstringentes cum alumine, vel saccharo saturni in vino rubro coquuntur. Dein spiritus vini camphoratus additur.

## FOMENTATIO RESOLVENS SICCA.

Farinæ resolventes cum speciebus resolventibus & camphora in pulverem rediguntur.

## ENEMA EMOLLIENS.

Ex ℥viii decocti emollientis & ℥iv olei lini constat.

## ENEMA ALVUM SOLVENS.

Ex decocto emolliente ℥viii & una uncia mellis communis, atque ℥j salis amari constat.

## ENEMA ACRE.

Ex decocto emolliente ℥vj. & pulvere jallapæ ℥ij, vel scillæ ℥j componi potest.

## PONDERA PHARMACEUTICA.

℔ seu libra habet ℥xij.

℥ — uncia — ℥viii.

℥ — drachma — ℥iiij.

℥ — scrupulus — gr. xx.

gr. — granum.

gt. — gutta.

ſ — ſemis.

ââ. feu ana, id est totidem.

Menf. feu menfura habet ℥iv.

Manip. — manipulus.

---

# MATERIA MEDICA

S E U

C L A S S E S

M E D I C A M E N T O R U M

I N T E R N O R U M.

---

## VOMITORIA SEU EMETICA.

*D*A N T U R *fi bilis corrupta, vel cibi corrupti in ventriculo sunt. Quod noscitur ex nausea & lingua amara.*

Pulvis radice Ipecacuanhæ gr. xv.

Tartarus emeticus gr. ij.

Potio emetica. *Ex 4. gr. tartari emetici & 4. unciis aquæ constat, & cochleatim datur.*

*Vomitoria nocent gravidis, herniosis, & qui sanguinem vomunt vel spuunt. His debet purgans dari.*

## PURGANTIA.

*Indicantur si corrupta saburra in intestinis est.*

*Purgantia dividuntur in lenia & fortia.*

*Lenia quæ simul refrigerant sunt.*

Sal amarus ℥iſs.

Manna ℥iij.

Cremor tartari ℥ſs.

Rheum ℥j.

Pulvis radice Jalappæ ℥ſs.

Potio laxativa D. Vien. ℥iv.

Electuarium lenitivum ℥j.

Pulpa tamarindorum ℥iij.

Syrupus cichorei c. rheo. vel

Syrupus manatus *cochleatim* infantibus datur.

*Purgantia fortia seu Draſtica vocantur.*

Refina Jalapæ gr. x. in ſpiritu vini ℥ſs.

Refina ſcamonii *etiam ſic.*

Pillulæ anethinæ ℥ſs.

#### SUDORIFERA.

*Indicantur in catarrho, acrimonia & ſcabie.*

Infuſum flor. ſambuci.

Decoctum lignorum.

Antimonium diaphoreticum gr. xx.

Pulvis antiſpaſm. ruber ℥ſs.

#### DIURETICA.

*Indicantur in morbis hydropicis & tumoribus aquoſis.*

Oxymel ſcilliticum ℥j.

Oxymel colchicum ℥j.

Pulvis ſcillæ gr. x.

Vinum ſcilliticum ℥ij.

Decoctum Juniperi ꝥj.

#### EXPECTORANTIA.

*Dantur in aſthmate pituitoso & purulento.*

Spec. pectorales cum scilla.  
 Oxymel scilliticum ℥j.  
 Gummi ammoniacum gr. xx.  
 Kermes minerale gr. ij.

### ANTIPHLOGISTICA SEU REFRIGERANTIA.

*Indicantur in morbis inflammatoriis & febribus calidis.*

Limonada Mj.  
 Decoctum hordei Mj.  
 ——— avenæ Mj.  
 Oxymel simplex ℥ij.  
 Nitrum ʒss.  
 Emulsio amygdalina cum nitro.

### ANTISEPTICA SEU ANTIPUTREDINOSA.

*Indicantur in febribus putridis, gangræna, & carie.*

Cortex peruvianus ℥j.  
 Camphora gr. x.  
 Acetum vini ℥ij.  
 Spiritus vitrioli gtt. xxx. ad ℥bj. aquæ.

### CARDIACA SEU EXCITANTIA.

*Indicantur in debilitate sine inflammatione, & calore.*

Vinum Tokainum ℥ij.  
 Liqueur anodynus mineralis gt. xx.

### ROBORANTIA.

*Indicantur in chlorosi, & debilitate, sine febre calida.*

Cortex peruvianus ℥j.

Extractum martis pomati ℥ss.

Tinctura cinamomi ℥j.

### STOMACHICA.

*Indicantur in debilitate ventriculi.*

Essentia amara ℥ss.

Elixir vitrioli gt. xx.

Spec. amaræ.

Pulvis gentianæ ℥ss.

### CARMINATIVA.

*Dantur in colica flatulenta.*

Essentia carminativa ℥j.

Spiritus nitri dulcis gt. xxx.

Aqua fœniculi.

### ANODYNA.

*Indicantur in dolore, qui sine inflammatione est.*

Opium gr. ss vel j.

Laudandum liquidum gt. xij.

### ANTISPASMODICA.

*Indicantur in tetano & convulsione, post omnes magnas operationes chirurgicas cum oleo dantur.*

Opium gr. j.

Laudanum gt. xx.

### VULNERARIA.

*Quæ in ulceribus pulmonum & aliarum partium hinc in phthysi & hæctica commendantur.*

Decoctum vulnerarium.

Decoctum polygalæ amaræ.

———— lichenis islandici.

Aqua felterana cum lacte caprino.

Pilulæ balsamicæ.

## RESOLVENTIA.

*Indicantur in scirrho , indurationibus viscerum & glandularum.*

Sapo venetus gr. xx.

Extractum cicutæ gr. xx.

Gummi ammoniacum. gr. xx.

Tartarus tartarizatus.

———— vitriolatus.

Sal mirabilis.

Sal polychrestus gr. xx.

## ANTACIDA SEU ABSORBENDIA ACIDUM.

*Indicantur in aciditate ventriculi aut intestinorum.*

Lapid. cancrorum gr. xx.

Magnesia alba ℥j.

Sal tartari gr. x.

## LENIENTIA.

*Indicantur in colica, doloribus aliis, & Dysuria.*

Emulsio amygdalina ℥j.

Pulvis gummi arabici ℥ss.

Oleum amygdalarum dulcium ℥ij.

Syrupus diacodii ℥ss.

## EMOLLIENTIA

## E M O L L I E N T I A.

*Indicantur in morbis dolorosis, & inflammatoriis.*

Decoctum rad. althææ.

Infusum seminum lini.

## A D S T R I N G E N T I A.

*Indicantur in hæmorrhagiis, & diarrhæa habituali.*

Alumen draconifatum ʒj.

Terra japonica ʒj.

Bolus armena ʒij.

Decoctum fimarubæ.

Conserva rosarum rubrarum ʒij.

## A N T I V E N E R E A.

*Indicantur in morbis venereis.*

Mercurius gummosus gr. xx.

——— dulcis gr. ij.

——— sublimatus corrosivus gr.  $\frac{1}{2}$  ʒij. Decocti.

## A N T I S C O R B U T I C A.

*Dantur in morbis scorbuticis.*

Succus nasturtii.

——— Cochleariæ.

——— Beccabungæ.

——— Citri.

——— Aurantiorum ʒij.

Conserva nasturtii ʒij.

Brassica acidulata.

Cerevisia raphanacea.

Mustum malti.

Fructus, & cibi vegetabiles.

# PURIFICANTIA SANGUINEM.

*Indicantur in omni acrimonia humorum in scabie,  
& in lue venerea.*

Decoctum sarsaparillæ.

———— Bardanæ.

———— lignorum.

Flores sulphuris.

Æthiops mineralis.

Extractum enulæ.



ELENCHUS  
INSTRUMENTORUM  
CHIRURGICORUM.

INSTITUTIONUM  
F. E. N. C. H. U. S.  
MUSEORUM



E L E N C H U S  
I N S T R U M E N T O R U M  
C H I R U R G I C O R U M M A X I M E  
U S U A L I U M.

---

I N S T R U M E N T A V U L G A R I A,  
Q U Æ C H I R U R G U S S E M P E R  
S E C U M H A B E A T.

**F** O R F E X recta.

— — — curva.

Spatha pro ore.

— — — myrthiformis.

Forceps vulgaris.

Stylus.

Sulcus.

Cochlear auriculare.

Instrumentum pro lapide infernali.

Culter tonsorius.

C A P S U L A P R O L A N C E O L I S.

6. Lanceolæ.

2. Phlebotomi.

CAPSULA PRO CULTRIS.

Culter rectus.

—— curvus.

—— capitatus.

Lanceola major.

MARSUPIUM PRO TORNACULO.

Tornaculum vulgare.

2 Acus curvæ cum filis ceratis.

Spleniola graduata.

Fascia 4. ulnarum.

Fungus agaricus.

---

INSTRUMENTA, PRO QUALIBET  
OPERATIONE SPECIATIM  
INDICATA.

---

PRO VENÆ SECTIONE.

Lanceola.

Phlebotomus.

PRO SECTIONE VENÆ  
JUGULARIS.

Compressorium venæ jugularis.

PRO ARTERIOTOMIA.

Lanceola.

PRO APERTURA ABSCESSUS.

Lanceola major.

PRO ENUCLEATIONE TUMORIS.

Culter.

Sulcus apice obtuso.

—— ——— acuto.

Hamulus.

Volsella.

PRO EXCISIONE SARCOMATIS.

Forfex juxta superficiem curvata.

Culter ——— curvatus major.

—— ——— curvatus minor.

Acus pro ligando sarcomate.

PRO EXPLORATIONE VULNERIS  
PUNCTI.

Stylus tenuior.

—— crassior.

—— longus.

—— ex balena.

Syringa pro vulnere.

PRO DILATATIONE VULNERIS.

Culter rectus.

—— curvus.

—— occultus.

Forfex dilatatoria.

Tubulus.

Sulcus latus.

Instrumentum pro contraapertura.

PRO EXIMENDO GLOBO  
E VULNERE.

Forceps recta.

—— curva.

—— tridentata.

Cochlear.

Terebra pro glandibus plumbeis.

PRO SUTURA VULNERUM.

6. Acus curvæ majores.

—— ——— minores.

PRO COMPRESSIONE ARTERIARUM.

Tornaculum vulgare.

—— PETITIANUM.

—— anglicanum.

—— pro læsione arteriæ radialis.

PRO LIGATURA ARTERIARUM.

6. Acus curvæ magnæ.

—— ——— minores.

Acus pro arteria intercostali.

Detrusorium arteriæ intercostalis.

Acus curva magna.

PRO SCARIFICATIONE.

Culter.

Cubus scarificatorius.

Ventosa.

Antlia.

PRO FACIENDO FONTICULO.

Culter.

Cingulum pro fonticulo.

PRO SETACEO.

Forceps pro setaceo.

Acus pro setaceo.

PRO INOCULATIONE.

Lanceola.

Phlebotomus pro inoculatione.

PRO CAUTERISATIONE.

Cauteria variæ figuræ.

Vaginæ variæ figuræ.

PRO DANDO ENEMATE.

Syringa clysmatica vulgaris.

Vesica clysmatica.

Tubulus major.

——— minor.

Machina pro fumo tabaci.

*Machina, qua quivis sibi ipsi commode clyisma injicere, & anum vel scrotum balneare potest, & qua foeminæ in vaginam uteri sibi injectiones facere possunt.*

PRO UNGUIBUS EXTRAHENDIS.

Forceps ad decerpandos.

—— — discindendos.

—— — extrahendos ungues.

PRO PUNCTURA AURICULARUM.

Instrumentum pro punctura auricularum.

PRO EXIMENDO CORPORE  
HETEROGENEO EX MEATU  
AUDITORIO.

Cochlear auriculare.

Forceps auricularis.

PRO EXSTIRPANDA CARIE.

Acus punctoria, seu subula.

Trepanum perforativum.

—— — exfoliativum.

Raspatorium.

Lima.

Forceps scissoria.

Serulæ CEL. SCHMUKER.

Cuneus.

—— — excavatus.

Malleus.

PRO DENUDATIONE CRANII.

Culter tonsorius.

—— simplex.

Spatha myrthiformis.

PRO TREPANATIONE.

Trepanum cum corona.

—— perforativum.

Clavis pro pyramide trepani.

Elevatorium cochleatum.

Forceps pro eximendo orbiculo offis.

Sulcus apice acuto.

Dentiscalpium.

Scopula setacea.

Culter lenticularis.

Depressorium, duræ matris.

Forceps scissoria cum apicibus semilenticularibus.

PRO ELEVATIONE CRANII.

Antlia.

Elevatorium vulgare.

—— PETITIANUM.

PRO HÆMORRHAGIA NARIUM.

Instrumentum pro obturatione foraminum posticorum  
nasi.

Tubulus elasticus pro hæmorrhagia narium.

PRO SECTIONE FRENULI  
SUBLINGUALIS.

Forfex apicibus obtusis.

Instrumentum CEL. PLATNERI.

Spathula incisa.

PRO PERFORATIONE ANTRI  
HIGMORIANI.

Hamulus pro bucca.

Stylus perforatorius major.

—— ———— minor.

Trepanum parvum.

Syringa pro injectione per alveolum dentis.

Tubulus.

Stylus tenuis.

PRO EXSTIRPATIONE POLYPI  
NASALIS.

Forceps recta pro polypo.

—— curva.

—— dentata ad conterendum polypum.

—— scissoria ad abscindendum polypum.

—— Cl. PROF. RICHTER.

Culter semilunaris.

—— oculus.

Cauterium pro polypo.

Cannula pro ligando polypo nasali.

—— ———— ———— ———— uterino.

Filum argenteum tenue.

PRO EXIMENDO CORPORE  
HETEROGENEO EX CAVO  
FAUCIUM.

Forceps semicircularis pro faucibus.

— superficialiter se aperiens.

Detrusorium ex balena.

Instrumentum VENELIANUM.

PRO AMPUTATIONE UVULÆ.

Instrumentum pro amputatione uvulæ.

— — liganda uvula.

— — ligandis tonsillis.

Forfex pro abscindenda uvula.

PRO APERTURA ABSCESSUS IN  
FAUCIBUS.

Cochlea oris.

Pharyngotomus.

Instrumentum pro pennicillatione faucium.

PRO INJECTIONE FAUCIUM.

Syringa argentea.

Spatha argentea pro ore.

PRO OPERATIONE LABII LEPORINI.

Forfex pro labio leporino.

Cultet.

Forceps scissoria pro decerpenda eminentia ossea.

Fascia uniens cum filis cruciatim decussatis.

PRO PALATO.

Obturator palati.

PRO TRACHEOTOMIA.

Culter rectus.

— bipennis.

Sulcus.

Cannula laryngea argentea.

Lanceola ocula laryngea. Cl. P. RICHTER.

Acus bis cannulata.

PRO OESOPHAGOTOMIA.

Culter.

Hamulus.

Sulcus.

PRO AMPUTATIONE MAMMÆ.

2. Cultri pro amputatione mammæ.

Hamulus.

PRO EXTRACTIONE LACTIS EX  
MAMMIS.

Antlia mammaria CEL. P. STEIN.

PRO PARACENTHESI THORACIS.

Culter acutus.

— capitatus.

Cannula argentea.

Syringa pectoralis CEL. P. LEBER.

Acus pro arteria intercostali.

PRO PARACENTHESI ABDOMINIS.

Acus triquetra vulgaris.

— — — cum cannula incisa.

Reductor omenti.

Obturator cannulæ.

Cingulum abdominale.

PRO GASTRORAPHIA.

6. Acus magnæ & curvæ.

Calamus crassus.

PRO ENTERORAPHIA.

3. Acus curvæ & tenues.

3. Fila diverfi coloris.

Tubus ex cartha lusoria.

PRO HERNIOTOMIA.

Culter rectus.

— — — curvus.

— — — capitatus.

— — — occultus.

Sulcus simplex.

— — — alatus.

Dilatatorium.

PRO SECTIONE CÆSAREÆ.

Culter curvus.

— — — rectus.

— — — recurvatus.

Sulcus latus.

Forfex curva.

PRO PARACENTHESI SCROTI.

Acus triquetra parva.

PRO SETACEO SCROTI.

Acus cannulata pro setaceo juxta CEL. POTT.

PRO AMPUTATIONE MEMBRI VIRILIS.

Culter.

Cannula argentea cum anfis.

PRO CATHETERISMO VESICÆ  
URINARIÆ.

Catheter virilis tenuior.

— — — crassior.

— — — flexilis.

— — — pro infante.

— — — muliebris.

Candelulæ simplices.

— — — cavæ.

— — — ex refina elastica.

PRO INCONTINENTIA URINÆ.

Machina pro incontinentia vesicæ in viris.

— — — — — in mulieribus.

PRO INJECTIONE VESICÆ URINARIÆ.

Catheter cum cochlea.

Syringa pro injectione vesicæ.

Compressorium penis.

PRO PUNCTURA VESICÆ.

Acus triquetra flexilis pro punctura vesicæ.

PRO

PRO DILATATIONE PRÆPUTII  
ET URETHRÆ.

Culter acutus.

Sulcus.

Culter PETITIANUS pro phymosi.

Instrumentum pro apertura urethræ concretæ.

PRO LITHOTOMIA.

6. Catheteres sulcati variæ figuræ.

2. Cultri lithotomi variæ figuræ.

2. Conductores. Mas & fæmina.

Lithotomus ocultus.

2. Forcipes rectæ.

2. ——— curvæ.

2. ——— dentatæ.

Instrumentum cochleonodosum.

Conductor novus.

Acus pro liganda arteria.

Cannula.

PRO LITHOTOMIA MULIEBRI.

Culter lithotomus duplex.

Forcipes variæ.

Dilatatorium urethræ muliebris.

PRO FISTULA ANI.

Culter curvus obtusus CEL. POTT.

Acus flexilis.

Culter cum hamulo.

Instrumentum pro fistula ani a CEL. D. RETTER  
inventum.

Instrumenta pro fistula ani a CEL. D. BRAMBILLA  
invent.

Tubus &

Culter CL. RUNGII.

Speculum ani.

### PRO COMPRESSIONE ANEURISMATUM.

Compressorium chalybeum.

———— ex subere excavato.

### PRO OPERATIONE ANEURISMATUM.

Culter rectus.

Sulcus acutus.

———— obtusus.

2. Acus curvæ.

Volsella major.

———— minor.

### PRO AMPUTATIONE.

Culter falcatus major.

———— ———— minor.

———— rectus.

———— bipennis.

Forceps pro attrahenda arteria.

Serra magna.

Forceps scissoria magna.

Tornaculum PETITIANUM.

Capſa cum acubus.

PRO EXCISIONE ARTICULI.

Culter major.

—— curvus.

—— recurvatus.

Tornaculum pro arteria subclavia.

Acus peculiaris pro arteria.

PRO EVULSIONE DENTIS.

Clavis anglicana.

Instrumentum CEL. AITKEN.

Pelicanus.

—— CEL. BOURDET.

Forceps dentaria simplex.

—— ——— composita (der Uibermurf.)

Tornaculum pro hæmorrhagia ex alveolo.

PRO DEPURATIONE DENTIUM.

Capſa cum 10. instrumentis dentifriciis.

PRO CAUTERISATIONE DENTIUM.

Infundibulum.

Cauteria varia.

Acus pro cauterisatione.

Magnes artificialis.

PRO DEPRESSIONE CATARACTÆ.

Acus variæ pro cataracta.

PRO EXTRACTIONE CATARACTÆ.

Cultelli oculares CL. P. RICHTER.

Kistotomus.

Cochlear.

Forceps ocularis.

Forfices oculares.

Digitale cum hasta. CEL. D. RUMPELT.

Tenaculum palpebrarum.

### PRO FISTULA LACHRYMALI.

Styli oculares.

Stylus pro setaceo.

Syringa ANELLIANA.

Perforatorium ossis lachrymalis.

Cannula aurea.

Infundibulum pro punctis lachrymalibus.

Compressorium sacci lachrymalis.

Pelvis pro balneatione oculi.

### PRO EXCISIONE BULBI CANCROSI.

Culter.

Volsella.

Forfex.

Hamulus.

Oculus artificialis.

### PRO TRICHIASI.

Volsella parva.

### PRO ARTE OBSTETRICA.

Vestis ROONHUISIANUS.

— excavatus.

Forceps LEVRETIANA.

— tribrachialis C. D. LEAR.

Perforatorium.

Uncus obtusus.

Forceps lata pro ossibus cranii extrahendis.

Forceps dentata longa.

Pelvimetrum &

Sella obstetricia CL. P. STEIN.

Syringa pro utero.

Speculum uteri.

Pessarium annulare.

———— peculiare.

Acus triquetra occulta pro paracenthesi fœtus.

Forfex pro funiculo umbilicali.

### MACHINE CHIRURGICÆ VARIE.

Machina pro embroche.

———— pro vapore.

———— pro ano artificiali.

Crura artificialia

Manus artificiales.

Reductor emendatus pro luxationibus.

———— spinæ dorsi.

Glossocomium.

Polyspastus.

Nux machina.

Furca PETITI.

Ambi emendatus.

Machina pro fractura cruris.

———— ——— femoris.

———— ——— valgus.

Tabula pro lithotomia.

Sella artificialis pro operationibus.

———— ——— pro reconvalescentibus. CL. WHITE.

Lectus artificialis pro ægrotis. CL. WHITE.

Ferulæ variæ pro fracturis.

———— variæ pro luxationibus.

## INSTRUMENTA PRO SECTIONE CADAVERIS.

Culter tonforius.

3. Scalpella magna.

3. ——— parva.

3. ——— bipennia.

Forfex recta.

——— curva.

2. Volsellæ.

2. Hamuli simplices.

2. ——— duplices.

Tubus cum epistomio, &amp; 3. cannulis.

2. Specilla.

2. Sulci.

Serra arcuata cum laminis.

Instrumentum ad cranium elevandum.

Spatha ad deglubendam duram matrem.

2. Acus magnæ, &amp; rectæ.

— — — — — curvæ; *pro sutura cadaveris, & tenue ligamen nigrum sericeum.*

## INSTRUMENTA ANATOMICA.

*Præter priora.*

Culter ad secandum cerebrum.

2. Cavatoria.

Malleus.

Syringa pro injectio major.

——— ——— minor.

Tubuli variæ diametri.

Serra versatilis.

3. Limæ variæ.

Tenaculum torculare. (*Schrauffst. .*)

Instrumentum ad solvenda ossa cranii.

Tabula anatomica versatilis.

ELENCHUS  
FASCIARUM  
CHIRURGICARUM.

ELLEN CHURCH

WAS CLAIR

CHURCH



E L E N C H U S  
F A S C I A R U M  
C H I R U R G I C A R U M.

---

S U P E L L E X C H I R U R G I C A V U L G A R I S  
P R O D E L I G A T I O N E.

---

I. Linteum carptum, & ex eo præparata, ut

1. Plumaccola.

2. Turundæ.

II. Emplastra; vel alia medicamenta.

III. Splenia.

IV. Fasciæ simplices.

Fascia circularis.

—— ascendens.

—— descendens.

—— uniens.

—— expulſiva.

—— comprimens.

—— contentiva.

V. Fasciæ compositæ.

VI. Res accessoriæ suppellectilis chirurgicæ.

Ferulæ.

Thoruli.

Ligamina, funiculi, fila &c.

## F A S C I Æ P R O C A P I T E.

Capitium magnum.

—— parvum.

Capellina.

Funda capitalis.

Fascia sexcapitata.

—— uniens.

Scapha pro sectione venæ frontalis.

Fascia nodosa, seu solaris pro arteriotomia.

—— mitralis.

Vinctura pro trepanatione.

## F A S C I Æ P R O O C U L I S.

Oculus simplex.

—— duplex.

Fascia triangularis.

—— ocularis CEL. D. VINCEL.

## F A S C I Æ P R O N A S O.

Accipiter.

Discrimen.

Funda nasalis.

## F A S C I Æ P R O L A B I I S O R I S.

Fascia pro labio leporino.

—— ——— superiori.

—— ——— inferiori.

F A S C I Æ P R O M A X I L L A  
I N F E R I O R I.

Capistrum simplex.

———— duplex.

Funda maxillaris.

F A S C I A P R O F A C I E.

Larva.

F A S C I Æ P R O C O L L O.

Fascia continens colli.

———— dividens colli.

———— ad tracheotomiam.

———— uniens.

F A S C I Æ P R O S P I N A D O R S I E T L U M B O R U M.

Fascia scapularis cum mantili.

Quadriga seu Cataphracta.

F A S C I Æ P R O M A M M I S.

Fascia 4. caput ad amputationem mammæ.

Suspensorium mammæ simplex.

———— duplex.

Fascia T pro mammis.

Subucula pro puerperis.

F A S C I Æ P R O A B D O M I N E.

Fascia uniens.

Cingulum abdominale.

FASCIÆ PRO MEMBRO VIRILI.

Fascia pro læsione penis.

Suspensorium scroti.

Bursa scrotalis

FASCIÆ PRO SINU MULIEBRI.

Fascia pro sinu muliebri.

FASCIÆ PRO PERINÆO ET NATIBUS.

Fascia T simplex.

—— — duplex.

FASCIÆ PRO INGUINIBUS.

Spica inguinalis.

Fascia ad herniam inguinalem.

FASCIÆ PRO HUMERI SUMMITATE.

Fascia stellata simplex.

—— — duplex.

Spica ascendens.

—— descendens.

FASCIÆ PRO BRACHIO ET ANTIBRACHIO.

Fascia pro fractura humeri.

—— — excisione humeri ex articulo.

—— — amputatione humeri.

—— — ————— antibrachii.

FASCIÆ PRO CUBITI ARTICULO.

Vinctura pro luxatione cubiti.

Fascia pro venæ sectione.  
—— — læsione arteriæ.  
Vinctura pro aneurismate.

### FASCIÆ PRO CARPO ET DIGITIS.

Vinctura pro carpo.  
—— — metacarpo.  
—— — uno digito.  
—— — omnibus digitis.

Digitale.

—— — sectione venæ salvatellæ.  
—— — — cephalicæ manus.  
—— — digito amputato.

Mitella integra.

—— media.

### FASCIÆ PRO FEMORE ET CRURE.

Spica ad luxationem femoris.  
Fascia ad fracturam femoris.  
—— — — cruris.  
—— — octodecim capitum.  
—— — ad amputationem femoris.  
—— — — cruris.

### FASCIÆ PRO GENU.

Vinctura ad luxationem genu.  
—— — fracturam patellæ longitudinalem.  
—— — — transversalem.  
—— — — rupturam tendinis patellæ.

FASCIÆ PRO PEDE ET DIGITIS PEDIS.

Vinctura pro pede luxato.

———— — venæ sectione in pede.

———— — ruptura tendinis Achillis.

FASCIÆ PRO HERNIIS.

Bracherium simplex pro inguine dextro.

———— ————— sinistro.

———— — cum pila excavata.

———— — cum elatere elastico.

———— — duplex.

———— — pro hernia umbilicali.

Suspensorium umbilici.

Bracherium pro hernia in perinæo.

Suspensorium scroti.


Bracherium pro infante ex corio.

———— ————— linteo robusto.

Vinctura pro hernia umbilicali infantis.

Bracherium pro hernia umbilicali infantis.

Fascia pro relaxatione abdominis.



N O T I T I A  
A U T H O R U M

PRO AUDITORIBUS, QUI IDIOMA  
GERMANICUM NON GALLENT.

IN OTTAWA

AUTHOR

AND EDITOR

OF THE



# BIBLIOTHECA CHIRURGICA.

---

## ANATOME.

**P**LENCK, primæ lineæ anatomes.

WINSLOW, expositio anatomica structuræ corporis  
humani. T. IV.

ZINN, descriptio anatomica oculi humani.

FABRICIUS, methodus cadavera humana rite se-  
candi.

LEBER, anatomia.

## PHYSIOLOGIA.

BOERHAAVII, Institutiones medicæ.

MARRHERR, prælectiones in Boerhaavii institutio-  
nes Medicas. T. III.

HALLERI, primæ lineæ physiologiæ.

————— elementa physiologiæ corporis humani.  
T. VIII.

## PATHOLOGIA CHIRURGICA GENERALIS.

VAN SWIETEN, commentarii in *Poerhaavii* apho-  
rismos de cognoscendis & curandis morbis  
T. V.

MATERIA CHIRURGICA.

PLENCK, Pharmacia chirurgica.

DOCTRINA DE FASCIIS.

HEISTERI, institutiones chirurgicæ. T. II.

DOCTRINA DE INSTRUMENTIS.

HEISTERI, institutiones chirurgicæ.

CHIRURGIA GENERATIM.

PLENCK, Compendium institutionum chirurgicarum.

HEISTERI, Institutiones chirurgicæ.

PLATNERI, institutiones chirurgicæ.

——— supplementa in institutiones chirurgicas.

LUDWIG, institutiones chirurgiæ.

CALLISEN, institutiones chirurgiæ hodiernæ.

BILGUER, dissertatio de membrorum amputatione  
rarissime administranda, aut quasi abroganda.

PLENCK, Doctrina de morbis cutaneis.

ALIX, observata chirurgica. II. Fasciculi.

MORBI OCULORUM.

BOERHAAVE, de morbis oculorum.

PLENCK, doctrina de morbis oculorum.

LANGE, Commentatio de ophthalmia.

M O R B I V E N E R E I.

A S T R U C, de morbis venereis. T. II.

P L E N C K, Doctrina de morbis venereis.

P L E N C K, Methodus nova & facilis, argentum vivum ægris venerea labe infectis, exhibendi.

M O R B I D E N T I U M.

P L E N C K, Doctrina de morbis dentium.

C H I R U R G I A F O R E N S I S.

L U D W I G, institutiones medicinæ forensis.

H E B E N S T R E I T, anthropologia forensis.

A R S O B S T E T R I C I A.

R O E D E R E R, Elementa artis obstetriciæ.

C R A N Z, Dissertatio de re instrumentaria in arte obstetricia.

M A N N I N G H A M, Compendium artis obstetriciæ.

C A S U I S T I C A.

R I C H T E R, observat. chirurgicarum 2. fasc.

A L I X, observata chirurgica. 4. fasc.

L. B. D E S T O E R C K libellus de cicuta.

— — — — — de flammula jovis.

— — — — — de pulsatilla nigricante.

H I S T O R I A C H I R U R G I Æ.

H A L L E R I, Bibliotheca chirurgica. T. II.

C O M M E N T A R I I, de rebus in scientia naturali & medicina gestis.

---

B I B L I O T H E C A  
M E D I C A.

---

C H E M I A.

SPIELMANNI, Institutiones chemiæ.

BOERHAAVE, Elementa chemiæ. T. II.

M A T E R I A M E D I C A.

CRANZ, Materia medica.

ZUCKERT, Materia alimentaria.

P H A R M A C I A M E D I C A.

REZII, Primæ lineæ pharmaciæ.

GAUBIUS, De methodo concinnandi formulas medicas.

PHARMACOPAEA, Austriaco - provincialis.

Taxa medicamentorum.

PHARMACOPAEA, Helvetica.

P A T H O L O G I A G E N E R A L I S.

LUDWIG, Institutiones pathologiæ.

————— theraphiæ.

GAUBII, Institutiones pathologiæ.

VAN SWIETEN, Commentaria in *Boerhaavii* aphorismos de cognoscendis & curandis morbis  
T. V.

SAUVAGES, Nosologia methodica sistens morborum  
classes, genera & species. T. II.

MAXIM. STOLL ratio medendi. 2. part.

GORTERI, Medicina Hippocratica.

HOME, Principia medicinæ.

VOGEL, Prælectiones de cognoscendis & curandis  
præcipuis corporis humani affectibus.

CAMPER, De emolumentis & optima methodo infu-  
tionis variolarum dissertatio.

L. B. DE STOERCK, Præcepta medico-practica in  
usum chirurgorum castrensium & ruralium.

COLLIN, Observationum circa morbos acutos &  
chronicos factarum. Partes V.

TISSOT, Opuscula medica. T. I.

L. B. DE STOERCK, Libellus de Stramonio, hyos-  
ciamo & aconito.

————— ——— de colchico autumnali.

STRACK, Observationes medicinales de colica pi-  
ctionum.

————— ——— ——— morbo cum  
petechiis.

TRNKA, Commentarius de Tetano.

————— Historia febrium intermittentium.

MORGAGNI, De sedibus & causis morborum per  
anatomem indagatis.

HUXHAM, De aere & morbis epidemicis.

BLANCARDI, Lexicon medicum.



CHIRURGIA  
PRACTICA

*SEU*

DOCTRINA SPECIALIS

*DE*


MORBIS CHIRURGICIS.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS

DEPARTMENT OF PHYSICS

PHYSICS



## PROLEGOMENA CHIRURGIÆ.

**C**HIRURGIA est scientia, quæ morbos externos sanare docet.

Doctrinæ Chirurgo *necessariæ* dividuntur in *præparatorias* & in *proprias*.

*Doctrinæ præparatoriæ* sunt VIII.

1. Anatomia.
2. Hygrologia.
3. Physiologia.
4. Pathologia.
5. Doctrina de medicamentis.
6. ——— de instrumentis.
7. ——— de fasciis.
8. Notitia authorum.

*Doctrinæ propriæ* dividuntur in doctrinas *communes* & *peculiares*.


*Doctrinæ communes* sunt VIII.

- I. Doctrina vulnorum.
- II. ——— ulcerum.
- III. ——— tumorum.
- IV. ——— prolapsuum.
- V. ——— herniarum.
- VI. ——— deformitatum.
- VII. ——— de morbis ossium.
- VIII. ——— de operationibus.

*Doctrinæ peculiares* sunt etiam VIII.

- I. Doctrina de morbis oculorum.

- II. Doctrina de morbis dentium.
- III. ——— de morbis venereis.
- IV. ——— de chirurgia forensi.
- V. ——— de arte obstetricia.
- VI. ——— de morbis cutaneis.
- VII. ——— Casuistica.
- VIII. ——— Historia Chirurgiæ.



## DOCTRINA VULNERUM.

### DE VULNERIBUS IN GENERE.

**V**ULNUS est solutio cruenta partium mollium, quæ per instrumentum acutum inflicta fuit.

Vulnera dividuntur.

*in Simplicia, complicata & lethalia.*

Vulnera *simplicia* sunt, in quibus sola integumenta communia læsa deprehenduntur.

*Complicata* vocantur illa, ubi præter integumenta simul magni nervi, arteriæ, tendines, musculi, vel ossa sunt læsa.

Vulnera *lethalia* vocantur illa, quæ mortem causant, vel causare possunt. Hæc vulnera lethalia in tres ordines distribuuntur.

I. in *absolute* lethalia.

II. — *per se* lethalia.

III. — *per accidens* lethalia.

Vulnera *absolute* lethalia sunt illa, in quibus chirurgus mortem avertere non valet.

*Vulnera per se lethalia* vocantur illa, in quibus chirurgus mortem avertere potest.

*Vulnera per accidens lethalia* sunt vulnera levia, in quibus mors errore chirurgi vel vulnerati supervenit.

Absolute lethalia vulnera in V. Classes dividuntur.

- I. Quæ liquidi nervi influxum ex cerebro in viscera vitalia impediunt.
- II. Quæ circulationem.
- III. Quæ respirationem.
- IV. Quæ chylicationem impediunt.
- V. Quæ extravasationem non amovendam faciunt.

Ad primam *Classem* pertinent.

Vulnera profunda Cerebri.

———— Cerebelli.

———— medullæ oblongatæ.

———— medullæ spinalis.

———— Octavi paris nervorum & nervi intercostalis magni.

Ad 2dam *Classem* pertinent.

Vulnera penetrantia Cordis.

———— Auricularum cordis.

———— Sinuum cordis.

———— Omnium internarum majorum arteriarum & venarum.

Ad 3tiam *Classem* pertinent.

Vulnera abscindentia thracheam

———— bronchiorum.

———— magna pulmonum.

———— diaphragmatis.

———— nervorum diaphragmaticorum.

Ad 4tam *Classsem* pertinent

Vulnera abscindentia œsophagum.

———— abscondita ventriculi.

———— ————— intestinorum tenuium.

———— ————— intestinorum Crassorum.

———— Vesicæ bilis.

———— Ductus pancreatici.

———— Receptaculi chyli.

———— Ductus thoracici.

Ad 5tam *Classsem* pertinent

Extravasatio in basi cranii.

———— in 4. ventriculis cerebri.

———— in cavo vertebrarum.

———— in pericardio.

———— in duplicatura postica mediastini.

———— in cavo celluloso lumborum.

———— in cavo pelvis.

### CURATIO VULNERUM.

Omnia vulnera vel unione vel suppuratione sanantur.

Vulnera *scissa* per unionem.

———— *contusa* per suppurationem.

### VULNERA SCISSA.

Unio vulnerum scissorum quadruplici modo fieri potest.

1. Per *emplastrum tenax*, quo uniuntur vulnera *superficialia*.

2. Per *fasciam unientem*, quo vulnera *profunda* & simul *oblonga*.

3. Per *futuram cruentam*, quo vulnera profunda & simul *transversa*.
4. Per *fasciam expulzivam*, quo vulnera pendula & *puncta* uniuntur.

### VULNERA CONTUSA.

Vulneris contusi sanatio requirit

1. *Suppurationem* per unguentum digestivum, vel balsamum Arcæi.
2. *Sanationem* per aquam vulnerariam.
3. *Exsiccationem* per linteum carptum ficcum, vel alumen austum, vel bolum armenam, vel extractum saturni.

### VULNERA PUNCTA.

In *simplicia* & *complicata* dividuntur. *Simplicia* in-  
jectione aquæ tepidæ detergantur, dein ope fa-  
sciæ expulzivæ comprimuntur a fundo versus ori-  
ficiū.

Si vero in fundo *abscessus* se formet, contraapertura  
fundi facienda est.

Vulnera puncta, *complicata* cum læsione vasis, ossis,  
vel visceris, illico satis dilatari debent, ut medi-  
camenta hisce partibus admoveri possint.

### VULNERA SCLOPETARIA.

In *penetrantia per membrum* & non *penetrantia* di-  
viduntur.

*Penetrantia per membrum* vix sunt sanguinolenta,  
valide inflammantur & tarde suppurant.

*Curatio fit I. per dilatationem orificiorum*

II. per *digestiva* & cataplasmata emollientia.

Fa<sup>cta</sup> suppuratione sanantur *injectione* aquæ vulnerariæ.

*Non penetrantia per membrum*, globum intra se recondunt. Hoc exempto tractantur ut vulnera penetrantia.

Globus eximitur dilatato vulnere

I. Digitis.

II. Forcipe.

III. Cochleari.

IV. Contraapertura si globus locum mutavit.

V. Terebra si globus ossi impactus hæret.

## VULNERA VENENATA.

Frequentissima vulnera venenata sunt illa, quæ a *canē rabido*, aut *vipera venenata* infliguntur.

Vulnus *canis rabidi* noscitur ex subsequente *hydrophobia* seu aversione potus.

Hydrophobia a morfu animalis rabidi futura præveniri quidem, at præsens jam curari hucusque nequit.

Prævenitur

1. *Scarificando* vulnus & *exsugendo* sanguinem ope ventosæ.
2. *Inspergendo* pulverem cantharidum, ut suppuration per aliquot menses excitetur.
3. Dando *mercurium gummosum* interne & applicando unguentum neapolitanum externe super pulverem cantharidum.

4. Præbendo interne pulverem rad. belladonæ a granis sex ad decem omni altero die.

Præsens jam Hydrophobia, nec mercurio ad salivationem usque dato, nec opio, moscho, balneis frigidis, aut calidis nec immersione in mare potuit extinguere.

Interim: loci quondam morfi & jam consolidatio scarificatio & insperio pulveris cantharidum sub ipsa hydrophobia jam ingruente tentanda est. Videtur enim virus hydrophobum adhuc in vulnere latere, ac per consensum hydrophobiam in faucibus producere.

Vulnus *viperæ venenatæ* varia symptomata statim post morsum exhibet. Nempe animi deliquia, iterum, palpitationem cordis, membri demorfi dolorem, tumorem ingentem, subinde gangrænam.

Laudatur membri *ligatura*.

*Scarificatio*.

*Exsuctio* ope ventosæ.

*Eluitio* cum theriaca.

Sed *salus* solummodo in redemiis *specificis* est.

In *viperæ Italicæ* morfu nil prodest, quam haustus ex mercurio gummoso & gentiana.

In *viperæ gallicæ* morfu profuit *interne* sal viperinum, & alia salia volatilia alcalina, *externe* linimentum ex sale viperino.

In *viperæ anglicæ* morfu profuit *externe* inunctio membri ope calidi olei olivarum, *interne* hoc oleum ad libram mediam potari debet.

In *Caudisonæ* morfu senegam & alcalina volatilia laudant.

In *Najæ* morfu Ophiorrhizam &

In *Illyricæ viperæ* morfu theriacam interne & externe prodesse perhibent.

In *Suecicæ viperæ* morfu folia fraxini applicantur.

In *Vesparum* morfu aqua frigida antitodum est externum.

### VULNERA TENDINUM.

In vulnera *semidissectorum* & integre *dissectorum* tendinum dividuntur.

Vulnus tendinis *semidissecti* ab initio nulla symptomata, dein magnam inflammationem & dolorem causat.

Hinc venæ sectione, & cataplasmate emolliente, symptomata auferenda sunt. Dein Essentia mastichina applicatur.

Vulnus *integre* dissecti tendinis solam immobilitatem partis causat, & nulla alia symptomata. Hinc sola unio dissecti tendinis per fascias, & congruum fitum adhibenda est.

In ruptura tendinis Achillis pro fascia adhiberi debet *Petitianus Calceus*.

### VULNERA NERVORUM.

In vulnera *semidissecti* & *integre* dissecti nervi dividuntur.

Nervus *semidissectus* crudelia symptomata facit, magnum dolorem, inflammationem, spasnum maxillæ & dorsi, sæpe convulsionem & mortem.

Hæc

Hæc symptomata I. Venæ sectione repetita.

II. Cataplasmate emolliente.

III. Unguento ex balsamo Arcæi cum opio.

IV. Ufu interno opii & mercurii gummosi sopiuntur.

*Tetanus maxillæ* exigit inunctionem mercurialem ad salivationem usque.

Si hæc spasmus non fistant, nervi læsi integra dissectio, & si hæc non sufficiat, membri amputatio facienda est.

Nervus *integre* dissectus, partis immobilitatem & insensibilitatem facit. Hæc symptomata per vitam durant, licet vulnus sanetur.

#### VULNERA VASORUM.

Arteriæ læsio triplex est *semidissectio*, *integra dissectio*, & *læsio superficialis*.

A læsione *superficiali* seu solius extimæ membranæ arteriæ, non quidem hæmorrhagia sed aneurisma verum oriri potest.

A *semidissecta* vel *integre dissecta* arteria enormis hæmorrhagia sequitur.

Hæmorrhogia arteriæ læsæ fistitur.

I. *Medicamentis adstringentibus*, ut alcohole vini, oleo terebinthinæ, aqua Thediana, linteo carpto.

II. *Compressione* linteolis graduatis.

Fungo agarico.

Charta bibula masticata.

Compressorio.

III. *Ligatura* ope acus & fili.

IV. *Cauterio* ignito.

In majoris arteriæ læsione *medicamenta* raro sufficiunt.

*Compressio* requirit, ut subtus sit os locatum.

*Cauterium* ignitum post lapsum inusta crustæ novam hæmorrhogiam admittit. Hinc

*Ligatura* certissimum est hæmorrhagiæ remedium.

Ubi arteria *canali osseo* accreta est, cera imposita & ope styli dilacerata arteria, sæpe sistitur hæmorrhagia.

#### VULNERA ARTICULATIONUM.

In *penetrantia* & non *penetrantia* dividuntur.

*Penetrantia* noscuntur *visu*, *stylo*, & *effluxu* liquidi synovialis.

Inflammatiō ope fomentorum resolventium & venæ sectione sedatur, & dein vulnus ope spiritus vini mastichini vel pulveris balsamici curatur.

#### VULNERA OSSIUM.

Ossa *nudata* vel *læsa* spiritu vini mastichino deligari debent, ne aere frigido, medicamentis pinguibus, aut pure vulneris cariosa fiant.

Idem spiritus mastichinus ossa *vulnerata* sanat.

#### VULNERA VASORUM LYMPHATICORUM.

Noscuntur ex lymphæ guttatim effluente.

*Curatur* lymphæ fluxus aqua Thediana vel extracto Saturni.

## VULNERA CAPITIS.

Dividuntur in *penetrantia* & non *penetrantia*. Utraque sunt *simplicia* vel *complicata*.

Complicantur 1. cum *læsione cranii*.

2. *commotione cerebri*.

3. *effusione sanguinis* vel

4. *læsione cerebri*.

*Capitis vulnus externum*, id est, sine *cranii læsione* ut aliud *vulnus* curatur.

*Vulnera cranii* in *acuta* & *contusa* dividuntur.

*Vulnera acuta* sunt V.

1. *Sedes* est *vulnus* *externam tabulam cranii* penetrans.

2. *Incisio* est *vulnus* ad *diploem cranii* penetrans.

3. *Percisio* est *vulnus* utramque *cranii tabulam* penetrans.

4. *Diacope* est *vulnus* oblique usque in *diploem* penetrans.

5. *Dedolatio* *vulnus* *tabulæ extimæ* partem auferens.

Cum *vulnus externum* has *cranii læsiones* comitetur, hinc *cranii læsis* visu, & *stylo* facile noscitur. Curatur spiritu *massichino*.

*Vulnera cranii contusa* sunt 16.

1. *Denudatio* seu *contusio*, qua *pericranium*, vel *dura mater* a *cranio* secedit.

2. *Hedra* est *rima* *extimam tabulam cranii* penetrans.

3. *Rima* est *rima* usque in *diploem* penetrans.

4. *Fissura* est *rima* usque per *intimam tabulam* penetrans.

5. *Fissura tabulæ internæ*, id est, sine *læsione tabulæ externæ*.

6. *Contrafissura* est fissura cranii in alio loco, quam qui contusus fuit.
7. *Festuca externa* est cranii contusio, quæ particulam ab externa tabula aufert.
8. *Festuca tabulæ internæ* est particulæ ab interna tabula cranii secessus.
9. *Fractura* est admodum hians cranii fissura.
10. *Impressio cum fractura*, ut in adultis observatur.

Aut *sine fractura*, ut in infantibus contingit.

11. *Camarosis* est partium fractarum elevatio.
12. *Appropinquatio* est, ubi in fractura una pars alteri incumbit.
13. *Diastasis suturæ*, est ubi futura cranii a se invicem hiando distat.
14. *Jactura substantiæ* est, ubi fragmentum ex cranio ablatum est.
15. *Contusio* quando extima superficies, vel diploe cranii contrita est.
16. *Caries* adest, quando substantia cranii eroditur.

*Visibiles* cranii læsiones noscuntur visu, vel stylo.

*Invisibiles* autem, seu ubi vulnus partium mollium non adest; noscuntur inflammatione loci contusi, quæ nulli remedio cedit, & circa septimum diem in suppurationem abit.

*Curatio* cranii læsi, & testi exigit incisionem partium contusarum, seu denudationem cranii læsi. Læsum cranium essentia mastichina curatur.

*Fragmenta, & festucae* cranii eximii debent.

Fere omnes cranii læsiones *complicatae* esse solent  
*sanguinis effusione*, vel *cerebri commotione*.

Hæc ex *symptomatibus internis* nosci debent.

*Sanguinis effusio*, & *cerebri commotio* ab initio  
fere æqualia habent symptomata, ut subito con-  
cidunt vulnerati sine sensu, & motu jacent,  
sæpe bilem vomunt, exit sanguis ex ore, auri-  
bus, & naso, convelluntur, vel paralytici sunt.

Si hæc symptomata a sola *commotione cerebri* sunt,  
tunc intra 24. vel 48. horas evanescent, si plures  
venæ sectiones, enemata laxantia, & fomentum  
ex speciebus cephalicis vino infusis, vel si *fo-  
mentatio frigida*, quæ præstat, super caput abra-  
sis capillis adhibeatur.

Sed si hæc *symptomata* tertio die nondum remittant  
imo augeantur, tunc hæc indicant sanguinem  
esse *effusum*. Hinc illico super loco cranii læso  
instituitur trepanatio, ut sanguis effusus exire,  
aut cranium impressum elevari possit.

Subinde *parvæ* sanguinis effusiones nullum symptoma  
faciunt ab initio. Sed sanguine effuso putrefacto  
17mo vel 20mo die gravia symptomata cerebri  
inflammati oriuntur. Etiam tunc trepanatio fieri  
debet, licet hæc in hoc casu raro ægrum salvet.

Sanguinis effusi sedes in cerebri ventriculis, aut basi  
cranii, aut super corpore calloso trepanatione  
educi non potest. Hinc hæc effusio absolute le-  
thalis est.

*Cerebri*, aut *cerebelli vulnus*, quod profundum non est spiritu mastichino, vel balsamo commendatoris sanari potest. Sed vulnera cerebri, & cerebelli profunda absolute lethalia sunt.

Cranium in infantibus sine fractura *imprimi* potest. Si ventosa vitrea elevari impressio non potest, res naturæ committenda est, nam ut plurimum symptomata sponte evanescent.

Sed cranium in adultis cum fractura *impressum* requirit trepanationem, ut impressa cranii pars possit elevatorio elevari.

*Contrafissura* noscitur *motu ægri automatico*, *rubore* loci a contusione cranii diversi, & *loco* contuso cranii integro. In contrafissura trepanatio non in loco contuso, sed in opposito, & rubore aut motu automatico indicato, instituitur.

## VULNERA FACIEI.

*Divisio in simplicia, & complicata.*

*Vulnus supercilio* illatum cæcitatem causare potest.

*Vulnus corneæ* sequitur effluxus humoris aquei, qui vulnere sanato iterum restituitur. Unio fit oculo clauso; & deligato; situs ægroti supinus esse debet.

*Vulnus albuginæ*, si effluat humoris vitrei magna portio sequitur cæcitas. Curatio ut prior.

*Vulnus linguæ semidiscissæ* collutorio ex vino, tinctura myrrhæ, & melle rosaceo curatur.

Vulnus *buccæ*, læsione *ductus salivalis* complicatum, noscitur effluxu salivæ copiosæ, relinquit *fistulam salivalem*.

## VULNERA COLLI.

Sunt *simplicia*, vel *complicata*.

Vulnus *tracheæ* semidiscissæ futura cruenta integumentorum uniri debet, si magnum est, si autem parvum, ope emplastri unitur.

Trachea *penitus* abscissa uniri non potest, hinc vulnus absolute lethale est.

Vulnus *æsophi* in loco, quo manus chirurgi pertingere potest curabile est. *Integra* ruptura *æsophi* absolute lethalis est.

Vulnus *nervi recurrentis laryngei* facit linguæ paralyfim, qua loquela amittitur.

## VULNERA THORACIS.

Dividuntur in *penetrantiâ*, & non *penetrantiâ*.

Penetrantia sunt *simplicia*, vel *complicata*.

Complicantur 1. Cum læsione arteriæ intercostalis.

2. ——— pulmonis.

3. ——— effusione sanguinis.

4. ——— læsione cordis, vel diaphragmatis.

*Simplex* vulnus penetrans unitur emplastro vulnerario, quod corio illitum esse debet.

Vulnus *penetrans duplex*, quo in utrumque thoracis cavum aer intrat; ægrotum illico suffocat.

*Vulnus penetrans cum læsione arteriæ intercostalis.*  
 Hujus arteriæ læsio in parte postica absolute, in parte thoracis laterali, & antica per se lethalis est. Nam acu curva supra costam ligari potest.

*Vulnus penetrans complicatum cum effusione sanguinis in thoracis cavum.*

*Signa* sanguinis in cavum thoracis effusi sunt, anxietas, & suffocatio, si ager lateri sano incumbit.

Sanguis effusus educitur.

I. Situ ægroti in vulnus.

II. Paracenthesi supra tertiam infimam costam.

Si vero ob angustiam vulneris, & sanguinis coagulati spissitudinem, sanguis effluere non posset, vulnus dilatatur scalpello capitato, & injectione aquæ mellitæ sanguis diluitur, ut effluere possit.

*Vulnus penetrans complicatum cum læsione pulmonis.*

*Signa* sunt *sputum* sanguinis spumosi, & *suffocatio*.

*Parva* pulmonis vulnera naturæ committenda sunt educto sanguine in cavum effuso. *Magna* pulmonis vulnera absolute lethalia sunt, aut phthisi necant.

*Vulnera cordis*, quæ in cavum penetrant citissime lethalia sunt, quæ vero in substantia carnea subsistunt statim lethalia non sunt. Sed subinde aliquo tempore elapso aneurisma cordis sequitur.

*Vulnus diaphragmatis.* Si viscus abdominale per tale vulnus in cavum thoracis penetret, vulnus absolute lethale evadit, alias non.

Sanguinis vel alius humoris effusio in cavum pericardii, vel cavum posticum mediastini absolute lethalis est.

## VULNERA ABDOMINIS.

Dividuntur in *penetrantia*, & non *penetrantia*.

Penetrantia sunt *simplicia*, vel *complicata*.

Vulnera non *penetrantia* fascia uniente, vel emplastro uniri debent.

Vulnera *penetrantia simplicia* futura cruenta, seu *gastroraphia* unienda sunt.

Vulnera penetrantia esse possunt complicata.

1. Cum incarceratione.
2. — corruptione, vel
3. — læsione viscerum prolapsorum, nempe omenti & intestinorum.

Si viscera ob vulneris angustiam *incarcerata* sunt, vulnus dilatari, viscera reponi, & vulnus *gastroraphia* uniri debet.

Si *intestina* læsa sunt, tunc vel *puncta*, vel *semidiscissa*, vel *integre* scissa sunt. Intestina *puncta* naturæ committuntur. Intestina *semidiscissa*, & *integre* discissa supra tubulum ex charta luforia consui debent per futuram cruentam, quæ *Enteroraphe* dicitur.

Si *omentum* est gangrænosum, id sine ligatura abscindi debet. Si *intestina* prolapsa essent gangrænosa hæc excindi, & partes sanæ per *enteroraphiam* consui deberent.

Si enteroraphia fieri non posset, ex superiori intestini portione *anus artificialis* confici deberet.

*Effusio* humorum in abdominis cavum exigit novam incisionem in inferiori abdominis parte, si situ in vulnus non exeant.


*Effusio*, cujus scaturigo *sisti* non potest, vel quæ in cavo pelvis, aut celluloso lumborum cavo extra peritoneum est, absolute lethalis censetur.

## DE CONTUSIONE.

*Contusio* est contritio minimorum vasculorum subcutaneorum, quæ *sugillationem* facit.

*Sugillatio* est effusio sanguinis sub cute. Noscitur tumore livescente, & prægressa causa contundente.

Curatur 1. *Fomentis* ex oxycrato, vel vino aquato, in quo herbæ resolventes simplices, vel cephalicæ coquuntur. 2. *Venæ sectionibus*. 3. *Purgantibus*. 4. Demum *incisione* cutis, qua sanguis per vulnus emittitur: si nimia sanguinis effusio adest.



## DOCTRINA ULCERUM.

### DE ULCERIBUS IN GENERE.

*ULCUS* est solutio continui lenta, purulenta, ut plurimum a causa interna.

*Causa interna* est omnis acrimonia nempe salsa, acida, putrida, venerea, scorbutica, scrophulosa, scabiosa, variolosa, cancrosa.

*Causæ externæ* sunt applicata vesicatoria, vulnera, contusiones, inflammationes, quæ in suppurationem abeunt.

Ulcerata dividuntur in *simplicia*, & *complicata*.

*Simplex ulcus* vocatur, quod purum est. *Complicatum*, quod cum impuritate, carne fungosa, callo, carie, vermibus, aut quadam acrimonia complicatum est.

Curatio ulcerum exigit I. *Purificationem*.

II. *Incarnationem*.

III. *Cicatrificationem*.

*Purificatio* fit medicamentis externis detergentibus, & internis, quæ acrimoniam specificè auferunt.

*Incarnatio* fit aquis vulnerariis, vel balsamis vulnerariis.

*Cicatrificatio* obtinetur exsiccantibus, ut linteo carpto, pulvere exsiccante, extracto saturni, vel alumine usto.

## U L C U S S I M P L E X.

Solam *incarnationem*, & *cicatrificationem* exigit.

## U L C U S S I N U O S U M.

*Sinus* est ulcus sub cute latens, cujus orificium angustum, sed non callosum est.

*Sinus purulentus* curatur.

- I. Per *injectionem* aquæ vulnerariæ, & dein comprimitur spleniolis graduatis, & fascia.

2. Vel si compressio non succedit, debet fieri *contraapertura* fundi purulenti, aut si hæc fieri non potest, tunc.

3. Integra *dissectio* totius finis purulenti fiat.

Et dein ulcus, ut vulnus simplex curatur.

### U L C U S F I S T U L O S U M.

*Fistula* est ulcus profundum, cujus orificium angustum, & callosum est.

*Curatio* exigit, ut auferatur *callus*, deinde ut finis profundus curetur.

*Callus* auferitur 1. *Exscindendo*, vel

2. *Caustico*, ut butyro antimonii

*Ablato callo* curatur finis purulentus, ut in priori capite docetur.

Ut plurimum præstat totam fistulam adeo *discindere*, ut vulnus apertum fiat.

### U L C U S F U N G O S U M.

Est ulcus, cujus superficiem obsidet *caro fungosa*.

*Caro fungosa* 1. vel *totam superficiem* obsidet.

2. vel hinc inde in superficie *papillas fungosas* format.

3. vel tota superficies in *magnum fungum* excrefcit.

4. Et si caro fungosa admodum *dolet*, & *livet*, *cancrefcens* vocatur.

Si *tota superficies fungosa* est, tunc alumine usto consumitur.

Si solummodo *papillæ fungosæ* adsunt, hæ lapide infernali tanguntur.

Si *altus fundus* adest. Ille vel ligatura, vel cultro auferri debet.

*Cancrescens* fungositas pulvere flammulæ jovis, vel oleo camphoræ caustico consummi debet.

### U L C U S L A R D A C E U M.

Ulcus, cujus superficies sordida, & ut *lardum* alba est.

*Lardum* aufertur unguento fusco, vel ægyptiaco.

Si autem ulcus *venereum* est insperso mercurio dulci, vel præcipitato rubro.

Ablata lardacea superficie curatur, ut ulcus simplex.

### U L C U S S C O R B U T I C U M.

Est ulcus, quod ab *acrimonia scorbutica* nascitur.

*Signa scorbuti* sunt gingivæ cruentæ, & fungosæ, maculæ lividæ in cruribus, & lassitudo genuum.

*Ulceræ* ipsa livida, & utplurimum fungosa sunt.

*Externe* prodest aqua calcis, vel aqua vitriolica cum succis antiscorbuticis.

*Interne* Serum lactis, vel jusculum cum succis antiscorbuticis, & fructibus maturis exhiberi debent.

*Tempore hiemali* cerevisia raphanacea, aut mustum malti, aut conservæ antiscorbuticæ dantur.

*Mercurialia* scorbuticis nocent.

*Stomacace*, id est, *scorbutus gingivarum* exigit colutorium ex decocto cort. peruviani, salvia, tinctura myrrhæ, spiritu salis, & melle rosarum.

## U L C U S V E N E R E U M.

Est ulcus, quod ab *acrimonia venerea* oritur.

*Noscitur* ex præsentibus, vel prægressis aliis morbis venereis, ut ulcusculis glandis, gonorrhæa, bubonibus, condylomatibus, tophis, cephalæa nocturna, dolore osteocopo nocte exacerbato, maculis venereis in fronte.

*Sedes* horum ulcerum frequentissima sunt fauces, frons, glans, præputium glandis, inguina, vagina.

*Curantur* externe. Aqua phagedænica, aut balsamo mercuriali, aut solutione aquosa sublimati.

*Interne* datur in omnibus morbis venereis mercurius gummosus ad gr. xx. cum decocto lignorum, & Sarsaparillæ, vel Bardanæ.

## U L C U S C A N C R O S U M.

Est ulcus, quod ab *acrimonia cancrosa* oritur.

*Triplex* est, glandulare, nerveum, fungosum.

*Cancer glandularis* a scirrho exulcerato oritur, labia inversa, fungosa, luridi coloris habet, simulque dolet, & fœtet.

*Cancer nervosus* a verruca, vel tuberculo faciei irritato ut plurimum oritur, cutem late, & sine fungositate exedit.

*Cancer fungosus* magnum fungum format, qui admodum dolet, ardet, fœtet.

*Specificum* cancri est cicuta externe, & interne adhibita.

*Externe* applicatur herba cocta in fomento, vel cataplasmate, vel extractum in aqua calcis solutum.

*Interne* datur extractum ad gr. x. bis de die in pilulis.

In *cancro fungoso* simul adspargitur pulvis flamulæ jovis, vel sedi acris.

### U L C U S C A R I O S U M.

*Ulcus*, in cujus fundo os corruptum, & carne fungosa *tectum* est.

Caries noscitur ulceris fœtore rancido, nigrescente sanie, & stylo per carnem fungosam intruso.

Ulcus cariosum sanari non potest, nisi prius caro fungosa auferatur. Sed de cariei sanatione *vide* doctrinam de morbis ossium.

### U L C U S I N V E T E R A T U M.

Ulcus, quod jam *antiquum* est, non sine periculo curatur, si subito exsicceetur. *Interne* purificantia sanguinem, & nitrum camphoratum. *Externe* aqua vulneraria cum mucilagine camphorata applicentur.

### U L C U S G A N G R Œ N O S U M.

*Ulcus*, quod subito lividum, fœtidum, laxum, & insensibile evadit *gangrænosum* fit.

*Interne* cortex peruvianus ad ʒj. omni bihorio cum camphora, vel vino exhibetur. *Externe* fomentum antisepticum ex ruta, cort. peruviano; camphora, & vino rubro applicandum est.

## ULCUS VERMINOSUM.

*Vermes* in ulceribus necantur oleo terebinthinæ, insperſo mercurio dulci, eſſentia aloes, vel elixirio vitrioli.

---

DE ULCERIBUS  
IN SPECIE.

---

## ULCERA CAPITIS.

**F**REQUENTISSIMA ulcera capitis, *scabies*, & *tinea* ſunt. Vide *morbos cutis*.

## OZENA.

Eſt *ulcus* malignum in naribus. Hoc *cancroſum*, vel *venereum*, vel *carioſum* eſt.

*Curatur* injeſtionibus in nares, quæ pro diverſitate ulceris, variæ eſſe debent.

## ULCUS MEATUS AUDITORIÏ.

Noſcitur *aurifluxu* purulento.

Subinde talis aurifluxus purulentus adeſt ſine ulcere.

In utroque caſu ſiant injeſtiones purificantes ex decocto rutæ cum melle roſaceo.

## FISTULA SALIVALIS.

Eſt *fiſtula* in externa ſuperficie buccæ, quæ a læſione ductus ſalivalis originem habet.

*Curatur.*

- Curatur. 1. Perforatione buccæ ope acus crassæ, &  
 2. immissione fili cerati, quod per fistulam  
 ex ore educitur.  
 3. Interno orificio buccæ calloso reddito,  
 externum orificium fistulæ sanatur.

### FISTULA MAXILLARIS.

A dente *carioso* sæpe in inferiori, vel superiori maxilla oritur *fistula*, quæ evulso dente carioso facile sanari, sine hac evulsione autem sanari non potest.

Sed *fistula maxillæ superioris*, quæ ab ulcere *Antri Higmoriani* provenit, curatur I. *evulso* medio dente molari superiori. II. Dein facta perforatione alveoli, & III. *injectione* aquæ vulnerariæ per alveolum in Antrum Higmori.

Pro injectione etiam inservit decoctum rutæ cum essentia myrrhæ & melle rosaceo.

### ULCERA FAUCIUM.

Ut plurimum veneræ sunt, in his dantur *externe* gargarismata mercurialia.

### APHTÆ.

Sunt parva albicantia *ulcuscula* oris, linguæ, & faucium.

In infantibus curantur aqua vitriolica cum melle rosaceo.

Aphthæ *scorbuticæ* curantur, si spiritu salis cum melle rosaceo ope pernicilli quotidie tangantur.

## U L C E R A C O L L I.

Externa colli ulcera ut plurimum *scrophulosa* sunt.

*Interne* dantur *antiscrophulosa*.

## F I S T U L A T H O R A C I S.

*Fistulæ*, quæ ab abscessu pulmonis, vel empyemate thoracis originem ducunt, curari non debent, nisi prius curatum sit ulcus pulmonum.

Sic etiam res se habet cum *fistulis abdominalibus*.

## F I S T U L A A N I.

Est ulcus finuosum, vel fistulosum circa intestinum rectum.

Fistula ani dividitur in *completam*.

— *externam*.

— *internam*.

*Completa* vocatur, quæ duo orificia, unum in intestino recto, alterum externe in cute circa anum habet.

*Noscitur* immissione styli, & exitu fæcum per orificium externum.

*Curatur* sola operatione, quæ consistit in integra per-scissione omnium partium sub fistula sitarum.

Fistula ani *externa* est illa, quæ orificium in cute externa ani, sine orificio in intestino recto habet.

*Noscitur* stylo non penetrante in intestini recti cavum, nullo exitu fæcum ex orificio externo.

*Curatio* potest injectionibus detergentibus tentari, sed raro profunt, sola operatio prodest.

Fistula ani *interna* est illa, quæ orificium in intestino recto, nullum autem in cute externa circa anum habet.

*Noscitur* 1. effluxu puris ex intestino recto ante vel post depositionem fœcum. 2. Tumore purulento, vel macula rubra externa circa ani ambitum. 3. Subinde immissione digiti in anum.

Etiam rarissime injectionibus *curatur*. Sed *curatur* 1. *incisione* abscessus externi. 2. Perforatione integra intestini recti cum omnibus partibus subjacentibus.

Facta operatione vulnus adest, quod ut aliud sanatur.

## FISTULA PERINÆI.

*Originem* habet ab erosa urethra, vel vesica urinaria.

1. *Catheter* vel candelula cava diu in urethra, & vesica relinquitur, ne stillet urina perpetuo per fistulam, & sanationem impediat.
2. Callus si adest, caustico aufertur.
3. Demum aqua vulneraria ulcus sanatur.

*Fistula urinaria* ab urethra in *vaginam* patens apud mulieres est incurabilis, nisi post partum catheter, vel candelula cava applicetur, contra urinæ stillicidium instrumentum *compressorium* applicatur.

## DOCTRINA TUMORUM.

## DE TUMORIBUS IN GENERE.

**T**UMOR est præternaturalis *elevatio* in quadam corporis parte.

In genere *dividuntur* tumores in *calidos & frigidos*.

*Calidi* vocantur, qui ab inflammatione oriuntur. *Frigidi* autem, qui ab alia causa pendent.

A materia contenta *dividuntur* tumores in 18. *Classes*, ut sunt:

1. *Tumores inflammatorii.*
2. ——— *purulenti.*
3. ——— *gangrænosæ.*
4. ——— *indurati.*
5. ——— *aquei.*
6. ——— *sanguinei.*
7. ——— *cystici.*
8. ——— *excrecentiales.*
9. ——— *Ossei.*
10. ——— *articulares.*
11. ——— *terrei.*
12. ——— *aerei.*
13. ——— *salivales.*
14. ——— *biliosi.*
15. ——— *lacteæ.*
16. ——— *urinosi.*
17. ——— *herniosi spurii.*
18. ——— *Organici.*

## I. C L A S S I S.

## TUMORES INFLAMMATORII.

Tumores, qui ab inflammatione nascuntur, *inflammatorii* vocantur.

*Noscuntur* rubore, calore, dolore, tensione.

*Causa proxima* inflammationis est, *stimulus externus*, vel *internus*, qui nervos vasorum irritat.

Vulnus nervi, contusi, ambustio, gelu, fractura, luxatio, vesicatorium, vel aliud acre applicatum agit, ut *stimulus externus*.

Acrimonia in partem aliquam decumbens, ut venerea, scorbutica, variolosa, biliosa, putrida, *specificæ*, agit ut *stimulus internus*.

*Exitus* inflammationis est *quadruplex*. Resolutio, suppuratio, induratio, vel gangræna partis inflammatae.

*Resolutio* prædicitur, si tumor & ejus quatuor *primaria* symptomata *sensim* remittant.

*Suppuratio* prædicitur, si hæc quatuor symptomata *sensim* increcant, & medietas tumoris mollior evadat.

*Induratio* prædicitur, si symptomata *sensim* remittant, sed *tensio* tumoris increcat.

*Gangræna* prædicitur, si omnia symptomata *subito* remittant, & loco caloris, *frigus*, loco ruboris, *lividitas*, loco doloris, *insensibilitas*, loco tensionis *flacciditas* in parte inflammata oriatur.

*Curatio* inflammationis exigit

I. Venæ sectionem, &

2. Fomentum ex oxycrato, vel

————— — vino aquato.

————— — aqua vegetominerali, vel ex

————— — herbis resolventibus.

*Species* tumorum inflammatoriorum sunt *communes*  
vel *propriæ*.

*Communes* sunt: *Phlegmone*.

*Furunculus*.

*Erysipelas*.

*Tumor pestilentialis*.

*Pernio*.

*Ambustio*.

*Propriæ* sunt: *Ophtalmia*.

*Angina*.

*Parylis*.

*Parotis*.

*Inflamatio mammarum*.

————— *testiculi*.

*Phymosis*.

*Paraphymosis*.

*Bubo*.

*Panaritium*.

## PHLEGMONE.

Est inflammatio *membranae adiposæ*.

Dividitur in phlegmonem *circumscriptam* & *extensam*.

*Phlegmone circumscripta*, tumorem ovi gallinacei  
magnitudinem non excedentem format, qui ut-  
plurimum in abscessum abit.

*Curatio* ergo exigit, ut suppuratio ope emplastri dia-  
chilon & cataplasmatibus emollientibus promoveatur.

*Phlegmone* autem *extensa* , quæ latam inflammationem membranæ adiposæ, totam fere partem occupantem, facit, ut in fracturis & contusionibus observatur, per fomenta resolventia & venæsectiones facile resolvi potest.

### FURUNCULUS.

Est inflammatio *glandulæ subcutaneæ*.

*Noscitur* tumore inflammatorio, ovi columbini magnitudinem non excedente.

Raro resolvitur, ut plurimum sed tarde in abscessum abit. Hinc

*Curatio* exigit suppurantia.

### ERYSIPELAS.

Est inflammatio *cutis* a depositione acrimoniæ biliosæ.

*Noscitur* tumore lato, colore rosaceo a digiti pressione evanescente, & prægressa febre.

*Curatur* purgantibus & externis fomentis ex farinis resolventibus, atque floribus sambuci.

Pingua & repellentia sunt in erysipelate nocua, priora gangrænosam suppurationem & *repellentia* repulsionem morbi ad viscera vitalia faciunt.

*Repulsum* erysipelas vesicantibus, synapismis parti prius affectæ appositis, & purgantibus revocatur.

### TUMOR PESTILENTIALIS.

Est tumor inflammatorius, durus, qui a miasmate pestis nascitur.

*Noscitur* ex præsentī epidemia pestilentiali.

In inguine, sub axillis, & aliis locis oriuntur.

Resolutio & recessus tumoris lethalis est. Hinc illico maturantibus suppuratio moveri, & dein cultro, vel lapide caustico aperiri debet.

### PERNIO.

Est tumor inflammatorius, a *gelu* productus.

*Nascitur* maxime in pedibus vel manibus, vel in apice nasi.

Abit in suppurationem vel gangrænam, si calida applicentur.

*Frigus* ex parte per aquam frigidam, vel nives impositas extrahitur. Dein unguentis nervinis & pinguibus curatur. Ut *unguento ad perniones*.

### AMBUSTIO.

Est tumor inflammatorius *igne* productus.

*Noscitur* ex prægressa causa.

Dolor & ardor sopitur aqua frigida, dein unguento albo curatur.

### ANGINA.

Est inflammatio *faucium*.

Dividitur in *visibilem* & *invisibilem*.

*Visibilis* sedem habet in *amygdalis*, *uvula*, *velo palatino* vel *pharynge* & hæc angina noscitur *in-spectione* faucium.

*Invisibilis* sedem habet in *larynge* vel *trachea*. Inspectione faucium inflammatio videri non potest,

sed noscitur voce glangosa, difficili respiratione  
& deglutione.

*Visibilis* non adeo *periculosa* ac *invifibilis*, quæ ægro-  
tum sæpe suffocat.

In utraque specie anginae *resolutio* inflammationis ten-  
tari debet

1. Per repetitas *venæ sectiones*.
2. Per *purgantia eccoprotica*, vel *enemata* ex sale  
amaro, si æger deglutire non possit.
3. Per *cataplasmata emollientia*, & simul *irritan-  
tia* ex semine lini & synapi,
4. Per *gargarismata resolventia*  
ut 1. ex *oxycrato* cum melle rosaceo.  
2. ex *aqua vegetominerali*.  
3. ex *Decocto* specierum *resoly.* cum nitro  
& melle rosaceo.

His gargarismatibus ægrotus se gargarizare potest,  
vel sua sponte vel ope injectionis.

Si angina hac methodo non evanesceret, & æger jam  
in suffocationem incideret, tunc illico *tracheo-  
tomia*, fieri debet.

Si vero *angina faucium* in suppurationem abiret,  
tunc *gargarismata emollientia* ex ficibus & her-  
bis emollientibus in lacte coctis adhibeantur, do-  
nec sua sponte abscessus in faucibus rumpatur.

Si vero talis abscessus suffocationem minaretur, tunc  
lanceola occulta, quæ *pharyngotomus* vocatur,  
aperiri debet.

Si angina transfret in *gangrænam* & maculae nigri-  
cantes in faucibus cum magna debilitate adef-

sent, tunc *gargarisma antisepticum* ex cortice peruviano, ruta & camphora applicatur. *Interne* ab initio vomitoria dein antileptica dantur.

Si *angina tonsillarum* in scirrhum seu indurationem abiret, tunc *gargarisma* ex cicuta in lacte cocta externe, extractum cicutæ autem interne datur.

*Angina venerea*, quæ ulcera lardacea faucium format, *interne* mercurium gummosum, *externe* *gargarisma mercuriale*, quod ex decocto sarsaparillæ, mercurio dulci, & melle rosaceo componitur, exigit.

Ex his ergo patet anginam commode dividi posse in  
1. *Inflammatoriam*. 2. *Suppuratoriam*. 3. *Gangrænosam*. 4. *Scirrhosam*. 5. *Veneream*.

## PAROTIS.

Est *inflammatio* glandulæ parotidis, quæ in morbis acutis sæpe critice contingit.

*Parotis metastatica* resolvi non debet, alias redit morbus acutus; sed illico emplastris emollientibus, & similibus cataplasmatibus suppuratio promoveatur, & factus *abscessus* caustico vel lanceola aperiatur.

## INFLAMMATIO MAMMÆ.

*Sedes* hujus inflammationis est *triplex*, in *cute*, in *pinguedine*, in *glandulis mammariis*.

1. *Cutanea* facile resolvitur.
2. *Pinguedinosa* difficiliter resolvitur, sed facile in suppurationem abit.

3. *Glandularis*, quæ profunda tubercula calida facit, sæpe in scirrhum abit.

*Curatio* requirit *resolutionem*, quæ ut in aliis locis.

1. *Fomentis resolventibus siccis vel humidis.*

2. *Venæ sectione, &*

3. *Lenibus purgantibus* peragitur.

De inflammatione *testiculorum*, *phymosi*, *paraphymosi* & *bubonibus* vide morbos veneros de *parylide* autem morbos dentium.

### PANARITIUM.

*Panaritium* seu *Paronychia* est inflammatio in apicibus digitorum manus vel pedis.

*Sedes* est quadruplex 1. in *integumentis communibus.*

2. in *vagina tendinum.*

3. in *periosteo.*

4. in *pulpa sub ungue.*

*Signa panaritii cutanei* sunt visibilis intumescencia inflammatoria.

*Signa panaritii in vagina tendinis* sunt tumor exiguus, sed dolor ingens, qui usque ad condylum humeri se extendit.

*Signa panaritii in periosteo* sunt tumor exiguus, sed dolor vehemens, qui usque in axillam se extendit.

*Signa panaritii sub ungue* sunt dolor & rubor sub ungue conspicuus.

*Prognosis.* Panaritium *cutaneum* non est periculosum.

Panaritium *tendinis* facit sæpe longos sinus purulentos, qui vaginam tendinis ad volam manus usque occupant. Panaritium *periostei* facit sæpe cariem phalangis, & panaritium *sub ungue* corruptionem & lapsum unguis.

*Curatio* exigit, ut *incipiens* inflammatio resolvatur quod fit: 1. *balneo* digiti in aqua vegetominerali, vel *fomento* ex herbis solventibus.

Si *resolutio* intra 24. horas non contingat, illico ope emplastri diachilon & cataplasmate emolliente *suppuratio* promoveri debet, & post 24. horas fiat incisio abscessus.

*Incisio* longitudinalis, & in eo loco fieri debet, ubi dolor primus incipit.

Si jam longi *sinus purulenti* in vagina tendinis adfuerint, hi omnes ope sulci & cultri aperiri debent.

Si jam *caries phalangis* adest, applicetur pulv. mastichinus, vel spiritus mastichinus. Subinde tota phalanx cariota ope forcipis extrahi potest, sic citius hæc ulcera sanantur.

Si *unguis corruptus* non sua sponte secedat, quotidie quantum fieri potest abscindi, vel extrahi debet. Nam nisi unguis corruptus auferatur ulcus non sanatur.

## I I. C L A S S I S.

### TUMORES PURULENTI.

Tumores, qui pus continent, vocantur *tumores purulenti* seu *abscessus*.

Huc pertinent

1. *Abscessus.*
2. *Tumor metastaticus seu criticus, &*
3. *Empyema.*

## ABSCESSUS.

*Abscessus* oriuntur a prægressa inflammatione alicujus partis.

*Signa* abscessus sunt tumor inflammatorius in medietate prominens, albicans, fluctuans.

*Curatio* abscessus exigit, 1. ut *incipiens suppuratio* promoveatur. 2. Ut abscessus in loco fluctuante aperiatur.

*Suppuratio* promovetur. 1. *Emplastro* diachilon simplici 2. *Cataplasmate emolliente* ex mica panis albi, lacte, butyro, croco.

*Apertura* abscessus duplici modo fieri potest

1. *Lanceola* vel
2. *Lapide caustico.*

*Facta apertura* continuatur emollitio tumoris, & suppuratio ope unguenti basiliconis, vel balsami arcei & cataplasmate emolliente. Et demum sanatur ope aquæ vulnerariæ, vel balsami vulnerarii ut *ulcus simplex.*

## TUMOR METASTATICUS.

*Abscessus*, qui oriuntur subito & sine prægressa inflammatione partis, vocantur *abscessus metastastici.*

Oriuntur in febribus calidis a depositione puris ex sanguine , & debent ut alii abscessus brevi aperiri, & sic curari.

### EMPYEMA.

Est *abscessus* inter costas, vel *effusio* puris in cavum thoracis.

Hinc *dividitur* empyema in *externum* & *internum*.

*Empyema externum* cultro ut abscessus aperitur.

In *empyemate interno* pus e cavo thoracis per *paracenthesin* thoracis evacuari debet.

## III. CLASSIS.

### TUMORES GANGRÆNOSI.

*Gangræna* est alicujus partis *mortificatio*, seu perfecta putredo.

Dividitur mortificatio in *gangrænam*, &  
in *sphacelum*.

*Gangræna* est mortificatio integumentorum communium.

*Sphacelus* est mortificatio omnium partium mollium ad ossa usque.

### GANGRÆNA.

*Signa*, quod gangræna jam adsit, sunt, si

1. *Dolor* inflammationis in *insensibilitatem*.
2. *Calor* ————— in *frigus*.
3. *Rubor* ————— in *lividitatem*.
4. *Tensio* ————— in *flacciditatem* abeat, &

5. *Epidermis* in magnas *vesicas*, *putrido humore* *plenas*, & *cadaverosum odorem* *spargentes*, se *elevet*.

*Signa sphaceli* sunt, si omnes partes molles ad ossa usque sine dolore *pungi* ac *scindi* possunt.

*Prognosis*. Gangræna transit in sphacelum, sphacelus in mortem.

*Curatio gangrænæ* exigit 1. ut putredini *limites* ponantur. 2. Ut omne jam putridum a sano *separetur*.

*Limites* ponuntur putredini 1. per *scarificationes*, 2. per *medicamenta antiseptica*. Hinc interne omni bihorio detur drachma corticis cum 3. granis *camphoræ*. Externe applicatur *fomentum* ex pulvere *camphoræ*, corticis & *rutæ*, cum aceto contritis.

*Separatio* gangrænosi a sano fit, si natura in limite loci gangrænosi *suppurationem* facit.

*Sphacelus* eadem methodo curatur, si *topicus* est; si vero totum membrum occupat tunc illud amputari debet. Sed in sphacelo a causa interna amputatio nihil juvat.

### NECROSIS SEU GANGRÆNA SICCA.

Est mortificatio, qua partes sine prægressa inflammatione *nigræ*, *siccæ*, & *insensiles* fiunt.

*Causa proxima* est, esus panis ex frumento corrupto vel ætas senilis vel ambustio.

*Gangræna sicca*, externe & interne *camphoram* exigit, nec *scarificatio*, nec *amputatio*, nec *cortex peruvianus* in *sphacelo sicco* quidquam profuit.

## CARBUNCULUS.

*Carbunculus* seu *Antrax* est tuberculum inflammatorium quod intra 24. horas in gangrænam abit.

*Causa proxima* est peculiare miasma pestilentielle.

Hinc *interne* camphora cum cortice & aceto rutaceo dari debet.

*Externe*, facta scarificatione applicatur fomentum antisepticum, & unguentum de styrace cum camphora.

## I V. C L A S S I S.

## TUMORES INDURATI.

Tumores, qui in *induratione* glandulæ vel alius partis consistunt, sic vocantur.

In hanc classem pertinent.

1. *Scirrhus*.
2. *Carcinoma*.
3. *Scrophulæ*.
4. *Struma*.
5. *Tuberculum*.

## S C I R R H U S.

Est *induratio* alicujus glandulæ.

*Signa* sunt tumor durus, indolens, inæqualis, cuti concolor.

*Sedes* frequentissima est in mammis.

*Prognosis*. Scirrhus benignus transit in malignum, malignus transit in cancrum.

*Dividitur* scirrhus in *benignum*, qui sine dolore est. in *malignum*, qui dolet.

*Curatio*.

*Curatio Scirrhi* exigit *resolvens specificum*, quod *cicuta* est. Hinc

*Interne* quotidie XX. grana extracti *cicutæ* dantur.

*Externe* applicatur interdium cataplasma *cicutæ*, de nocte autem emplastrum de *cicuta* & gummi ammoniaco.

Omnia *acria* & *pinguia* remedia sunt in Schirrhis nocua.

### CARCINOMA SEU CANCER.

Est *Scirrhus*, qui dolet & livescit.

Dividitur in *cancrum occultum*, qui non exulceratus, &

in *cancrum apertum*, qui exulceratus est.

*Specificum* in cancro occulto & aperto est *cicuta*. Hæc ergo ut in scirrhis externe & interne adhibeatur.

*Carcinoma* quod *cicuta* curari non potest, exstirpari debet.

*Carcinoma apertum* est ulcus cancrosum, de quo in doctrina de *ulceribus* diximus.

### SCROPHULÆ.

Sunt indurationes glandularum submaxillarium, & colli.

Ad *resolutionem* scrophularum adhiberi debent

*Cortex peruvianus cum cicuta.*

*Aqua marina.*

*Aethiops mineralis.*

*Externe* ut in scirrho *cicutæ* emplastrum vel cataplasma adhibetur.

## S T R U M A.

Est *induratio* glandulæ thyroideæ & anticæ partis colli.  
*Signa* sunt oblongus, duriusculus tumor in antica colli parte.

*Causa proxima* est peculiaris acrimonia, quæ *strumosa* vocatur, & quibusdam regionibus endemia est, ut Tyrolensibus, Helvetis &c.

*Incipiens Struma* curatur pulvere contra strumas, seu ex testis ovorum tostis.

## T U B E R C U L U M.

*Parvus* tumor induratus sic vocatur.

Tubercula in *benigna* & *maligna* dividi, atque ut scirrhus curari debent.

In *facie* sæpe talia livescentia tubercula oriuntur, quæ male tractata in cancrum sæpe abeunt.

## V. C L A S S I S.

## TUMORES AQUOSI.

Sunt tumores, qui *aquam* intra se continent.

Sequentes 9. tumores in hanc *classem* pertinent.

1. *Oedema.*
2. *Tumor serosus.*
3. *Tumor lymphaticus.*
4. *Anasarca.*
5. *Hydrocephalus.*
6. *Spina bifida.*
7. *Hydrothorax.*
8. *Ascites.*
9. *Hydarthron.*

## O E D E M A.

Est tumor *aquosus*, qui a digito impresso foveam retinet.

*Sedes* est ut plurimum in cruribus, rarius in manibus.

*Signa* sunt tumor totius partis, frigidus, indolens, cuti concolor, mollis, a digito impresso foveam retinens.

*Oedema* curatur si in crure est

1. *Ligatura* totius cruris ope fasciæ circularis.
2. *Fomento* roborante ex aqua calcis & spiritu vini camphorato.
3. *Fomento sicco* ex farinis resolventibus & camphora.
4. *Friktionibus siccis* cum fumo aromatico.

Demum interne simul dantur purgantia & diuretica.

Laudantur etiam *vesicatoria* & *scarificatio* sed in *inveteratis oedematibus* hæc duo remedia subinde gangrænam faciunt.

*Oedema calidum* ut inflammatio curari debet.

## T U M O R S E R O S U S.

Est tumor, qui *serum* limpidum non pituitosum continet, & foveam a digito impresso non retinet.

*Curatur* ut *Oedema*.

## T U M O R L Y M P H A T I C U S.

Est tumor *aquosus*, qui a *ruptura* vasis lymphatici oritur.

*Dividitur* in *tumorem lymphaticum incipientem*.

— — — — — *suppurantem.*

— — — — — *apertum.*

*Signa* tumoris lymphatici *incipientis* sunt tumor bifloreni magnitudine, planus, indolens, cuti concolor, rotundus, multos menses volumen lente augens.

*Signa* tumoris lymphatici *suppurantis* sunt si talis tumor dolens, flavescens, subito volumen augens, ubique fluctuans fiat.

*Signa* tumoris lymphatici *aperti*. Tumor rumpitur, effluit multa & tenuis lymp̃ha purulenta, totus tumor collabitur manet ulcus pallidum, in toto ambitu cavum, multum lymphæ purulentæ tenuis plorans. Subinde excrescit caro fungosa pallida, sequitur febris lenta, & post aliquot menses mors.

*Sedes* hujus tumoris est, ubi vasa lymphatica sunt, non alio in loco.

*Curatio* exigit ut tumor illico aperiatur, & dein aqua Thediana sanetur. Si caro fungosa excrescat, hæc pulvere vitrioli cærulei consumi debet.

## A N A S A R C A.

Est *œdematosa* totius corporis intumescentia.

*Curatur* roborantibus & diureticis.

## H Y D R O C E P H A L U S.

Est *capitis* intumescentia aquosa.

*Divisio* est in *hydrocephalum externum* ubi aqua extra cranium.

— — — — — *internum* ubi aqua intra cranium est.

*Signa hydrocephali externi* sunt oedometosa totius capitis intumescencia.

*Signa hydrocephali interni* sunt magna capitis intumescencia, quæ digiti impressi foveam non retinet, & hiatum magnum inter suturam sagittalem habet.

Hydrocephalus *externus* est sanabilis, *internus* ratissime.

————— *externus* curatur ut œdema cruris.

1. *Fomentis* roborantibus, & interne datis *diureticis*.
2. *Scarificatione* in nucha.
3. *Vesicatorio* in nucha.

*Interni* hydrocephali *curatio* iisdem medicamentis tentari debet. *Trepanatio cranii* hunc morbum non curat, sed ægrum citius necat.

## S P I N A B I F I D A.

Est tumor aquosus, qui medullæ spinali intra fissas vertebrae infidet.

Hic morbus est morbus *neonatorum*, & ut plurimum in vertebrae lumborum *sedem* habet.

*Causa proxima* est effusio lymphæ in specum vertebralem.

*Signa* sunt tumor fluctuans, indolens, cuti concolor, qui inter vertebrae est, ad latera tumoris tanguntur processus spinosi, & adest paralyfis extremitatum inferiorum.

Tumor incurabilis est, & semper lethalis. *Incisio* tumoris mortem accelerat.

### HYDROTHORAX.

Est *hydrops* thoracis, seu *effusio* aquæ in cavitates thoracis.

Si medicamenta diuretica non juvant fieri debet *Paracenthesis thoracis*.

### ASCITES.

Est *hydrops* abdominis, seu *effusio* aquæ in cavum abdominis.

Si morbus per medicamenta diuretica curari non potest, tunc *paracenthesis abdominis* instituitur.

### HYDARTHROSIS.

Est *hydrops* articulationis, seu *effusio* aquæ in cavitatem alicujus articulationis.

*Sedes* frequentissima est in articulo genu.

*Signa* sunt intumescencia totius genu, quæ fluctuans est, patellam coronat, cuti concolor, ab initio indolens, sensim dolorosa fit.

*Curatio* fit per *resolutionem* vel per *incisionem*.

*Resolutio* tentatur

1. *Fomentis siccis* ex farinis resolventibus cum camphora.
2. *Gummi ammoniaco* aceto in formam emplastri cocto vel linimento ex *radice mandragoræ* & melle.
3. *Interne* diuretica & purgantia dantur.

Si hisce remediis tumor non cedat, tunc per *incisionem* aqua emittatur. *Parva incisio* fiat in extrema genu parte juxta patellam.

Aqua evacuata illico vulnus emplastro tenaci tegatur, ne aer intrare possit. Injections in cavum articulationis sunt nocuæ.

Fomenta roborantia post operationem continentur.

Si in *inveterato* hydrope articulationis jam ossium caries adsit, tunc amputari debet membrum, ne æger febris lenta pereat.

## VI. CLASSIS.

### TUMORES SANGUINEI.

Sic vocantur tumores, qui sanguinem recondunt.  
Hæc classis continet 5. species.

1. *Ecchymosis.*
2. *Aneurisma verum.*
3. ——— *spurium.*
4. *Varix.*
5. *Hæmorrhoids.*

### ECCHYMOSIS.

Est tumor ab *effusione* sanguinis in telam cellulosem e vasis minoribus facta. Vid, *Contusionem.*

### ANEURISMA VERUM.

Est præternaturalis dilatatio alicujus arteriæ.

*Signa* sunt tumor *pulsans*, qui sensim magnitudinem ovi acquirit, indolens, & cuti concolor est.

Sed aneurismata vera *inveterata* & admodum *magna* vix amplius pulsant.

*Causa proxima* est laxitas, in quodam loco arteriæ. Hinc a prægressa contusione, corrosione, vel vulnere exterioris membranæ arteriæ oritur.

*Sedes* frequentissima est in flexura cubiti a prægressa mala venæ sectione.

*Prognosis.* Tumor est periculosus, a ruptura *sub cute*, *aneurisma spurium*, a ruptura *per cutem*, mors subito contingere potest.

*Curatio* per *compressionem* vel per *operationem* fieri debet. *Compressio* fiat 1. per *lindeola* graduatim posita.

2. — *suberem excavatum.*

3. — *peculiare compressorium.*

*Compressio* sensim augeri, & subinde per annum continuari debet.

*Operatio* fieri debet in aneurismatibus inveteratis & adeo magnis ut comprimi non amplius se finant.

### ANEURISMA SPURIUM.

Est sanguinis effusio in telam cellulosa a magna arteria læsa.

*Signa* sunt tumor latus, lividus, *parum pulsans.*

*Causa proxima* est aneurisma verum ruptum, vel arteriæ vulnus, ruptura, vel erosio.

*Curatio* tentatur ut in vero 1. per *compressionem.* 2. per *operationem.*

*Minora aneurismata spuria compressione.*

*Majora, quæ comprimi non possunt operatione curari debent.*

## V A R I X.

*Est præternaturalis unius vel plurium venarum dilatio in nodosos tumores.*

*Sedes frequentissima est in cruribus mulierum gravidarum.*

*Curatio varicis exigit 1. Compressionem, quæ ope fasciæ vel tibialium artificialium fieri debet. 2. per Fomenta adstringentia.*

## HÆMORRHOIS.

*Est dilatatio venarum hæmorrhoidalium intra vel extra anum.*

*Hæmorrhoides dividuntur.*

1. a sede in *externas*, quæ extra anum sunt conspicuæ.
2. — in *internas*, quæ intra intestinum rectum latent.
3. — in *fluentes*, quæ sanguinem plorant.
4. — in *cæcas*, ex quibus sanguis non fluit.

*Curatio hæmorrhoidum cæcarum fit per resolutionem vel per evacuationem sanguinis.*

*Resolutio tentatur*

1. *Venæ sectionibus.*
2. *Enematibus.*
3. *Purgantibus eccoproticis ut electuario lenitivo.*

4. *Fomentis ex herbis resolventibus* in aqua alba coctis.

*Evacuatio sanguinis ex vasis hæmorrhoidalibus* fit

1. *Sua sponte* per infessum ad vaporem aquæ, vel
2. Applicatione *hirudinum*, vel
3. *Incisione* in venam dilatatam.

*Fluxus hæmorrhoidalis* si *criticus* & modicus est, naturæ committitur, si *nimius* est, & debilitatem infert, sisti debet.

*Fluxus externus* sistitur ope fungi agarici vel aquæ Thedianaæ.

———*internus* ope injectionis aquæ frigidaë cum aqua Thediana mixtæ.

## VII. CLASSIS.

### TUMORES CYSTICI.

Sunt tumores, quorum contenta materies in peculiari *cystide*, seu sacco membranaceo inclusa est.

*Contenta materies* horum tumorum admodum varia est, unde varia tumorum nomina.

Dantur 8. horum tumorum *species*, ut

1. *Meliceris*, continet humorem melli similem.
2. *Atheroma*, — pulvem albam
3. *Steatoma*, — sebum.
4. *Osteosteatoma*, — sebum ossificatum.
5. *Hygroma*, — aquam.
6. *Lipoma*, — pinguedinem.
7. *Lupia*, — substantiam spongiosam.
8. *Ganglium*, — albumini ovi similem humorem.

## MELICERIS.

Est tumor cisticus cujus contenta materies *melli* similis est.  
*Signa* sunt tumor globosus, indolens, cuti concolor,  
 mollis, attactu glaber.

*Curatio.* Incipiens meliceris resolventibus fortioribus  
 subinde resolvitur, ut spiritu saponato.

Meliceris jam *inveterata* sola operatione curabilis est,  
 quæ fit *enucleatione* vel *incisione* & *erosione* ci-  
*stidis.*

*Enucleatio* fiat 1. incisione cutis, & dein cistis inte-  
 gra scalpello separatur ex tela cellulosa vel

Fiat *incisio* in cutem & in cistidem simul, liquido  
 emisso imponitur cistidi cavæ *unguentum digesti-  
 vum acre*, quod præcipitatum rubrum habet, vel  
 consumitur cistis *butyro antimonii* vel *oleo cau-  
 stico camphoræ.*

*Prior* methodus tutior & melior est quam incisio.

## ATHEROMA.

Est tumor cisticus, cujus contenta materies *pulti albæ*  
 seu *farinacæ* similis est.

*Curatio.* Incipiens atheroma ut meliceris resolvi po-  
 test. *Inveterata* sola extirpatione curatur.

## STEATOMA.

Est tumor cisticus, cujus contenta materies *sevo* vel  
*lardo* similis est.

*Differt* majori duritie ab atheromate, sola extirpatione  
 curari potest.

## O S T E O S T E A T O M A.

Est tumor cisticus cujus contenta materies partim *steatomatosa* partim *ossificata* est.

Osteosteoma sola *excisione* curabilis est.

## H Y G R O M A.

Est tumor cisticus, cujus contenta materies *sero* vel *lymphæ* similis est. Subinde totus tumor *hydaticibus* plenus invenitur. Hinc.

*Curatur* operatione ut meliceris.

## L Y P O M A.

Est tumor mere *pinguedinosus*.

*Curatur* excisione totius tumoris. Primum circa basin tumoris inciditur sola cutis, dein elevatur totus tumor, & excinditur radicitus pinguedo.

## L U P I A.

Est tumor, cujus contenta materies est tela cellulosa *fungosa*.

*Sedes* frequentissima est in articulo genu vel cubiti. Habet *signa* tumoris cistici sed mollitiem spongiosam, quæ tactu discernitur.

*Curatio*. Resolvi potest *emplastro* ad lupiam, vel gummi ammoniaco ut sæpe observavi.

## G A N G L I U M.

Est tumor cisticus, qui a vagina tendinis formatur, & liquidum *crudo albumini* ovi simile continet.

Frequentissima *sedes* est in dorso manus vel pedis.

*Signa* habet tumoris cistici.

*Curatio* est triplex.

1. Per *medicamenta*, quæ in meliceride laudavi nempe spiritu saponato.
2. Per *crepaturam* cistidis, quæ pressione tumoris ope digitorum fit, & rupta cistide fascia comprimatur locus tumoris.
3. Per *enucleationem* tumoris ut de meliceride diximus.

## VIII. CLASSIS.

### TUMORES EXCRESCENTIALES.

Tumores, qui ultra cutem excrescunt, & ex *fibrosa* carni simili *substantia* constant.

In hanc *Classem* refertur.

1. *Sarcoma*.
2. *Nævus*.
3. *Cornu*.
4. *Fungus cerebrinus*.
5. *Polypus nasi*.
6. *Polypus uterinus*.

### SARCOMA.

Est tumor ex *fibrosa* carni simili *substantia* constans.

*Dividuntur* sarcomata in *pensilia*, quæ petiolum habent, & pyriformia sunt.

in *sessilia*, quæ lata basi cuti adhærent.

*Signa* sunt tumor ultra cutem excrescens, indolens, rubens, vel cuti concolor, qui mollitiem carnis habet.

*Curatio* est triplex.

1. Per *ligaturam* radice, quæ solummodo in penfilibus.
2. Per *abscissionem* vel *exscissionem*, quæ in sessilibus fieri debet.
3. Per *Causfica liquida*, quæ in parvis sarcomatibus adhibentur.

### N Æ V U S.

Est *sarcoma nativum*, seu quod cum homine natum est.

*Imaginatio matris* pro causa excitante censetur.

Nævi *plani* curantur applicatione *pastæ* ex calce viva & sapone Veneto.

Nævi autem *altiores* etiam *ligatura*, *abscissione*, vel oleo *camphoræ caustico* curari debent.

### C O R N U A.

Sunt *excrecentiæ* magnæ admodum ac *callosæ* ut *Veruca*.

Curantur spiritu *salis concentrato* vel oleo *camphoræ caustico*.

### F U N G U S C E R E B R I N U S.

Est *excrecentia fungosa* ex *dura matre* vel *cerebro*, per præternaturale foramen *cranii* sub *cutem capitis* emergens.

Noscitur tactu *foraminis*, *mollitie* & *obscura pulsatione tumoris*.

*Curatio* exigit *incisionem cutis*, *trepanationem* in toto ambitu *foraminis* & *excisionem excrecentiæ*.

## P O L Y P U S N A S I.

Est *excreſcentia petiolata* ex membrana pituitaria narium.

*Noſcuntur* polypi viſu tumoris albicantis, pyriformis, indolentis.

Dividuntur in *benignos*, qui non dolent.  
in *malignos*, qui dolent & livent.

*Curatio* eſt 1. per *extorſionem* ope forcipis, quo extorqueri, ſed non evelli debent.

2. Per *excifionem*, quæ raro poſſibilis eſt.

3. Per *cauſtica*, quæ in minoribus ope olei camphoræ cauſtici tentari poſſunt.

4. Per *ligaturam* polypi, quæ optima methodus eſt, ſi fieri poteſt, etiam hæc in polypo *cancroſo* adhiberi debet.

## P O L Y P U S U T E R I N U S.

Est *polypus* ex uteri vel vaginæ cavo excreſcens.

*Signa.* Polypus uterinus noſcitur tactu & hæmorrhagia uterina. Polypus *vaginalis* eſt ſine hæmorrhagia.

*Curatio* optima fit per *ligaturam* polypi.

## I X. C L A S S I S.

## T U M O R E S O S S E I.

Vide Doctrinam *de morbis offium*.

## X. C L A S S I S.

## T U M O R E S A R T I C U L A R E S.

Vide *morbos offium*.

## X I. C L A S S I S.

## T U M O R E S T E R R E I.

Sunt tumores, qui a depositione *succi terrei* oriuntur.  
In hanc classẽm pertinent.

1. *Tumor terreus.*
2. *Tophus podagricus.*
3. *Ranula lapidea.*

## T U M O R T E R R E U S.

Est tumor, qui materiem *calcaream* vel *lapideam* in se continet.

*Noscuntur* duritie, albicante colore, & maxime incisio tumore.

*Curatio* fit 1. per *resolutionem* ope lixivii caustici aqua diluti.

2. per *incisionem* tumoris & exemptionem terræ calcariæ.

## T O P H U S P O D A G R I C U S.

*Tubercula* in digitis manuum vel pedum, quæ in podagricis oriuntur, & terram calcaream intra se continent, vocantur *tophi podagrici*.

*Curatio* est ut in tumore terreo, subinde aqua frigida prodest.

## R A N U L A L A P I D E A.

Est *tuberculum* sub lingua, quod terram continet.

*Sedes* est in *ductu salivali*.

*Signum* est durities lapidea tuberculi.

*Curatio* fit per *incisionem* tumoris & exemptionem lapidis.

## XII. CLASSIS.

## TUMORES AEREI,

Sunt tumores, qui ab *aere* in telam cellulofam effuso oriuntur.

In hanc claffem pertinet.

1. *Emphyfema.*

2. *Phyfocephalus.*

3. *Bronchocele.*

4. *Tympanites.*

5. *Pneumatofis.*

## E M P H Y S E M A.

Est intumefcentia alicujus partis ab aere in tela cellulofa contento.

*Caufa proxima* eft

1. Aer *athmospæricus* per vulnus in telam cellulofam fe infinuans.

2. Vel aer per putredinem e noftris humoribus *extricatus*, hinc fæpe gangranam comitatur.

*Signa* Emphyfematis funt intumefcentia cuti concolor vix dolens, elastica, at digitis preffa *crepitans*, ut offa fracta.

*Curatio* requirit, ut aer ex tela cellulofa expellatur, hinc

1. *Vulnus anguftum* dilatandum.

2. *Friczionibus* aer verfus vulnus exprimendus eft.

3. Vel *novum vulnus* infligendum in alio loco emphyfematofe.

In *emphyfemate putrido antifeptica*, ut camphora externe & interne applicari debet.

## P H Y S O C E P H A L U S.

Est intumescencia *emphysematosa* totius capitis.

*Angusta capitis vulnera* subinde comitatur.

*Curatur*, ut *emphysema* a causa externa.

## B R O N C H O C E L E.

Est intumescencia aerea & crepitans in antica colli parte.

*Causa proxima* est rima inter annulos cartilagineos tracheæ.

*Curatur*, rima sponte sua, tumor fomento adstringente abigitur, spiritus vini camphoratus cum alumine conducit.

## T Y M P A N I T E S.

Est abdominis intumescencia ab aere in eo contento.

*Signa* sunt tumor levis, non fluctuans ut in ascite.

*Curatur* interdum medicamentis roborantibus.

*Paracenthesis abdominis* in nulla specie utilis esse videtur.

## P N E U M A T O S I S.

Est *Emphysema* totius corporis.

*Nascitur* ab *emphysemate* topico, a fractura costæ cum læsione pulmonis.

*Curatur* inflictio vulnere, & expresso aere.

## X I I I. C L A S S I S.

## T U M O R E S S A L I V A L E S.

Sunt tumores a retentione salivæ in ductu salivali contentæ.

Unica datur hujus classis species, nempe.

## RANULA SALIVALIS.

Est tumor sub lingua, qui salivam in ductu salivali collectam continet.

*Signa* sunt tumor mollis, fluctuans, concolor cum interna membrana oris, & indolens, si tumor inciditur effluit liquidum albumini ovi simile.

*Curatio* fit *incisione* tumoris & excisione partis superioris.

## XIV. CLASSIS.

## TUMORES BILIOSI.

Sunt tumores, qui a retentione bilis in vesicula fellea oriuntur. Unica in hanc classē pertinet species nempe.

## TUMOR VESICULÆ FELLÆ.

Est intumescētia vesiculæ felleæ a bile intra eam congesta.

*Causa proxima* est obstructio ductus cystici a calculo bilioso vel bile inspissata.

*Signa* sunt tumor profundus & fluctuans sub hypochondrio dextro, dolor profundus, & absentia signorum abscessus.

*Curatio* debet fieri per *resolutionem*, vel *puncturam* tumoris.

*Resolutio* tentatur per *decocta saponacea*, & *fomenta emollientia*.

*Punctura* vesiculæ felleæ ope acus triquetra tentari non debet, nisi certo constet vesiculam esse peritoneo accretam, alias punctura lethalis fieret.

Vesiculam *accretam* esse peritoneo docet prægressa inflammatio vesiculæ & loci dolentis.

Punctura vesiculæ accretæ sæpe *fistulam biliosam* relinquit.

## X V. C L A S S I S.

### TUMORES URINARI.

Tumores, qui ab urina in vesica urinaria retenta oriuntur, huc pertinent.

### INTUMESCENTIA VESICÆ URINARIÆ.

Est intumescentia vesicæ urinariæ ab urina in ejus cavo retenta.

*Causa proxima* est obstructio colli vesicæ vel urethræ.

*Causæ* hujus obstructionis esse possunt calculus, caruncula, spasmus, inflammatio urethræ, compressio urethræ a graviditate, paralyfis vesicæ.

*Signa* sunt tumor profundus supra ossa pubis cum urinæ retentione conjunctus.

*Prognosis.* Morbus lethalis est, si urinæ effluxus non restituatur.

*Curatio* requirit

1. *Ablationem* causæ, quæ urethram obstruit.
2. *Extractionem* urinæ ope catheteris.
3. *Puncturam* vesicæ si ope catheteris urina eximi non possit.

*Remotio* causarum obstruentium sic peragitur, si *spasmus* colli vesicæ *enematibus* & *cataplasmatibus* emollientibus, atque opio tollitur.

*Inflammatio urethræ venæ sectionibus, emolliente fomento & enemate, atque emulsione refrigerante curatur.*

*Caruncula urethræ usu longo cereolorum sanatur.*

*Calculus urethræ impactus excisione tollitur.*

*Compressio urethræ in graviditate, retropressionem uteri retroverfi requirit.*

*Paralysis vesicæ infuso arnicæ curatur & vesicatorio ad os sacrum.*

## XVI. CLASSIS.

### TUMORES LACTEI.

Sunt tumores, qui a depositione *lactis* oriuntur. Huc pertinet.

1. *Intumescencia lactea mammarum.*

2. *Tumor lacteus extremitatum.*

### INTUMESCENTIA LACTEA MAMMARUM.

Est mammarum intumescencia dolorosa a nimia lactis depositione.

*Signa* sunt intumescencia mammarum mollis non inflammata.

*Curatio* requirit *evacuationem* lactis, quæ fiat.

1. Suctione infantis proprii vel alius.

2. Expressione mammae.

3. Extractione per antliam mammariam.

*Interne* datur juscum tenue ex chærophylo & lene purgans. *Diæta* fit tenuis non nutrens.

## TUMOR LACTEUS EXTREMITATUM.

Est tumor a depositione *lactis* in telam cellulofam alicujus extremitatis.

*Causa proxima* est lactis abundantia, in mammas vel non *deposita*, vel e mammis subito *retropulsa*.

*Signa* tumoris lactei extremitatem inferiorem occupaturi sunt. Primo die inguen dolet; altero die genu dolet, & inguen intumescit; tertio die genu intumescit, & crus, atque pes dolet; tandem & pes intumescit.

Si autem lac in *extremitatem superiorem* deponitur, tunc primo cavum subaxillare, dein cubitus, ultimo manus vehementer dolet, ac semper tumor locum, quem dolor deseruit, occupat.

*Intumescencia* est calida, splendens, flavo rubens, elastica, impressi digiti foveam non retinens.

*Resolutio* requirit fomenta resolventia ex sapone veneto in lacte soluto. *Interne* datur purgans dein nitrum camphoratum.

## XVII. CLASSIS.

## TUMORES HERNIOSI SPURII.

Vide doctrinam *de herniis*.

## XVIII. CLASSIS.

## TUMORES ORGANICI.

Sic vocantur tumores, qui viscus, vel aliam partem organicam suo loco naturali motam, intra se recondunt.

In hanc classem referri possunt omnes *herniæ veræ*,  
atque *parochidium*.


### PAROCHIDIUM.

Est tumor in inguine a testiculo ibi fito natus.

*Causa proxima* est lentus descensus, ut in infantibus, vel reascensus, ut in adultis.

*Signa* sunt defectus testiculi in scroto.

*Curatio* exigit, ut via testiculo relaxetur, ut descendere possit. Hoc fit *cataplasmatibus emollientibus*, & leni frictione.



## DOCTRINA PROLAPSUUM.

*PROLAPSUS* sunt *visibiles* dimotiones viscerum e suo cavo, in quo continentur. Huc pertinent *Prolapsus ani*.

—— *vaginæ.*

—— *uteri.*

### PROLAPSUS ANI.

Est intestini recti *protuberantia* ex ani orificio.

*Curatio* exigit 1. *Repositionem*, quæ digitis peragitur.

2. *Retentionem* in naturali loco, quæ linteolis graduatis, & fascia T. fit.

3. *Roborationem intestini*, quæ fomentis ex herbis adstringentibus cum alumine peragitur.

## P R O L A P S U S V A G I N Æ.

Est vaginæ *protuberantia* ex orificio vaginæ.

*Noscitur* visu protuberantiæ rugosæ, rubescentis.

*Curatur* 1. *Repositione* membranæ.

2. *Retentione* in situ ope pessarii.

3. *Injectione roborante* ex speciebus roborantibus cum alumine.

## P R O L A P S U S U T E R I.

Est uteri *descensus* intra, vel extra vaginam.

*Causa proxima* est *laxitas* ligamentorum uterinorum.

*Dividitur* in prolapsum *imperfectum*, & *perfectum*.

*Imperfectus* *noscitur* exploratione digiti, *perfectus* visui patet.

*Curatio* exigit 1. *Repositionem*, quæ ope digitorum peragitur.

2. *Retentionem*, quæ pessario fit.

3. *Fomenta*, & *injectiones roborantes*.

## I N V E R S I O U T E R I.

Est internæ uteri superficiei *inversio*, & prolapsus per orificium uterinum. Uteri *inversio* puerperis subinde a violenta placentiæ uterinæ protractione fit.

*Curatur* 1. *Reversione*, & *repositione* uteri per ejus orificium, quod digitis peragitur.

2. Adhibito pessario.

3. *Roborantibus* externis, & internis, & longo situ supino.

---

## DOCTRINA DE HERNIIS.

---

### DE HERNIIS IN GENERE.

**H**ERNIÆ dividuntur in *veras*, & *spurias*.

*Veræ* herniæ sunt tumores, qui a dimotione alicujus visceris producuntur.

*Herniæ spuriae* sunt tumores in umbilico, vel scroto, qui a congestis humoribus nascuntur.

Herniæ veræ a loco, quem occupant in 12 Genera dividuntur, nempe sunt,

1. *Herniæ inguinales.*

2. ——— *scrotales.*

3. ——— *femorales.*

4. ——— *ovalares.*

5. ——— *ischiadicæ.*

6. ——— *vaginales.*

7. ——— *umbilicales.*

8. ——— *abdominales.*

9. ——— *lumbares.*

10. ——— *perinæales.*

11. ——— *thoracicæ.*

12. ——— *cephalicæ.*

Quodlibet herniarum genus a *contento viscere*, & a *sua peculiari constitutione* in suas *species* distinguitur.

A viscere contento vocantur herniæ intestinales ,  
 omentales , ventriculi , hepatis , splenis , uteri ,  
 vesicæ , pulmonis , cerebri.

A Constitutione habetur Hernia simplex.

*incarcerata.*

*inveterata.*

*Causa proxima* est dilatatio peritonei in saccum.

*Causæ remotæ* sunt laxitas loci herniosi a prægressa  
 contusione , vulnere , clamore , tussi , partu ,  
 vomitu , saltu , peritonei ruptura.

*Diagnosis.* Noscitur hernia simplex tumore sensim  
 crescente , & reducibili.

*Curatio herniæ simplicis* exigit.

1. *Repositionem.*

2. *Retentionem* ope bracherii.

3. *Loci herniosi roborationem.*

*Repositio* peragitur 1. Situ ægroti supino , elevatis  
 genibus.

2. *Intropressione* partium elap-  
 sarum.

*Retentio* fit ope bracherii elastici.

*Roboratio* loci fit externo usu spiritus vini.

## HERNIA INVETERATA.

Hernia accreta , seu *inveterata* , quæ se reducere non  
 finit , requirit bracherium cum *pila excavata*.

## HERNIA INCARCERATA.

Est hernia , quæ subito irreducibilis fit , & mala sym-  
 ptomata facit. Nempe vomitum , colicam , &  
 obstructionem alvi.

Dividitur incarceration,

in *chronicam*, quæ non est inflammata, & a facibus, flatu, vel spasmis oritur.

— *inflammatoriam*, quæ inflammata est.

Incarceratio *inflammatoria* exigit *venæsectiones*, enemata *emollientia*, & fomentum ex *aqua vegeto-minerali*, vel *oxycrato*.

Incarceratio *chronica* exigit.


Fomentum ex *aqua frigida*.

Enemata ex *foliis tabaci*, vel ex *fumo tabaci*.

Potionem ex *sale amaro*, si fæces induratae.

*Opium*, & fomenta *emollientia*, si spasmus musculorum abdominalium incarcerationem facit.

In utroque casu sæpius tentetur *repositio*, & si hæc impossibilis, tunc fiat *herniotomia*.



## D E H E R N I I S

### I N S P E C I E.

#### I. HERNIA INGUINALIS.

**E**st tumor in inguine, qui a prolapsu omenti, vel intestini per annulum inguinalem oritur.

*Noscitur* reducibilitate, bubo enim reducibilis non est.

*Species sunt*

1. *Hernia intestinalis*, quæ elasticitate, & murmure sub repositione noscitur.

2. *Hernia omentalis* noscitur duritiæ, difficili repositione, absente murmure.
  3. *Hernia intestino-omentalis*. Partim signa herniæ intestinalis, partim herniæ omentalis habet.
  4. *Hernia vesicæ urinariæ* noscitur difficili mictione, sed faciliore, si reponatur hernia.
- Hernia in utroque inguine requirit bracherium, quod *duplicem pilam* habet.

## II. HERNIA SCROTALIS.

Est tumor scroti a prolapsu visceris abdominalis per annulum inguinalem in scroti cavum.  
*Species, signa & curatio* ut in herniis inguinalibus sunt.

*Inveterata* hernia scrotalis *suspensorium* scroti exigit.

## III. HERNIA FEMORALIS.

Est tumor sub inguine in summo femore natus, a prolapsu visceris abdominalis, quod sub ligamento Pupartii exit.

*Curatio* ut in herni inguinali.

## IV. HERNIA OVALARIS.

Est tumor in suprema & interna femoris regione a prolapsu visceris abdominalis per superiorem excisuram foraminis ovalis in pelvi.

*Noscitur & curatur* ut hernia femoralis.

## V. HERNIA ISCHIADICA.

Est tumor juxta anum, qui a prolapsu omenti vel intestini per hiatus, quem excisura ischiadica & ligamenta sacro-ischiadica formant.

*Noscitur & curatur* ut hernia alia.

## VI. HERNIA VAGINALIS.

Est tumor in cavo vaginæ locatus, a prolapsu abdominalis visceris in laxatam vaginæ partem productus.

*Curatur* pessario.

Datur etiam *hernia labialis vulvæ*, quæ vero species herniæ inguinalis in fæminis est.

## VII. HERNIA UMBILICALIS.

Est tumor umbilici, qui a prolapsu visceris abdominalis per annulum umbilicalem oritur.

*Indiget* peculiari bracherio.

## VIII. HERNIA ABDOMINALIS.

Tumor in quacunque abdominis regione fitus, a prolapsu visceris abdominalis natus.

Loca *aponevrotica* ut lineam albam, semilunarem, vel loca supra anulos inguinales, ut plurimum occupat. Sed a prægresso vulnere ubique oriri potest.

*Curatur* per splenia & *cingulum abdominale*.

## IX. HERNIA LUMBARIS.

Est tumor in regione lumbari, a prolapsu visceris abdominalis in locum quemdam relaxatum, natus.

*Curatur* ut hernia abdominalis.

## X. HERNIA PERINÆALIS.

Tumor in perinæo a prolapsu vesicæ urinariæ natus.

*Curatur* ut alia hernia, bracherium per longa lora supra humeros firmatur.

## XI. HERNIA THORACICA.

Tumor intra costas emergens, a prolapsu pulmonis nascens.

*Noscitur* reducibilitate ut alia hernia, & curatur etiam apta ligatura.

## XII. HERNIA CEPHALICA.

Tumor in quadam capitis parte, a cerebro per præternaturalem aperturam in cranio emergens natus.

*Noscitur* etiam reducibilitate, & curatur apta compressione.

---

DE HERNIIS SPURIIS  
GENERATIM.

---

*HERNIAE spuriae* sunt tumores in *scroto* vel in *umbilico*, qui autem non viscus abdominale ut *herniae verae*, sed præternaturalem humorem intra se recondunt.

*Dividuntur* a loco quem occupant.

in hernias spurias *scroti*, &

in ——— *umbilici*.

Atque a contenta materia vocantur.

I. *Herniae spuriae scroti*.

1. *Hydrocele* seu hernia aquosa *scroti*.

2. *Hæmatocele* ——— sanguinea *scroti*.

3. *Pneumatocelē* ——— aerea —

4. *Spermatocele* ——— spermatica —

5. *Sarcocèle* ——— carnea —

6. *Empyocoele* seu hernia purulenta scroti.
7. *Lyparocoele* ——— pinguedinosa —
8. *Varicocoele* ——— varicosa —
9. *Hydatocoele* ——— hydatitosa —

II. *Herniæ spuriae umbilici sunt.*

1. *Hydromphalus* seu hernia aquosa umbilici.
2. *Hæmatomphalus* ——— sanguinea —
3. *Pneumatomphalus* ——— aerea —
4. *Empyomphalus* ——— purulenta —
5. *Sarcomphalus* ——— carnea —
6. *Varicomphalus* ——— varicosa —
7. *Lipomphalus* ——— pinguedinosa —

H Y D R O C E L E.

Est intumescencia *aquosa* scroti.

*Divisio* a sede aquæ effusæ in 3. species.

1. *Hydrocele integumentorum scroti.* Ubi aqua in tela cellulosa scroti continetur, totum scrotum & membrum est œdematosum, id est, retinet digiti impressi vestigium.
2. *Hydrocele scrotalis.* Aqua in cavitate scroti format rotundam intumescenciam inflatæ vesicæ adinstar, raro membrum virile simul affectum est.
3. *Hydrocele vaginalis.* Aqua effusa in vagina funiculi spermatici, vel in vagina testiculi hæret. In primo loco *tumor farciminalis* versus annulum inguinalem, in secundo loco tumor *ovalis* in fundo scroti formatur.

*Curatio* requirit *resolutionem* per fomenta ficca, vel per aquam calcis cum spiritu vini camphorato,

si tumor per medicamenta resolvi non possit,  
tunc aqua effusa evacuari debet.

*Evacuatio aquæ effusæ quadruplici methodo institui potest.*

1. Per *paracenthesim scroti*, sed hæc raro morbum radicaliter curat.
2. Per *lapidem causticum*, Sic sæpius integre curatur morbus, lapidis caustici exigua molecula vix lentis magnitudinem excedens applicetur fundo scroti.
3. Per *dissectionem totius cavi scrotalis*, hæc etiam sæpe radicaliter curat, at periculosa symptomata operationem sequuntur.
4. Per *Setaceum scroti*, hæc curatio etiam plerumque est radicalis.

#### H Æ M A T O C E L E.

Est intumescencia scroti a sanguine in ejus cavum effuso.

*Causa proxima* est effusio cruoris in scrotum a prægressa contusione vel punctura scroti.

*Curatio* requirit *resolutionem* per fomenta resolutentia, vel *evacuationem* effusi sanguinis per incisionem.

#### P N E U M A T O C E L E.

Est scroti intumescencia *aerea* seu emphysematosa.

*Sedes* aeris est solummodo in tela cellulosa scroti.

*Signa* sunt intumescencia scroti crepitans.

*Causa* est emphysema universale, vel vulnus scroti.

*Curatio*

*Curatio* exigit aeris *emissionem*, vel per fomenta humida & frictionem, vel per *incisionem* scroti.

### S P E R M A T O C E L E.

Est testiculi intumescencia a *semine* in eodem accumulato.

*Signa* sunt tumor testiculi, dolor usque in lumbos propagatus, sine inflammatione præsente testiculi.

*Curatio* requirit potum refrigerantem, & venæ sectionem.

### S A R C O C E L E.

Est testiculi *induratio* seu scirrhus.

*Divisio* sarcocèles.

in *benignam*, quæ non dolet.

in *malignam*, quæ livet, & sua sponte dolet.

*Signa* sunt intumescencia testiculi, qui durus tangitur.

*Curatio*. Sarcocèle benigna *resolvi* debet ut alius scirrhus. *Sarcocèle maligna* excindatur per *castrationem*, si autem jam funiculus spermaticus in abdomen usque induratus est, nec operatio prodest.

### EMPYOCELE.

Est *puris* collectio intra scrotum, vel substantiam testiculi.

*Causa proxima* est prægressa inflammatio, vel depositio puris in scrotum.

*Curatio* exigit *evacuationem* puris, quæ per *incisionem* peragitur.

## LIPAROCELE.

Est *adiposa* scroti, vel tunicæ vaginalis intumescencia.  
*Signa; exitus & curatio* liparoces sunt ut lipomatis.

## VARICOCELE.

Est venarum intumescencia in scroto vel funiculo spermatico.

*Divisio* 1. in *varicocelem scrotalem*, quæ noscitur visu venarum lividarum & tumidarum in externa facie scroti.

2. in *varicocelem funiculi spermatici*, hæc noscitur tactu quasi vermium duriusculorum in funiculo spermatico locatorum.

*Causa proxima* est vel laxitas venarum vel compressio.

*Curatio* exigit fomenta roborantia.

## HYDATOCELE.

*Vesiculæ* aquæ plenæ vocantur *Hydatides*.

*Sedes* hydatidum est in scroto, vel in funiculo spermatico.

*Noscuntur* tactu globulorum pisiformium.

*Curatio* exigit *resolutionem* ope spiritus saponati, vel *evacuationem* aquæ ope incisionis.

## SPECIES HERNIARUM SPURIARUM UMBILICI.

## HYDROMPHALUS.

Est intumescencia aquosa umbilici.

*Signa* sunt tumor œdematosus, qui in gravidis & in ascite aliquando observatur.

*Curatur* remediis roborantibus, & leni compressione umbilici. In asciticis hic tumor subinde sua sponte rumpitur.

### HÆMATOMPHALUS.

Est umbilicus ab ecchymosi prominens.

*Signa* sunt livor in regione umbilici.

*Curatur* hæmatomphalus ut ecchymosis in alio loco per fomenta resolventia.

### PNEUMATOMPHALUS.

Est intumescencia *aerea* umbilici.

*Causa* est emphysema totius corporis.

*Curatio* exigit aeris emissionem ope frictionis, vel vulneris inflicti.

### EMPYOMPHALUS.

Est abscessus in umbilico.

*Curatio* exigit evacuationem puris, quæ *incisione* peragitur.

### SARCOMPHALUS.

Est caro fungosa, quæ ex umbilico pronascitur.

*Causa.* Oritur ab ulcere umbilici.

*Curatio* abscissione, ligatura, vel caustico peragitur.

### VARICOMPHALUS.

Est varicosa vasorum circa umbilicum intumescencia.

*Curatio* exigit fomenta adstringentia.

## LIPOMPHALUS.

Est pinguedinis intra umbilicum intumescencia.

*Signa* sunt eadem ac lipomatis.

*Curatio* hinc etiam cum eo convenit.

## DOCTRINA DEFORMITATUM.

*DEFORMITATES* sunt recessus a naturali formatione alicujus partis.

*Dividuntur* deformitates in 8. *Classes*.

1. in *clausuras*, ut *concretio ani*, *vaginæ*, *oris*, *præputii*, *urethræ*. Hæ concretiones cultro discindi debent.

2. in *accretiones* ut *concreti digiti*, *articuli*, *accreta lingua*. Digiti cultro discinduntur, sic etiam frenulum linguæ parum discinditur, sed articulorum concretiones sunt incurabiles.

3. in *solutiones præternaturales*; ut *labium leporinum*, quod ficca fissura labii superioris, & quandoque simul palati ossei est.

*Curatio* exigit ut labia ficca fissuræ peculiari forfice abscindantur, & ut vulnus dein peculiari fascia uniente uniatur. *Sutura cruenta* raro prodest.

4. in *partes supernumerarias* ut 6. *digiti* manus vel pedis. *Digitus supernumerarius* ex articulatione exscindi debet.

5. in *partes deficientes* ut *digiti, testiculi, penis, nasi defectus*. Hi defectus incurabiles sunt, sed loco membri amputati, membrum artificiale applicatur.

6. in *præternaturales magnitudines*, ut pars quædam nimis *parva* vel *magna*, nimis *longa* vel *brevis*. Hoc vitium utplurimum incurabile est. Huc etiam refertur *claudicatio* ob pedem breviorē & *aridura membri*, quæ subinde irritantibus & simul emollientibus medicamentis curatur.

7. in *præternaturales curvaturas* ut *collum obstipum*, *gibbositas spinæ dorsi*, *contracturæ membrorum*, *crura vulga*, *rhachitis*.

*Collum obstipum* abscissione musculi sternomastoidei statim supra sternum facta curatur.

*Gibbositas spinosæ dorsi* quæ solum in infantibus curabilis est, machinam Domini LE VACHER exigit.

*Contractura membrorum* unguenta emollientia & fomenta ex sedo vermiculari in cerevisia cocto exigit.

*Crura valga* ocreis artificialibus curantur.

8. in *errores loci* ut *oculus* in medietate frontis, *vulva* sub umbilico, *cor* extra thoracem situm. Hæc vitia sunt incurabilia. Sed *dens* in palato excrescens evulsione curatur.

---

## DOCTRINA DE MORBIS OSSIUM.

---

### DE MORBIS OSSIUM IN GENERE.

**M**ORBI qui ossa infestant, dividuntur in *articulares & substantiales*.

*Morbi articulares*, qui solam articulationem afficiunt, sunt,

1. *Luxatio.*
2. *Diastrasis.*
3. *Distorsio.*
4. *Laxitas articuli.*
5. *Rigiditas seu anchylosis.*
6. *Tumores articulares.*
7. *Strepitus.*
8. *Dolor.*
9. *Vulnera.*
10. *Ulcera.*

*Morbi substantiales* seu qui ipsam ossis substantiam infestant, sunt

1. *Fractura.*
2. *Fissura.*
3. *Tumores ossei.*
4. *Caries.*
5. *Spina ventosa.*
6. *Dolor osteocopus.*
7. *Fragilitas.*
8. *Mollities.*
9. *Deformitas.*
10. *Vulnera.*

## DE LUXATIONIBUS IN GENERE.

*Luxatio* est recessus articuli mobilis e sua naturali cavitate.

Dividitur luxatio in *perfectam*, ubi *medium* caput e cavo exit, & *imperfectam*, quando *totum* caput excidit.

in *simplicem*, *duplicatam* & *complicatam*.

in *violentam* & *spontaneam*.

in *recentem* & *inveteratam*.

*Noscitur* luxatio 1. *tactu* præternaturalis tumoris & cavitatis in regione articuli.

2. *Visu* deformitatis articuli.

3. *Impotentia* motus naturalis.

*Curatio* exigit 1. *Repositionem*.

2. *Retentionem* in situ naturali.

3. *Ablationem* symptomatum.

4. *Roborationem* articuli relaxati.

*Repositio* exigit extensionem, contra - extensionem, & introductionem ossis luxati.

*Flexus* aliquantum membri luxati situs pro repositione necessarius est.

*Retentio* in situ peragitur fasciis, & quiete.

*Symptomata*, ut dolor & inflammatio auferuntur venæ sectione, fomentis solventibus.

*Laxitas* articuli curatur medicamentis spirituosius, fomento ex succibus vini.

Luxationes cum vulnere articulationis *complicatæ* admodum periculosæ sunt, & tetanum faciunt. V. *vulnera nervorum*, & luxationes a *causa interna*, ut tumores articulares curantur.

## DE LUXATIONIBUS IN SPECIE.

### *Luxatio maxillæ.*

Hæc solummodo *antrorsum* uno vel utroque condylo luxari potest.

Hinc dividitur in *simplicem*, & *duplicatam*. *Simplex* noscitur oris obliquitate. *Duplex* noscitur ex ore hianti, quod claudi non potest.

*Prognosis*. Luxatio lethalis est, si non reponatur.

*Repositio* exigit, ut primo deorsum, dein recta retrorsum maxilla inferior præmatur.

*Ligatur* funda maxillari.

### *Luxatio Nuchæ.*

Est recessus capitis cum prima vertebra colli a processibus articularibus vertebræ secundæ colli.

Hæc *dextra*, vel *sinistra*, & fracto processu odontoides *antica*, vel *postica* esse potest.

*Perfecta luxatio nuchæ* est absolute lethalis, *imperfecta* paralyfim extremitatum superiorum facit.

### *Luxatio vertebrarum.*

Est secessus apophysium obliquarum unius vertebræ a sua socia. Seccessus *dextrorsum*, vel *sinistrorsum* contingere potest.

*Noscitur* exploratione, visu, paralyfi extremitatum inferiorum. *Perfecta luxatio vertebræ* lethalis est, *imperfectæ* repositio tentari debet.

*Repositio.* Æger locatur supra magnum dolium, & sic extensio, & contra extensio fiat.

*Luxatio Costæ.*

Capitulum posterius costæ a fovea articulari vertebrarum solummodo *introrsum* luxari potest.

*Noscitur* mobilitate costæ luxatæ.

*Luxatio claviculæ.*

Anterior claviculæ extremitas, & ejus extremitas posterior luxari potest.

*Antica* luxatio *extrorsum*, vel *introrsum*.

*Postica* luxatio, *sursum*, vel *deorsum* contingit.

*Luxatio humeri.*

Humerus triplici modo luxari potest; *deorsum*, *posterorsum*, & *antrorsum*.

*Luxatio cubiti.*

Cubitus a trochlea humeri *introrsum*, vel *retrorsum* luxari potest.

*Luxatio radii.*

Radius a processu capitato humeri tripliciter luxari potest. *Antrorsum*, *posterorsum*, *extrorsum*.

*Luxatio manus.*

Hæc *quadruplex* esse potest. *Interna*, *externa*, & *lateralis*.

*Luxatio carpi.*

Unum ex ossibus carpi *extrorsum*, vel *introrsum* luxari potest.

*Luxatio digitorum.*

Phalanges digitorum *extrorsum*, *introrsum*, vel ad *latera* luxari possunt.

*Luxatio femoris.*

Hæc quadruplex esse potest nempe 1. *Introrsum*, & *sursum*. 2. *Introrsum*, & *deorsum*. 3. *Extrorsum*, & *deorsum*. 4. *Extrorsum*, & *sursum*.

*Luxatio patellæ.*

Potest *extrorsum*, vel *introrsum*, sed rupto ligamento patellæ inferiori etiam *sursum* luxari.

*Luxatio tibiæ.*

Solummodo imperfecte luxari potest, *retrorsum*, vel *ad latera*.

*Luxatio pedis.*

Pes *antrorsum*, & *retrorsum*, sed fracto malleolo etiam *introrsum*, vel *extrorsum* luxatur.

Ossa *tarfi*, & *metatarfi sursum*, & *deorsum* luxantur. Et

*Digiti pedis*, ut *digiti manus* luxari possunt.

## D I A S T A S I S.

Est secessus ossis immobilis a suo socio. Nam secessus ossis mobilis vocatur luxatio. Huc referri debet.

Diastrasis, seu secessus futuræ in *cranio*.

— — — — — ossium *pubis*.

— — — — — ossis *coccygis*.

— — — — — *fibulæ* &

— — — — — alicujus *epiphysis* ab osse.

*Causa*, & *curatio* eadem, ac in luxatione est.

## D I S T O R S I O.

Est violenta alicujus articuli extensio sine remanente luxatione.

*Curatur*, ut contusio venæ sectione, fomentis resolventibus, & simul roborantibus, ut oxycrato spirituofo, vel aqua frigida.

### L A X I T A S A R T I C U L I.

Si a luxatione, vel distorsione remaneat articuli laxitas, roborantia spirituofo, & fomenta adstringentia adhibeantur, vel aqua frigida.

### A N C H Y L O S I S.

Est tumor *articularis durus*, qui immobilitatem articuli facit.

Tumore duro *differt* ab hydrope articuli, in quo tumor fluctuans percipitur.

*Divisio* anchylosis est

in *perfectam*, in qua ossa succo osseo concreta sunt.

in *imperfectam*, in qua ossa non concreta sunt.

*Diagnos.* *Anchylosis perfecta* noscitur perfecta immobilitate articuli.

———— *imperfecta* noscitur mobilitate quadam adhuc superflite.

*Causa proxima* est synoviae inspissatio, vel rigiditas ligamentorum, vel extremitatum ossearum concretio.

*Curatio* est varia, prout causa varia.

*Anchylosis* a ligamentis rigidis curatur unguento emolliente, & vapore aqueo.

———— a synovia inspissata curatur unguento saponato, gummi ammoniaco aceto soluto, embrocatione, vapore aqueo, thermis sulphureis.

———— a concretionem articuli est incurabilis.

## TUMORES ARTICULARES.

Huc pertinet

1. *Hydrops articuli* vide *tumores aquosos*.
2. *Tumores rheumatici*, qui fomentis siccis, vel vesicatorio, vel unguento mercuriali.
3. *Tumores podagrici*, qui aqua frigida.
4. *Tumores albi*, seu *pituitosi*, qui vesicatorio curantur.
5. *Tumores rhachitici*, vide *Hyperostosis*.
6. *Osteosteoma articuli*, quod ingens fit, & cariosum est. Amputationem exigit.
7. *Cartilagines mobiles* in articulis tactu noscuntur, & excindi debent.

## STREPITUS ARTICULI.

Utplurimum in scorbuticis ob tenuitatem synoviae, vel secessum epiphygium observatur.  
*Curatur* antiscorbuticis.

## DOLOR ARTICULI.

Qui sine tumore est a rheumatismo, vel arthritide oritur, & curatur, ut *Rheumatismus*.

## ULCERA ARTICULORUM.

Dividuntur in *penetrantia*, & non *penetrantia*.  
*Simplicia* curantur, ut in alio loco. *Cariosa* si totum articulum occupant, exigunt amputationem, raro enim *excisio* cariei possibilis est.

## VULNERA ARTICULATIONUM.

Vide Doctrinam de *vulneribus*.

---

*comminutam.*

*Sanatio* a natura peragitur ope transsudantis glutinis, qui sensim in *callum* induratur.

*Tempus sanationis* ab ætate, constitutione corporis, magnitudine ossis, & fracturæ specie desumitur, intra 6. vel 8. septimanas fracturæ simplices sanantur.

*Ablatio symptomatum*, ut inflammationis, venæ sectione, & fomentis peragitur solventibus.

*Complicatæ fracturæ* nempe ubi vulnus, vel luxatio, vel gangræna adest, simul postulant specifica his morbis remedia.

Fracturæ admodum *comminutæ* sæpe gangrænam faciunt.

### F I S S U R A O S S I U M.

Est ossis non plenaria, sed imperfecta divisio.

Difficiliter *noscitur* ab initio, sed tandem dolore diu non cessante, pertinaci inflammatione, & abscessu carioso subsequente *noscitur*.

*Curatur* ab initio, ut contusio, si malum non cedat, incisio, & nudatio loci cariosi facienda est.

### T U M O R E S O S S E I.

Tumores, qui ab ipsa ossis substantia formantur, sunt

1. *Exostosis.*
2. *Tophus.*
3. *Gummi.*
4. *Hyperostosis.*
5. *Sarcostosis.*

## E X O S T O S I S.

Est ossis *excreſcentia* in tumorem.

*Signa* ſunt tumor profundus, oſſi continuus, qui duritiem oſſeam, & inæqualem ſuperficiem habet.

*Diviſio* eſt in *benignam*, quæ a cauſa externa, & ſine dolore oſteocopo eſt.

in *malignam*, quæ dolet, livet, & a cauſa interna eſt.

*Prognofis.* Exoſtoſis *benigna* ſæpe per vitam ſic manet.  
*Maligna* ſæpe in cariem abit.

*Curatio* requirit *exſtirpationem* tumoris ex oſſe, quæ cuneo, & malleo fieri debet.

## T O P H U S.

Est *intumeſcentia* oſſis ab elevatione exteriorum laminarum oſſearum.

*Sedes* eſt utplurimum, in fronte, ſterno, claviculis, cubito, tibia.

*Signa* ſunt tumor profundus, oſſi continuus, oſſe vix mollior, qui planam ſuperficiem, qua ab exoſtoſi differt, habet.

*Cauſa excitans* eſt fere ſemper *miaſma venereum*.

*Prognofis.* Si tophus non reſolvitur, in cariem abit.

*Reſolutio* tentatur per internum, & externum uſum *mercurii*, & per infuſum *Mezeræi*.

In *topho carioſo* inciſio, & perforatio oſſis fieri debet.

## G U M M I.

Est tumor ossis, qui ab elevatione periosteï formatur,  
*Signa* habet topi, sed *mollior* est.

*Curatio* eadem, ac in topho est.

## H Y P E R O S T O S I S.

Est intumescencia *totius ossis*, vel *totius extremitatis* in osse.

*Causa* est lues *venerea*, vel rachitis, vel fissura ossis.

Hyperostosis *rachitica* sua sponte evanescit, sed quæ a lue, aut fissura est, in cariem abit, & tunc amputationem exigit.

## S A R C O S T O S I S.

Est tumor, qui a transmutatione substantiæ ossæ in *carneam* oritur.

*Signa* sunt tumor profundus, ossi continuus, sed spongiosus, ab initio indolens, dein vehementer dolens.

Tumor *adultus* in cariem *cancrosam*, ac in mortem abit.

*Curatio* exigit amputationem.

## C A R I E S.

Est ossis erosio, quæ ejus substantiam consumit.

*Dividitur* caries

1. in *perfectam*, ubi os revera erosum est, & in *imperfectam*, ubi solummodo ossis color vitatus est, ut pallidus, flavus, fuscus.

2. in

2. in *visibilem*, quæ nuda, & in *invisibilem*, quæ carne fungosa tecta est.

*Noscitur caries Visu* ossis flavi, bruni, nigri, vel erosi.

*Stylo*, quo os nudum, vel scabrum deprehenditur.

*Effluxu* saniei nigrescentis, rancidi odoris.

*Causa* est, vel *externa*, ut contusio, vulnus, nudatio ossis, ulcus periostei, vel *interna*, ut acrimonia ad periosteum deposita, venerea, scorbutica, scrophulosa, variolosa &c.

*Caries* a causa *externa* facilius, a causa *interna* difficulter sanatur.

In carie *imperfecta* ubi solummodo naturalis ossis color vitiatum est, conveniunt spirituosæ balsamica, ut *spiritus mastichinus*, vel *essentia myrrhæ*, aut *euphorbii*.

In carie *perfecta*, ubi os nigrum, & erosum est, conveniunt.

1. *Caustica liquida*, ut butyrum antimonii, aqua fortis.
2. *Cauteria*.
3. *Puncturæ* cum trepano perforativo.
4. *Excisio* ope cunei, vel ferræ, vel trepani.
5. *Sculptura* ope trepani exfoliativi.

In carie *articulationis* non semper amputatio subinde *excisio* cariei sufficit.

*Caries cranium perforans* multis trepanationibus excindi debet.

*Caries* carne fungosa *tecta* requirit ut caro fungosa caustico auferatur, ut sic caries nuda tractari possit.

### S P I N A   V E N T O S A.

Est tumor, qui a carie interna ossis oritur.

*Dividitur* spina ventosa in *occultam* & *apertam*.

Spina ventosa *incipiens* noscitur dolore osteocopo, & macula rubra cutis, quæ post aliquod tempus in intumescentiam rubicundam, & spongiosam se elevat.

Tandem hicce tumor multis foraminibus aperitur at non collabitur.

*Sedes* hujus mali frequentissime in ossibus parvis, ut carpo, digitis vel tarso observatur.

*Causa proxima* est caries interna ossis, quæ a depositione peculiaris alicujus acrimonæ oritur. Raro *adultorum* fere semper *infantum* est morbus.

*Curatio.* Spina ventosa unguento mercuriali subinde resolvitur; si simul interne aquila alba, asa fœtida, cicuta cum cortice peruviano datur.

### F R A G I L I T A S.

Est ossium dispositio qua facile franguntur.

*Causa* est senium, scorbutus, lues venerea.

*Curatio* ergo exigit in senio bonum nutrientem victum & antiscorbutica vel antivenerea in lue aut scorbuto.

### M O L L I T I E S.

Est ossium dispositio, qua sine fractura facile flecti possunt.

*Causa est ut plurimum acrimonia acida, vel rachitis.  
Curatio exigit antacida & antirachitica, atque radicem rubiæ tinctoriæ.*

## DE F O R M I T A S.

*Vide deformitates.*

## V U L N E R A O S S I U M.

*Vide Doctrinam vulnerum.*

---

# DOCTRINA DE OPERATIONIBUS.

---

## DE OPERATIONIBUS GENERATIM.

**O**PERATIO est artificialis manipulatio cum vel sine instrumentis, qua morbus aliquis curatur.

Operationes dividuntur in *manuales*, quæ sola manu, & *instrumentales*, quæ instrumentis peraguntur.

In omni operatione considerari debet.

1. *Indicatio.*
2. *Contraindicatio.*
3. *Locus.*
4. *Instrumenta.*
5. *Deligaturæ apparatus.*
6. *Situs ægroti.*
7. *Operatio ipsa.*
8. *Deligatio & reliqua curatio.*
9. *Infortunia*, quæ in operatione contingere possunt.

## V E N Æ S E C T I O.

*Indicatio* est abundantia sanguinis.

Febris inflammatoria.

Inflammatio valida.

*Contraindicatio.* Deffectus sanguinis.

*Locus.* Omnis vena secari potest. *Consuetissimæ* autem sunt

In *capite* Vena frontalis.

— angularis.

— ranina.

— jugularis externa.

In *brachio* Vena mediana.

— cephalica.

— basilica.

In *manu* Vena salvatella.

— cephalica.

In *membro virili* Vena dorsalis.

In *pede* Vena cephalica.

— saphena.

— dorsalis.

— malleolaris.

*Instrumenta* sunt, lanceola vel phlebotomus.

*Vindura.* Spleniolum & fascia requiruntur.

*Situs ægroti* in sella versus lucem.

*Operatio* 1. Vena ligamine supra locum puncturæ ligetur.

2. Ope *Lanceolæ* fit punctura in venam, quæ sub extractione lanceolæ aliquantum dilatari debet, vel

Ope *phlebotomi* fit punctura in venam.

*Deligatio.* Requisita quantitate sanguinis emissa, vulnus spleniolo ficco, & fascia circulari unitur, & sanatur.

*Infortunia*, quæ male administratam venæ sectionem sequuntur, sunt

1. *Trombus* seu sugillatio sanguinis, qui ex vena incisa in telam cellulosa exit, curatur oxycrato vel fomento resolvente.
2. *Aneurysma verum*, si extima arteriæ membrana læditur, graduata compressione curatur.
3. *Aneurysma spurium*, si ex arteria incisa sanguis sub cute in telam cellulosa effluit, etiam graduatam compressionem requirit.
4. *Hæmorrhagia ingens*, si arteria brachialis lædatur & sanguis libere exire possit. Tunc sanguis admodum alte & cum strepitu profilit, coloris est coccinei, & si ligamen supra puncturam fortiter constringitur, fluxus sanguinis cessat.

*Curatio.* Sex spleniola graduatim posita, quorum primum monetam cupream contineat, ad vulnus ponantur 6. alia splenia ad partem oppositam brachii & 6. alia ad partem oppositam antibrachii locentur, atque per longam fasciam hæc splenia omnia per 15. dies sine renovatione appressa servantur.

5. *Varix pulsans.* Si vulnus arteriæ vulnere venæ responderet, & non consolidatur, tunc vena varicosa fit & pulsat; compressione curatur.

6. *Inflammati*o valida & *dolor* ingens si nervus pungi-  
tur. Aqua alba vel cataplasmate emolliente  
resolvitur.
7. *Lymphæ fluxus*, qui altero die observatur, si  
vas lymphaticum læsum fuit, aqua thediana vel  
extracto saturni curatur.
8. *Suppuratio* ab inflammatione prægressa oritur,  
& curatur aqua vulneraria simplici, vel balsamo  
vulnerario.

### OPERATIO ANEURISMATIS SPURII.

*Indicatio.* Aneurisma spurium adeo magnum ut com-  
pressione curari non possit, operationem exigit.

*Præparatio instrumentorum* 1. Tornaculum.

2. Scalpellum acutum.
3. Sulcus acuto apice.
4. Acus cum filo cerato.

*Præparatio deligationis* 1. Plura plumaceola.

2. Spleniola.
3. Fascia sex ulnarum.
4. 6. Frusta, fungi agarici.

*Situs ægroti* in lecto vel sella, extenso supra tabulam  
brachio.

*Operatio ipsa.* 1. Tornaculo truncus arteriæ brachia-  
lis comprimendus est.

2. Integumenta communia tumoris in-  
cidenda sunt, & sanguis effusus  
spongia eximendus est.
3. Si sanguis simul sub aponevrosi mu-  
sculi bicipitis effusus esset etiam  
hæc aponevrosis cultro incidenda

est, & sanguis grummosus etiam  
hic loci auferendus.

4. Demum vulnere arteriæ læsæ detecto  
frustilla fungi agarici lamellatim  
applicanda.

5. Reliquum vulneris spatium pluma-  
ceolis & linteo carpto ficco expleri  
debet. Desuper spleniola ope fasciæ  
deliganda sunt.

6. Tornaculum post operationem sen-  
sim relaxatur, sed non aufertur.

*Deligationes reliquæ.* Tertio die quando suppuratio  
vulneris incipit, balsamo Arcæi ambitus vulneris  
deligatur, fungo agarico non exempto.

Si fungo hæmorrhagia fisti non posset, tunc arteria læ-  
sa immisso stylo elevari & acu ligari deberet.

### OPERATIO ANEURYSMATIS VERI.

*Indicatio.* Aneurysma verum rupturæ proximum, vel  
adeo magnum, ut se amplius comprimi non  
permittat.

*Operatio.* 1. Tornaculo ad truncum arteriæ brachia-  
lis apposito, integumenta communia  
tumoris discindantur.

2. Dein aponevrosi musculi bicipitis adeo  
cultro dividenda est, ut saccus aneu-  
rysmatis penitus nudus appareat.

3. Dein saccus aneurysmaticus aperiendus,  
sanguis grummosus evacuandus, partes  
laterales sacci abscindendæ.

4. Arteria immisso stylo aliquantum elevatur, & supra saccum aneurysmaticum acu cum filo liganda est, interposito spleniolo, cavendum ne simul nervus medianus colligetur.

5. Dein arteria etiam infra saccum aneurysmaticum ligari debet, ut aneurisma inter has duas ligaturas sit intercepta.

6. Tandem vulnus linteo carpto implendum, spleniolis & fascia muniendum, reliqua ut in aneurysmate spurio sunt peragenda.

*Symptomata* operationem subsequentia, nempe anti-brachii frigus, intumescencia & levis paralyfis sua sponte evanescunt 4<sup>ta</sup> vel 7<sup>ma</sup> die, dilatatis vasis lateralibus arteriæ brachialis.

## OPERATIO SETACEI.

*Indicatio.* Intentio ulcus artificiale faciendi.

*Locus* in nucha consuetissimus est.

*Præparatio instrumentorum.* Acus lata cum ligamine longo, unguento basiliconis illito.

*Operatio* 1. Minister & chirurgus cutem in nucha in plicam longitudinalem elevant.

2. Dein chirurgus per plicæ medietatem acum perfigit & ligamen in vulnus introductum in vulnere relinquit.

3. Desuper spleniolum ponitur, quod fascia circulari munitur. Ligamen vulnus irritat, ut plus suppuret, & a concretionem impediatur.

## O P E R A T I O F O N T I C U L I .

*Indicatur* ubi ulcus artificiale requiritur.

*Locus* consuetissimus est in externo brachii latere ubi musculus biceps & brachialis externus spatium pinguedinosum relinquunt.

2. Ad 4. Digitos supra genu in interna superficie femoris.

3. Ad 4. digitos infra genu in interna superficie cruris.

*Operatio ipsa.* 1. A ministro & chirurgo cutis elevatur in plicam transversalem.

2. Hæc plica lanceola discinditur.

3. In vulnus pisum unguento basiliconis illitum imponitur, desuper emplastrum, spleniolum & fascia applicatur.

4. Omni die novum pisum imponitur, ne concre scat ulcus, & loco fasciæ peculiari loro firmatur fonticulus.

*Methodus*, quæ ope *caustici* fonticulum inurit, ob vulnus non adeo profundum, pisum difficulter retinet, hinc hæc methodus abolenda est.

## S U T U R A V U L N E R U M C R U E N T A .

*Indicatio.* Vulnera, quæ adeo profunda, & transversim inflicta sunt, ut nec emplastris, nec fascia uniente possint uniri, *suturam* exigunt *cruentam*.

*Contraindicatio.* Vulnera multum contusa, vel alia læsione complicata per suppurationem sanari debent.

*Infrumenta.* Tres acus curvæ, quæ filum quadruplex ceratum habent.

*Operatio.* 1. Acus ad pollicem a margine vulneris per labium usque in fundum vulneris immittitur.

2. Dein eadem acus a fundo vulneris iterum extrorsum per alterum labium vulneris in dicta distantia extrahitur.

3. Ablata acu filum in puncturis relinquitur.

4. Sic tot fiant puncturæ, quot vulneris longitudo pollices habet.

5. Demum compressis labiis vulneris plumaceolum oblongum unito vulnere imponitur, & desuper fila ligantur in nodum elegantem, qui iterum resolvi possit, si id necessitas exigeret.

*Deligatio.* Supra futuram splenia, fomentis resolventibus madida, locantur, quæ fascia firmari debent. Post 10. vel 12. dies vulnere sanato, ex uno latere fila deciduntur, ex altero extrahuntur.

*Symptomata.* Si vero magna inflammatio futuram sequeretur, hæc relaxanda esset ad aliquot dies.

## APPLICATIO VESICATORII.

*Indicatio.* Intentio derivationem vel ulcus artificiale, vel evacuationem faciendi.

*Locus.* Caput, nucha, spatium interscapulare, interna superficies brachii, femoris, cruris, retro aures.

*Operatio.* Emplastrum vesicatorium, quod magnitudinem figuram & crassitiem bifloreni habet, parti apponitur, desuper emplastrum diachilon fim-

plex, & spleniolum locatur. Tandem omnis apparatus fascia circulari firmetur, & per 12. horas relinquatur.

*Deligatio prima.* Incisa vesica, exprimitur lymphæ, si suppuratio longior requiritur, *unguento ad vesicatoria*, si sanatio indicatur, *unguento albo* deligatur.

Vesicæ detractatio, & inspersio pulveris cantharidum, est mala methodus, dolentissima, ulcera maligna relinquens.

Si vesicatoriis repetitis, *Dysuria cruenta* superveniat, emulso camphorata juvat.

#### APPLICATIO LAPIDIS CAUSTICI.

*Indicatio.* Quando abscessus aperiendus est.

*Operatio.* 1. Tumori emplastrum, cui hiatus incisus est, agglutinatur.

2. Lapis causticus saliva emollitus hiatus imponitur.

3. Desuper linteam carptum, aliud emplastrum & spleniolum applicatur, & totus apparatus fascia circulari firmatur.

Post aliquot horas aufertur apparatus, inusta crusta unguento emollitur, donec suppuratione secedat.

#### APPLICATIO HIRUDINUM.

*Indicatio.* Quando hæmorrhoides cæcæ evacuari debent.

*Hirudines* per famem esurientes redduntur. Locus cui applicantur bene lotus & frictus, vel sanguine maculatus esse debet.

*Operatio ipsa.* 1. Hirudines ope manus linteo involutæ, vel ope lagenulæ parvæ parti apponuntur, donec firmiter adherent.

2. Si sanguine hausto, ad crepaturam fere intumescunt, abscinditur illis cauda.

3. Sufficienti sanguinis quantitate obtenta, sale vel cineribus insperguntur hîrudines, si non sua sponte a loco decidant.

4. Locus vino calido abluitur, & sic etiam deligatur.

### A R T E R I O T O M I A.

*Arteria temporalis* sola secure ut vena incidi potest.

*Indicatur* in pertinacissimis capitis vel oculorum morbis.

*Incisio* ob rami arteriosi parvitatem transversa esse debet.

*Fascia stellari* vel *nodosa* & compressione pyramidali sistitur hæmorrhagia, ne aneurisma sequatur.

### I N O C U L A T I O V A R I O L A R U M.

*Indicatio.* Infantes sani variolas nondum passi inocularuntur.

*Contraindicatio* est omnis morbus.

*Operatio.* Lanceola cujus apex pure ex variola benigna illitus est sub epidermidem in externo brachii latere in utroque brachio immergitur, dein apex sub epidermide invertitur adeo ut pus variolosum in vulnere maneat.

Variolæ post 8. vel plures dies erumpunt.

Vulnus non deligatur, infantes in aere sereno detineantur extra lectum toto morbi tempore.

## TREPANATIO CRANII.

*Indicatio.* 1. Effusio sanguinis sub cranio.

2. Cranii fissura, vel impressio.

3. Caries cranium penetrans requirunt trepanationem.

*Contraindicatio.* Non fiat trepanatio sine summa necessitate.

1. In *medietate ossis frontis* propter finem longitudinalem.

2. *Supra supercilia* ob finem pituitarios frontis.

3. In *anteriori & inferiori angulo* ossis parietalis, ob arteriam spinosam duræ matris.

4. In *medietate & ad latera medietatis* ossis occipitis ob finem finis longitudinalis, & ob finem laterales duræ matris.

5. Super *nulla sutura* cranii, quia dura mater his firmiter adhæret. Nisi sanguis sub ea effusus sit.

6. Nec super *osse vacillante*, ne imprimatur fragmentum ossis in cerebrum.

*Instrumenta requisita pro denudatione cranii.*

*Scalpellum.*

*Spatha detrusoria.*

*Pro Trepanatione.* *Trepanum perforativum.*

*Trepanum cum corona & pyramide.*

*Clavis pyramidis.*

*Cochlea elevatoria orbiculi excisi.*

*Scopula setacea.*

*Dentiscalpium.*

*Scalpellum lenticulare.*

*Meningophylax seu detrusor duræ  
matris.*

*Pro elevatione cranii. Elevatorium commune.*

————— *Petitianum.*

*Præparatio diligationis. Linteolum orbiculare cum  
filio.*

*Lamina plumbea, cribrosa  
cum ansis.*

*Turunda orbicularis.*

*Linteum carptum crudum.*

*Spleniola varia.*

*Fascia capitis vel mitra.*

*Situs ægroti. Adeo ut pars, cui trepanum admo-  
vendum est, sit suprema.*

*Denudatio cranii, qua locus pro trepanatione para-  
tur, fit incisione ope scalpelli, quo cranii inte-  
gumenta ad cranium usque in foram X. vel T  
inciduntur, & spatha detrusoria a cranio sepa-  
rantur,*

*Trepanatio ipsa. 1. Chirurgus trepano integro ope  
pyramidis stigma imprimit loco  
trepanando.*

*2. Dein hoc stigma trepano perfo-  
ratorio profundius redditur, ut  
pyramis trepani punctum fixum  
habeat super cranio.*

3. Imponitur *trepanum integrum* & continuatur trepanatio in *diploem* cranii usque. Dum eximitur ope clavis pyramis ex corona, dentes coronæ dentiscalpio & scopula setacea a scobe purgantur.
4. Iterum imponitur trepanum sed *sine* pyramide, & continuatur trepanatio a diploe in intimam superficiem cranii usque. *Vacillatio* excisi orbiculi docet cranium perforatum esse.
5. Demum *cochlea* vel *stylo* eximitur orbiculus, trepano excisus.
6. Et dein *cultro lenticulari* polli-tur margo excisus a spiculis prominentibus.
7. Sic sanguis sua sponte si vulnere incumbit æger, effluit, vel suspirio retento exprimitur.
8. Aut si sub *dura matre* sanguis effusus hæret, hæc lanceola cruciatim incidenda est.

*Deligatio.* 1. Foramini trepanato imponitur *orbiculus* ex linteo tenui cum filo.

2. Desuper *lamella* plumbea cribrosa cum ansis.
3. *Turunda* orbiculata.
4. *Plumaceola* plura.
5. *Splenina* plura fomento cephalico madida.

6. Omnia firmantur *fascia* capitali, vel *mitra* ex linteo.

Si os fractum & simul *impressum* est, tunc *veſte* *vulgar*i vel *veſte* *Petitiano* fragmentum impressum elevari debet.

Si foramen trepano excisum non firmiter deligatur, tunc cerebrum in magnum *fungum* excrescit, hicce abscindi deberet.

### POLYPI NASALIS EXSTIRPATIO.

Hæc fit per *extorsionem* si polypus parvus est, vel per *ligaturam* si polypi magni sunt.

Ad *extorsionem* requiritur peculiaris forceps, quo polypus prehendi & sensim & diu intorquendo in radice extorqueri, sed non vi evelli debet.

Ad *ligaturam* requiritur peculiaris canula, cui filum argenteum in ansam plicatum immittitur.

1. Ansa fili circa ventrem polypi applicatur. 2. Ope canulæ ansa circa polypum perpetua circumvolutione protruditur ad radicem polypi usque 3. Dein exterius sub canula fili extremitates attrahantur, & ansa circa radicem polypi locata, contorqueatur.

Sic omnibus 24. horis ope canulæ magis ansa fili contrahitur, donec post 14. dies citius vel tardius polypus corruptus ex nare excidat.

Exstirpatio polypi per *caustica* vel per *excisionem* raro possibilis & semper periculosa est.

### HÆMORRHAGIÆ

## HÆMORRHAGIÆ NASALIS OBTURATIO.

Si *acetum* vel *aqua frigida* naribus attracta, *venæ Sectio* in pede, *insectio* aquæ vitriolata, vel thedianæ, non juvat, tunc nares fungo agarico, vel linteo carpto implendæ, & obturandæ sunt.

*Fumus* ex alumine ope infundibuli in nares attractus sæpe juvat, facies larva tegi debet, alias admodum ex hoc fumo rubet.

Si obturatio anterioris narium foraminis etiam non prodest, tunc & foramen narium posterius obturari debet, quæ res optime succedit instrumento D. LE DRANE.

## T R A C H E O T O M I A.

*Indicatur,*

1. Si angina inflammatoria suffocationem facit.
2. Si corpus heterogeneum in trachea hæret.

*Instrumenta.* Scalpelli acutum.

Cannula laryngea Cl. Prof. RICHTER.

*Deligatio* Linteum ex findone rarissima.

Emplastrum fenestratum.

Spleniolum fenestratum.

Fascia pollicis lata.

Linteum carptum.

*Situs ægri.* Sit in Sella sedens.

*Operatio ipsa,*

1. Scalpello acuto integumenta communia a larynge ad tres pollices super trachea longitudinaliter inciduntur.

R

2. Linea tendinea, quæ a musculis sternohyoideis, & sternothyroideis super trachea formatur, etiam longitudinaliter inciditur.
3. Tandem scalpello *cannulato* spatium membranaceum inter 3tium & 4tum, vel 4tum & 5tum anulum cartilagineum tracheæ transversim inciditur.
4. Extracto scalpello, cannula, ope fuorum ligaminum in nucha firmatur.

*Deligatio.* Vulnus supra & infra linteo carpto expletur.

*Cannulæ opertura.*

1. Sindone seu linteo raro tegitur.
2. Emplastrum fenestratum.
3. Splenium fenestratum imponitur, &
4. Hæc omnia fascia pollicis lata, circularibus circumvolutionibus firmantur.

*Curata* angina, quod noscitur ex facili respiratione, si cannulæ apertura digito claudatur, cannula eximitur, & vulnus emplastro unitur, atque sic sanatur.

Si tracheotomia ob *corpus heterogeneum* in trachea hærens instituat, tunc tracheæ incisio longitudinalis per 4. vel 6. annulos cartilagineos fieri debet, ut dein forcipe in tracheæ cavum immissa, corpus heterogeneum commode extrahi possit.

## OESOPHAGOTOMIA.

*Est œsophagi incisio.*

*Indicatur.* Si corpus heterogeneum magnum, adeo œsophago sit impactum, ut nec sursum, nec deorsum possit loco moveri.

*Locus incisionis.* Juxta tracheam in sinistro latere.

*Operatio ipsa.*

1. Fieri debet juxta finistram tracheæ latus incisio longitudinalis integumentorum communium colli.
2. Per uncum latum, & obtusum retinentur partes molles a trachea.
3. Prominens œsophagi pars longitudinaliter incidatur adeo, ut vulnus sufficiat pro extractione corporis.
4. Demum forcipibus, digitis, vel cochleari extrahitur ex œsophago corpus heterogeneum.

*Extractione facta* vulnus emplastro, spleniolis, & fascia unitur.

## EXEMPTIO CORPORIS HETEROGENEI EX FAUCIBUS.

Corpora heterogenea ex faucibus. 1. Digitis.

2. Forcipibus

3. Balena eximuntur.

*Si eximi non possunt*, trudentur ope balenæ in ventriculum.

*Metalla* excepto ferro, quod acidis solvitur, mercurio vivo solvi possunt, si in ventriculo retineantur. Corpora majora, & indissolubilia e ventriculo etiam excindi possunt.

A M P U T A T I O M A M M Æ.

*Indicatur*, si mamma cancroſa eſt.

*Contraindicatur*. 1. Si cancer a cauſa interna, 2. ſi mamma muſculo pectorali fortiter adhæreat. 3. Si plures partes, ut glandulæ axillares jam cancroſæ ſint, ſi tarſi palpebrarum perpetuo rubeant.

*Inſtrumenta*. Scalpellum acutum, &

Acus cum filo pro ligatura arteriæ mammariæ.

*Deligatio*. Glomer magnus ex linteo carpto.

Splenia.

Faſcia.

*Operatio*. 1. Fiat incifio per mammam a ſterno verſus axillam. 2. Dein pinguedo totius mammæ ope manus finiſtræ elevatur, & perpetuis ſectiõnibus a muſculo pectorali majori ſeparatur.

Demum *arteria mammaria* ſanguinem plorans, ligatur. Quod autem raro neceſſarium eſt.

*Deligatio*. 1. Imponitur vulnerei *glomer* magnus, ſicus vel ſpiritu terebinthinæ madidus.

2. Duo *emplaſtra* longa cruciatim poſita.

3. *Spleniola*.

4. *Faſcia*.

Tertio die ope baſſami Arcæi ſuppuratio, & dein ſanatio, atque ultimo cicatrifatio procuratur.

## PARACENTHESIS THORACIS.

*Indicatur* quando *sanguis*, vel *aqua* vel *pus* in thoracis cavo effusum educi debet.

*Locus.* Ad palmæ latitudinem a spina dorfi, supra tertiam costam spuriam ab inferiori numeratam.

*Instrumenta.* Culter acutus.

—— apice obtuso.

*Deligatio.* Cannula vel linteolum efimbriatum.

Plumaceolum.

Fascia lata.

*Situs ægroti.* Super fella æger dorsum luci obvertat.

*Operatio ipsa.* 1. Cutis discindatur longitudinaliter ad tres pollices.

2. Etiam longitudinaliter discindatur musculus latissimus dorfi.

3. Tandem transversaliter incidantur musculi intercostales usque ad pleuram; incisio fiat in medietate spatii intercostalis.

4. Parvum vulnus transversale infligatur pleuræ. Hoc vulnus scalpello capitato ad medium pollicem dilatetur.

5. Sic ægro in vulnus locato effluit sanguis, vel aqua vel pus in cavo thoracis contentum.

*Deligatio.* Emisso fluido, vulnus, linteo efimbriato intruso, plumaceolo, & fascia lata firmetur. Et

si nil amplius ex vulnere effluat, vulnus consolidetur emplastro tenaci.

Si pleuræ esset *accretus pulmo* in loco operationis, tunc digiti minimi apice deberet deglubi a pleura, vel si hæc separatio impossibilis esset, deberet nova institui operatio ad quatuor digitos a sterni intra sextam, & septimam costam veram.

### TREPANATIO STERNI.

*Indicatur.* Si in antico spatio mediastini sub sterni sanguis, vel pus lateat.

*Operatio* fit iisdem instrumentis, ac eadem methodo, ut trepanatio in cranio.

### PARACENTHESIS ABDOMINIS.

*Indicatio* est hydrops abdominis, medicamentis incurabilis.

*Locus* in medietate inter spinam anteriorem ossis ilei, & inter umbilicum. Locus filo mensuretur, & atramento notetur.

*Instrumenta* sunt *Acus triquetra*.

*Vasa* pro excipienda aqua.

*Deligatio.* *Cingulum abdominale*.

*Spleniolum* spiritu vini madidum.

*Cardiaca* ut vinum forte.

*Situs* pro operatione est sedens ad marginem lecti.

*Præparatio.* Abdomen cingulo bene comprimitur, & fenestra cinguli aperitur.

*Operatio ipsa.*

1. Chirurgus acum triquetram in loco notato parum oblique in abdominis cavum immergit.
2. Extrahit acum ex cannula, & hanc in abdomine relinquit.
3. Excipit vase effluentem aquam.
4. Quotiescunque cingulum abdominale flaccescit, illud suis loris firmiter contrahitur.
5. Aqua omni effluxa extrahit cannulam, & vulnus spleniolo spiritu vini madido, vel emplastro anglicano deligat, atque cingulum abdominale per aliquot dies abdomini applicatum relinquit.

Si sub operatione *animi deliquium* supervenit illico cannula obturatur, cingulum abdominale contrahitur, æger aqua frigida, & vino cardiaco refocillatur.

Si animi deliquium non superveniat; omnis aqua simul emittitur.

## GASTRORAPHIA, SEU SUTURA ABDOMINALIS.

*Indicatur* in vulnere penetrante abdominis.

*Instrumenta.* Si vulnus 4. pollices longum, requiruntur

1. Sex acus magnæ, & curvæ.
2. Tria fila cerata. Acus una fit in qualibet fili extremitate.

3. *Bacillus* ex calamo.

4. *Plumaceolum oblongum* balsamo arcæi illitum.

*Operatio.* 1. Manus finistræ digito indice, & pollice attrahitur peritoneum. 2. Acus unius extremitatis ab introrsum per peritoneum, & omnes partes molles extrorsum ducitur. 3. Talis punctura fiat in opposito latere cum acu alterius extremitatis. Sic fiant tres futuræ.

Demum super bacillum fila in nodum elegantem constringuntur.

## ENTERORAPHIA, SEU SUTURA INTESTINALIS.

*Indicatio.* Intestina integre, vel semidiffecta.

*Instrumenta.* 1. *Acus* curvæ, & tenues.

2. *Fila* cerata sed diversi coloris.

3. *Tubus* ex charta luforia formatus, duos pollices longus.

*Operatio.* 1. *Tubus* chartaceus in superiorem intestini dissecti portionem immittitur.

2. Dein hæc portio intestini simul cum tubo, inferiori portioni intestini dissecti imponitur.

3. Unitis intestinis acus curva adeo immergitur, ut ex altero margine intestini læsi, & intromissæ chartæ iterum emergat.

4. Tandem acus a filo aufertur, & filii duo extrema solummodo contorqueri non in nodum constringi debent.

5. Tales futuræ fiant 2. vel 3. Dein fila extra vulnus abdominis emplastro tenaci cuti firmiter agglutinentur, & vulnus abdominis tandem gastroraphia uniatur.

6. Post 20. dies fila ex una parte abscinduntur, & ex eo latere extrahuntur ex intestinis. Tubus chartaceus interea cum fœcibus alvinis exit.

### ANI ARTIFICIALIS FORMATIO.

*Indicatio.* Si futura intestinalis fieri non possit, tunc superius intestini dissecti extremum vulneri abdominali per futuram uniatur, & ne vulnus concreasca, turunda vulneri imponatur.

Orificium ani artificialis *pila* excavata, & *bracherio elastico* affixa comprimitur, ne fœces perpetuo exeant.

### HERNIOTOMIA.

*Indicatur*, si hernia incarcerata, & nulla alia arte reducibilis est.

*Instrumenta.* Scalpelli simplex, & occultum.

Sulcus, &

Dilatatorium.

*Deligatio.* Linteum carptum.

Fascia lata T.

Spleniola.

*Situs ægroti.* In lecto divaricatis, & elevatis genubus.

*Operatio.* 1. Fiat longitudinalis incisio integumentorum herniæ ab annulo usque in fundum scroti.

2. Fiat parva incisio *sacci herniosi*, hæc immisso sulco cavo dilatetur sursum usque ad anulum inquinalem.

3. Tandem si repositio prolapsarum partium ob annuli angustiam fieri nequeat, tunc ille vel *dilatatorio*, vel *scalpello occulto* sursum, ac simul introrsum versus umbilicum dilatetur ad medium pollicem.

4. Tandem fiat repositio intestinorum, & dein omenti prolapsi.

Si vero *omentum* scirrhusum, vel gangrænosum est, tunc abscindendum est.

Si *intestina* gangrænosa essent, anus artificialis formari deberet. Raro enim enteroraphia fieri potest.

*Deligatio.* Vulnus unitur plumaceolis, spleniis, & fascia.

## OPERATIO CÆSAREA.

*Indicatio.* 1. Si fœmina sub graviditate moriatur.

2. Si ob pelvim angustam partus impossibilis sit.

3. Si fœtus extra uterum vel conceptus, vel per ruptum uterum elapsus sit.

*Operatio.* 1. Fiat ad palmæ latitudinem ab umbilico vulnus 6. pollicum usque in abdominis cavum.

2. In parte laterali uteri fiat vulnus 5. pollicum, dein eximatur fœtus & placenta.

3. Tandem utero contracto, & sanguine e cavo abdominis expurgato, gastroraphia vulnus abdominale uniatur.

In *mortua* fieri debet operatio ut in viva muliere. Est autem hæc operatio in viva femina periculosissima, raro felicitis exitus.

## PARACENTHESIS SCROTI.

Indicatur in *hydrocele vaginali* scroti.

Ope *parvæ acus triquetræ* fit punctura in fundum scroti parum oblique, ne testiculus lædatur, qui manu sinistra sub punctura sursum premi debet.

Raro punctura *radicaliter* curat hydrocelem; sed illam solummodo ad tempus palliative sanat.

Persæpe *hæmatocele* ingens sequitur puncturam scroti. Hæc requirit magnam scroti incisionem.

## SECTIO SCROTI INTEGRA.

*Indicatur.* In *hydrocele vaginali*.

1. Cutis longitudinaliter inciditur.
2. Vulnus hoc sursum ac deorsum dilatatur usque ad fundum scroti.

3. Sic etiam tunica vaginalis testiculi perscinditur.
4. Emissio liquido aquoso, totum vulnus linteo carpto impletur, & excitata suppuratione iterum sanatur.

### S E T A C E U M S C R O T I.

*Indicatur in hydrocele vaginali.*

*Acus triquetra cava per scrotum pungitur, & ligamen per septimanas aliquot relinquitur.*

### C A S T R A T I O.

*Indicatur in cancro testiculi.*

*Contraindicatio.* Si funiculus spermaticus jam ultra annulum inguinalem scirrhusus est.

*Operatio.* 1. Fiat *denudatio* testiculi per *sectionem integram* scroti.

2. Dein ope acus latioris & fili quadruplicis totus funiculus spermaticus super spleniolo ligetur.

3. Tandem separetur testiculus sub ligatura a vicinis partibus, sed relinquatur donec putrescat, tum abscindatur sub ligatura.

4. Totum vulnus linteo carpto ficco impletur, & facta supuratione sanatur.

### A M P U T A T I O P E N I S.

*Indicatio.* Cancer glandis & præputii.

*Operatio* fit per *ligaturam* vel per *abscissionem*.

Ligatura exigit ut *canula argentea* in urethram immitatur, ut æger tempore, quo ligatura in membro relinquitur, urinam mittere possit.

In *abscissione* penis per cultrum, sanguis ex duabus arteriis profilit, si aqua thediana fisti hæmorrhagia non possit, compressio membri ope fasciæ ad cannulam, quæ in urethra est, fieri debet.

### C A T H E T E R I S M U S.

*Indicatur* in omni *retentione urinæ*, & etiam pro *exploratione calculi* in vesica.

Catheter duplici methodo applicatur

1. Methodo simplici, &
2. ——— cum versione magistrali.

In *applicatione simplici* membrum manu sinistra servatur, & catheter, cujus apex oleo illinitus esse debet, immittitur in urethram adeo, ut curvatura catheteris deorsum sit versa, & sic in vesicam paullatim immergitur.

In *applicatione magistrali* imponitur catheter urethræ adeo ut ejus curvatura sit sursum versa, sic immergitur catheter tantum, quantum possibile est, dein subito vertitur catheteris curvatura deorsum, sic subinde facilius penetrat catheter in vesicam.

Immisso cathetere extrahitur filum argenteum, & emititur urina, quæ vase excipitur.

In *mulieribus* facilius applicatur catheter, quia earum urethra brevis & recta est. Habetur pro illis *peculiaris* catheter, qui brevis est.

## PUNCTURA VESICÆ.

*Indicatur* si *urina* jam diu *retenta* nullo modo per catheterem extrahi possit, & æger in mortis periculo jam versetur.

*Instrumentum* est longa & curva acus triquetra.

*Locus* tutissimus est per intestinum rectum.

*Operatio ipsa.* Duo digiti manus finistræ in intestinum rectum imponuntur, inter hos adeo immergi debet acus triquetra, ut per intestinum in vesicam usque intrudi possit.

Dein extrahitur acus & cannula in vulnere & vesica relinquitur per aliquot dies, nempe donec sua sponte per urethram *urina* exeat.

## URETHROTOMIA.

*Indicatur* in *calculo*, qui in urethra impactus hæret.

*Locus* est in parte inferiore membri virilis ubi calculus tangitur.

Ibi fiat longitudinalis incisio, ut calculus parvo cochleari vel forcipe extrahi possit.

Vulnus sanatur emplastro adhæsivo.

## OPERATIO FISTULÆ ANI.

*Indicatur* in fistula completa, vel incompleta, quæ alia methodo insanabilis est.

*Contraindicatur.* Si fistula nimis alta, si caries ossis sacri adest, si omnis pinguedo circa intestinum rectum jam consumpta, & fistula ani cancrofa est.

*Instrumenta.* Culter curvus cum apice obtuso.

Forfex.

*Deligatio.* Turunda longa.

Plumaceola plura.

Splenia.

Fascia T.

*Præparatio ægroti.* Die ante operationem purgans datur. Aliquot horas ante operationem enemate eluuntur intestina, & in plethoricis venesectio instituitur.

*Situs.* Æger in lecto in genua flexus, & pectore antroorsum flexo locetur.

*Operatio.* 1. Chirurgus indicem finistræ manus oleo illinitum immittat in intestinum rectum, & orificium internum fistulæ tangat apice digiti.

2. Dextra manu cultrum per fistulam trudat usque in intestini recti cavum.

3. Apice indicis, qui in intestino est & altera manu ope manubrii, quod extra fistulam est, deorsum per omnes subjacentes partes trahatur acies cultri.

4. Dein callositates si adsint exciduntur forfice.

*Deligatio.* Turunda longa immittitur intestino recto. Vulnus expletur linteo carpto, desuper spleniis & fascia T firmatur.

*Operatio fistulæ externæ* requirit, ut cultro perforetur intestinum rectum, & dein ulterior sectio, ut in casu priori fieri debet.

In *fistula interna*, prius externe debet incisio in fundum fistulæ fieri, sic ex fistula incompleta completa fit, quæ eandem exigit operationem.

Fistulæ *altiores* instrumento Celeber. D. *Brambila* discindi possunt.

## A M P U T A T I O F E M O R I S.

*Indicatio* est 1. *Sphacelus* totius cruris.

2. *Comminutio* ossium cruris.

3. *Caries magna* articulationis genu.

*Contraindicatio* est sphacelus ad inguina jam ascendens, vel a causa interna natus.

*Instrumenta.* 1. *Tornaculum.*

2. *Acus curvæ* cum filis ceratis & parvum spleniolum.

3. *Culter magnus falcatus.*

4. *Culter rectus.*

5. *Serra.*

6. *Ligamen.*

7. *Linteum fissum.*

*Pro deligatione.* 1. *Plumaceola parva* terebinthinæ spiritu madida.

2. *Glomer magnus* ex linteo carpto.

3. *Emplastrum* 2. longa.

4. *Splenium* in forma crucis malthenfis.

5. 2. *Longa splenia.*

6. *Fascia* 6. ulnas longa, in duo capita convoluta.

*Situs*

*Situs ægroti.* Sedeat in magna sella, vel in lecto  
versus lucem.

- Operatio ipsa.* 1. Applicatur *tornaculum* ad arteriam  
femoralem, quæ in interna parte  
femoris est.
2. Ad duos digitos supra genu liga-  
tur *ligamen*, juxta quod incisio  
fieri debet.
3. *Cultro falcato magno* fiat incisio  
circularis omnium partium ad  
ossa usque.
4. Dein *cultro recto* deorsum abra-  
ditur *periosteum*.
5. Applicatur *ligamine ablato* lin-  
teum *fissum* adeo, ut eo carnes  
fursum ab adjutore trahantur.
6. Demum *ferra magna* perscinditur  
os femoris, & pars amputata, &  
linteum fissum aufertur.
7. *Tornaculum* parum relaxatur, ut  
ex profiliente sanguine videri pos-  
sit, ubi arteria femoralis discissa  
hæreat.
8. *Acus curva* juxta arteriam immer-  
gitur per pinguedinem, quæ ar-  
teriam circumdat, & ex altera  
parte arteriæ iterum educitur  
acus, atque aufertur a filis. Dein  
arteriæ apponitur parvum splenio-

lum, ac desuper fila constringuntur in nodum.

*Deligatio.*

1. Deligata arteria ossi abscisso imponitur *plumaceolum* spiritu terebinthinæ madidum.
2. Toti vulneri imponitur *glomer* magnus ficcus.
3. Glomer firmatur duobus *emplastris* longis cruciatim impositis.
4. Dein imponitur *splenium*, quod crucis malthenfis figuram habet.
5. Ultimo *fascia* firmantur omnia circularibus circumvolutionibus.
6. Femur amputatum imponitur *sacco stramineo*, & tornaculum sensim ac sensim relaxatur, sed non penitus primis diebus auferatur.

*Curatio reliqua.* Tertio die auferitur tota deligatio, & glomer magnus balsamo Arcæi illitus imponatur, ut in vulnere suppuratio moveatur, & loco fasciæ longæ *fascia multicapitata* applicetur.

Facta ubique vulneris suppuratione, vulnus aqua vulneraria, os spiritu terebinthinæ, vel essentia mastichina sanatur.


*Ligatura* utplurimum circa 14tum diem ab arteria ligata decedit.

Sanato vulnere adaptatur *crus ligneum artificiale*.

In amputatione, *cruris*, *caro interossea* cultro recto discinditur, & deorsum truditur. Dein serra primum tibia inciditur aliquantum, tandem simul fibula.

In *femore* arteria femoralis, in *brachio* brachialis, in *crure* tibialis antica, tibialis postica, & peronea, in *antibrachio*, cubitalis, radialis, & interossea ligari debent.

Si *phalanx* manus, vel pedis amputari debet, tunc hæc ex articulatione excindenda est.



## DOCTRINA DE MORBIS OCULORUM.

### OPHTHALMIA.

**E**st inflammatio membranæ albuginæ oculi.

Dividitur in *humidam*, quæ lachrymis noscitur.

in *siccam*, quæ sine lachrymis est.

*Inflammatio oculorum humida* resolvitur.

1. *Venæ sectione.*
2. *Purgantibus.*
3. *Vesicatoriis* in nucha, aut
4. *Hirudinibus* ad tempora applicatis.
5. *Collyriis*, seu *aquis ophthalmicis* leniter adstringentibus, ut

*Aqua rosarum vitriolata.*

—— *vegeto mineralis.*

—— *frigidissima.*

*Ophthalmia sicca* requirit *collyrium emolliens*, ut

*Cataplasma* ex mica panis albi, & lacte.

———— ex pulpa pomorum cum croco, & camphora.

*Ophthalmia* a contusione oculi requirit vinum tepidum, in quo herbæ cephalicæ sunt infusæ.

*Ophthalmia inveterata* requirit præter laudata remedia etiam *setacea*, & *fonticulos*.

### H Y P O P I U M.

Est puris *effusio* in cameram anteriorem oculi.

Nisi *fomentis resolyentibus* pus absorbeatur, parva *incisio* in inferiori corneæ parte fieri debet, ut pus effluere possit.

### P T E R Y G I U M.

Est macula opaca, in cornea pellucida oculi.

Ad *curationem* requiritur.

1. *Unguentum Sæntyvianum*.
2. *Butyrum recens* cum *præcipitato rubro*, vel
3. *Pulvis ophthalmicus* ex partibus æqualibus sacchari, cremoris tartari, & boli armenæ.

### T R I C H I A S I S.

Est ciliorum *inversio* versus oculi bulbum.

*Curatio* exigit, ut *volsella parva* cilia inversa evelantur.

## FISTULA LACHRYMALIS.

Est muci puriformis effluxus e punctis lachrymalibus.  
Divisio in *apertam*, quæ ulcus in interno angulo  
habet.

- *occultam*, quæ sine ulcere externo est.
- *Complicatam*, quæ cum obstructione ductus nasalis complicata est.

*Occulta* fistula lachrymalis curatur *instillatione* collyrii vitriolati. *Injectiones* peractæ sunt nullius usus ope syphonis *Annelliani* per punctum lachrymale inferius.

*Aperta* fistula lachrymalis curatur, ut aliud ulcus callosum.

Fistula lachrymalis *complicata* cum *obstructione* ductus nasalis exigit, ut saccus lachrymalis *incidatur*, & ut obstructio *stylo*, vel *setaceo e chorda fidium* in nasalem ductum immisso, auferatur.

## CATARACTA.

Est *cæcitas* ab opacitate lentis crystallinæ.

*Noscitur* hæc cæcitas ex pupilla ægroti albicante, quæ in statu sano nigra esse debet.

Cataracta rarissime *curatur* medicamentis. Sed possunt ea tentari, quæ contra amaurosim laudantur.

Si medicamentis malum non cedat *operatio* fieri debet.

- Hæc duplex est 1. per *extractionem* cataractæ.  
2. per *depressionem* cataractæ.

## A M A U R O S I S.

Est plenaria *cæcitas* sine apparente oculi vitio.

*Causa proxima* est paralyfis nervi optici.

Ad *curationem* laudatur aliquoties dato tartaro emetico & fetaceo ad nucham inciso

1. *Infusum arnicæ.*
2. *Extractum pulsatillæ nigricantis.*
3. ——— *Aconiti cum mercurio dulci.*
4. *Electricitas.*

## E T R O P I U M.

Est inversio palpebræ inferioris.

*Curatio* exigit ut caro fungosa inversæ palpebræ forfice excindatur. Externa transversalis palpebræ cutaneæ incisio nihil prodest.

---

DOCTRINA DE MORBIS  
DENTIIUM.

---

## O D O N T A L G I A.

**E**st dolor dentium. *Odontalgia rheumatica*, seu a rheumatica inflammatione gingivarum exigit colutorium ex ruta vel radice pyrethri in vino cocta; interne sudorifera dentur.

*Odontalgia cariosa* exigit evulsionem dentis.

*Odontalgia consensualis* seu a saburra ventriculi, curatur vomitorio, a graviditate curatur venæsectione & nervinis.

## DENTITIO DIFFICILIS INFANTUM.

Dens erumpens in gingiva maculam albam, vel tumorem rubentem facit, si convulsio exinde oritur, gingiva cruciatim discindi debet.

## P A R U L I S.

Est *tuberculum inflammatorium* in gingivis.

Oritur utplurimum a radice dentis *cariosa*.

*Incipiens* inflammatio subinde resolvi potest *collutorio* ex herbis resolventibus.

Si resolutio non contingat, tunc *suppuratio* debet promoveri ope *collutorii* ex ficibus in lacte coctis.

Dein *abscessus* lanceola aperitur.

*Ulcus* dein sanatur *collutorio vulnerario* ex decoctio rutæ, salviæ cum melle rosaceo.

Curato tumore dens cariosus evelli debet, alias post aliquot septimanas redit malum.

## E P U L I S.

Est *tuberculum fungosum* ex gingiva excrescens.

*Causa* est caries alveoli.

*Curatio* exigit excisionem tumoris, & evulsionem dentis cariosi.

## TARTARUS DENTIIUM.

Est terreus mucus, qui dentes incrustat.

Si tartarus per pulveres dentifricos, ex conchis præparatis, detergi non potest, tunc instrumento acuto tartarus findi, & frustillatim detrudi debet.

## VACILLATIO DENTIIUM.

In senibus, in scorbuticis, & ab usu mercurii observatur, exigit collutorium adstringens vel tincturam laccæ.

## HÆMORRHAGIA ALVEOLARIS.

Quæ evulsionem dentis sequitur calido & forti aceto sistitur.

Si vero fluxus sanguinis nimius est, tunc stylo acuto arteriola fundo alveoli acreta dilaceretur, & dein masticata charta bibula impleatur atque alio corpore duro desuper posito, utraque maxilla firmiter colligetur.

## CARIES DENTIIUM.

Si omnes fere dentes sint nigricantes, tunc collutorium ex ruta & salvia adhibeatur.

In carie *foraminosa* foramen auro expleatur, vel stylo candente uratur.

Caries *magna* evulsionem dentis exigit. Hæc peragitur *clave anglicana*, vel *pelicano*, vel *forcipe dentaria simplici* aut *composita*.

Evulsio dentis in scorbuticis aut in gingivis multum inflammatis admodum periculosa est.

---

M O R B I C U T A N E I.

---

V E R R U C Æ.

**B**ENIGNÆ seu non dolentes quotidie *spiritu vitrioli* tangantur, & *emplastro* albo tegantur.

*Malignæ* seu lividæ & dolentes in *cancrum* abeunt.

C L A V U S.

Clavi digitorum pedis *pediluvii* emmolliantur & dein parvo *emplastro vesicatorio* vel *diachilon* tegantur.

S C A B I E S.

*Noscitur* pustulis prurientibus in digitorum interstitiis incipientibus.

*Dividitur* in scabiem *siccam*, quæ pustulas ficas  
— — — *humidam* quæ pustulas suppurantes format.

*Interne* detur *purgans*.

*Decoctum purificans*.

*Æthiops mineralis* vel *flores sulphuris* cum *extracto enulæ*.

*Externe*, *balnea sulphurea*.

*unguentum helleboratum*.

— — — *ex præcipitato albo* laudatur.

*Scabies squamosa* quandoque *decocto corticis ulmi* curatur.

## S C A B I E S C A P I T I S.

Format crustas humidus in capitis parte capillata.  
 Subitanea exsiccatio pessimos morbos oculorum, vel  
 pulmonum facit.

Præter purgantia, & purificantia lavetur caput *decocto*  
*specierum emollientium & melle.*

## T I N E A C A P I T I S.

Format crustas ficas viridescences.

*Interne* mercurius gummosus, *externe* lavamentum ex  
 speciebus emollientibus cum radice hellebori  
 albi, & sublimato corrosivo prodest.

Subinde unguentum ex *præcipitato rubro*, & viridi  
 æris profuit.

## C R U S T A L A C T E A.

Est *scabies crustosa*, quæ in buccis faciei infantum  
 oritur.

*Interne* dentur purgantia, & *decoctum bardanæ*, ac  
*violæ tricoloris.*

## H E R P E S.

Est macula pustulis prurientibus, & tuberculis quan-  
 doque crustosis obfita.

Si unguentum *helleboratum* non prodest, applicetur  
*emplastrum vesicatorium.*

## V A R I.

Sunt pustulæ rubræ, & duræ in facie vel circa nasum,  
 quæ etiam *gutta rosaceo* vocantur.


*Facies aqua sale marino imprægnata tenui solutione sublimati abluatur. Interne dentur purgantia. Livida faciei tubercula sæpe in cancrum abeunt.*

### H Y D A T I S.

*Vesiculæ aqua repletæ hydatides vocantur. Curatio exigit incisionem vesicularum & exsiccationem.*

### L E N T I G I N E S.

*Seu maculæ solares abluantur aceto armoraciæ.*



### M O R B I V E N E R E I.

**S**UNT morbi, qui a miasmate venereo oriuntur. In omnibus morbis venereis *interne* datur *mercurius gummosus* mane, ac *vesperi* grana X. cum decocto bardanæ, vel farsaparillæ vel lignorum. Demum sub usu mercurii omni otiduo detur purgans. *Externa* medicamenta autem requiruntur varia.

### G O N O R R H Œ A.

Est fluxus puriformis ex urethra. Oritur a coitu cum fæmina, quæ fluore albo venereo laborat. Primis diebus *dysuria*, seu dolorosa urinæ emissio adest.

*Curatio* exigit

1. *Emulsionem* refrigerantem.
2. *Decoctum althææ.*
3. *Purgans* eccoproticum ex rheo, & sale mirabili.

Remittente ardore urinæ detur pulvis balsamicus.

R. *Rhei electi.*

*Salis mirabilis* aa ʒj.

*Balsami copaivæ.* gt. vj.

*Misce dividatur in IV. doses. Signetur omni quadrihorio unus summatur.*

*Injectiones* adstringentes in urethram factæ nocent, inde oriuntur *bubones* vel testiculorum *inflammationes*.

At *injectiones* ex ℥j aquæ, mucilaginis gummi arabici ʒj, ac merc. sublimati corrosivi grano uno & semis gonorrhæam brevi curant.

## FLUOR ALBUS.

Est fluxus puriformis ex vagina muliebri.

Oritur a coitu cum viro gonorrhæa affecto.

*Curatur* ut gonorrhæa.

## BUBONES.

Sunt intumescentiæ glandularum inguinalium.

*Resolvantur* emplastro mercuriali, vel *aperiantur* lapide caustico.

*Ulcera venerea inguinum* solutione sublimati curantur.

## PHYMOSIS.

Est inflammatio venerea præputii.

## PARAPHYMOSIS.

Est inflammatio venerea glandis, præputium colaris adinstar reprimat.

Phymosis , & paraphymosis curantur balneo penis in lacte cum mercurio *gummoso* cocto , vel solutione sublimati.

Si ob strangulationem glandis instaret ejus gangræna, tunc præputium cultro discindi deberet.

### INFLAMMATIO TESTICULORUM.

*Curatio* præter emulsionem refrigerantem, & mercurium gummosum exigit cataplasma ex speciebus emollientibus cum aqua vegetominerali coctis.

### ULCERA VENEREA GLANDIS.

Ulceræ glandis vel præputii, quæ *cancri venerei* vocantur solutione mercuriali deligantur.

*R. Mercurii sublimati corrosivi. gr. iv.*

*Aquæ florum sambuci. ℥j.*

*Mellis rosacei. ℥ss.*

*misceatur.*

### ANGINA VENEREA.

Ulceræ venerea *faucium* eadem solutione ope pennicilli aliquoties de die illiniantur , decocto bardanæ cum mercurio interne dato.

### OZÆNA VENEREA.

Ulceræ in cavitate narium , vel in nasi externa superficie *curantur* solutione sublimati ad ulcus applicata.

Septo narium erosione destructo *callabitur* totus nasus.

## C O N D Y L O M A T A.

Sunt excreſcentiæ fungosæ circa anum, & genitalia.

*Curatio.* Illiniantur forti ſolutione ſublimate, dein regantur unguento mercuriali.

## T O P H I.

Seu tumores venerei in oſſibus *emplastro*, vel *unguento mercuriali*, atque decocto *mezeræi* reſolvuntur.

## A R T H R I T I S V E N E R E A.

Eſt dolor capitis, & articulorum, qui noctu augetur, & de die multum remittit.

*Curatur* interno uſu mercurii gummofi.

## S C A B I E S V E N E R E A.

Facit maculas, & varos in fronte, ac in aliis partibus.

Præter uſum internum mercurii, poteſt pars ſcabioſa tenui ſolutione mercurii ſublimate lavari.

## F I N I S.