

**Wenceslai Trnka de Krzowitz Historia leucorrhoeae, omnis aevi observata
medica continens.**

Contributors

Trnka z Křovic, Václav, 1739-1791.

Publication/Creation

Vindobonae : Prostat apud Rud. Grafferum, 1781.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/snqqkn2c>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>




52034/B

J. XVIII. e

18

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b28775491>



WENCESLAI TRNKA
DE KRŽOWITZ

S. R. I. EQVITIS MEDICIN. DOCTOR.
IN REG. UNIVERS. THERESIANA BU-
DENSI PATHOLOGIÆ PRO-
FESSORIS P. O.

H E S T O R I A.
LEUCORRHOEAE

OMNIS AEVI OBSERVATA
MEDICA CONTINENS.

P A R S I.



V I N D O B O N A E
Prostat apud RUD. GRÆFFERUM.

CIO DCC LXXXI.



P E R I L L U S T R I

C L A R I S S I M O

A C

D E X T E R R I M O

DOMINO

F E R D I N A N D O

D E

L E B E R

SACR. CAES. REG. APOST. MAJEST.

C O N S I L I A R I O

C H I R U R G I A E D O C T O R I

E J U S D E M Q U E

I N U N I V E R S I T A T E V I N D O B O N E N .

P R O F E S S O R I P . O .

N E C N O N

N O S O C O M I I C I V I U M C H I R U R G O

O R D I N A R I O

I N
PERPETUAE GRATITUDINIS
ET
AMICITIAE
MONIMENTUM
LUCUBRATIONEM
HANC
DE LEUCORRHOEA

D. D. D.

AUCTOR.

LECTORI S. AUCTOR.

Inter eos, quorum historias per aliquot ab-hinc annos in lucem edidi, morbos haud po-stremo ponendum esse censui loco illum, qui qua late orbis terrarum patet, in sequiorem sexum non impune grāssatur. Leucorrhœam puto. Nam cum sit (nostra præsentim ætate, quæ frugalitati pudicitiaeque repudii libelum de-dit) vitæ muliebris ut plurimum otio, inglu-vie, libidinibusque perditæ soboles, id etiam sibi proprium habet, ut omnibus pœnis altrices suas pleat, molestum juxta ac invisum mun-ditiem seellantibus malum, naturaque sua lon-ge fædissimum (nisi quod turpitudinem ejus lo-ca, quæ pudor oculis subducta esse voluit, vul-gari non patientur), virorum amorem ab uxori-bus avertens, spem prolis ardentiſſimiſ ſæpe votis expetitæ, commodorumque inde in paren-tes dimanaturorum, accidens, & quod ægrotas ad desperationem interdum adigit, omnem haud raro ſoteriæ artis industriam plane elu-dens, ac ne quid ad absolutum calamitatum

cumulum desideretur, sacer numero gravissima
quæque tormenta, non nisi lenta morte finienda,
intentans. Quæ cum ita sint, existimavi me
Tuo aliquid commodo Lector facturum, si hanc
talem ægritudinem, vix a quoquam, pro eo
ac par est, pertractatam, nisi quod de illa sua
cuique in praxi posteriorum memoria dignum
occurrit, pro more institutoque meo ita literis
proderem, ut omnia ejus monumenta undique
conquisita uno velut obtutu Tibi sisterem.
Hæc vero non eo pertinere credas, velim, ut
me œncomia abs Te præstolari putas, (ut qui
nunquam non memoria teneam DIVINUM il-
lud danti mihi sapientiam dabo gloriam),
sed ut bis meis conatibus in salutem qua imme-
rentium puellarum, quas vel mater vel aliæ
humanae ærumnæ hic præcipites dederunt, qua
earum, quæ meritas vel scelerum vel mortalis
certe fragilitatis pœnas per leucorrhœam luunt,
utare. Dabam e præsidio Budensi XIV ka-
lend. Apriles CIC IO CC LXXXI.

SERIES OPERIS.

P A R S I.

Caput I. Definitio leucorrhœæ	pag. 1.
Genera ejusdem	2.
I. Vera, eaque	ibid.
1. Uterina vel vaginalis	ibid:
2. Recens aut vetus	ibid.
3. Continua vel intermittens	3.
4. Simplex vel complicata cum	
a) nota leucorrhœa,	6.
b) cachexia,	ibid.
c) hysterica passione,	ibid.
d) ulcere	ibid.
II. Notha, eaque	ibid.
A. Benigna, ut est	7.
1. Gonorrhœa benigna	ibid.
2. Leucorrhœa gravidarum	8.
B. Maligna	ibid.
Caput II. Symptomata leucorrhœæ	9.
I. Fluxus phænomena, ut	10
1. Tempora ejus	ibid.
2. Qualitates, sc.	11.

a) Color	pag. II
b) Consistentia	14.
c) Odor	15.
d) Acrimonia	ibid.
3. Ubertas	17.
4. Contenta	18.
II. Functiones Iæsæ	25.
1. Dolores	26.
2. Tensiones	ibid.
3. Dyspepsia	ibid.
4. Alvus	26.
5. Urina	ibid.
6. Menses	ibid.
7. Habitus	ibid.
8. Præcordia	ibid.
9. Lassitudo	ibid.
10. Animus affectus	27.
Caput III. Proegumenæ causæ	29.
1. Ætas	ibid.
2. Corpus	35.
3. Hæreditaria labes	36.
4. Cachexiæ	37.
5. Uteri morbi	39.

Caput IV. Procatareticæ causæ pag. 39.

1. Pathemata animi	ibid.
2. Ingesta	40.
3. Tempestas anni	41.
4. Venus immodica	42.
5. Graviditas	46.
6. Catameniorum vitia	47.
7. Partus, molæ, hæmorrh. uteri	51
8. Metastases	53.
a) Sudoris	ibid.
b) Lactis	ibid.
c) Sputorum	55.
d) Vomitus	ibid.
e) Catarrhi	ibid.
f) Tumorum	57.
g) Sangvinis retenti	59.
Caput V. Proxima causa, evicta	61.
Anatome	63.
Ratiocinio	65.
Caput VI. Diagnosis	69.
A. Veræ	ibid.

B. Venereæ indicia sunt	pag. 70.
1. Causa	ibid.
2. Symptomata propria	72.
3. Qualitates	73.
4. Ubertas	75.
5. Autopsia	76.
6. Coitus	79.
7. Typus	81.
8. Juvantia & nocentia	85.
Caput VII. Prognosis	94.
1. Duratio varia	ibid.
2. Effectus	96.
A. Ubertatis	97.
a) Vulvæ amplitudo	ibid.
b) Uteri prolapsus	ibid.
c) Abortiendi proclivitas	99.
d) Sterilitas	104.
e) Sensuum læsio	107.
f) Cachexiæ	108.
g) Acrimonia.	109.
B. Acrimoniae	110.
a) Excoriatio	ibid.
b) Inflammatio cum seqvelis	ibid.
c) Ulcera	114.

d) Excrecentiæ	pag. 119.
e) Dolores	123.
f) Urinæ difficultas	124.
g) Hæmorrhagiæ	ibid.
h) Tabes, hectica, phthisis	125.
i) Exanthemata	126.
3. Suppressio creat aliat mala,	
unde	128.
a) Dolores	ibid.
b) Catarrhus	130.
c) Diabetes	131.
d) Exanthemata	ibid.
e) Febres	132.
f) Abscessus, ulcera	133.
g) Phthisis	135.
4. Reversio hæc rursus abolet	138.
5. Solvitur leucorrhœa	
a) Pubertate	149.
b) Conceptu	150.
c) Ptyalismo	ibid.
d) Anacatharsis	ibid.
e) Sudore	151.
f) Emesi	pag. 152.
g) Diarrhœa	153.

P A R S . II.

Caput I. Indicans, indicationes, indica-	
cata	pag. 155.
Caput II. Emetica, præfertim	158.
1. Ypecacuanha	159.
2. Afari radix	ibid.
3. Vitrum cerat. antimon.	161.
Caput III. Cathartica, in primis	ibid.
1. Rheum	168.
2. Aqvæ soteriæ	176.
Caput IV. Diuretica	178.
1. Abſtergentia	179.
2. Roborantia, ut	180.
a) Daucus	ibid.
b) Juniperi grana	181.
c) Dictamni alb. radix	ibid.
d) Balsama nativa	182.
Caput V. Diaphoretica.	186.
Caput VI. Sialagogæ	190.
Caput VII. Invigilantia	194.
Caput VIII. Roborantia	195.
1. Stomachica	196.
a) Mentha	199.

b) Nux moschata	pag. 199.
c) Rosmarinus	ibid.
d) Serpillum	200.
e) Qvassia	ibid.
2. Uterina	ibid.
a) Uva ursi	201.
b) Basilicum silvestre	202.
3. Vulneraria	205.
a) Cicuta	ibid.
b) Balsama nativa	215.
c) Gummi - resinæ	216.
d) Cortex Peruvianus	219.
Caput IX. Adstringentia	225.
1. Exsiccantia , ut	233
a) Lapidès cancrorum	ibid.
b) Corallia	234.
c) Aqva calcis	235.
2. Austera , ut	ibid.
a) Suber ustum	ibid.
b) Qvercus folia	236.
c) Terra catechu	ibid.
d) Vitrioli acidum	ibid.
e) Martialis	238.
Caput X. Composita remedia	241.

Caput XI. Externa remedia	pag. 252.
1. Sangvinis missio	ibid.
2. Frictiones	257.
3. Litus	ibid.
4. Fots	258.
5. Suffitus	261.
6. Injectiones	264.
7. Balnea	269.
A. Diaphoretica	ibid.
B. Thermæ sulph.	ibid.
C. Roborantia	270.
a) herbacea	ibid.
b) mineralia	272.
c) frigida	275.
8. Fonticuli, setacea	276.
9. Amuleta, transplantationes	278.
Caput XII. Regimen diæteticum	279.
1. Alimenta	ibid.
2. Veneris usus	282.
3. Aeris foliqve mutatio	285.
4. Motus corporis	ibid.
5. Pathemata animi	287.
6. Vestitus	288.
Appendix historias 13 selectas continens	290.

HISTO-

E R R A T A.



- Pag. 3. nota (*f*) pro §. 20. lege §. 22.
— 160. lin. 22. cretæ ȝij lege ȝij.
— 197. lin. 21. entiffima lege lentiffima.
— 245. lin. 1. pro 235.

AT 158
C. 1800
1800
1800
1800
1800
1800

5





HISTORIAE
LEUCORRHOEAE
PARS I.

DE NATURA AC VARIETATE
LEUCORRHOEÆ.

C A P U T I.

DEFINITIO AC GENERA LEUCORRHOEAE.

§. I.

DEFINITIO. Λευκόρροια, alias & πάσις λευ-
κος & πάσις γυναικεῖος, Latinis *Fluor albus*, est
humoris serosi e muliebris fluxus, qvem alii

A

menstrua alba, alii *gonorrhœam muliebrem*, alii *profluvium uteri* aut *muliebre* vocitarunt. Sunt etiam, qveis *coryzæ uteri* nomen ar-
rigit (a).

§. 2.

GENERA porro hujus ægritudinis duo præsertim sunt, ad qvæ facile omnia alia ab aliis assignata revocari se se patiuntur. Pe-
tiimus illa, natura rei sic innuente, ta di-
versa fluxus ipsius scaturigine, qva confide-
rata dicenda erit Leucorrhæa

I. *Vera*, cuius fluxus ex iisdem vasis pro-
venit, e qvibus menstruus sanguis exstillat.
Qvæ cum non in uteri modo, sed vagina
etiam superficiem haud raro hient, ita ut
menses aliis ex utero, aliis e vagina quo-
que scaturiant, leucorrhœa quoque vera

1. *Uterina vel vaginalis* sit oportet (b).
Utraqve autem hæc rursum est

2. *Recens aut inveterata* (c), eaqvæ
spectato typo; qvem obtinet,

(a) Vide §. 18. e).

(b) Vide §. 19. sqq.

(c) Vide §. 34.

3. *Continua vel intermittens.* Continuam expertæ sunt matronæ ALBRECHTI (*d*), GASSERI (*e*), HILLII (*f*), Dux ST ARCKII (*g*), mulieres BURGGRAVII (*b*), BURTONI (*i*), HOFFMANNI (*k*), MÜNNICHII (*l*), ST ÖRCKII qve (*m*), tum puellæ BEHRII (*n*) ac JUCHII (*o*); continuam qvoqve, at erecto tantummodo in situ, patiebatur ægrota MURALTII (*p*). Morbi continui remittentis casum narrat B. SILVATICUS (*q*), nempe matronæ 25 annorum gracili, cum post mœrorem ex obitu patris conceptum anno ætatis 17^{mo}, erroresqve in victu, catameniis bis inde suppressis, tabesceret, nuptui datæ leucorrhœa oborta est, ita ut 6 annos sterili, mensibus rite, at aliquanto profusius, procedentibus, semper ex intervallo 12 dierum succederet tridui fluor albus, parcior qvidem mensibus, at varius, materia profluente modo viscida,

(*d*) Vide §. 35. B. g).

(*l*) Vide histor. 6

(*e*) Vide §. 62. a).

(*m*) Vid. histor. 10.

(*f*) Vide §. 20.

(*n*) Vide §. 36. f)

(*g*) Vide histor. 5.

(*o*) Vide histor. 7.

(*b*) Vide §. 45. No 1.

(*p*) Vide §. 35 B. b).

(*i*) Vide §. 35 B. d).

(*q*) Cons. & resp. med.

(*k*) Vide §. 70.

Gent. 4. No 23. p. 314.

mucosa, crassa, modo tenui, ichorosa, fœtida, modo alba cum tenuissimis sangvinis striis ac fibris, modo livida ac fœculenta, freqventius loturam carnis recentis magis minusve dilutam referens, vel purioris sanguinis forma. Fluxus hieme uberior molestiorqve erat, qvam æstate. Medio tempore genitalia perpetuo madebant, licet nihil effatu dignum proflueret. Tam vero menses, qvam in primis leucorrhœa, cauſabant dolorem dorsi & circum pubem cum gravitate cervicis & colli uteri, ut ægra vix stare posset, cogereturqve federe declivis sublatis genibus. Multa frustra remedia adhibuit. Intermittens vero leucorrhœa vel ex æquis vel incertis (qvod freqventissimum) temporis recurrit intervallis (r). Äqvalibus ex intervallis eam patiebatur R A U L I N I (s) femina 36 annos nata, cui in dorſum prolapsæ tremor ocyus in extremitatis inferioris dextræ, ac non multo post dextri etiam brachii, muscularis accidit perpetuus, identidem tamen inducias, at non ultra $\frac{1}{2}$ horam, dans; qvandoqve etiam finistra extre-

(r) Vide §. 4. I. No 1.

(s) Traité des Fleurs blanches T. 2. P. 3. S. 2. C. 10.
p. 485.

mitas inferior, qviescente tuic dextra, contremiscebat : in lecto autem jacenti ægræ omnes corporis partes tremuere. Ex qvo cecidit, inquietas noctes crebris cum insomniis, & freqventem patitur cephalalgiam, cui sæpe tantus supervenit abdominis dolor, ut meteorismum in eodem excitet non ante cessantem, qvam ipse remiserit ; digerit difficulter ac laboriose cum seqventi vomitu habituali omnium alimentorum vespertino, qvæ mane ac meridie sumpsit, & meridiano in cœna pridie ingestorum, id qvod sæpiissime retinet, est aqua cum pauxillo vini, neutrum vero seorsim. Febris est expers, urinamque sat bonam reddit ; at seguis admodum est alvus. Non multo post lapsum ingruit etiam leucorrhœa chyli similis ac periodica, ita ut 2. 3ve dies durans per totidem postea dies semper conqviescat, donec ut ante redierit, qvam ægra aliquot post pastum horis uberiorem semper, qvam ullo alio tempore, observavit. Est emaciata, at citra phthisin, viribus pollens. A. PITCARNIUS apud R. MEAD (t) „ fluorem album „ per 4 annos nova singulis mensibus luna „ recurrentem, perstante semper octiduum

(t) De imper. sol & lun, p. 44.

,, profluvio, observavit ,,. Omnis denique haec tenus dicta leucorrhœa est vel

4. *Simplex vel complicata.* Prior est, dum præter fluxum nihil morbosī secum trahit (i. e. dum leucorrhœa cum nullo alio morbo tanquam causa vel effectu ejusdem præsto est; tametsi forte aliis adhuc morbus nullum cum eadem nexus alens, v. g. vulnus, febris epidemica, &c.): posterior vero, dum alteri morbo ut causæ vel effectui simul juncta adest. Mala ei complicari solita sunt ut plurimum

a) *Leucorrhœa notba* (*u*).

b) *Cachexia*, præsertim chlorosis (*x*).

c) *Hysterica* symptomata; cuiusmodi casum insignem describit F. HOFFMANN-NUS (*y*).

d) *Ulceratio locorum*, qvæ fluor alluit (*z*).

II. *Notba*, cuius profluvium ex aliis vasibus, qvam ex qvibus catamenia prodeunt, ortum trahit. Observavit nempe J. B. MORGAGNIUS (*a*) innasci sæpen numero internis uteri

(*u*) Vide inferius mox eandem.

(*x*) Vide §§. 9. 35. B. h).

(*y*) Med. rat. syst. T. 4. P. 4. C. 16. Obs. 6.

(*z*) Vide §. 35 B. a) c).

(*a*) De sedib. & cauſ. morb. Epist. 47. № 19. sqq.

parietibus vesiculas præter naturam , aquam mucumve varii coloris continent , qui humores ruptis vesiculis jugiter postea effluentes leucorrhœas varii coloris , consistentes , & indolis causare videntur. At vero ut haec ita se habeant , non tamen unica notharum leucorrhœarum scaturigo sunt id genus vesiculae uteri ; nam & e vaginæ glandulis , &c. oriri leucorrhœa notha potest ; estque duplicitis indolis , nimirum :

A. *Benigna* , cuius materia est ad sensum blanda , ut mucus , lympha , &c. Hujus proinde loci est

I. *Gonorrhœa benigna mulierum* , quam ab leucorrhœa veteres follicite discreverunt , in primis AETIUS (b) , GALENU斯qve (c) , tum eorum affeclæ , ut apud P. FORESTUM (d) videre est , in eo tantum lapsi , quod haud secius ac in gonorrhœa benigna vera virorum semen hocce in malo a feminis excerni crediderint. Interea cum glandularum prostatarum aliarumqve humor , non ipsum , quo feminæ destituuntur , semen , hic

(b) L. 3. C. 33.

(c) De semine L. 2.

(d) Obs. & cur. med. L. 16. Obs. 15. & schol. L. 28. Obs. 24.

exstillet, cumqve „ in viris prostatarum flu-
 „ xus gonorrhœa (benigna notha) vocetur,
 „ cur non etiam in mulieribus eodem no-
 „ mine nuncuparetur, cum in utroqve sexu
 „ partium & ductuum eadem fere sit substantia
 „ tia, „? inquit R. de GRAAF (e), qvi in
 muliere gonorrhœam passa prostatas exulce-
 ratas a morte reperit. Fluxum hunc salaces
 præprimis feminæ experiuntur. Sic P. G.
 SPERLING (f) hujusmodi „ gonorrhœam
 „ in puella nubili notavit, ... qvæ ad con-
 „ spectum personæ, qvam deperibat, no-
 „ tabilem humoris limpidi per muliebria ef-
 „ fundebat quantitatem „.

2. *Leucorrhœa gravidarum* SAUVAGE-
 SII (g), in qva humor vel amnii vel glan-
 dularum NABOTHI e genitalibus jugiter
 exstillat.

B. *Maligna*, cuius humor ex ulcere, ut
 plurimum maligno, uteri aut vaginæ acer,
 purulentus, saniosus, ichorofususve scaturit;
 cuiusmodi ulcera sunt venerea, scorbutica,

(e) De organ. mulier. C. 6. p. m. 213.

(f) Diff. de morbis ex nimio veneris usu thes. 13.
 Resp. M. I. H. HEUCHERO 4to Viteberg. 1700.

(g) Nosol. meth. T. 3. P. 2, Cl. 9, Ord. 3. art. 29.
 No 8, 9.

fungosa, cancrosa, &c. Huc proinde referenda est *gonorrhœa virulenta* mulierum syphilitica, nec non ea leucorrhœa, cuius in Act. Parisinis (b) fit mentio, in qua pus ex abscessu ovarii per tubam in uterus, & ex hoc in vaginam decurrebat, & purulentæ pessimæ ex uteri ulceribus tetris ortæ ab RAULINO (i) & MORGAGNIO (k) memoriaræ proditæ. Cum autem spuriæ hæ leucorrhœæ a vera illa profus natura sua discrepent, nec plurium uno loco morborum historiam condere sit animus, illis missis de sola leucorrhœa vera in præsenti agetur, nisi ubi spuriam vera effecerit, nexusqve ambarum aliud facere nos coegerit.

C A P U T III.

SYMPTOMATA LEUCORRHOEÆ.

§. 3.

S Y M P T O M A T A *leucorrhœæ*, quo doctrina hujus argumenti reddatur ordinatior, aptissime binas in classes dispisci possunt,

(b) A. 1700. Obs. anat. §.

(i) l. c. S. 3. C. 8. p. 239.

(k) l. c. No 8, 25. sqq.

qvarum in prima phænomena fluoris ipsius,
in altera vero functionum triplicium status,
in considerationem vocetur.

§. 4.

I. *Fluxus phænomena* sunt præprimis

I. *Tempora*, qveis procedit. Hæc o-
mniō nulla lege adstricta sunt, ut F. H O F F-
M A N N U S (*l*) haud immerito inter charac-
teristicas hujus fluoris notas retulerit, qvod sit
inordinatus: „ qvia non certam servat tem-
„ poris periodum; siqvidem aliis continuus
„ est, & qvotidianus, in aliis per interval-
„ la repetens bis terve in mense accidit,
„ licet sint exempla, ubi etiam periodice &
„ statio qvafsi tempore venit. Dein in non-
„ nullis menstruum fluxum modo præcedit,
„ modo comitatur, modo seqvitur, vel
„ etiam intermedio tempore prodit, qvin
„ imo in graviori statu ipsorum mensium lo-
„ co oritur, & ne illis qvidem, qvibus men-
„ struorum tempus secundum naturæ ordi-
„ nem præteriit, ut vetulis, parcit,. Qvin
etiam novit Cl. Vir (*m*),, gravidas toto

(*l*) Med. rat. syst. T. 4. P. 4. C. 16. thes. pa-
thol. §. 3.

(*m*) Ibidem §. 2.

„ gestationis tempore eidem obnoxias „.
 Qvæ singula adeo vera & indubitata sunt,
 ut qvotidiana illis experientia suffragetur.
 Etenim continuo afflgentis mali exempla,
 præter superius allata (n), præbent etiam
 SCHENKBECHERI (o) ægra, LOE-
 WII (p) matrona, ac vetula FÜRSTE-
 NAUII (q). Mensum fluxui præcurrentis
 vel succedentis vel etiam sufficti specimina
 alibi (r) referentur. Omnino autem vagus
 erat apud B. SILVATICUM (s), qvi ma-
 tronæ 42 annor. cachecticæ, admodumqve
 hystericæ, ventre cum cruribus tumente
 „ freqvens & profusus aqvosæ materiæ ex
 „ utero effluxus menstruam purgationem
 „ plurimum prævertit, illi qvandoqve suc-
 „ cedens, aliqvando vero tempore vacuo,
 „ imo & dum utero geffit, erumpens „.

2. *Qualitates*, qvas humor effluens
 præ se fert, qvas inter in primis est

a) *Color* ejus, qvi licet ut plurimum
 esse *albus* observetur (a qvo etiam morbus

(n) Vide §. 2. I. No 3.

(o) Vide §. 55. d).

(p) Vide §. 35. B. d)

(q) Vide §. 66.

(r) Vide §. 16.

(s) l. c. No. 9. p. 302.

fluoris albi nomen adeptus est), serumque lactis aut cremorem hordei æmuletur, cuiusmodi fuit in casibus ALBRECHTI (*t*), FORESTI (*u*), GALENI (*x*), HOFFMANNI (*y*), MÜNNICHII (*z*), STAHLII (*a*), STÖRCKII (*b*), &c. tamen haud raro etiam ab eodem magis minusve abludit; quippe qui jam sit *pallidus*, jam *flavescens* seu (ut Veteres dicere amant) *bilioſus*, qualis matronæ FORESTI (*c*), POTERII que (*d*), ac virginis JUCHII (*e*) erat, jam *viridescens*, velut in mulieribus BURGGRAVII (*f*) & COCKSENII (*g*), matronisque HARDERI (*b*) una, ac binis B. SILVATICI (*i*), quarum alteri (*k*) sterili, a sexennio post mensium tarde fluentium periodum semper effluebat materia viridis porracea, nigra, per 10 dies, cum virium jactura, anorexia, doloribusque abdominis, lumborum, inguinum, cru-

(*t*) Vide §. 35. B. g).

(*c*) Vide histor. 3.

(*u*) Vide histor. 3.

(*d*) Vide histor. 4.

(*x*) Vide histor. I.

(*e*) Vide histor. 7.

(*y*) Vide §. 35. B. i). & §. 70.

(*f*) Vide §. 45. No. 1.

(*z*) Vide histor. 6.

(*g*) Vide §. 71.

(*a*) Vide §. 5. No. 10.

(*h*) Vide infra in d).

(*b*) Vide §. 35. B. b).

(*i*) Vide §. 35. A. c.)

(*k*) I. c. No. 26. p. 317.

rum per vices recursantibus, jam loturæ carnium instar *subcruentus*, jam *fusca* & *subniger* (l), qvalis interdum STÖRCKII (m) in femina visus, &c. pro vario scilicet morbi vel ortu vel gradu. Qvandoqve etiam color hic admodum est *varius*, velut in BLASSII (n) qvadragenaria, & vetula FÜRSTENAUII (o), ac SILVATICI (p) matrona; in primis vero ex albo in flavum ac viridescentem vergere consuevit, ut in MARXII (q) SCHENKBECHERIqve (r) feminis, ac MORGAGNI (s) virgine. GALENICI morbos qvosqve ab humorum qvaternario, dupli nempe bile, pituita, ac sanguine, repetere soliti, & illos e vario excretorum colore determinantes, hic etiam id ipsum tenuerunt, studiofaqve diagnosi ope linteoli vel bilem vel pituitam vel sanguinem prædominantem, unde leucorrhæa ortum duceret, detegere satagebant, ut in AETIO (t) videre est. Nos vero ad alia longe hodie respicimus.

(l) RIVER. Prax. med. (q) Vide §. 55. c).

L. 15. C. 4.

(r) Ibidem d)

(m) Vide §. 55. d).

(s) Vide §. 35. B. b.)

(n) Vide §. 35. B. c).

(t) Tetrabibl. 4. Serin.

(o) Vide §. 66.

4. Cap. 65.

(p) Vide §. 2. I. No. 3.

b) *Consistentia* qvoqve, et si fero lactis vulgari in fluxu æqviparetur, qvalis in TERRANEI (u) septenni puella adfuit, non ubiqve tamen eadem observatur. Aliqvando enim humor profluens aquosus est, ut in muliere BURTONI (x), binisqve SILVATICI (y) matronis, qvarum posterior (z) 30 annor. ob menses variis animi turbis imminutos in biennalem immodicum ∇æ fluxum uterinum incidit, qvalem HARDERI (a) etiam matrona perpeffa est. Aliis multo est viscidior, pituitamqve vel mucum refert, ut in casibus BURGGRAVII (b), GAHRLIEPII (c), HOFFMANNI (d), MÜNNICHII (e), SCHAAAR-SCHMIDTII (f), SCHENKBECHERI (g), STAHLII (h), STÖRCKII que (i) videre est; ita ut mucus hic albumini ovi sæpen numero sit simillimus, qualem HOFFMANNI (k) quadragenaria, &

(u) Vide §. 6.

(d) l. c. Obs. 6.

(x) Vide §. 35 B. d).

(e) Vide histor. 6.

(y) Vide præced. No. 1.

(f) Vide §. 33.

(z) l. c. No. 27. p. 318.

(g) Vide §. 55. d).

(a) Vide infra in d).

(h) Vide §. 5. No. 10.

(b) Vide §. 45. No. 1.

(i) Vide histor. 10.

(c) Vide §. 6.

(k) Vide §. 37.

B. SILVATICI (*l*) matrona post abortum, excernebant.

c) *Odor* porro profluentis materiae haud raro nullus est, velut in STÖRCKII (*m*) femina, præcipue morbi initio, qvi deinceps gravis diuturniore in morbo efficitur, fœtidissimusqve demum evasit in mulieribus BLASII (*n*), BOETTICHERI (*o*), BURTONI (*p*), COCKSENII (*q*), STÖRCKII (*r*); ac HOFFMANNI (*s*). Talem etiam J. J. HADERUS (*t*), puellam 17 annor. . . vidit, „ qvæ orbata menstruo fluxu a fero hoc „ profluente, atqve qvod negligentius mali „ hujus curam habuit, acrimoniam insignem „ aqvirente, adeo læsa fuit, ut summa cum „ difficultate incederet, fœtoreqve, qvem „ naturalia spirabant, una adstantibus reli- „ qvis molesta effet „.

d) *Acrimonia* autem sub exordium morbi nulla plerumqve sentitur, velut in HOFFMANNI (*u*) ac LOEWII (*x*) matro-

(*l*) l.c. No 30. p. 320.

(*r*) Vide §. 55. a).

(*m*) Vide §. 35. B. b).

(*s*) Vide §. 70.

(*n*) Ibidem c)

(*t*) Mus. nat. cur. dec. 3

(*o*) Ibidem d)

ann. 2. obs. 102.

(*p*) Ibidem.

(*u*) Vide §. 37.

(*q*) Vide §. 71.

(*x*) Vide §. 35 B. d).

nis, feminaqve STÖRCKII (y), vel siqva interdum per intervalla observatur, ut in RIEDLINI (z) qvadragenaria, ea potissimum ab acribus ingestis (acidis, falsis, spirituosis, aromaticis) inducitur. Ubi tamen morbus in longius procefferit tempus, fluor qvoqve sensim acrimoniam contrahit, qvem admodum accidit HARDERI (a) puellæ, HOFFMANNI (b) qvadragenariæ, mulieri NIZETI (c), feminisqve SCHAEFFERI (d), STÖRCKII (e), ac WINTERI (f), præsertim vero si prava accedat medicatio BÜCHNERO (g) teste. Hæc acrimonia qvibusdam in ægris usqve adeo intenditur, ut subinde evadat rodentissima, præsertim ubi acris simul humorum diathesis præsto est, aut ubi fluor uterus vaginamve ulceravit. Sic acer- rimam leucorrhœam ægræ BOETTICHE RI (h), HEISTERI (i), ac STÖRCKII (k), &c. sunt expertæ.

(y) Ibidem b).

(e) Vide §. 55. a).

(z) Vide §. 57 No 2.

(f) Vide §. 49.

(a) Vide præced. c).

(g) Vide §. 43.

(b) Vide §. 37.

(h) Vide §. 35. B. d)

(c) Vide §. 71.

(i) Vide §. 50.

(d) Vide §. 69,

(k) Vide §. 55 a).

3. *Ubertas* vero emanantis fluidi cum per principia ut plurimum sit exigua, dein a diuturnitate incrementa capit, velut in virgine JUCHII (*l*), matronaque HOFFMANNI (*m*), ac MÜNNICHI (*n*) muliere, usque dum adulto morbo evadat insignis, id quod e casibus DEGNERI (*o*), DETHARDINGII (*p*), FÜRSTENAUII (*q*), MURALTII (*r*), PECHLINI (*s*), RIVERII (*t*), SCHAAARSCHMIDTII (*u*), STÖRCKII (*x*), TERRANEIque (*y*) patescit; quin imo interdum incredibilis ejus vis elabitur, quam BURGGRAVII (*z*) mulier torrentis pene ad instar est experta, BURTONIQUE (*a*) mulieri tanta erumpebat ubertate, ut penetratis omnibus togis in sedili quoque, ubi assurrexisset ægra, reperiretur. Incredibili etiam copia matronæ ALBRECHTI (*b*) manabat, & quam tractaverat J. J. HARDERUS (*c*) saepius jam partu levatam, tamque

(*l*) Vide histor. 7.

(*t*) Vide §. 45 No 1.

(*m*) Vide §. 35 B. i)

(*u*) Vide §. 33.

(*n*) Vide histor. 6.

(*x*) Vide §. 35 B. b).

(*o*) Vide §. 38 f).

(*y*) Vide §. 6.

(*p*) Vide §. 54.

(*z*) Vide §. 45 No 1.

(*q*) Vide §. 66.

(*a*) Vide §. 35 B. d).

(*r*) Vide §. 35. B. b).

(*b*) Ibidem g).

(*s*) Vide §. 38 a).

(*c*) l. c.

moleste semper menstruantem, ut omni periodo lectum petere coacta sit, ob adeo copiosum primis diebus fluxum sanguinis, grumis quandoque interpolatum, ut saepe syncopeen causarit; cui circiter octiduo post subita succedit leucorrhœa, usque adeo copiosa, ut haud raro $\frac{1}{2}$ mensura laticis aquosius acriusculi ac subinde viridescentis efflueret. Unde matrona formosa prius, rosea, alacris, nunc pallebat cum anorexia, palpitatione cordis, ac dyspnœæ ad motum per acclivia accessione. Data jura herbacea, sal volat. blandus, corallia, sangu. draconis, ♂lia, aliaque anticachectica, affectionem maximam partem sustulerunt.

4. Contenta denique prætereunda non sunt, quæ in humore excreto nonnunquam reperiuntur, atque ut de striis grumulisque sanguinis, fibris, ac granulosa materia in STÖRCKII (*d*) femina, dicam nihil, vermiculi ascaridum forma in primis notandi sunt, qui dicto in humore subinde sunt observati. Sic apud J. STORCHIUM (*e*) puerpera 26 annorum, dum alias quoque teneros id genus vermiculos, pruritum causantes cum

(*d*) Vide §. 35 B. b).

(*e*) Obs. clinic. ann. 8 Maji Cl. 2. No 3. p. 465. sq.

fluore albo excrevisset, eodem in puerperio integrum illorum glomerem, fabam magnum, excrevit. Trimestri etiam spatio hujusmodi vermiculis cum fluore uterino prodeuntibus COCKSONI (*f*) ægra fuit vexata. Verum haud abs re isthic dubitari potest, in uterone vermiculi illi exclusi sint, an illic ex ano irrepserint? Ascarides in utero reperi etiam, binæ hanc in rem svadent obervationes, nempe (*g*), mercatoris Norici... „ conjux (narrat M. HOFFMANNUS) æta- „ tis anno 44^{to} cum insigni pruritu pluri- „ mos candidos vermiculos ascarides dictos „ quotidie per muliebre pudendum excer- „ nebat, mox intereuntes, quorum ulterio- „ rem proventum injectiones uterinæ ama- „ ræ ex decocto colocynthidis paratae dein „ prohibuerunt, „ Alteram suppeditat B. TIMAEUS (*b*): „ A. 1629. Ill. D. TOR- „ QVATU S de Comitibus, exercitus Cæsa- „ rei campi Mareschallus... edicto publico „ cavit, ne quis ex stationariis concubinam „ aleret, & si quæ haec tenus altæ fuissent,

(*f*) Vide §. 71.

(*g*) Mantiss. obs. select. obs. 27 in Mis. nat. cit. Cent. 9 & 10. append. p. 458.

(*b*) Casuum medic. L. 4. cas. 6.

„ intra triduum sub pœna fustigationis re-
„ moverentur. Mandato ut pareret ... Ti-
„ bicen qvidam , raptam non ita pridem
„ per vim villici cuiusdam filiam monuit, ut
„ consortio abstineret, urbeqve qvam pri-
„ mum excederet. Illa nexum conjugalem,
„ qvem raptor promiserat, urgere, instan-
„ tiusqve propter ingravidationem , qvam
„ prætendebat, flagitare. Hic contra acrius
„ instare, mortemqve, ni abitum matura-
„ ret, minari, tandemqve obluctantem gla-
„ dio confodere ausus est. Demortuæ ven-
„ trem ut subito propter animantis spem
„ aperirem , jussit Ill. D. Campi Mareschall-
„ lus. Aperui ; sed præter mucosum qvid,
„ & ingentem ascaridum viventium & hinc
„ inde obreptantium numerum, nihil in ute-
„ ro repertum .,. Priore in casu sane ama-
ra colocynthidis in genitalia injectio et si præ-
fentes vermiculos necare potuerit , haud
tamen impedivisset , qvo minus illuc ex ano
(si hinc illuc devenissent, & non ipso in u-
tero exclusi fuissent) deinceps etiam ar-
repssent. In posteriore autem casu auto-
psia directa veritatem ascaridum in utero ni-
dulantium evincere videtur. Neqve etiam
in STORCHII puerpera ex ano in vaginam
glomeratim , ut excreti sunt , arrepssisse
potuere. Quid qvod nulli harum ægrarum

ascarides intestinorum crearint molestias , nec vermiculi COCKSONO visi reapse fuerint ascarides ? Cui rei & id suffragari videtur, qvod loca qvæque ulcerosa , aut muco abundantia (ut sunt v. g. sinus frontales) facile verminosam prosapiam hospitio donent. Sic apud F. MAURICEAU (*i*) mulier 50 annor. cum post biennem catameniorum plenariam suppressionem in uteri demum hæmorrhagiam 7 menses contineiter durantem incidisset , cancrosum uteri ulcus ex isthac reportavit, qvod qvotidie varium rubellum , fœtidum, interdumqve cruentum humorem reddebat tanta cum putredine , ut vermes granum hordei crassi ibidem nascerentur. Post 6 menses misera obiit. Verum hæc omnia non ejusmodi tamen sunt , queis res confecta videri possit ; nam etsi ascarides in utero anatome detexerit, num ideo ibi eos generatos fuisse , nec ex ano illuc advenire potuisse conseqvitur ? Non meminit TIMAEUS eos in recto intestino simul repertos ? At nec meminit illud fuisse lustratum ! Cur autem injecto colocynthidis decocto in vaginam non amplius visi sint , cum varia adferri possint, tum unum illud suffectorum puto , qvod ni-

(*i*) Obs. chir. obsteir. Cent. I. Obs. 61.

mirum parte decocti per vaginam in rectum
 resorpta utrinque necari potuerint. Atque
 his magnopere favet R. F. OVELGÜNII (k)
 historia: „ infimæ sortis vir... me (ait ille)
 „ conveniens in hunc modum me alloqui-
 „ tur: 12ma jam agitur puerperii uxoris meæ
 „ septimana; 8vo die foras prodiit puercu-
 „ lum suum quæsitum. Ex eo statim cor-
 „ repta fuit fluore albo, non cessante justo
 „ puerperii ac consveto purgationis uteri-
 „ næ tempore, sed per id tempus continu-
 „ ante, interne pariter atque externe mu-
 „ liebria aggrediente & excoriante. Sub
 „ emissione laticis urinofî multus dolor,
 „ haud dubie ea ex causa est, ejus tamen
 „ incontinentia haud laborat. Et quod demi-
 „ ror, multi vermiculi eorum æmuli, qui in
 „ caseis reperiuntur, ex interioribus arvi mu-
 „ liebris prodeunt. Hæc ille... Iterum atque
 „ iterum quæro, an certo sciat, hos vermi-
 „ culos ex parte, qua mulier est, non ve-
 „ ro ex intestino recto... prorepere? Ille
 „ isthoc etiam atque etiam... adfirmat.
 „ Hiuc seqventem præscribo formulam medi-
 „ cam, majorem in modum simul imperans,

(k) Nov. act. nat. cur. Tom. 3. Obs. 60. p. 274.
sqq.

„ ut partem affectam suis, non alienis, usurpet oculis:

Rx. Rad. Jalapp. resinos.

Magnes. alb. optim. aa. 3ij

℞ dulc. bene ppt. 3j. M. F. ℥,

„ de qvo 1^{mo}, & deinde 4^{to} qvovis die

„ drachma misceatur cum pauca ∇æ calidæ

„ qvantitate, & primo mane exhibeatur,

„ dehinc per 3 horarum intervallum nihil

„ cibi, postea vero tremor hordei, cum le-

„ ni continuatoqve motu, in usum trahatur,

„ Cum hoc simul alterum conjunxi reme-

„ dium:

Rx. Raf. lign. sassafr.

Rad. Bardan.

Althææ aa. 3ij

Liqvirit. 3fl.

Herb. Veronic. M. ij

Rutæ murar.

Flor. Hyperic. aa. M. fl. incif. &

„ contus. M. F. species pro decocto, de

„ qvibus qvavis die, qva laxationi non va-

„ cat, 3 cochlearia plena misceantur cum 2

„ ℥ ∇æ ferventis, hisqve per bihorium

„ cineribus calidis impositis, dein percola-

„ tis, 3 vicibus, nimirum hora 4^{ta} 5^{ta} &

„ 6^{ta} matutina hanc qvantitatem assumat, ad

„ horam 8^{am} usqve calide cubando. Ter-

„ tium remedium seqvens erat:

Rx. Succin. ppt. ʒf

Myrrh. rubr. elect.

Matr. perl. pp. aa. ʒij. M. F. ʒ,

„ de qvo ʒf cubitum ituræ detur cum trans-
„ piratione nocturna aucta. Ceterum auctor
„ fui, ut herb. Veron. M. jf & summit.
„ centaur. min. M. j cum ∇x f. q. ad re-
„ manent. ʒb j decoctis externe calidiuscu-
„ le cum spongia linteisve duplicatis in u-
„ sum vocaret. His factis maritus rediens
„ nunciavit, qvod sub usu remediorum pri-
„ mis diebus fluor albus incrementa ceperit,
„ procedente vero tempore hic ipse sen-
„ sim imminutus fuerit, medicamentis vero
„ consumptis plane cessaverit. At vero,
„ (metaftasi forte humoris serofo-pituitofo-
„ acris non penitus eliminati facta) cessa-
„ tionem fluoris albi exceptit dolor in genu
„ sinistri pedis, itemqve in inferiore ejus
„ articulatione, & sub posteriore plantæ
„ parte, ut surgens pedi insistere haud va-
„ luerit, sub qvo incommodo id erat me-
„ morabile, qvod qvo magis ægra pede,
„ molestia sibi facta, incedebat, eo mino-
„ ra erant dolorum tormenta, & eo melius
„ incedere potuit. Ob rem angustam domi
„ remedium commendavi ex herb. Betonic.
„ & Trifol. fibrin. aa. M. j cum ∇x ʒb v.
„ decoqvendis: qvo decocto cum regimine

„ blando sudorifero justa dosi mane sumpto
 „ ceffat & hoc, qvod ægre tulit, malum.
 „ Qvod vero ad ascarides attinet, exhibi-
 „ bito pulv. laxante bis terve largius de-
 „ posuisse alvum, de uxore ad me refere-
 „ bat . . . maritus, ipsas vero feces alvi-
 „ nas indefinito numero pusillorum vermi-
 „ culorum qvasi multo semine conspersas in-
 „ fectasqve fuisse, nihil vero horum ex-
 „ matrice prodiisse, oculata fide affirma-
 „ bat „.

§. 5.

II. *Functiones* triplices in leucorrhœa
 nonnunquam sunt prorsus integræ, velut
 NEUHOLDI (*l*) viduæ, virginis P E C H-
 L I N I (*m*), RÜCKERI (*n*) vetulæ, infantis
 SCHAARSCHMIDTII (*o*), ac puellæ
 octenni T I L L I N G I I (*p*) pallidæ mansere;
 alias vero plus minusve ab sanitatis statu
 recedunt, atqve eum fere in modum, quem

(*l*) Vide §. 35. A. f).

(*m*) Vide §. 76.

(*n*) Vide §. 6.

(*o*) Vide §. 18. d).

(*p*) Vide §. 37.

cachexia lenta mucosa, præfertim vero chlorotica, leucorrhœæ familiaris, invehere consuevit. Unde solennia hujus morbi symptomata sunt

1. *Dolor* varius, præcipue vero caput, spinam dorsi, lumbos, imos artus, stomachum, intestina varia intensitate laceffens, nec utero parcens.

2. *Tensio* hypochondriorum vel hypogastrii.

3. *Dyspepsia*, cum anorexia, ructibus, nauseis, vomitu, fitique.

4. *Alvus* ut plurimum segnis vel adstricta, rarius fluxa, subinde tenesimodes.

5. *Urina* turbida, quandoque difficulter excernitur, imo & nonnullis supprimitur.

6. *Menses* vel profusiores fluunt, vel inordinati, vel parciores, vel decolores, vel suppressi sunt.

7. *Habitus corporis* initio pallidus cum tumore pastaceo, pedumque oedemate: provecto autem in deterius morbo febricula vespertina hecticodes supervenit cum corporis extenuatione.

8. *Præcordia* anxietas, palpitatio, dyspnœaque, præfertim ad motum, tenet.

9. *Lassitudo* debilitasque virium cum incedendi difficultate ægras efficit segnes.

10. *Animus* ad hæc dejectus, morositas, melancholia haud raro accedunt. &c. Omnia hæc in observationibus per libelli decursum occurrentibus passim reperire erit, de qvibus etiam summatim **HIPPOTRATES** (q): „ cum fluor albus (inqvit) subortus fuerit, urina qvalis asini appareat, & „ dolor imum ventrem, lumbos ac laterum „ inanitates detinet, crura ac manus intumescent, oculorum cava elevantur, & „ oculi humescunt, color auriginosus & „ albus redditur; cumqve deambulat, anhelatione corripitur „. Interea vero paradigmatis instar casus **G. E. STAHLII** (r), in qvo horum symptomatum genesis, nexus, & incrementum elucet, hic tironibus serviet, nempe mulier 22 annorum, bennium nupta, at huc usqve sterilis, ex qvo virum admisit, proxima inde mensium periodo universi corporis lassitudinem cum hypogastrii tensione, pressione, ponderisqve sensu, ac demum insigni etiam dolore,

(q) De natur. muliebr. FOES. T. 1. p. 567. sq.
Conf. etiam, qvæ de morb. mul. L. 2. fol.
m. 641. sqq.

(r) Colleg. casual. magn. Casu 68. p. 673.

persentiscere cœpit. Tum catamenia proceſſere qvidem, at parcius solito, per genteqve dolore; qvorum in fine successit humoris albi mucaginosi profluviuſ, manente etiam tum, imo increſcente ſemper, preſſivo illo dolore. Cumqve poſt abſolutum menſium penſum ægra variis cibis dyſpeptiſ indulgeret, auctiſ pedetentim doloribus ſe junxit vehemens anxietas, ac leucorrhœæ fluxuſ evadebat cum uberior tum diuturnior. Cetera adfuſit corporis totius gravitas, præſertim vero inferiorum artuum, periit appetentia, & crescente ad uſum dyſpeptorum leucorrhœa ſymptomata qvoqve increſcebant, pallente facie cacheotica, inflata; & qvo fluor albus diuturnior fiebat, eo luctuſtiores etiam circum oculos livores ægra nacta eſt.



C A P U T III.

P R O E G U M E N A E C A U S A E.

§. 6.

1. *Ætas leucorrhœæ obnoxia in primis consistens*, F. HOFFMANNO (*s*) teste, observatur; licet secundum HIPPOCRATEM (*t*), „fluor albus senioribus magis, „qvam junioribus contingit, fulvus utrissim „qve, ruber junioribus „: nisi (ut videtur) seniores, qvæ consistente sunt ætate, accipiendæ sint. Interea tamen qvandoque admodum etiam juvenis, imo tenera, ætas fluore albo affici est observata. Sic apud B. SILVATICUM (*u*) adolescentula fana, rubicunda, ante 12 ætatis annum in chlorosim incidit cum pica & leucorrhœa: effluens humor flavesiens erat, ac parumper cruentus. Undennis erat STORCHII (*x*) puerilla hoc malo affecta, & J. DOLAEUS (*y*)

(*s*) l. c. thes. pathol. §. 2.

(*t*) De morb. mulier. L. 2. §. 1.

(*u*) l. c. Cent. 2. No. 68. p. 169.

(*x*) Vide §. 61. c.)

(*y*) Encycl. med. L. 5. C. 4. §. 1. p. m. 498.

leucorrhœam „ in puella nobili nondum 10
 „ annum egressa jam jam (ait) observo,
 „ & cui medicinam facio „ . Perinde TER-
 RANEUS (z) apud J. B. MORGAGNI-
 UM (a) puellæ circiter novennis meminit
 a fluore albo persanatæ, & „ dixit mihi, in-
 „ qvit c. F. PAULLINI (b), in Eichs-
 „ feldia cordata obstetrix de fluore albo
 „ puellæ vix novennis, cui purgato prius
 „ corpore medicus . . . ther. cœl. caff.
 „ cum sirupo corall. dederat „ . Octen-
 nem vero eodem fluxu diu graviterque
 molestatam viderat J. FERNELIUS (c),
 cuius etiam ætatis fuere puella NESTE-
 RI (d) ac TILLINGII (e). „ Nota
 „ mihi, inquit etiam P. HOECHSTETTE-
 „ RUS (f), est puella, cui ætas menstrua-
 „ negavit, & anni semen; at hanc (symp-
 „ tomata) hysterica ac convulsiva fatiga-

(z) De glandulis post C. 5. Obs. 2.

(a) De sedib. & cauf. morb. Epist. 47. No. 15.

(b) De theriac. cœl. S. 2. P. 3. membr. 8. C. 3.
 §. 2. p. 290.

(c) Pathol. L. 6. C. 16. §. 5.

(d) Vide §. 61. a).

(e) Vide §. 37.

(f) Obs. med. dec. 4. schol. ad cas. 1. p. 294.

„ runt, . . . & albus fluor molestavit, ut
 „ infra octavum ætatis fluxerit copiose „.
 Apud J. N. PECHLINUM (g) duæ septen-
 nes in idem ægritudinis genus lapsæ sunt,
 qvarum priori virium dispendium attulit,
 nulli remedio cedens, qvoad sponte desit;
 posteriori autem præ ubertate periculum
 minabatur. Alia TERRANEI (h) puella
 itidem septennis e genitalibus qvasi „ serum
 „ lactis non dum clarificatum emittebat co-
 „ piose non sine ardore aliquo & pruritu „.
 Ejusdem ætatis puella hoc ipso morbo af-
 fecta HEISTERI (i) curæ obtigit; septi-
 mum vero annum ingressa erat DETHAR-
 DINGII (k) ægra, & sexennem aliam
 KOELICHEN (l) a leucorrhœa persanavit.
 Imo 3 aut 5 annorum infantis meminit
 SCHAAERSCHMIDT (m). Verane leu-
 corröhœa fuit in G. C. GAHRLIEPII (n)
 infante? Hæc pfimis a partu 5 diebus nihil

(g) Obs. phys. med. L. I. Obs. 34. p. 82. & M.
 N. C. dec. I. ann. 9. obs. 28.

(h) l. c.

(i) Vide histor. 8.

(k) Vide §. 54.

(l) Vide §. 58. No. I. b).

(m) Vide §. 18. d).

(n) Miſs. nat. cur. dec. 3. ann. 7. obs. 140.

emisit lotii, triduum vagiit, postea per vulvam biduo excrevit humorem album, viscidum, in longum ductilem, qvo sensim in ruborem transeunte successit sanguis per 5 dies, sensim paucior, qvo demum subsistente urina sine ulla molestia processit. Posse leucorrhœam vel primo qvoque jam ætatis anno oboriri, præsertim si hæreditate accepta sit, documento est RAULINI (*o*) puella annicula. Aliam qvoque nobilibus ortam parentibus novit F. A. WEIZ (*p*), cui non dum anniculæ fluor albus accidit, persistitqve in multos etiam matrimonii annos cum sterilitate. Narrat qvoque M. SCHURIGIUS (*q*) A. 1692 Dresdæ a causidici uxore pueram partu fuisse editam, qvæ mox a nativitate ad $1\frac{1}{2}$ usqve ætatis annum catamenia justis ex intervallis habuit; abhinc vero illorum in locum leucorrhœa successit, biennium durans, periodosqve menstruas tenens, a qva puella tantopere enervabatur, ut ante annum octavum vix incedere didicerit. Postmodo vero collegit vires;

(*o*) Vide §. 8.

(*p*) Neue Auszüge aus Dissert. für Wundärzte II.
Band No 2. p. 10.

(*q*) Parthenol. p. 139.

nuptuique data sana vixit. Sed hæc rara sunt: „ frequentius vero, inquit F. HOFF- „ MANNUS (r), evenit, & incipit hic „ fluxus circa annum 13 vel 14, quo tem- „ pore feminis menstrua erumpere solent, „ velut id Gedanensibus puellis hac ætate con- tingere, etiam non dum menstruatis, refe- runt Annales Vratislav. (s), quodque in MORGAGNI (t) virguncula 14 annorum, tum TILLINGII (u) puella ac neonupta ejusdem ætatis J. G. HENTRICHII (x) accidit, quarum ad censum pertinet etiam J. STORCHII (y) puella 14 annorum, cui molimina mensium febri catarrhali rheumaticæ complicata passæ detractis declinante morbo sanguinis e pede 3jx symptomata remisere; ac post aliquot dies leucorrhœa erupit, quam post 14 dies prima catamenia secuta sunt. „ Nullatenus igitur, inquit

(r) l. c.

(s) Tentam. 15. A. 1721. Mart. Cl. 2. art. 3.

§. 1. p. 248.

(t) l. c. No. 14. 15.

(u) Vide §. 45 No. 2.

(x) Vide §. 35. A. c).

(y) Von Weiberkrankheiten 2 Band easl. 108. p.

„ ROD. a CASTRO (z), MONTANO acce-
 „ dendum est, qvi virginibus hunc fluo-
 „ rem nunquam accidere contendit, & cau-
 „ sam inducit viarum adstrictionem: qvod
 „ si contingat, ex eo corruptam esse in-
 „ caute pronunciat; cum tamen illa causa
 „ sit, qvod raro, at non qvod nunquam
 „ virgines hoc malo exerceantur . . .
 „ Ego honestissimas ac integerrimæ famæ
 „ virgines tum in Hispania tum in Germa-
 „ nia vidi & curavi, qvæ per triennium,
 „ anteqvam menses prorumperent, hunc
 „ affectum passæ sunt „. Freqvens etiam
 puellis Augustanis hoc malum esse testa-
 tur PHIL. HOECHSTETTERUS (a).
 Ætas vero menstruis jam defuncta; etsi mi-
 nus hoc malo infestari soleat (cum enim
 fluor albus per eadem vasa, e qvibus san-
 guis menstruus scaturit, contingat; liqvet,
 si illa ad sanguinem transmittendum jam
 inepta sunt, etiam fluori albo eadem haud
 favere), non est tamen ab illo prorsus im-
 munis. Vedit eum in virgine 64 annor.

(z) De univ. muliebr. morb. medicina L. I. C.
I4. p. m. 87.

(a) l. e.

C. F. KÄLTSCHMIED (*b*), in veluta 70 annor. FÜRSTENAU (*c*), in alia itidem vetula FORESTUS (*d*), & „, *hunc ipsum* „, porro matrona qvædam septuagenaria ma- „, jor absqve sanitatis detimento ultra tri- „, mestre spatiū experitur, neqve fluori „, qvidquam, præter justam rhabarbari dosin „, opponit „, qvam J. D. RÜCKERUS (*e*) memoriæ prodidit.

§. 7.

2. Corpus laxum, obesum, phlegmaticum. Nolo hanc in rem prolixis pathologicis argumentis differere; id unum evi-
ctum est, corpora vel ab origine vel certe
vitio 6 rerum non naturalium, præsertim
vero otio diurno (*f*), laxa fieri; neqve
aliam esse leucorrhœæ scaturiginem, qvam
vasorum vel uteri vel vaginæ ob justo majo-
rem eorumdem laxitatem anastomosin (*g*),

(*b*) Vide §. 35. A. c). Diff. cit. §. 9. №. 2.

(*c*) Vide §. 66.

(*d*) Vide §. 35. A. b).

(*e*) Commerc. Nor. T. 4. A. 1734 hebd. 8. №.
6. p. 59.

(*f*) Vide §. 78.

(*g*) Vide §. 19. sqq.

cui suscipiendæ obesa phlegmaticaque corpora sunt perqvam idonea, ita ut ceteris paribus ab eadem data causa procatarctica isthæc longe facilius, qvam corpora stricta, leucorrhœam contrahant.

§. 8.

3. *Hæreditaria labes*, ut in ceteris chronicis morbis, ita & in hoc nonnunq; subest; qvalis aderat in RAULINI puella (b), nec non in domicellæ (i) admodum juvenis nuptui datæ prolibus; etenim cum brevi post nuptias leucorrhœam nocta binas postea pueras enixa esset, senior jam inde ab ætate bimula leucorrhœam sæpe sangvine tintam patiebatur, junior vero primo mox vitæ anno eandem contraxit, tam uberem, ut ambæ (qvarum una 8^{um} jam altera 5^{um} attigit annum) sæpius per diem lineas vestes mutare cogerentur. Perinde J. W. GULD-BRAND (k) „ vedit infantes infra 6, imo „ infra 4 annos fluore albo laborantes, & „ procreatæ a parentibus debilibus, matre

(b) Vide §. 35 B. h).

(i) l. c. T. I. P. I. S. 2. C. I. p. 100.

(k) De sangivifluxu uterino p. 34. sq.

„ debili, semper fluore albo, absqve omni
 „ malignitatis suspicione, infestata „. Hor-
 sumqve pertinet, opinor, F. H O F F M A N-
 NI (*l*) consilium olim expetens Ill. femina
 30 annor. tenera, in loco mari vicino de-
 gens, vitæ sedentariæ, cibis durioribus, (ut
 piscibus marinis, in primis vero ostreis) af-
 sveta, qvam post menses per annum parce
 inordinateqve procedentes leucorrhœa inva-
 sit molestissima, faciei pallorem, corpori ma-
 ciem, animoqve metum ac tristitiam inven-
 hens, qvæ matris eodem olim morbo afflicta
 recordatio graviora etiam reddebat.

§. 9.

4. *Cachexia* lentæ mucosæ, præsertim chlorosis, scabies, qvarum cum priore leucorrhœam adolescentula SILVATICI (*m*), cum posteriore eandem STOELLERI (*n*) puella est experta. Chlorosis profecto diuturnior raro admodum puellas nubiles absqve leucorrhœa esse finit. Memorabilem leucorrhœæ a cachexia lenta casum refert

(*l*) I. c. Obs. 2.

(*m*) Vide præced. No 1.

(*n*) Vide §. 55. 2).

RAULIN (o) : femina 25 annorum a prima juventute pedetentim adeo evalit irritabilis, ut triennio ante mortem a minimo strepitu pedum, januæ, voce clariore, &c. convelleretur. Circa 12^{um} ætatis annum aliquo ante mensium eruptionem tempore tumores ei abscessusque variis in corporis partibus ita emergebant, ut curato uno alias oriretur. Tandem spasmmodici motus ingruebant cerebriores; mensibusque præibat leucorrhœa, quæ in dies crescens ad mortem usque duravit. Spretis tamen his malis ægra nubens 2 proles sanissimas nacta est. Post alterum vero partum & spasmmodici motus auchi sunt, & leucorrhœa: hæc evasit purulenta, eodemque tempore dolor lœvum abdominis latu invadens a morte tantum defuit, cuius sedes ob leucorrhœam in dies fœtidiorēm ac magis purulentam in ovario lœvo esse credebatur. Tandem symptomatis ad summum evectis, cum marasmo, glandulisque parotidibus, axillaribus, aliisque brachiorum ac thoracis summe turgentibus, quarum nonnullæ suppuratae fœtidum dederunt pus, ægra paucis post diebus obiit. Cuius in cadavere omnia pene viscera obstructa

(o) I. c. T. 1. P. 2. S. 1. C. 4. p. 294. sqq.

pessimoqve in statu reperta, solo utero cum utroqve ovario naturalem sanissimumqve statum habente.

§. 10.

5. *Uteri morbi chronicī*, ut tumores purulenti aut scirrhosi, aliive, a qvibus leucorrhœam KRAPF (p), POLZER (q), ac STÖRCK ipse bis (r), observarunt. PANAROLI (s) qvoqve femina huc facit, licet morbum ejus Auctor ad venereum cladem retulerit.

C A P U T IV.

PROCATARCTICAE CAUSÆ.

§. 11.

1. *Pathemata animi.* E. HAGENDORNI (t) „temina... implorabat opem, re-„ferens, se non ita pridem nimis perter-

(p) Vide §. 55. a.)

(q) Ibidem.

(r) Ibidem & §. 35 B. b).

(s) Vide §. 35 B. e).

(t) Histor. med. phys. Cent. 2, hist. 87.

„ refactam in album fluorem incidisse , an-
 „ tehac sibi insolitum , idqve per hanc for-
 „ san rationem , qvod amicæ cuidam inter-
 „ fuerit ex simili fluore laboranti , hincqve
 „ nauseam qvamdam conceperit. Fieri per-
 „ gebat interdum , ut fluor hic qvodammo-
 „ do fisti videretur , recurrens vero moram
 „ istam longiore fluxu compensare soleret.
 „ Qvare malo ... obviam itum est idoneis,
 „ a qvo etiam sensim fuit liberata , . Haud
 secius leucorrhœam a mœrore ortam refert
A L I X (u). Non uno semper modo animi
 motus leucorrhœam accersunt ; sunt , qvi
 digestionem depravando eam creent , ut mœ-
 ror , timor , ira , qvorum bini priores etiam
 cachexiam lentam inducendo profluvium de-
 dum accersunt. Ante omnes tamen lasci-
 vus amor celerrime morbum inducit , dum
 uberiorem humorum ad genitalia affluxum
 continenter caufat.

§. 12.

2. *Ingesta dyspepta* , vel qvacunqve ra-
 tione cacochymiam , ac laxitatem vasorum
 uteri , cum motu humorum illuc adaucto ,

(u) Vide §. 58. No 2. e).

inducentia. Sic F. HOFFMANNUS (*x*) in vicum ac humidum atmosphæræ frigus, laxitatem uteri vasis conciliantia, causam conjicit, qvod morbus hic in Belgio crebrior, quam alibi, F. SYLVIO (*y*) teste occurrat. Perinde J. D. GOHLIUS (*z*) causam fluoris albi Berolini adeo freqventis, ut non indigenæ modo, sed Gallæ etiam mulieres numerosæ qvovis anni tempore eo infestentur, in aquæ e solo paludosof scaturientis usum rejicit. Prava etiam diæta textoris uxori apud MURALTIUM (*a*) leucorrhœam accivit, quam NESTERUS (*b*) qvoqve sua in octenni puella facchari abusui attribuit. Ipse etiam tenerrimæ ætatis puellam vidi, qvæ ex portione acerrimi emmenagogi (qvod bellarium esse rebatur) abligurita in leucorrhœam incidit,

§. 13.

3. *Tempestas anni humida ac frigida, qualis esse solet mensibus autumnalibus, hi-*

(*x*) l. c. thes. pathol. §. 11.

(*y*) Prax. med. L. 3. C. 4.

(*z*) Act. med. Berol. Dec. 2. Vol. 3. art. 1. p. 25.

(*a*) Vide §. 35. A. d).

(*b*) Vide §. 61. a).

bernis, ac primo vere. His sane temporibus fluoris albi exacerbationes ac reversiones contingere Annales Vratislaviensium abunde testantur, & qvidem

- Tent. 23 A. 1723 Febr. Cl. 2 art. 1 §. 3 p. 143
- 24 A. 1723 Maji Cl. 2 art. 1 §. 3 p. 497
- 26 A. 1723 Nov. Cl. 2 art. 1 §. 2 p. 484
- 27 A. 1724 Janu. Cl. 2 art. 1 §. 4 p. 32
- 30 A. 1724 Octo. Cl. 2 art. 1 §. 2 p. 368
- — — — — 3 §. 4 p. 385
- — — — — Nov. Cl. 2 art. 3 §. 1 p. 475
- — — — — Dec. Cl. 2 art. 3 §. 3 p. 604
- 35 A. 1726 Janu. Cl. 2 art. 1 §. 3 p. 41
- — — — — Febr. Cl. 2 art. 1 §. 3 p. 163

Hist. morb. Vrat A. 1700 verno temp. p. 165

RAULINUS (c) vero leucorrhœam Parisiis A. 1765 mense Septembri post summum æstum cum insolita prorsus siccitate regnante vidit, quæ feminas nunquam antea illi obnoxias id temporis invasit, aliis vero eam prius quoque jam passis uberior tum & viscosior accidit.

§. 14.

4. *Venus immoderata.* Orgasmus enim lasciviæ humores uberior ad muliebria ciet,

(c) l. c. T. 2. P. 3. S. 1. C. 2 p. 14.

vasa iis laxantur, &c. unde leucorrhœa (*d*),
qvam BEHRII (*e*) puella ita sibi accivit.
In neonuptis rei veritas vel maxime elucet,
qvæ admisso per principia crebrius viro (seu
hujus id, seu illarum libido poposcit) haud
ita multo post voluptatis immoderatæ pœnas
luunt. Sic V. RIEDLINUS (*f*) feminam
novit, „ qvæ jam diu in conjugio vivens
„ sub principium semper fere de hoc malo
„ conqvesta fuit, marito tum ipsomet faten-
„ te, se exsatiari his amoribus vix posse;
„ jam vero remittente hac amoris vehe-
„ mentia contra hunc fluxum ulterius medi-
„ camentis non indiget. Et alia ... fassa
„ est, se majus levamen ab hoc malo, quo
„ valde vexatur, non percipere, qvam si
„ maritus debitum conjugale aliquamdiu
„ non reddat „. Perinde B. SILVATICI
matrona 25 annor. sanissima prius,
nuptui data leucorrhœam tantum non con-
tinuam contraxit cum dolore lumborum, cru-
rum, pedum, meteorismo rugiente, stran-

(*d*) HENTRICH Diff. de fluore albo benigno Præf.
C. F. KALTSCHMIED 4to Jenæ 1749. §. 10.
No 2. p. 10.

(*e*) Vide §. 36. f).

(*f*) Lin med. ann. 5. April. 2. p. 328.

(*g*) l. c. Cent. 4. No 39. p. 327.

guria, ac sterilitate. Idem GEHEMÆ (b) STAHЛИIque (i) mulieres sunt expertæ. Complures id genus mulieres J. STORCHIO obtigere curandæ, quas inter mulier (k) fuit magna, cholérica, 30 annis major, quæ viduo triennium nupta, toto hoc tempore leucorrhœæ subjecta mansit sterilis; tandem A. 1719 puellam peperit. Leucorrhœa rediit, duravitque ad A. 1721, cujus mense Majo alterum grida dolentes dextro in crure nocta est varices: dolor earum lotione vini calidi est sopitus; sed suppressa a partu lochia eundem resuscitarunt, haud prius conqviescentem, quam profluentibus lochiis. A. 1729 mense Octobri tertium prægnans, octavum in mensem, magnam laitudinem pondusque omnium artuum querebatur, quæ Væ Sø in pede lenivit, partu post 4 hebdomades consecuto. Varices tota inde vita cum mansissent, leucorrhœa A. 1737, quo vidua facta est, desit. Altera (l) mercatoris uxor 28 annorum, cholérica, robusta, sana, jam inde a principio

(b) Vide §. 70.

(i) Vide §. 5. No 10.

(k) Von Weiberkrankheiten 3 Band cas. 14. p. 100.

(l) Ibidem 8 Band cas. 2. p. 18.

matrimonii, in quo jam 3 annos vixit, leucorrhœam, nunquam sibi ante notam, adepta est fere continuam cum sterilitate, qvæ ad vernalis curationis remedia conticescere visa versus brumam denuo revertit; at resumptis remediis tandem ter mulier intra 9 annos peperit, leucorrhœa nihilo minus persistante, qvæ non nisi post 20 matrimonii annos viduæ factæ tum primum desit. Haud secius alia (*m*) matrona ob leucorrhœam multos annos sterilis illam non prius, qvam ab obitu viri, amisit, quo tempore cetera quoque ab leucorrhœa provenientia symptomata eam reliquerunt. A crebriore genitalium ac præsertim vaginæ titillatione & irritatione fluxum hunc in venere nimia oriri vel inde patet, quod alter etiam qualisqvalis mechanicus stimulus vaginæ applicatus interdum leucorrhœam proritet. Sic apud M. A. WEIKARDUM (*n*) puellæ, cum insigne spongiæ marinæ frustum vaginæ, (nescio cur) inditum aliquot intra horas adeo intumuisset, ut se se non amplius eximi pataretur, post complures dies obortus fluxus albo similis, teterimi fœtoris, accedente

(*m*) Ibidem p. 23. sq.

(*n*) Vermischte medic. Schriften 3 St. p. 61.

lotii ardore, symptomatibusque gonorrhœæ virulentæ solennibus: donec detecta spongia multoque cum fœtore educta fluxus ille convievit.

§. 15.

5. *Graviditas.* Hæc nonnullis leucorrhœam jam ante acquisitam solet reddere uberiorem. B. SILVATICI (*o*) matrona post crebros qva partus qva abortus a triennio illam patiebatur, non modo extra graviditatem, sed concepto etiam fœtu, & gravius qvidem quam alio tempore. Aliis vero, cum extra graviditatem non sit molestæ, ut primum utero gerunt, accidere consuevit, id qvod RIEDLINI (*p*), ROMMELII (*q*), ac SCHLIERBACHII (*r*) testantur historiæ; imo prior (*s*) feminam novit,, quæ undecies jam concepit, quæ se,, concepisse tum nunquam falso conjecit,, quando primo mense elapsò loco mensium

(*o*) l. c. No 18. p. 309.

(*p*) Vide §§. 15. 48 d).

(*q*) Vide §. 38 g).

(*r*) Ibidein e).

(*s*) Lin. med. ann. 1. Novembr. 6 p. 371.

„ fluore albo laborare cœpit; cum alias vel
„ per bimestre sine conceptione mensibus
„ obstructis nil simile patiatur. Eadem e-
„ tiam sœpe & sat fortiter sternutat, & ab
„ insomniis tantum incommodatur, ut pro-
„ pterea cum metu somno se det, & pro-
„ qvodam beneficio agnoscat, si talibus in-
„ somniis præsentibus expergefiant: ast hæc
„ illi . . . semper certo conceptionem in-
„ dicaverunt . . . Qva autem ratione leu-
corrœa gravidis, utero licet clauso, eve-
niat, facile inde intelligitur, qvod, cum
fluor albus verus ex iisdem scaturiat vasis,
e qvibus catamenia procedunt, qvemadmo-
dum ista in graviis e vaginæ vasis haud in-
freqventer pullulant, ita ille etiam ex iis-
dem, utero licet clauso, contingere queat.

§. 16.

6. *Catamenia* aut imminuta, aut suppres-
fa, aut ob ætatem provectionem desinentia,
haud raro fluorem album post se trahunt.
Sunt etiam, qveis menses nunquam flu-
xere, eorumqve velut vicariam qvovis men-
se leucorrhœam patiuntur. Sunt denique,
qvibus catamenia vel imminentia vel finientia
leucorrhœam semper proritant. Unde li-
qvet, leucorrhœam vel præire vel succe-

dere menstruo fluxui, vel vices ejusdem agere deficientis. Ita COCKSENII (*t*) mulieri 3 vel 4 dies ante menstrua fluor albus molestus esse solebat, quem NEUHOLDI (*u*) quoque vidua aliquot semper ante diebus experiebatur. Finientem vero semper catameniorum fluxum conseqvebatur in PECHLINI (*x*) virgine, ac feminis RIEDLINI (*y*), STAHLII (*z*), & ERNESTI (*a*), atque in hac mox occipiens prope ad sequentem usque periodum durabat. Matronæ vero HARDERI (*b*) circ. 8^{vo} primum a fluxu mensium die inguebat. In muliere denique HOFFMANNI (*c*) licet continuus esset, post catamenia tamen uberior procedebat. Contra autem in ejusdem matrona (*d*) ac JUCHII (*e*) virgine, tum ROSTII (*f*) & SCHENKBECHERI (*g*) feminis leucorrhœa mensium fluxum non præcedebat modo, sed seqvebatur etiam. Ex imminutis

(*t*) Vide §. 71.

(*b*) Vide §. 1. No 2. d).

(*u*) Vide §. 35. A. f).

(*c*) Vide §. 70.

(*x*) Vide §. 76.

(*d*) l. c. Obs. 1.

(*y*) Vide §. 57. No. 2.

(*e*) Vide histor. 7.

(*z*) Vide §. 5. No. 10.

(*f*) Vide §. 37.

(*a*) Vide §. 43.

(*g*) Vide §. 55. d).

porro, simulqve intensos inter dolores erumpentibus, catameniis leucorrhœam cum nocturno calore, cephalalgia vagisqve hypochondriorum doloribus obortam plethorica in femina J. G. ERNESTI (*b*) vidit, qvæ dato post Væ Se in pede mane decocto cathartico-diuretico, vesperi autem dæ e rad. pimp. alb. succin. alb. & diaphor. ♀ vitriolato, nitro, cinnab. ad cusp. cultri, deinceps vero effent, millef. pimp. alb. succin. TR^a ♂ ii ♀ sat. & bals. Peruv. usurpandis, remisit, mensesqve uberiiores prodiere. Idem qvoqve parci ac decolores menses HOFFMANNI (*i*) feminæ malum causarunt; qvod ad plenariam eorumdem suppressionem tanto certius accedit. Sic paulo ante laudatus ERNESTI (*k*) meminit lactantis plethoricæ, cui cum nihilominus menses rite procedentes aliquando emansissent, fluor albus ingruit; sed illis Væ Se in pede, usuqve pilul. bals. STAHL. &

(*b*) Annal. Vratisl. Tent. 25. A. 1723 Sept. Cl. 2. art. 3. §. 5. p. 274.

(*i*) l. c. Obs. 6.

(*k*) l. c. Tent. 22. A. 1722, Novemb. Cl. 2. art. 3. §. 4. p. 504.

infusi vinosi e rad. Bryon. Angel. Pimp. alb. herb. Abrotan. Melissæ, Rosmar. flor. Galeops. Millef. Ros. lign. Saffafr. Rheo: &c. revocatis leucorrhœa continuo desit. Hanc ipsam ex suppressis mensibus HARDERI (*l*) puella, TUCHII (*m*) virgo, feminaque MURALTII (*n*), sunt perpetuae. Apud J. STORCHIUM (*o*) virginis 19 annorum catamenia diu suppressa dum a remediorum usu rediissent, ab hoc ipso tempore etiam leucorrhœa occipit acris ac mordax, vehementes quandoque dolores, artumque pondus, causans; quam tamen profligarunt pilulæ catharticæ cum ♀ io dulci, & sumptæ quotidie mane ac vesperi gtt. xxx ex essent. ligni saffafr. pimpin. & TRÆ ♀ ri æquis partibus mistis. A mensibus vero per ætatem cessantibus eandem matrona LOEWII (*p*), femina MURALTII (*q*), nec non STARCKII (*r*) Dux, adeptæ sunt, meminitque

(*l*) Vide §. 4. I. No. 2. c).

(*m*) Vide histor. 7.

(*n*) Vide §. 35. B. b).

(*o*) Von Weiberkrankheiten 2. Band, cas. 165, p. 525.

(*p*) Vide §. 35. B. d).

(*q*) Ibidem A. e).

(*r*) Vide histor. 5.

etiam J. D. GOHLIUS (*s*) mulieris 48 annorum, cui cessantibus ante 3 annos mensibus leucorrhœa supervenit, usu tamen TRÆ vietæ KÖNIGSSEESIUM circumforaneorum profligata. Leucorrhœæ denique mensium loco periodice revertentis exemplum præbet J. D. RÜCKERUS (*t*) „ judæa (in „ qviens) phlegmaticæ constitutionis non „ nisi gravida facta lunare tributum solvit: „ extra graviditatis tempus mensium vices „ adhuc supplevit fluor albus benignus „: qvem ipsum etiam catameniorum loco & F. HOFFMANNI (*u*) quadragenaria, & TILLINGII (*x*) puella, sunt adeptæ.

§. 17.

7. *Partus, abortus, molæ, hæmorrhagia uterinæ, haud raro leucorrhœas pertinaces, a laxitate in vasis uteri cum stimulo qvodam relicta, post se trahunt, præsertim ubi sæpius acciderant. Ita post hæmorrhæ-*

(*s*) Aët. med. Berol. Dec. 1. Vol. 5. art. 2.
No. 21. p. 39. sq.

(*t*) l. c.

(*u*) Vide §. 37.

(*x*) Vide §. 45. No. 2.

giam uteri in leucorrhœam incidit MARXI (y) matrona, & post partus unum pluresve, plus minus laboriosos, mulieres BLASII (z), BURTONI (a), HOFFMANNI binæ (b), MÜNNICHII (c), QVARINI (d), RIEDLINI (e), ac SCHAEFFERI (f). Perinde uni iterative abortibus suam debebant leucorrhœam feminæ HOFFMANNI (g), ac THOMPSONI (h). Idem a molis visum. Sic J. STORCHII apud A. E. BÜCHNERUM (i) mulier 22 annor. sangvineo cholerica, bis prolem aliam ex alia enixa, postea molis laborare cœpit (qvarum unam in platea excrivit): cuiusmodi semiabortus ubi ter quaterve perpetua est, in copiosam demum leucorrhœam incidit, nullis mitigandam remediis (forte qvod ægra inconstans nulli illorum diu institerit), citra nullam tamen cachexiam, & versus inseqventem autumnum

(y) Vide §. 55. c). (g) Vide §. 72. C. a).

(z) Vide §. 35. B. c). (b) Vide §. 58. No.

(a) Ibidem d). (i) c).

(b) Vide §. 70. 35. B. i. (i) Miscell. phys. med.

(c) Vide histor. 6. math. A. 1727. Jul.

(d) Vide §. 55. a). Cl. 2. art. 2. p.

(e) Vide §. 35. A. c), 405.

(f) Vide §. 69.

denuo uterum gessit. Porro „ portento
 „ fane simile est, inquit B. SILVATI-
 „ CUS (k), qvod a viro præclariss. ocu-
 „ lata fide nobis narratum. Ill. scil. Comi-
 „ tem qvadragenariam plures qvam 150
 „ molas unico partu edidisse, variæ qvidem
 „ figuræ, lacertarum, cochlearum, & can-
 „ crorum fluviatilium, non sine profuso
 „ sanguinis fluxu: a qvibus lingvæ paralyfi
 „ correpta est, & totius corporis stupore,
 „ cum cachexia & muliebri profluvio; qvi-
 „ bus adhucdum afficitur, lingvæ & totius
 „ corporis motu incolumi „.

§. 18.

8. *Metastases* sani vel morbosí ad vasa
 uteri; qvorsum in primis pertinent:

a) *Sudor* criticus perperam repressus,
 a qvo SCHLIERBACHII (l) femina fluo-
 rem album est perpetua. Perinde

b) *Lac* uberum in non lactantibus
 resorptum, cuius a metastasi ad vasa uteri
 leucorrhœam lacticinosam nasci afferit J. A-

(k) l. c. Cent. 4. No. 53. p. 339.

(l) Vide §. 38. e).

STRUC (*m*). Testatur L. B. LENTINUS (*n*), pluribus quam 10 puerperis juvenculis, quod nec lactando, nec alia ratione lacti daretur apud eas exitus, accidisse leucorrhœam diutinam, excoriantem, qua steriles reddebantur, atque ad abortiendum pronæ, &c. Sic RAULINI (*o*) feminæ optimi habitus ac robustæ ante semestre felici partu levatae, prolem tamen haud lactanti, lacte regurgitante lochia processerunt copiosa, neque defierunt, sed fluxus mutata natura semper persistebat; tandem a trimestri evasit sensibiliter chylosus cum dolorificis ventriculi tensionibus, anorexia, dyspepsia, insigniique emaciatione: supervenit a bimestri crebra tussis, primum sicca, dein humida, continuoqve gravior, tum etiam febriles motus cum sudoribus nocturnis (i. e. phthisis nervosa secundi gradus). Meminit etiam alijs (*p*), cui post felicem partum non lactanti; licet robustissima effet, e lactis metastasi femur dextrum cum crure summe intumuit, doluitqve; tumores metastatici internum præ-

(*m*) Tract. de morb. mul. L. I. C. 10 §. 2.

(*n*) Beobachtungen einiger Krankheiten p. 137.

(*o*) I. c. T. I. P. 2. S. I. C. 9. p. 340.

(*p*) Ibidem p. 341.

fertim latus infederunt tuberum forma, in
qveis manu exploratis manifestus percipie-
batur infarctus cum insigni duritie, inflam-
mabanturqve cum febre; sed resolutione ta-
men curati sunt: ægra vero ex illo tempore
copiosa laborat leucorrhœa.

c) *Sputa.* T. THOMPSONI (q) femi-
næ mucum copiosum expectoranti post men-
struum suppressionem leucorrhœa superveniens
sputa sttit, corpore existente cachectico.
Et „ ego (addit Auctor) plures animadver-
„ ti casus, ubi ex aliis evacuationis mor-
„ bosæ ad uteri vasa metastasi fluor albus
„ est obortus „ Et vero

d) *Vomitus* multoties accidens matro-
næ nobili viduæ apud R. a FONSECA (r),
50 annos natæ, habitu corporis crasso &
molli, otio ac delitiis deditæ, ubi conqvie-
visset, in leucorrhœam est mutatus, qvois
mense freqenter molestam, effluente mate-
ria mucosa alba sublutea cum aliquo morsu.

e) *Catarrhus*, præfertim cum coryzæ
fluxu, citra crisin post coctionem, solutus.
RAULIN (s) „ vedit ægras in leucorrhœam

(q) Samml. auserl. Abhandl. zum Gebr. præt,
Aerzte 3 B. 1 St. p. 31.

(r) Consult. med. T. 1. Conf. 21. p. m. 150.

(s) I. c. T. 1. P. 2. S. 1. C. 8. p. 329.

„ lapsas, postquam a crebris capitis ac faciei
 „ fluxionibus fuerunt percuratae: aliæ post
 „ notabilem sputorum seroforum habitua-
 „ lium & copiosorum, queis a longo tem-
 „ pore obnoxiæ fuerant, imminutionem per-
 „ inde fluore albo multabantur „. Priori
 casui plane simillimum literis mandavit J.
 STORCH (t). Idem subsistens coryzæ pro-
 fluvium causat. Narrat hanc in rem s.
 SCHAAERSCHMIDT (u) infanti trimulæ
 (aut ad summum quinquenni) post vehe-
 mentem coryzam cum totius faciei capitis-
 que catarrho suffumigiis discussam continuo
 insignem obortam fuisse leucorrhœam, uno
 alterove mense cum narium siccitate, anof-
 mia, ac pruritu (quem infans digitis affiduo-
 nares laceffens prodebat), afflagentem. Idem
 quoque RIEDLINI (x) matronæ accidit.
 Perinde in Actis erud. Lips. (y) exstat leu-
 corrœæ exemplum post sedatam coryzam
 observatae. Videbimus quoque inferius (z)
 coryzam catarrhosque subsistenti leucorrhœæ

(t) Vide histor. 13.

(u) Med. u. chirurg. Nachricht. 2 T. No 51 p. 396.

(x) Vide §. 48. d).

(y) A. 1709. p. 376.

(z) Vide §. 18. e).

succedere. Unde haud immerito fluor albus ab nonnullis *uteri coryza* (a), GALENO-qve (b) *uteri rheuma* dictus est, qvem G. BALLONIUS (c) *catarrbum*, L. a FONTE (d) *distillationem uteri*, nuncuparunt. Atqve huc forte etiam BURGGRAVII (e) mulier est referenda.

f) *Tumores glandularum subsidentes.*
 Insignem hujus rei casum ad posteros dedit „ Ill. A. de STÖRCK (f) : virgo 18 annor. „ (refert ille) mammam utramqve lapidis „ instar duram a triennio fere habuit; pallida „ præterea fuit, flaccida, tota cachectica, ne- „ qve unquam ei menses adhuc fluxere, cor- „ dis palpitationem conqverebatur, & a pau- „ lo fortiori ingressu semper anhelavit, & „ fere suffocata est. Mamma utraqve striis „ lividis erat variegata, advertebaturqve „ perfreqventer dolor acute punc torius, va- „ gus. Glandulæ subaxillares & ingvinales „ qvoqve erant tumidæ, induratæ. Dedi

(a) Vide §. 1.

(b) De symptom. caus. L. 3. C. 4.

(c) Cons. med. L. 1. Cons. 56 sub fin.

(d) Cons. med. 117.

(e) Vide §. 45 No 1.

(f) De cicuta Lib. 2 Cap. 2 cas. 16 p. 117. sqq.

„ illico ter qvotidie 3 pilulas gr. ij de ex-
„ tracto Cicutæ, & qvalibet vice feci desu-
„ per hauriri infusi melissæ & fl. sambuci vas-
„ cula duo. Externe nil applicui. Qvinto
„ die nil adhuc erat mutatum. Exhibui igi-
„ tur ter qvotidie pilulas jv, & idem infu-
„ sum continuavi. Octavo die striæ lividæ
„ in utraqve mamma disparuerunt, dolores
„ autem vagi pungentes erant longe fre-
„ qventiores, vires auctæ sunt. Decimo
„ die jam dabantur 15 pilulæ per diem.
„ Duodecimo die prodiit ex utero materies
„ copiosa alba glutinosa, & omnes durities
„ tunc molliores videbantur, & respiratio
„ fuit levior, nec cordis palpitatio adeo
„ freqvens. Eadem pilularum dosi in vige-
„ simum diem continuavi, & erant tunc o-
„ mnia meliora, tumores multo minores,
„ mamma utraqve mobilis & pro parte pen-
„ dula. Color faciei antea ex flavo viridis
„ nunc in subroseum mutabatur; functiones
„ omnes incipiebant restaurari. Qvotidie
„ ex utero copiosus mucus prodiit, qvī
„ subinde acer fuit, & in vagina ardorem
„ excitavit, subinde autem adeo blande ex-
„ stillavit, ut ægra nil adverterit. Datae jam
„ sunt 18 pilulæ per diem. Trigesimo die
„ mammæ ambæ jam erant fere naturales,
„ & glandulæ subaxillares multo minores;

„ nullum dolorem ægra conqverebatur,
„ mens fuit longe hilior: fluxus autem
„ uterinus nec amplius copiosus nec fre-
„ qvens fuit. Pilularum dosis non amplius
„ aucta est, & continuabatur infusum fl. sam-
„ buci & herbæ melissæ. Qvinqagesimo
„ die nil in mammis repertum est; sub axil-
„ lis erant adhuc qvædam tubercula pisis
„ æqvalia; fluxus muci ex utero penitus
„ desit; viguit appetitus. Per 3 adhuc
„ septimanas dedi mediocrem cicutæ dosin,
„ & infusum rutæ. Comparuit dein citra
„ omnem dolorem fluxus menstruus, prodi-
„ itque sangvis sanissimus per 5 dies, nec
„ advertebatur cordis palpitatio, nec a for-
„ tiori ingressu respiratio inhibita fuit. Un-
„ de optima videbatur aeffe sanitas: atque
„ ideo nil amplius medicamenti datum fuit „

g) *Sangvinis vacuationes* confvetæ vel
earum molimina non succendentia: quo fit,
ut metastasis humorum ad vasa uteri facta
leucorrhœam excitet. Ita FÜRSTENAUI
(g) vetulæ neglecta scarificatio confveta
fluorem album proritavit. Sed omnium fa-
cillime hæmorrhoides cœcæ morbum hunc
efficere valent. Sic apud Auctorem Ob-

(g) Vide §. 66.

servationum clinic. Varsav. (b) „ innupta fe-
 „ mina pertinaces potissimum alvi obstrucio-
 „ nes accusabat. Enematibus jussis illa re-
 „ cusavit; qvia aliunde, si alvum exoneret,
 „ atroces semper dolores habeat, simulqve
 „ se fluore albo laborare indixit. Re exa-
 „ minata, leucorrhœam syphiliticam non
 „ esse certum erat, sed valde materia cor-
 „ rosiva. Jussit balnea emollientia, postea
 „ ut super fervidæ aquæ vaporem fedeat;
 „ sed noduli nulli provenerunt, & potius
 „ his adhibitis dolores intestini recti etiam
 „ extra casum sedis aucti fuerant. Intimius
 „ igitur rectum visitatum fuit, & altius in-
 „ terne nodi hæmorrhoidales inveniuntur.
 „ Ea indicatione prosecuta & recti dolores
 „ (qvod non mirum), sed & leucorrhœa,
 „ sponte cessarunt,. Postmodo (i) quo-
 „ que „ referre (inqvit idem Auctor) debeo,
 „ me iterum in uxore leucorrhœam hæmor-
 „ rhoidalem, illi, qvam in primo fasciculo
 „ narravi, omnino similem, reperisse, &
 „ eadem indicatione illam abstulisse, qvæ
 „ jam per triennium omnes alias indicatio-
 „ nesfefellerat,

(b) Fascic. I. p. 39. sq.

(i) Ibidem fasc. II. p. 68.

C A P U T V.

P R O X I M A C A U S A.

§. 19.

PROXIMA *Leucorrhœæ causa* (de vera leucorrhœa sermo est) haud alia sit oportet, quam anastomosis arteriarum in cavum uteri vel vaginæ (vel utrobiqve) hiantium, ex earum laxitate justo majore proficiscens, ac sero plus, quam oportet, transitum præbens, cuius J. B. MORGAGNIUS (*k*) duplcem causam principem arbitratur esse, nimirum eam uteri aut vaginæ affectionem, ut eorum „ aut intima membrana, non secus at „ que illa narium in coryza, rheumate quo- „ dam afficiatur (*l*), aut ora vascorum „ post emissum menstruum sanguinem se „ haetenus contrahant, ut sanguini quidem „ exitum, ejus autem sero non intercludant, „ quod ut alio in aliis colore infectum est, „ ita in omnibus non eodem colore fluorem „ facit „ : quodque resorpta aquosiore

(*k*) De sedib. & caus. morbor. Epist. 47 No 11.

(*l*) Vide §. 18 e).

parte evaporati feri ad instar spissius profluit (*m*).

§. 20.

Fuere, qvi humorem in leucorrhœa non ex ipso utero, sed tantummodo e vagina scaturire contenderint; qvos inter etiam J. A. WEDELIUS (*n*) plus vaginæ qvam ipsi utero hocce in malo tribuere videtur: forte non aliam ob causam, qvam qvod tum in gravidis, qveis uteri conclusi sunt, fluor hic nihilominus persæpe observetur (*o*), tum qvod etiam similis qvoqve humor in lascivis sola genitalium vexatione e vagina eliciatur, &c. Verum enim vero qvi hanc opinionem sectati sunt, haud satis, qvid veram inter ac nothas leucorrhœas, qvarum sedes ut plurimum in vagina est, intersit, discrevisse videntur. Neqve graviorum fluor albus, ut ut e vaginæ accidat vasis, continuo ostendit, sedem suam propterea in utero esse haud posse; qvando-

(*m*) l. c. No 13.

(*n*) Diff. de fluore albo Resp. A. M. EILHARD.
4to Jenæ 1743. §. 1. sqq.

(*o*) Vide §. 15.

qvidem id ipsum reapse & anatome pervincit, & rite deductum ex observatis ratiocinum. Etenim

§. 21.

Anatome cum leucorrhœa defunctarum exhibuit cum uteri in cavo tum ad ejus quoque parietes adhærescentem ipsum illum humorem, qui viventibus e pudendis profluxit, quoque compressa manibus uteri substantia uberior etiam ex ea prodibat, indicio manifesto, ipsum ex uteri vasis ejus in cavum fluxisse. Sic s. PINAEUS (p),, sæpius vidimus (inquit) in dissectis cadaveribus puellarum seu virginum & aliarum mulierum profluvio uteri albo, dum viventes, laborantium, quo ob aliud aliquem morbum gravem extinctæ fuerant; in utero enim earum humorem limpidissimum invenimus, qui e cavitate ejusdem guttatum stillabat per verum collum insimum pudoris, in quo candorem tantum acqvirebat, ut cretam aut calcem diffundam in aqua dixisses, & ejusdem mixtionis crassitatem quoque, in aliis majorem,

(p) De notis virginis. L. i. problem. 3.

„ in aliis minorem. An vero id fiat (i. e. an
 „ ista albedo & inspissatio humoris antea te-
 „ nus & limpidissimi acquiratur) coctione
 „ aliquia vel aeris externi appulsi, frigidi
 „ potius ut videtur, aliis judicandum pro-
 „ ponimus,. Melius profecto MORG A-
 GNIUS (q) id ab resorpta sensim aquosiore
 feri parte effici judicavit, cui id ipsum phæ-
 nomenon binis in virginibus detegere licuit,
 quvarum in una (r) circiter 16 annor. leu-
 corrhaem, dum viveret, passa „ cum mu-
 „ cum secundum naturam se habentem ute-
 „ ri osculo & proximæ cervicis parti abster-
 „ sisset, comprimendo inferiorem uteri fun-
 „ dum, cervicem, & osculi uterini coro-
 „ nam, prodire ex his locis omnibus, &
 „ ordinate qvidem, vidi albam crassiuscu-
 „ lam materiam, quæ unde albus fluor pro-
 „ venisset, non obscure significavit,. In
 altera (s) vero 14 annorum eodem ante obi-
 tum morbo afflita uterum a morte „ cum
 „ incidisset, fundi cavum invenit humida
 „ materia plenum ex albo in flavum & sub-
 „ viridem colorem vergente,. Haud se-

(q) Vide §. 19.

(r) I. e. No 12.

(s) Ibidem No 14.

cius etiam s. SCHAAARSCHMIDT (*t*) testem se ejusdem rei nonnullis in sectionibus cadaverum ab se visæ præbet. Unde liquet, per anatomen constare, leucorrhœæ veræ fontes non in vagina modo, sed ipso etiam utero, fuisse observatos. Atque ad hæc

§. 22.

Ratiocinium quoque rite ex observatis institutum evincit, fontes leucorrhœæ veræ non alios esse, quam ipsa illa vasa, e quibus menstruus sanguis scaturit; quandoque videm leucorrhœa vera

1^{mo} Emmenagogis interdum procuratur (*u*);

2^{do} Catameniorum fluxum jam præcedit, iam conseqvitur (*x*), imo quandoque

3^{tio} Vices ipsorum catameniorum obit (*y*).

Quæ proinde satis superque memoratos leucorrhœæ fontes ab omni ambiguitate vin-

(*t*) l. c. § Th. No 3. p. 77.

(*u*) Vide §. 12.

(*x*) Vide §. 16.

(*y*) Vide §. 16.

dicant. Haud tamen id ita accipiendum venit, fluoris albi scaturiginem in dato corpore v. g. LAIDIS ex iisdem individuis vasis, e quibus illi catamenia procedunt, esse opportere, ita ut, si evasis fundi uterini ista proveniant, ille quoque ex iisdem pullulare debeat, nec pro vero habendus sit, si illis ex uteri fundo prodeuntibus ipse ex ejusdem cervice vel vagina scaturiat. Nam cum id ipsum fere semper quidem ita eveniat, potest tamen contingere, ut catameniis LAIDI ex uteri fundo exstlicantibus leucorrhœa e vagina erumpat; modo hujus quoque vase ita natura comparata sint, ut ad systema fluxus menstrui pertineant, id quod rara nos observatione docuit J. HILL (z), nempe A. 1741 mulieri 20^{mo} ætatis anno primum puerperæ obstetrix placentam magna vi avulfit, ut laceratum quid sonus a puerpera perceptus persvaderet: unde illo in latere perpetua debilitas cum dolore jacenti ægræ superfuit; ubi vero lecto relicto misera per conclave ambulare occepit, uterus pugni magnitudine e vulva prorupit, quem vagina simul prolapsa inverfaque bursæ instar te-

(z) Medicin. Commentar. von Edinburgh 4 Th. 1 St.
2 Abschn. No 5. p. 88. sqq.

gebat. Os uteri ultra cuncta mammillæ forma ad pollicem prominebat. Qveis visis letum mox repetens omnia facillime reposuit, non ante rursus elapsa, qvam denuo periculum fecisset ambulandi: tum vero prolapsui mulierum e consilio fascias admovit; at incassum, nam non modo repetebat stanti prolapsus, sed fasciæ qvoqve excoriationem cauabant. His proinde abjectis uterus totis diebus propendebat, noctu repositus, mane postero iterum prolapsurus, illæsa nihilominus sanitate. Proli 18 menses lac præbuit, ac non multo post ablactationem catamenia more pristino procedebant, qvæ solummodo ex uteri orificio prodire observabantur, e vagina ne gutta qvidem: qvandoqve guttatum ac lente, qvandoqve vero ubertim erumpabant; semper autem copiosa experiebatur mulier. Aliquo inde post tempore iterum concipiens tota graviditate molestias multas perpetra est, utero interdiu semper prolapso, ac noctu tantum reposito, qvoad ita demum increvit, ut non amplius prolabi quiret; sed tum ponderosæ molis instar ossibus pubis vicinisqve ad 7^{um} usqve mensem, qvo peperit, incumbebat. Hancce etiam sobolem, qvæ 4 annis vixit, lactavit, lactationisqve tempore, ac post illam uterus pristinâ plane ratione prolabi pergebat, ore uteri

nunc aliquanto longius etiam deorsum pendente. Paucos intra annos mulier ter adhuc utero gescit, sed semper 3^{to} mense abortiit, idque ab ira. Post quemvis abortum os uteri mammillam referens aliquanto plus, quam ante, descendebat. Abortus hos iteratos leucorrhœa 6 vel 7 annorum est consecuta, quæ, dum catamenia hactenus e solo uteri orificio prodirent, ex omni bursa illa a vagina efformata in integrum scaturiebat, quæ tantopere madebat, ut semper linteis tectam esse oportuerit. Per id tempus vehementi colica prehensæ uterus a perfrigeratione adeo intumuit, ut reponi non posset: idcirco opem petiit. Colica tumoreque brevi percuratis reliquum naturæ est commissum usque ad 1761 (forte 1771), quo post vehementem febrim intermittentem superatam menses (quod ætatem ageret annum inter 40^{um} & 50^{um}) non amplius reversi sunt, prolapsu pristinum obtinente statum, nisi quod os uteri concreverit, cuticulaque fuerit investitum. Leucorrhœa quoque desiit. Uterus propendens nil novi causabat incommodi, quod per 30 jam annos non adfuiisset; quam ob rem postremis 10 vel 12 annis reponere quoque illum neglexit, qui interdum vel a perfrigeratione vel graviori labore admodum intumescebat, alias

vero contrahebatur in rugas instar scroti rugosi, cui perqvam similis erat, donec a temporis diuturnitate, qvo aeri expositus erat, cutis instar, cujus etiam colorem induit, siccus evaderet. Ubi reponebatur (qvod facillime succedebat), continuo rursus elabebatur. Nunqnam sua magnitudine urethram clausit. Ægra hodieum sana hilarisqve degit, ut paucis de morbo ejus constet. Ex isthac historia liqvet, leucorrhœam fuisse veram, non spuriam; qvandoqvidem e vasis vaginæ scaturiebat, & post iteratos abortus occipit (*a*), atqve cum catameniis desit.

C A P U T VI.

D I A G N O S I S.

§. 23.

DIAGNOSIS *leucorrhœæ veræ* haud exiguis laborat difficultatibus, qvas clinici plerique omnes qvotidie experiuntur. Nam ut dœ iis, qvæ titulo cum specierum tum cau-

(*a*) Vide §. 17.

farum J. ASTRUC (*b*) fuse hoc in medium attulit, dicam nihil; quippe quæ magna sui parte & cerebri humani commenta sint, & ad leucorrhœam cito tuto jucundeqve currandam haud magnopere faciant: illud certe, quod ad leucorrhœam veram a spuriis quibusvis rite discernendam pertinet, & in quo omnis curationis cardo vertitur, medentem haud raro ambiguum tenet. Non omne id quidem, quod veram inter leucorrhœam ac singulas spurias discrimen est, sagaciorem præterit observatorem; novit enim ex faciliti, qui gonorrhœa benigna (*c*) ab leucorrhœa vera sit disjungenda; nec est nescius, quid purulentos inter fluxus uterinos (ut sunt uteri ex inflammatione suppurati, eorumve aut carcinomata aut fungi exulcerati, &c.) ipsamque simplicem leucorrhœam veram intersit. Eapropter in ipsis, quandoquidem etiam uberior eorumdem diagnosis aliis est loci, moras trahere vîsum non est. Princeps autem difficultas per vestiganda supereft, leucorrhœæ veræ a gonorrhœa venerea mulierum rite dignoscendæ, quæ duo mala usqve adeo sibi saepe sunt affinia, communibusque

(*b*) l. c. §. 5.

(*c*) Vide §. 2. II. A. No 1.

notis se se tuerunt, ut unum ab altero discernerere subinde vix sit integrum; id qvod nihilo minus non recta modo medendi methodus, verum ipsa etiam seqvioris sexus fama, ne detrimenti qvid capiat, exposcit. Idcirco

§. 24.

Vera ne an syphilitica fit leucorrhœa, cum hæc illam interdum mentiatur, vel faltem pro illa Medico ab infectis obtrudatur, decretorii utriusque characteres pro eo, ac par est, sunt pernoscendi. Præcipuos illorum, qvos Auctores celebriores hanc in rem proferunt, isthic dabo, qvi etsi complures sint, haud tamen semper tollendæ rei ambiguitati sufficiunt, in primis vero, ubi gonorrhœa syphilitica cum ipsa leucorrhœa vera est complicata (d). Qvapropter in momentosa hac diagnosi pensanda sunt vel maxime seqventia:

§. 25.

I. *Causæ fluoris prægressæ, cum ipsis ejus adjunctis rite collatæ.* Si enim symptomata

(d) ASTRUC l. c.

ta (e) ejusmodi sint, qvæ leucorrhœam veram præse ferant, eique excitandæ idoneæ simul præcessere causæ, nec quidquam adsit, qvod suspicionem syphilitidis præbeat, res plana erit. Sin vero fluxus ipse suspectus sit, & ægra contagii venerei caussas fateatur fuisse admissas, fluor aut ex toto venereus erit, aut certe leucorrhœæ complicatus, ubi reliqua etiam signa dicenda congruerint. Verum cum ægræ admissas contagii caussas persæpe alte tacere, imo pernegare etiam, norent; alia erunt Medico prudenti circumspicienda, nempe

§. 26.

2. *Symptomata syphilitica, ut inflammatio vaginæ fluorem prægressa;* nam gonorrhœa syphilitica, ut recte notat J. ASTRUC (f), dum recens est, inflammationem vel vulvæ vel vaginæ comitem habet, qvæ ab leucorrhœa vera simplici prorsus abest. Qvod si vero inflammatio hæc ob morbum jam diuturniorem haud amplius adsit, videndum, num aliud quid e profapia syphilitica leucorrhœam comi-

(e) Vide §. 4. & 5.

(f) I. c.

tetur, ut tophi, dolores osteocopi nocturni, bubones, efflorescentiæ, &c. qvæ contagium venereum arguant, velut in muliere STORCHII (g). Sed etiam hæc sæpenumero absunt, præprimis ubi gonorrhœa hujusmodi ab reliqviis tantum venereæ luis excitatur, ut sæpe accidit, ac tum prægressa varia syphilitica mala ægrotæ summo studio tacent, negantqve. Hoc proinde in casu examinare oportet

§. 27.

3. Qualitates materiæ profluentis, nempe colorem, odorem, acrimoniam, &c. horumqve effectus in corpus ægræ, præsertim dolorem ardoremqve genitalium, qvem lotii sub mictione transitus auget in gonorrhœa, cuius materiæ est simul color testæ SWIETENIO (b) vel mox initio vel cito post pravus „, qvi initio albicat, qvandoqve „, in flavum & viridem transit satis cito, „, erosisqve vasis effluit tabus sangvinolen- „, tus „. Fœtor qvoqve gonorrhœæ proprius detegitur, & acrimoniam cito humor

(g) Vide §. 32.

(b) Commentar. ad h. BOERH. §. 1447.

profluens assumit cum celeri qvoqve ejusdem incremento. Omnia autem vera in leucorrhœa secus eveniunt; nam color mali principio diu albidus perstat, anteqvam flavescat ac demum viridescat. Porro leucorrhœa recens caret pure, fœtore, acrimonia, ac proinde etiam genitalium dolore, nec de alio fere dolore queruntur ægræ, nisi qvi lumbos tenet, & qvi ipse a gonorrhœa abest (*i*). His ergo mali utriusqve principia sic satis ab se dissident. At ubi uterqve fluxus proiectior evasit, vix ullum inter utrumqve discrimen reperitur; nam leucorrhœa vera initio alba, blanda, indolens, ita diurnitate demum, ut dicetur (*k*), materiam mutat, ut & colore, fœtore, & acrimonia venereum illam non exæqvæ modo, sed & superet interdum. Verum qvidem est, ægras de principio fluxus, qvalis tum fuerit, percontandas esse, indeqve discrimen erendum; sed, ut recte advertit ASTRUC (*l*), „ægras qvandoqve levioris coloris ergo „syphilis latet, interdum ea symptomata, „qvamvis vehementiora, inscitiae ergo anim

(*i*) ASTRUC l. c.

(*k*) Vide §. 35 A g).

(*l*) l. c.

„ advertere nesciunt, vel ipsa parvi faciunt,
„ ut fœpissime sub silentio prætereant, qvæ
„ in diem eveniunt, aut accidere obser-
„ vent, ne fluxus mutationibus detectis
„ proprii errores detegantur. In iis casi-
„ bus ne in maxima versemur incertitudi-
„ ne, in qvam ignorantia aut fraus illarum
„ nos impellerent,, ad alia qvoqve indi-
„ cia respiciamus, oportet, spectandaqve tum
etiam svadetur

§. 28.

4. *Ubertas profluvii*; nam cum leu-
corrœæ veræ, SWIETENIO (m) obser-
vante, initium leve sit per menses, imo
annos, latusqve ejus progressus & incre-
mentum, duratio qvoqve longa, anteqvam
acrimonia accedat; in vetusto autem fluxu
copia profluvii multo sit major, qvam in
gonorrhœa venerea; in ista omnia contra-
rio procedunt ordine, nempe initium ejus
est subitum, incrementum citum & conti-
nuum, nunqvam tamen ubertate sua, aut
raro admodum, leucorrhœam vetustam ex-
æqvat, nisi forte eidem sit complicata. Sed

(m) l. 4.

indictum ex ubertate profluvii petitum per-
qvam esse ambiguum haud pauci observant;
qvandoqvidem humoris profusi copia utrin-
que variat. „ Nam albi fluores interdum
„ erumpunt , qvi syphilide parum uberi-
„ ores sunt „ teste ASTRUC (n): & in
gonorrhœa venerea e vaginæ glandulis af-
fectis tantum sœpe adeffe profluvium s.
SCHAARSCHMIDT (o) ait , qvantum in
vehementissima leucorrhœa benigna obser-
vatur. Sic. L. G. KLEIN (p) „ meminit
„ venereum chronicum fluorem sic largum,
„ ut lectos penetrarit altius subterpositos
„ illuvies emanans „ . Qvod tanto etiam
evenit certius , ubi gonorrhœa leucorrhœæ
est complicata. Hujusmodi vero in casu

§. 29.

5. *Inspectio genitalium* , svadente
ASTRUC (q) , non est negligenda , in qva
si vulva aut vagina exulcerata est , maliqve
scaturigo in eadem reperitur , gonorrhœam

(n) l. c.

(o) l. c. p. m. 88. sq.

(p) Interpr. clinie. tit. fluor allus p. 113.

(q) l. c.

adefse in propatulo est. „ Aegras (inqvit
„ ille) obstetricare oportebit, ut triplicem
„ sedem benignæ syphilidis, ac proinde
„ continentis gonorrhœæ investigemus. 1)
„ Prostatæ se ostendunt, ex qvibus virus
„ stillat supremam versus vulvæ partem per
„ orificia lacunarum GRAAFII ad latera
„ urethræ locatæ: 2) Glandulæ vero
„ COOWPERIANAE se produnt interna
„ vulvæ parte sitæ perinæum versus aut cir-
„ ca ostium vaginæ, ex qvibus gonorrhœa
„ circa anum aut limen vulvæ fluit: 3)
„ Glandulæ tandem vaginæ, qvæ virus in
„ ipso vaginæ ductu fundunt per vulvam
„ erumpens. In eo duplici casu si ægro-
„ tantium inspectione certiores fieri volu-
„ mus syphilidem adefse, materiam ex la-
„ cunis aut glandulis COOWPERI exire
„ observabimus, deniqve ipsam superius,
„ inferius, aut interius vagina cumulari;
„ contra vero afferere possumus fluore albo
„ tantum laborare mulieres, qvando ex-
„ tremitates eorum canarium minime læsæ
„ aut pure fœdatæ apparent „. Sed præ-
„ terqvam qvod hujus inspectionis non semper
copia fiat, simul etiam ipso ASTRUC fa-
tente „ in postremo casu difficultimum erit
„ fluorem album a vaginæ syphilide distin-
„ gvere; cum hæc æqve ac ille a vaginæ

„ fundo profiliant „. Et numquid fluorem album e vaginæ vasis, quæ alias menstruum sanguinem stillant, erumpentem a gonorrhœa e glandulosis vaginæ locis pululante discernes? Et, quod rei caput est, ulcera id genus glandularum vaginæ cum purulenta leucorrhœa sine ulla prorsus labe venerea praesto esse possunt, id quod liquido evincit exemplum apud RAULIN (r) innocuae puellæ circ. 18 annorum, severæ virtutis, cui adeo pruriebant ardebantque genitalia, ut nec dormire, nec ambulare, nec quiete sedere posset. Universæ glandulæ circum urethram, sebaceæ, nympharum, vulvæ, labiorum inflatæ erant inflammatæque, humorem reddentes purulentum, multo etiam uberiorem, ubi aderant excoriations & ulceræ superficialia, quam albi. Præter ulcera illa numerosa etiam puncta ulcerosa & admodum sensilia ibidem visibantur. Puella tamen per Væ Ses, balnea, fatus, usumque simplicissimæ ptisanæ brevi ex intervallo temporis convaluit. Ergo cum & haec neutiquam diagnostin absolvant, alia porro erunt pensanda, quorum e numero etiam est

(r) Vide §. 2. II. A. No. 1.

§. 30.

6. *Coitus*, quippe qui gonorrhœa venerea præsente cum feminæ tum viro quoque molestus sit. Etenim teste J. DOLÆO (*s*), cui & ASTRUC (*t*) assentitur, „ gonorrhœa virulenta affectæ coitum haud „ sustinere possunt, qvi tamen fluore al- „ bo . . . affectas vix impedit,,. Neque id mirum; nam penis virilis rigentis ad ulcerosa vaginæ loca vehementior affictus non potest dolorem non caufare, qvi in vera leucorrhœa ulcerum vaginæ experite nullus est futurus. Porro quod ad viri molestiam inde oriundam attinet „ gonorrhœa coitu „ communicatur, inquit J. ASTRUC (*u*), „ fluores vero albi viro innocui sunt, aut „ leves excoriationes tantum pariunt,,: id quod pulchre illustrat casus apud POMMÉ (*x*), videlicet puer perditæ vitæ, 25 annorum, temperamenti siccii, hysterica, mature vene- ri dedita, luem syphiliticam contraxit, a qua per litus ♀ les tumultuaria methodo ,

(*s*) l. c. §. 2. p. 498.

(*t*) l. c.

(*u*) Ibidem.

(*x*) Abhandl. von den hyster. und hypoch. Nerven- krankheiten oder von den Vapeurs p. 307. sqq,

exacerbatis sub curatione hystericis turbis, tertium etiam instituta, cum liberari non posset, quartum ad eandem circumspectius institutam convaluisse visa est, matrimonio ineundo habilis etiam judicata, nihil obstante (ut videbatur) trienni leucorrhœa, ut quam nemo medentium suspectam habuerit. Sed nuptui data 6^{to} die gonorrhœam virulentam viro attulit, ut proinde & ipse antivenerea methodo, & illa quoque jam quintum tractanda fuerit. Vir cum vulgata mendendi ratione brevi convaluisset, illa non nisi post præmissa 30 balnea, quotidianie ad 4 horas usurpata, potumque juris pullorum, litus & les denuo experta, balneaque diebus a litu vacuis continuans, lente tandem, at ex integro, convaluit. Sed haec ut ut sponsum numero ita se habeant, haud raro tamen certitudinem diagnoseos morantur. Quod enim dolorem affectæ in coitu concernit, iste pro magnitudine exulcerationis varia item varius esse potest, qui si exiguus est, facile celari a cautiore ægrotæ potest. Quid si locus ulceratus paulo altius situs sit, quam ut a pene irritari queat? Porro vagina & vulva in ipsa etiam leucorrhœa vera, ubi temporis diuturnitate humor ejus causticus evasit, excoriatur, ulceraturque: proinde etiam tum dolor in coitu percipietur. Sed

vir

vir saltem, dicet qvis nihil inde contagii, præter levem forte excoriationem patietur? At quid si mulieris malum a viro prius hac labe fœdato est profectum, isque illud studiose celare pergit? Id ipsum sane in casu SCHAAERSCHMIDTII (y) accidit, nullatenus nisi extorta demum a viro confessione detegendum. Sed quid, inqvis, his omnibus ambagibus opus est; qvandoqvidem pathognomicum suppetit indicium leucorrhœam veram a gonorrhœa, imo spurio qvocunque profluvio muliebri discernendi? Qvod illud? videlicet

§. 31:

7. *Typus* utriusqve hujus profluvi diversus natura, ac nunquam fallens, de qvo ita G. BAGLIVUS (z): „fluor albus „uterinus & gonorrhœa Gallica adeo simi- „libus comitantur symptomatis, ut qvisqvis „Medicorum fere semper decipiatur in illo- „rum diagnosi, præsertim cum mulierculæ

(y) Vide §. 33.

(z) Prax. med. L. 2, C. 8. §. 3.

„ verecundia perfusæ gonorrhœam per im-
 „ purum scortum contractam fluoribus ute-
 „ rinis mentiantur. Ne succedant imposte-
 „ rum hæc incommoda, dabo signum infal-
 „ libile tales morbos ad invicem distingven-
 „ di. Pete a muliere, an superveniente
 „ menstruo sanguinis fluxu perseveret quo-
 „ que eodem tempore fluor ille albæ mate-
 „ riæ? si dicat, quod sic, significato eidem,
 „ qvod morbus, a qvo divexus, sit go-
 „ norrhœa Gallica: si vero durante men-
 „ struatione fluor albus evanescat, & ea-
 „ dem finita denuo regrediatur; pro certo
 „ habeas, mulierem fluore albo uterino
 „ laborare. Cetera signa fallunt, hoc ve-
 „ ro constans est, & mulierum dolum aper-
 „ te eludit,. Multum sane rationis huic
 signo ineft, cui propterea & v. RIED-
 LINUS (*a*) applausit, & multi alii, qvos
 ASTRUC (*b*) in medium adducit, sunt
 confisi. Cum enim fluor albus ex ipsis iis
 scaturiat vafis, qvæ sanguinem menstruum
 profundunt (*c*), ita ut iste majorem, mi-

(*a*) Curar. medic. millenar. No. 431.

(*b*) I. c. nota (*a*).

(*c*) Vide §. 2. I. No. 1.

norem contra ille eorumdem anastomosin (*d*)
exigat: satis liqvet, fluentibus catameniis
leucorrhœam evanescere debere postliminio
reversuram, ubi illa substiterint. Syphili-
tica vero sanies cum ex ulcerosis pudendo-
rum glandulis proveniat, nil obstabit, qvo
minus ejus fluxus cum catameniis pergit.
Interea cum indicium hoc in se longe sit
verissimum, tamen in praxi medentem facile
eludere, eiqve imponore potest, & „ B A -
„ G L I V I pace, qvi hanc sententiam stre-
„ nue defendit, nullum est, inquit A -
„ S T R U C (*e*), eo magis erroneum signum;
„ nam 1) albi fluoris eruptio necdum des-
„ fit catameniis fluentibus, etiam si nos
„ lateat cruoris ergo, qvo permiscetur; 2)
„ idem accidere solet in syphilide, qvæ
„ ex glandulis intimioribus vaginæ prodit,
„ ut ex sanguinis admixtione impossibile
„ sit hoc inutile signum distingvere. 3)
„ Addo tandem frustraneum esse & incer-
„ tum in ea gonorrhœa, qvam glandulæ
„ COOWPERIANÆ aut prostatæ faciunt;
„ nam menstrua tunc totum cruore vulvæ

(*d*) Vide §. 19. 21. sq.

(*e*) I. c.

„ ambitum inficiunt, ut fluxum laticis illius
 „ conspici impediunt,.. Profecto qveis
 fluxus gonorrhœæ parcior, profusior autem
 catameniorum, est, ab hoc illum ita obscu-
 rari debere, qvæsi illo tempore non adesset,
 in confessu est, et SCHAARSCHMID-
 TII (f) ac STORCHII (g) casus id
 evincunt. Porro id verum fit etiam, deco-
 lores menses facile in leucorrhœa vera pro-
 gonorrhœa syphilitica haberi posse; qvis
 enim detexerit, in uterone jam vel in
 vagina primum id genus fôrdes sangvini
 fuerint admistæ? Denique demus cum san-
 guine menstruo album qvoqve profluvium
 pergere, num istud continuo pro gonor-
 rhœa habendum? Haud qvamqvam! Cur
 enim pus ex abscessu ovarii per tubam in ute-
 rum delatum non possit cum sangvine men-
 struo simul e pudendis prodire (b)? Qvod
 idem valet de uteris ipsis ubi ubi alibi
 ulceratis, ad qvos pertinere videntur verba
 G. BALLONII (*) scribentis: „ narrat FER-

(f) Vide §. 33.

(g) Vide §. 32.

(b) Vide §. 2. II. B.

(*) Paradigmata 160.

„ NELIUS fluorem muliebrem a gonor-
„ rhœa virulenta distingvi, qvod hæc
„ fluat mensibus etiamnum erumpentibus;
„ fluor autem muliebris cefset fluentibus
„ mensibus: nos contra in misella muli-
„ ere utrumque simul fluere observavimus;
„ & saniosa excretio per fluorem muli-
„ ebrem adeo foeda erat, ut nullus effet
„ ferendo „. Atqve hinc colligitur, qvam
parum pathognomicum sit indicium BAGLIVIANUM. In tanta ergo incertitudine signorum diagnosticorum si nihil uspiam nostris votis fecerit satis, nihil jam reliquum erit, qvam ut postremo omnium experiamur.

§. 32.

8. *Juvantia ac nocentia*, atqve a posteriori, ut ajunt, diagnostin, qvoad ejus fieri possit, obtinere satagamus Eapropter si fluor albus ad omnia qvæque rebellis antivenereis tandem remediis, ac vel maxime mercurialibus, expugnari se se patiatur, successus hic suspicionem gonorrhœæ ex haætenuis allatis indicis conceptam efficiet probabiliorem. Sic ubi apud J. STORCHI

UM (*i*) mulieri 40 annor. per aliquot menses leucorrhœam cum catameniis alternantem passæ tam acrem, ut eam excoriariet, duo quoque ulcera ad muliebria, & in inguinibus tubercula orta essent, aliis non juvantibus, & li salivatione adhibita sanitas rediit. Qvod si vero antivenerea hac methodo multum quidem emendatus, at non prorsus expugnatus, fuerit morbus, signum esse ait ASTRUC (*k*), leucorrhœam veram cum gonorrhœa syphilitica fuisse complicatam, ita ut, isthac antivenereis sublata, illa persistet porro, Verum non desunt etiam, quæ contra postremum quoque hoc diagnosticum signum, licet a posteriori petitum, pugnare videantur, nempe posse fluorem album esse venereum, quin se se antivenereis remediis profligari ex facili sinat, velut in POMMEI (*l*) syphilitica accidit, & posse ipsam leucorrhœam veram iisdem remediis abigi, quin quidquam labis venereæ eidem sit adspersum, Etenim

(*i*) Obs. clinic. ann. I. Januar. class. 3. №. 7.
p. 10.

(*k*) I. c.

(*l*) Vide §. 30.

si A. PITCARNIO (*m*) fidem habeas „ non
„ opus est (inqvit ille) distingvere inter
„ fluorem muliebrem Gallicum & non
„ Gallicum; cum raro (secus ac in viris)
„ possit fluor albus tolli, etiam si virulen-
„ tus non sit, nisi remediis lui Gallicæ
„ propriis „. Et ex ingenti remediorum
hic laudari solitorum farragine non alia esse
pronunciat efficacia, quam cathartica ite-
rata, ♀lia, Gvajacum, Sarsaparillam, tere-
binthinam, &c. Sed quemadmodum verum
est, ♀lia ceteraque antisyphilitica in vera
etiam ac simplici leucorrhœa haud raro
egregie prodeesse, ut suis postea locis (*n*)
dicetur: ita universim longe est falsissimum,
solis his antivenereis quamlibet leucor-
rhœam profligari posse, ut singula curationis
capita percurrenti uberioris deinceps patebit.
Sufficerit hic unum duntaxat id genus ca-
sum J. STORCHII (*o*) in medium attu-
lisce, qui simul ambiguatem diagnoseos a

(*m*) Element. medic. L. 2. C. 27.

(*n*) Vide §§. 49. 50.

(*o*) Von Weiberkrankheiten 8 Band cas. 27. P.

materiæ qvalitate (*p*) petitæ egregie ostendit, nempe mendicæ 50 annorum, cœlibi, sanguineo-melancholicæ, menses, ubi postremis annis uberrime fluxissent, demum sublstantes leucorrhœam causarunt fere continuam, ac tam acrem, ut præ excoriatione qvandoqve vix ambulare posset. Data remedia:

R. Effent rosmarin.

— millefol.

— lign. saffasfr. aa 3jß.

TRæ ♂ ii 3j. M. D. mane & a meridie gtt. 30; vesperi autem sumat e ♂ offis sepiæ 3ß semper ad cultri cuspidem. Ex horum usu leucorrhœa brevi prorsus defuit, nec deinceps revertit. Id unum interea hic tamen certum est, ne a posteriori qvidem petitam hanc diagnosin eam esse, qvæ omnem veram inter ac syphiliticam leucorrhœam ambiguitatem submoveret.

§. 33.

Cum itaqve singula comparativæ hujus diagnoseos capita nihil certitudinis adferant, conandum est, ut ne ullum eorum in exa-

(*p*) Vide §. 27.

mine ægrarum prætereatur; qvod enim singula seorsim non promittunt, id omnia, aut plurima eorum saltem, simul sumpta majori cum probabilitate determinabunt. Qvam parum autem singulis seorsim diagnosticis illis characteribus probabilitatis infit, documentum dabit seqvens s. SCHAARSCHMIDTII (*q*) luculentus gonorrhœæ venereæ casus, in qua plura aderant phænomena leucorrhœæ veræ qvam syphiliticæ propria. Nempe matronæ 32 annor. teneræ, sanguineæ, post crebras in infantia narium hæmorrhagias semper abhinc sanæ hilariqve qvinto decimo ætatis anno prima catamenia citra ullam molestiam erupere, ordinateqve postea sub mobili hilariqve vita fluxere. Nono decimo vitæ anno nuptui data intra 6 annos 3 proles sanas fortesqve est enixa. Anno 27^{mo} alterum nubens paucis post hebdomadis leucorrhœam sensit, in qvinque annos durantem cum sterilitate. Profluvium initio leve, indolens, & sine ullo symptome, fuit (*r*), nec nisi catamenia diebus

(*q*) l. c. p. 90. sqq.

(*r*) Poterat ergo crebriori veneris usui imputari.

Confer §. 14. 26. 28.

aliquot cum præcessit, tum subsecutum est
(s): idcirco toto anno neglectum. Sed
ubi largius, licet absqve ægritudine, ma-
nare cœpit, qvod sterilitatis causa esse vi-
deretur, ægra opem qvæsivit. Itaqve de-
tractus e brachio sanguis, data sanguinem
depurantia, balnea bis per hebdomadem
imperata, & proximo ante menses instantes,
qui ubertim semper fluebant, sextiduo bis
qvotidie datus ḡ temperans albus, & ve-
speri 15 pilulæ STAHLL. Verum cum
per qvadrimestre sub limitata diæta morbus
ab his non superaretur, ægra medicationis
pertæsa menses aliquot remediis abstinuit.
Sed aucto admodum fluxu cum virium cor-
porisqve extenuatione varia rursus, at in-
cassum, usurpavit. Fluxus continuus erat,
nisi qvod fluentibus catamenii evanescere
visus, ubi illa desiere, denuo apparuerit (t);
materia muco simillima nec acris erat, nec
excorians (u), nisi interdum, ubi flave-
scens magis dolentem creabat pruritum cum
levi excoriatione (x), id qvod tamen ca-

(s) Confer. §. 16. 31.

(t) En fallens BAGLIVI criterion (§. 31.)!

(u) Confer. §. 27.

(x) Confer. §. 4. No. 2, d).

thartico ita semper cessit, ut simul uno alterove die profluvium parcus fuerit. Aderat præterea anorexia, a pastu stomachi pondus, aliaqve dyspepsiæ incommoda. Data igitur uterina mundantia balsamica, & aliquo post tempore impendebatur opera ad lenem sudorem, ad qvem ægra, ob horripilationes pene continuas hactenus, nulla ratione inclinabat, qvovis mane prolicendum, ut sic averfis ab utero humoribus iste interea pristinum recuperaret robur, datis nimirum ter qvotidie hunc in finem MRæ ex effent. menthæ, rosmarini, ac TRæ Catechu æqvis partibus conflatæ gtt. 50, & vesperi ᷄ e corall. r. ppt. nitri pur. aa gr. viij, ᷄ ii diaph. ᷄ lis & croci ᷄ ᷄ ti aa gr. ij. mistis. Sub sudore, et si ægre admodum, tamen post 10. 12 ve dies ab hac medicatione apparente leucorrhœa minuebatur, donec demum pene ex toto desit. Menses ordinatissime fluxere. Nihilo tamen secius ægra nec viribus nec habitu corporis proficiebat; accessit multo potius crurum gravitas, & inter scapulas suspectum erupit exanthema cum rheumatico capitis artuumqve dolore in noctem præsertim ingravescente. Suborta hinc venereæ luis suspicione, qvamvis matrona ejus sibi haud esset

conscia (y), datum qvoqve mane saturatum decoctum lignorum, post qvod balneum qvotidie ingressa est, ab eoqve in lecto sudabat; vesperi dabatur $\ddot{\sigma}$ is e lap. 69. milleped. aa gr. viij. ♀ dulc. gr. ij, & 4^{to} qvoqve die hujus in locum 15 pilulæ balsamicæ: potui serviebat ptifana e rad. saponar. & liqvirit. affatim haurienda; in cibum vero præter jus tenue ac bis coctum panem affa caro maximam partem concessa. Sub horum usu marito ei interdictum. Mox per principia hujus curationis exanthema venerèum in fronte dorsoqve emicuit, ac 3 hebdomadum spatio sub eadem cum istud tum cetera qvoqve symptomata sunt profligrata, viribus corporisqve habitu insigniter recuperatis (z). Verum post 4 fere menses rediit leucorrhœa, materia nunc admodum acri profluente; cuius tandem genuina causa est detecta, nimirum maritus anno ante nuptias malignam ac diuturnam gonorrhœam est perpeffus, qvæ etiæ ante easdem prorsus curata videbatur, ab illo tamen tempore homo semper ex intervallis stillicidium qvodam materiæ jam albæ jam flavescentis **ex**

(y) Confer. §. 26.

(z) Confer. §. 32.

urethra experiebatur, qvod tamen ob par-
citatem flocci fecit. Porro nonnunquam,
præsertim ubi a generoso potu incauisset,
ingvinum glandulas aliquatenus tumescere
sentiebat, cum molesta qvadam in faucibus,
qvarum uvula ac tonsillæ rubræ mucoqve
obsitæ deglutitionem tardabant, sensatione,
doloresqve vel capitis vel crurum acerbos,
maxime noctu, qverebatur. Qvæ tamen
symptomata nunquam fuere diurna, &
vel sponte vel usui cathartici aut diaphore-
tici cedebant. Cetera nec appetentia, nec
vires, nec valetudo alioquin qvidquam pa-
tiebantur. His cognitis ubi cum vir tum
uxor prius memoratis remediis (decocto,
balneis, ac ♀ io dulci) 4 hebdomades rite
vacaffent, leucorrhœa plane desiit, ac ma-
trona anno post filium est enixa.



C A P U T VII.

P R O G N O S I S.

§. 34.

i. *Diuturna plerumqve est leucorrhœa,*
 & sœpe ad optima qvæqve remedia *contumax*, qvalis puellam FERNELII (*a*), anum FORESTI (*b*), ceterasqve BERTRAMI (*c*), LANZONI (*d*), POLZERI (*e*), RIVERII (*f*), STÖRCKII (*g*), ac Vratislavien-sium (*h*) ægras afflixit : qvæ eo etiam esse consuevit pertinacior, qvo magis in vetustatem incidit. Variæ durationis exempla in historiis medicis videre est: complures menses durantem leucorrhœam referunt BLASIUS (*i*), COCKSEN (*k*), HOFFMANNUS (*l*), IACOZ (*m*), JUCH (*n*), NES-

(a) Vide §. 6.

(b) Vide §. 62 a).

(b) Vide §. 35 A. b).

(i) Vide §. 35. B. e).

(c) Vide §. 58 No 2. e).

(k) Vide §. 71.

(d) Vide §. 38. e).

(l) Vide §. 70.

(e) Vide §. 55. a).

(m) Vide §. 44.

(f) Vide §. 44.

(n) Vide hist. 7:

(g) Vide §. 48 c) &
§. 55 a).

TERUS (*o*), RÜCKERUS (*p*), ac SCHAAAR-SCHMIDT (*q*); ultra annum detinuit feminam GRÜLINGII (*r*); STÖRCKIUS (*s*) cum NIZETO (*t*) biennium excedentis meminit; triennio molesta fuit conjugi Medici Varsaviensis (*u*), & ultra hoc duravit in JENSENII (*x*) vidua, & SCHENKBECHERI (*y*) agra, quadriennem porro sustinuit ALIXII (*z*) femina, sexennem femina QVARINI (*a*), septennem BURTONI (*b*) matrona, & STÖRCKII (*c*) femina, novennem textoris uxor apud MURALTIUM (*d*); ultra decennium protractam curavit STÖRCK (*e*), II annos uxor figuli apud FORESTUM (*f*) cum eadem est confictata, 13 annis GEHEMÆ (*g*) matronam, 3 integris lustris feminam STÖRCKII (*h*) vexavit, imo vicenis amplius annis durantis

(*o*) Vide §. 61. a).

(*p*) Vide §. 6.

(*q*) Vide §. 18. d).

(*r*) Vide §. 74.

(*s*) Vide §. 55. d).

(*t*) Vide §. 71.

(*u*) Vide §. 18. g).

(*x*) Vide §. 37.

(*y*) Vide §. 55. d).

(*z*) Vide §. 58 No. 2.e).

(*a*) Vide §. 55. a).

(*b*) Vide §. 35 B. d).

(*c*) Vide histor. 10.

(*d*) Vide §. 35 A. d).

(*e*) Vide §. 55. a).

(*f*) Vide §. 38. g).

(*g*) Vide §. 70.

(*h*) Vide §. 55. a).

BOETTICHER (*i*), & ROST (*k*) historias dedere. Complurium quoque annorum fuit, quam perpeſſæ ſunt ægræ ALBRECHTI (*l*), HEISTERI (*m*), KRAPFII (*n*), NEUHOLDI (*o*), RIEDLINI (*p*), SCHAARSCHMIDTII (*q*) SCHAEFFERIque (*r*). Cauſas hujus diuturnitatis in tria potiſſimum rejicit F. HOFFMANNUS (*s*), nempe in Medicos morbi cauſam in ſolo humorum vitio, non item in uteri atonia, diſculter admodum emendanda, quærentes, in prætervisam ab iisdem digeſtionem laſtam, ac deniqve in ipſas ægras, quod initia morbi negligant, nec poſtea etiam legitimæ diætæ ſint pa- tientes.

§. 35.

2. *Efficit leucorrhœa mala varia, quæ profluviij qua ubertati qua acrimoniæ debentur. Enim vero*

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (<i>i</i>) Vide §. 35 B. d). | (<i>o</i>) Vide §. 35. A. f). |
| (<i>k</i>) Vide §. 37. | (<i>p</i>) Vide §. 57. No 2. |
| (<i>l</i>) Vide §. 35. B. g). | (<i>q</i>) Vide §. 37. |
| (<i>m</i>) Vide §. 50. | (<i>r</i>) Vide §. 69. |
| (<i>n</i>) Vide §. 55 a). | (<i>s</i>) l.c. curat. §. 12 |

A.

A. *Ubertas genitalia macerans, humorumque simul requisitam ad circulationis integritatem copiam insigniter minuens, post se trahit*

a) *Vulvæ vaginalaque amplitudinem cum nimia lubricitate, virofoque fœtore; propter quæ, ut recte P. FORESTUS (t) notat, uxor a viro fastiditur.*

b) *Uteri, vaginalis prolapsus.* „ Qui-
„ busdam etiam uterus ipse, inquit AETI-
„ US (u), procidit, ut usque ad muliebre
„ pudendum progrediatur, ut vetulæ cuidam
„ Delphensi longo tempore albo fluxu labo-
„ ranti, accidisse P. FORESTUS (x) refert.
Sic etiam B. SILVATICI (y) matronæ 8
annos continua fere, nec menses tamen
nec conceptum impediente leucorrhœa labo-
ranti, & a biennio jam biliosas in vulvæ la-
biis pustulas perpeffæ, post bimestrem ad la-
tera ossis sacri primum, mox inde ad læ-
vam coxam toleratum dolorem, uterus de-
repente prolapsus est ad labia vulvæ, cum
pondere in pube, conatu ac difficultate me-

(t) Obs. & cur. med. L. 28. Schol. ad Obs. 23.

(u) Tetrab. 4. Serm. 4. Cap. 65.

(x) I. c. Schol. ad Obs. 20.

(y) I. c. Cent. 4. No 19.

jendi, alvumqve reddendi, atqve dolore illo coxae lœvae, noctu præsertim ac jejunio stomacho invalecente, freqventiqe intra vulvam lacinante morsu, vigiliis, & calido halitu ex utero erumpente. Similis etiam uterini prolapsus incompleti ab leucorrhœa casum videre est apud P. J. BUCHOTZ (z). Graviorem hujus commatis casum H. A. SCHAEFFER, ut apud J. F. HENCKELIUM (a) videre est, observavit. Gravissimus vero est, qvem P. A. BOEHMERUS (b) descripserat, nempe: „virgo cachectica 30 „annorum per plures annos laboravit fluore „albo benigno, succedente ipsi prius pro- „lapsu uteri incompleto, postea vero com- „pleteo facto. Dedecus sibi metuit a chirur- „gorum auxilio, forsan ex verecundia... „Hinc nulla alia a Medicis sibi expetiit me- „dicamenta, qvam evacuantia, purifican- „tia, & qvæ specificam habere dicuntur „virtutem in fluore albo. Contigit vero „causa mali minus cognita infelix curatio,

(z) Neuste Heilkunde 8 Haupft. No 1. p. 147. sqq.

(a) Vide §. 69.

(b) Diss. de prolapsu & inversione uteri, ejusqve
vagina relaxatione Resp. F. B. WACHTER 4to
Halæ 1745. Præfam. p. 4. sq.

„ & tristis rei eventus. Sectione post mortem instituta partes fere omnes sanas, „ præter inflammationem uteri ejusque prolapsum completum, invenimus. Magnitudo hujus prolapsus extra genitalia erat instar capitis foetus, pars superior ejus admodum constricta, inferior in circulum majorem expansa & valde rugosa, orificium uteri ita angustum, ut vix ac ne vix quidem acu in cavitatem uteri penetrare potuerimus. Ligamenta non disrupta sed relaxata nimis, pelvis ampla & rotunda, vesica urinaria lotio, & intestinum rectum scybalis induratis, repleta, partesque omnes inferiores inflammatae observabantur.

c) *Abortiendi proclivitatem.* Pulchre hac de re pro more suo Ill. STÖRCK (c): feminæ (inqvit), si non integre currentur a fluore albo, anteqvam nubant, admodum proclives sunt ad abortiendum. Et 2do 3tio ve graviditatis mense sentiunt materiem ex utero prodire, qvæ loturæ carnis similis est; paulo post prodit sanguis crassior, dein excernuntur grumi, tandem post multos dolores & tenesmos seqvitur

(c) Ann. med. 2. p. 214, sq.

„ abortus. Si tunc acre in uteri vasis stan-
„ gnans aptis medicamentis aut balneis non
„ tollitur, & si femina iterum concipit, ma-
„ net eadem abortiendi dispositio: motus
„ violentior, ira, & nimia corporis agitatio,
„ plerumque causæ sunt abortum excitantes.
„ Potest tamen fœtus & in similibus casibus
„ quandoque ad maturitatem deduci, si
„ omnes causæ irritantes, quantum possibile
„ est, evitentur, si alvus servetur libera,
„ quod commode fieri potest, si omni vespe-
„ ra ex ḫe (Rx. Scammon. 35 ḫ antispas. m.)
„ Dispens. Vienn. 3ij Magn. nitr. 35 M. f.
„ ḫ vel j in leni emulso assumatur; &
„ si nimia uteri irritatio advertitur, si oriun-
„ tur spasmi aut tenesmi, tunc illico pare-
„ goricis, opiatibus, & quandoque leniter ad-
„ stringentibus succurrentum est. Tales au-
„ tem feminæ pariunt plerumque infantes
„ crassos, pingues, robustos, & hi tales
„ manent per plures menses; postea vero
„ emaciantur, laffi fiunt, & membra pen-
„ dula gerunt: tandem subseqvitur pessima
„ rachitis, quæ raro hucusque sanari
„ potuit. Perinde ad abortus pronas LEN-
„ TIN (d) observavit, quæ ex lactatione ne-

(d) Vide §. 18. b).

glecta leucorrhœam contraxerunt. Neque aliud evenit „ matronæ , (cui) ab utero con- „ tinuo humiditates effluebant, ita ut hanc „ ob causam sterilis permaneret, & si con- „ ciperet, ad felicem partum non veniret,, narrante P. FORESTO (e). Haud secius RAULINI (f) mulier 26 annor. menstrua extra graviditatem ordinata habens, ob copiosam, qva laboravit, leucorrhœam quater ex ordine abortiit; sed illa curata quintum imprægnata feliciter justo tempore robustam enixa est puellam. Id ipsum etiam matrona quædam apud B. SILVATICUM (g) experiebatur. Cum autem abortus gravidarum haud raro periculosi sint, ideo etiam teste RAULIN (h) „ leucorrhœæ gravidis præ- „ fertim periculum intentant, ubi jam prius „ invaluere, quo in statu non modo non „ semper cessant, verum sæpe inde auge- „ scunt etiam usqve adeo, ut non raro per- „ ire matrem cum fœtu ab iis viderit „ . Qvod seqvens ejus comprobat casus (i):

(e) l. c. Obs. 20.

(f) l. c. T. 2 P. 3. S. 1. C. 3. p. 35.

(g) l. c. Cent. 4. No 57. p. 342.

(h) l. c. P. 1. S. 1. C. 1. p. 8.

(i) l. c. T. 1. P. 2. S. 1. C. 7. p. 322.

femina 30 annor. tenera, curas egestatemque experta, leucorrhœamque plurium annorum sat uberem post novissimum partum multo etiam uberiorem passa, atque in 3^{um} mensem gravida, emaciata, valetudinaria, febriculam lentam tolerans, cum morbus in dies cresceret, ac leucorrhœa cum intollerando fœtore uberrime procederet, 6^{to} mense abortiit, & 8^{vo} post die vivere desiit. Sunt tamen, quæ legitimo tempore vitales sanosque edunt fœtus, ut SCHAEFFERI (*k*) ægra. Perinde B. SILVATICI (*l*) matronæ 20 annor. a biennio fere materia albicans e muliebris continenter fere prodiens non impeditiebat, quin rite pareret. Alia (*m*) Comes 32 annorum post varia valetudinis incommoda in leucorrhœam 19 annorum lapsa, effluente materia copiosa, subviridi, fœtida, cum anxietate, syncope, palpitatione, jactigitatione, dyspnœa, spasmoque, nihilominus peperit justo tempore. Quemadmodum etiam (*n*) hysterica alia matrona leucorrhœa 4 annorum laborans eodem, ta-

(*k*) Vide §. 69.

(*l*) I. c. Cent. 1. No 7. p. 8.

(*m*) Ibid. Cent 4. No 24 p. 316.

(*n*) Ibid. No 15. p. 307.

„ men tempore concepit, & feliciter par-
 „ tum edidit „. Haud secius J. STOR-
 CHII (o) juvencula leucorrhœam ali-
 qvot annis paffa , alterum nihilominus
 grava , tempore justo feliciterqve pepe-
 rit. Meminit etiam puellæ 15 annorum leu-
 corröhœam paffæ , qvæ nihilominus nupti
 data 6 proles enixa est (p). Narrat casum
 pariter J. G. HENTRICH (q) feminæ Ciza-
 næ , qvæ ante plenariam pubertatem coitum
 paffa , anno 14^{to} nupta , leucorrhœam nacta
 est , sub qva tamen imprægnata „ decenti
 „ tempore infantem bene factum exclusit,
 „ qvum tamen per totum gestationis tem-
 „ pus fluor albus perduraverit „. Ita &
 v. RIEDLINUS (r) „ novit qvamdam , qvæ
 „ post primum statim partum hoc fluore cor-
 „ repta brevitamen post denuo concepit , &
 „ licet hoc malum tantum non per totum
 „ gestationis tempus sat vehementer instite-
 „ rit , filiolum nihilominus sanum & incolu-
 „ mem enixa est ; qvin imo , licet postea
 „ nulli remedio omnino cesserit dictus fluor,

(o) Obs. clinic. ann. 1. Jan. Cl. 2 No 8. p. 10.

(p) Von Weiberkrankheiten 2 Band, casu 48, p. 209.

(q) Diff. cit. §. 16.

(r) Lin. med. ann. 1. Decembris 22. p. 449.

„ plures adhuc fœtus cum priori convenient,
 „ tes justo tempore edidit. Novit aliam,
 „ qvæ truſtra in hoc morbo qvam plurima
 „ in uſum traxerit remedia a variis &
 „ doctissimis præscripta medicis, & hæc ta-
 „ men, licet fluore vel maxime instantे
 „ gravida facta fuit, & filiolam peperit, de
 „ qva in hunc uſqve diem haud parum
 „ gaudet. Qvibus plures adhuc addere poſ-
 „ ſem (ſubjungit Auctor), ſi opus eſſe cre-
 „ derem,. Sed ſimilia fieri interdum jam
 ante E S T Ö R C K I O vidimus, atqve hujus-
 modi feminis e vaginæ vafis tantummodo
 leucorrhœa ſcaturire forte videtur, ut paulo
 poſt dicetur. Interēa vero cum aliis abor-
 tus facile accidunt, aliis

d) *Sterilitas* etiam omnem prolis ſpem
 adimit; etenim teste HIPPOCRATE (s)
 „ qvæ frigidos & denuſos habent uteros, non
 „ concipiunt, neqve qvæ præhumidos ha-
 „ bent; ſi qvidem in iſpis genitura exſtingvi-
 „ tur,. Et alibi (t): „ ſi uteri lubrici fue-
 „ rint... mulier utero non concipit,. Cu-
 jus ſententiæ veritati plurimæ obſervationes
 ſuffragantur. R. a FONSECA (u) matronæ

(s) Seſt. 5. aphor. 62.

(t) De iis, qvæ uterum non gerunt. fol. m. 675.

(u) l. c. T. 2. Cohſult. 52.

Venetæ meminit , qvæ ubi primum fœtum abortiisset, per 4 deinde annos ob leucorrhœam sterilis mansit. Idem plures apud B. SILVATICUM sunt expertæ , qvarum una (x) matrona 35 annor. post primum partum cum in crebrum humoris albi , viridis, & lividi fluxum incidisset cum mensium immunitatione , igitravia ad venerem , & cachecticis symptomatibus , sterilis simul est effecta. Altera (y) Comes ex abortu leucorrhœam 11 annorum nacta est , a qva in melancholiam hypochondriacam , palpitationem cordis, sterilitatem , ac tabescentiam incidit. Tertia (z) matrona perinde ex 10 annor. leucorrhœa lassitudinem , febriculam lentam , ac sterilitatem contraxit. Ita etiam narrante J. MÜRALTO (a) , textoris S. uxori 23 annorum „ inordinate cibo & potu a longo tempore „ usq; triennium integrum sterilis in matrimonio vixit. Inde vero a pubertate 9 „ annis continuis albo fluore tentata est. „ Tandem adhibitis medicamentis variis „ concepit. Mox primis mensibus usq; ad

(x) I. c. Cent. 3. No 21. p. 216.

(y) Ibid. Cent. 4. No 20. p 311.

(z) Ibidem No 29. p. 320.

(a) Misc. nat. cur. dec. 2, ann. 1. obs. III.

„ medium gestationis terrore, tristitia, me-
 „ tu, & tantum non desperatione agitata
 „ fuit, ita ut solitudinem amaret, & in
 „ idem objectum defixa cogitatione delira-
 „ ret. Præterea uteri inflationes perpesta est.
 „ Demum edidit puerum, qvi cum per menses
 „ 9 superstes vixisset, convulsionibus epi-
 „ lepticis nuper correptus interiit,. Huc
 pariter sunt referendæ steriles BERTRA-
 MI (b), GEHEMAE (c), HEISTERI (d),
 LOTICHII (e), MÜNNICHII (f), THE-
 VARTIQUE (g). Interea tamen sèpenum-
 ro id genus ægrotæ & concipiunt, & legi-
 timo tempore pariunt, ut paulo superius
 (h) vidimus; imo v. RIEDLINUS (i) te-
 statur, „ plures sibi hoc malo affectas curan-
 „ das obtigisse, qvæ fœcundæ, qvam qvæ
 „ steriles fuerunt,. Qværi itaqve haud abs-
 re potest, qvi fiat, ut non omnes leucor-
 rhœa affectæ sint steriles, siqvidem hæc ex
 iisdem vasis, unde catamenia, scaturiat?
 Sed recte hujus diversitatis causam omnem
 HENTRICH (k) a sola leucorrhœæ sede

(b) Vide §. 58 No 2. e). (g) Vide §. 36. e).

(c) Vide §. 70.

(b) Vide præced c).

(d) Vide §. 50.

(i) l. c.

(e) Vide §. 70.

(k) l. c.

(f) Vide histor, 6,

pendere existimat, ita ut si scaturigo fluoris albi sola sit vagina, leucorrhœa nihil conceptum partumve legitimum morari queat; sin vero illa vel uteri fundum vel tubas vel ovaria tenet, sterilitas conseqvatur: in ovario enim genesis ovuli, in tuba arrestio sub coitu (& qvæ ab hac pendent), in uteri fundo ovuli ad eumdem adhæsio, &c. impeditur. Ex his autem simul elucescit, ne in hisce qvidem singulis semper sterilitatem esse inevitabilem, sed posse etiam tunc aliquando conceptum fieri, ut si v. g. unius tantum lateris vel ovarium vel tuba, &c. sedes fit ac fons leucorrhœæ.

e) *Sensuum vitia*, ob inanitionem va-
forum. Sic oculorum caliginem aliaqve en-
cephali mala ab uberiore leucorrhœa tribus
in feminis observaverat RIEDLINUS (l).
Neqve aliorum, opinor, pertinet observa-
tus ab J. de MURALTO (m) casus, tametsi
ille eum regurgitationi fluoris albi ad caput
imputet; videlicet „femina pastoris 45 an-
„norum per triennium ægrotabat, datis ta-
„men induciis, magnus capitidis dolor ad-

(l) Vide §. 57 No 2.

(m) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 7. obs. 107. p. 170.

„ erat versus cervicem , retro aures & ca-
 „ rotides : malum hoc primitus auditum
 „ ei abstulit , visumqve debilitavit ; falsus
 „ & acris humor lingvam petebat , maxime
 „ cum se inclinaret : comedebat , dormie-
 „ bat , paroxysmus per 3 & 4 hebdomadas
 „ durabat , fluore albo laborabat , qvæ ma-
 „ teria ad caput debile & nervos regurgita-
 „ bat ; vulva ardebat ; multos habuit ructus.
 „ A 12 annis defecerunt menstrua . Facta
 „ totius provisione præscripsit diaphoret.
 „ mart. cum tremor . ♀ & facch. item Ω
 „ Θ* cum TR^a croci , meliusqve habuit „
 Efficit porro ubertas hæc

f) *Cachexias* variæ. Omnis enim im-
 moderata evacuatio eas post se trahit , qvid-
 ni ergo & leucorrhœa ? Hydropem ex ea
 ortum FORESTUS (n) vidit , cachecticum
 habitum cum variarum functionum læsione
 RAULIN (o) , SILVATICUS (p) &c. Leu-
 corrœæ an alii causæ tribuenda est lactis
 alteratio , de qua J. J. NEUHOLD (q) ?

(n) Vide §. 38. g).

(o) Vide §. 75.

(p) Vide §. 35. A. d).

(q) Commerc. Norimb. T. 4. A. 1734. hebd. 1.
No 1. p. 2.

„ Vivit hic loci (narrat ille) nobilis qvæ-
„ dam femina annos circiter duo de qua-
„ draginta nata , temperamento sangvineo
„ cholericō , atqve corporis textura graci-
„ liori prædita. In matrimonio 20 comple-
„ vit annos , mater aliquot liberorum facta;
„ nunc autem in triennium fere vidua vitam
„ agit & ratione sanitatis & aliarum rerum
„ sat tolerabilem. Alioquin mensium fluxu
„ immodico , præcedente semper aliquot
„ diebus fluore albo a multis retro annis,
„ sine ullis tamen aliis molestiis , laborat.
„ Et qvod mirum ... ex utraqve mamma
„ lustris fere abhinc duobus liqvidum ali-
„ qvod spissius , coloris longe nigerrimi ,
„ qvotiescunqve vult , exprimere potest ,
„ qvod lnteamine exceptum intra spatum
„ 24 horarum ad instar æruginis viride eva-
„ dit , simulqve (ut videtur) naturam cor-
„ rosivam induit. Qvotiescunqve autem la-
„ ctavit , sanissimum lac prolibus fugentibus
„ præbuit , neqve hujus phænomeni ullum
„ vestigium , sicut alias intermedio tempore ,
„ apparuit .,. Denique

g) *Acrimoniam* sæpen numero uberior diu-
turniorve leucorrhœa tantam sensim consci-
scit humoris profluenti , ut benignus initio
morbis in malignum demum abeat , qvem-

admodum superius (r) hac de re pluribus actum est. Hæc autem

B. *Acrimonia* novos producit effectus prioribus multo deteriores, qvorum præcipui sunt

a) *Excoriatio* uteri, vaginæ, vulvæ, femorumqve velut in casibus BEHRII (s), BÜCHNERI (t), BURGGRAVII (u), QVARINI (x), RIEDLINI (y), pluribusqve STÖRCKII (z) videre est.

b) *Inflammatio* facile in gangrenam letalem abiens, cuius terna suppetunt exempla. J. B. MORGAGNIUS (a) refert historiam puellæ 14 annorum post colicos dolores, procul dubio leucorrhœæ, qva labravit, tribuendos, mortuæ, cuius,, ventris,, viscera hic illic tuberculis erant inæquavalia; omentum autem crassissimum fundo uteri adhærebat. Hic vero etiamtum erat valde parvus, qvalis videlicet puerilam deceret, qvam, si pubem spectares, pilis vix ullis instructam, necdum plane puberem posses dicere. Cum incidissim

(r) Vide §. 4. No. 2. d). (x) Vide §. 55 a).

(s) V. de §. 36. f).

(y) Vide §. 57 No. 2.

(t) Vide §. 43.

(z) Vide §. 55. a).

(u) Vide §. 45 No. 1.

(a) I. e. No. 14.

„ (ait), fundi cavum, inveni humida mate-
 „ ria plenum ex albo in flavum & subviri-
 „ dem colorem vergente: qva detersa fun-
 „ di interior facies apparuit in minuta al-
 „ bida tubercula passim excrescens. Porro
 „ nulla osculi uterini corona protuberabat,
 „ ipsumqve & proximam vaginam, & infe-
 „ riorem qvoqve hujus partem & hymen-
 „ nem phlogofis tenebat; ut facile esset
 „ conjicere, a fluidiori acrioriqve materiæ
 „ illius parte defluente inferiora fuisse irri-
 „ tata, dum crassior in decubentis vir-
 „ gunculæ utero subsistens minutis illis ad-
 „ hærebat tuberculis, qvæ aut ipsa effe-
 „ rat, aut e qvibus fortasse prodierat „.
 Apud T. BONETUM (b) uteri excoriati
 inflammatiæ cum vaginæ gangræna casum
 J. de MURALTO in hæc verba refert:
 „ Anglæ qvinqvagesimum jam agenti æta-
 „ tis annum menstrua octennio ante fluere
 „ cessarunt, nunc inde ab anno redeuntia,
 „ sed inordinate. Per 3 menfes fluore cor-
 „ ripitur albo, copioso, summaqve cum
 „ virium debilitate, sensim aucto adeo, ut
 „ stanti ambulantiæ semper invitæ qvid
 „ destillet. Acrimonia humoris abditi na-

9

(b) Sepulcr. anat. L, 3. S. 36. Obs. 1, §. 1.

„ turæ loci multum erodebantur, urinaqve
„ suppressebatur: inde grumi sangvinis
„ prodierunt ingenti cum dolore, præsertim
„ in hypochondriis; alvus per dies 5 conti-
„ nuos adstricta erat. Adhibita autem in-
„ cassum fuerunt . . . pharmaca. Tandem
„ supervenientibus intolerabilibus circa pu-
„ bem & anum cruciatibus & vomitu ma-
„ teriæ biliosæ mortua est. Dissecto post
„ mortem cadavere seqventia notavimus:
„ 1) Omentum tenue sine pinguedine; 2)
„ ventriculum magnum ac valde capacem,
„ biliosi humoris plenum, interne ruben-
„ tem, & multis quoqve glandulis conspi-
„ cuum; 3) intestina tenuia in ingvine si-
„ nistro contracta penitus, & crassa tum
„ flatibus tum duris excrementis distenta;
„ præterea variis in locis veluti occlusa;
„ 4) pancreas cinerei coloris, durum tactu;
„ 5) lienem coloris nigricantis; 6) hepar
„ pallidum, ad flavedinem biliosam ver-
„ gens, nec sanguineo rubore tinctum: 7)
„ hujus vesiculæ copiosa bilis inerat. 8)
„ Glandulæ in regione lumborum plures,
„ conglobatae, atqve aliæ prope uterum,
„ valde duræ erant, humorem crassum, se-
„ baceum, flavescentem, & puri analogum
„ ex se fundentes, quo & vasa lymphati-
„ ca distenta turgebant. 9) Venarum san-

„ gvis

„ gvis tenuissimus fuit, sero multo dilutus.
„ 10) Cordi polypus erat. 11) Pulmones
„ sani. 12) Ren sinister duplice cavitate pel-
„ vim efformante præditus. 13) Vesica
„ urinaria lotio adhuc turgebat. 14) Ute-
„ rus arcte undique partibus vicinis adhæ-
„ sit, fundo ejus cum recto intestino vesi-
„ caque urinaria unito. 15.) Circa testicu-
„ los utroqve in latere hydatides sat ma-
„ gnæ conspiciebantur, lympha turgentes
„ insipida. Ipsi testiculi purulenti & ulce-
„ rati fuerunt; nec tubarum processus rite
„ apparuit. Liqvor in arteriam spermati-
„ cam injectus omnia uteri & vaginæ vasa
„ implevit, indeqve levi compressione cum
„ ex utero tum e vagina manavit. Ute-
„ rus magnus erat, intrinsecus rubeus, ex-
„ ulceratus, excoriatus, pure farctus, in-
„ que sinistrum magis latus inclinans. Ul-
„ cus extra uteri pomœria in vicinam quo-
„ que vaginam serpsit; nam ista quasi gan-
„ græna tacta prorsus nigricare visa est.
„ Vasa uteri omnia crux turgebant „.
Eiusdem tenoris est casus ab A. STÖRCK (c)
observatus, nempe „ femina 25 annorum

(c) I. e. Cadav. s. p. 244. sq.

„ phthisi, hydrope ventris, & uteri deter-
 „ rimo fluore adeo debilitabatur, ut 4^{to} die,
 „ qvo in nosocomio fuit, interierit. Ma-
 „ teries ex utero prodeuns erat lenta,
 „ alba, subinde granulosa, calcarea, ad-
 „ modum copiosa, neqvaqvam tamen acris,
 „ nec fœtida. Sectione anatomica vidi-
 „ mus pulmones adeo exesos ab acri icho-
 „ re, ut nil nisi membranam crassam, flac-
 „ cidam, exulceratam referrent. In ah-
 „ domine latuit serum copiosissimum, ni-
 „ grum, fœtidum, qvod totum omentum in
 „ frusta consumpsit, & intestina atqve ven-
 „ triculum partim arrosit, partim adeo mol-
 „ lia & flaccida reddidit, ut minima vi in
 „ pultem potuerint conteri. Uterus & ute-
 „ ri vagina videbantur vere gangrenosa;
 „ ovarium autem utrumqve erat pugno vi-
 „ rili majus, tuberosum, durum. Hæc tu-
 „ bera discissa continebant materiam albam
 „ duram, vere cretaçeam; etenim erat fri-
 „ abilis, & cum acidis effervuit. Vesica
 „ ea ex parte, qva uterum & vaginam spe-
 „ ctat, erat qvoqve arrofa, semiputrida „.

c) *Ulceræ* locis excoriatis inflammati-
 que facile generari posse nemo non intel-
 ligit; sed id tantummodo adducere oportet,
 ulceræ hæc adeo prava sæpen numero eva-
 de, ut vicinas qvoqve partes, præfertim ve-

sicam & rectum intestinum, pessum dent,
 vel pus in abdominis cavum eructent. Bi-
 nis id G. BLASIUS observationibus con-
 firmat, nempe (*d*) „ matrona 40 annor.
 „ ex partu laborioso fluore albo laborare
 „ se conqverebatur; dolorificus valde hic
 „ fluxus, nec uniformis semper, cum te-
 „ nuis modo, modo viscida magis exiret
 „ materia, diversi coloris odorisve. Inje-
 „ ctiones hic adstringentes variæ . . .
 „ adhibitæ, ast sine ullo successe: postquam
 „ enim per 14 septimanas misere sic vitam
 „ egit, obiit tandem, exhibuitque . . .
 „ diffecanti uterum omni modo purulentum,
 „ non uno loco materiam, etiam ex fundo
 „ ipso, abdominis cavo communicantem „.
 Idem porro Auctor (*e*) „ aperuit cadaver
 „ mulieris alicujus 30 annor. Fluxu hæc
 „ laboraverat albo jam per 7 menses, qvi
 „ ultimis temporibus gravis admodum &
 „ dolorificus, materiæ fœtidissimæ. Urinam
 „ parce admodum excernebat, nec un-
 „ qvam sine dolore. Diflectus venter ve-
 „ sicolam urinariam offerebat mirum in mo-

(*d*) Obs. med. rar. P. 5. Obs. 3.

) Ibidem Obs. 5.

„ dum distentam , urinæ insigni quantitate
„ repletam , capitis humani magnitudini
„ fere accedebat, ad umbilicalem regionem
„ se extendens , ossium pubis margini fir-
„ miter undique adnata ; incumbebat hæc
„ uteri non solum vaginæ , sed & fundo ;
„ imo pondere suo partem utramque gra-
„ viter adeo comprimebat , ut non rotunda
„ aut saltem leviter protuberans , sed com-
„ planata , imo potius sinuosa observata
„ fuerit . Fundus ipse substantiæ licet debi-
„ tæ , vix a naturali statu recendentis , par-
„ te antica atque postica digiti transversi ,
„ lateralí utraqve duplicis digiti , crassitatem
„ habebat , hinc , ampla valde quamvis ipsi
„ incumbens vesica , extensio ejus tanta ,
„ ut utriusque manus digitis tegi vix va-
„ lcret . Vagina ab extremo pudendi
„ usque ad orificium internum ulcere for-
„ dido affecta notabatur , scatebat hæc ma-
„ teria purulenta summe fœtida , cuius
„ etiam aliqua portio ipso in ventris cavo ,
„ loco eo , ubi vagina dicta intestino recto
„ cohærebat , reperiebatur ; eo quod con-
„ sumpta substantiæ uteri particula materiæ
„ illi concessus fuerit exitus , omnibus lo-
„ cis gravis æque vaginæ bujus exulcera-
„ tio , levior quæ vicina magis orificio ex-
„ terno , gravis quæ interna . Nec tamen ,

„ ab ulcere qvamvis libera magis pars an-
„ tica vaginæ dictæ, alienæ constitutionis
„ omnino expers reperiebatur; duritiem
„ enim hic singularem notabamus, imo &
„ crassitatem, utraqve tanta, ut substantia
„ vix minimi digiti crassitatem habens na-
„ turaliter constituta & pollicum crassitatem
„ superaret, cartilaginosæ fere constituti-
„ onis . . . In latere dextro tuba uterina
„ circa extremitatem eam, qvæ ab utero
„ est remotior & amplior, inflammata valde,
„ toto reliquo corpore purulenta omnino,
„ cavitate omni destituta; purulentus icidem
„ testiculus. In sinistro utraqve pars a
„ statu legitimo notabiliter haud recedebat.
„ In utroqve, loco testibus vicino, corni-
„ bus uteri adhærebat vesica, qvarum dex-
„ tra ovi gallinacei magnitudinem habebat,
„ liqvore gelatinoso; pellucido, subflavo
„ repleta, sinistra vix juglandis, aquosa
„ magis. Ren uterque sero mire extende-
„ batur, forsitan qvod urinæ excretio ali-
„ quamdiu parcius fuerit. Ureteres am-
„ pli icidem. Vesica fellis insignis qvoqve
„ magnitudinis, bile turgida. Hepar bo-
„ næ notæ, pancreas qvoqve. Lienis mira
„ structura, numerum five species, five fi-
„ guram; ille duos exhibebat lienes intime

„ connexos, sic ut non nisi singulari adhisi-
„ bita circumspetione separari potuerint;
„ hæc locis variis incisam substantiam, a-
„ deoqve quasi in lobos quosdam parte ea,
„ quæ ventris anteriora respiciebant, divi-
„ fam. Imo in liene hoc dupli ex cor-
„ pore dicto modo composito appendicula
„ singularis etiam observabatur, quam lo-
„ bum ejus vere nominare licebat. Circa
„ renem siniſtrum nucis moschatæ magnitu-
„ dinem habens globosa occurrebat sub-
„ stantia vasis mire irretita, difiecta hæc
„ lienis substantiæ simillima observabatur.
„ Cordis ventriculum dextrum insignis ad-
„ modum occupabat polypus, tenax valde,
„ albus, fibrosus, extendebat se ad plu-
„ rium digitorum longitudinem in arteriæ
„ pulmonalis interiora. Mediaſtino circa
„ pericardium utroqve latere vesiculæ va-
„ riæ flatu turgidæ adſtabant. In ingvine
„ ſinistro glandulæ, quæ aderant, naturali
„ in ſtatu inveniebantur; aſt quæ in dextro
„ duplicitis juglandis ſimilitudinem referebant
„ externam faciem ſpectantibus, licet val-
„ de inæquales eſſent, difiectæ plurimis ex
„ particulis albiflumis, facile digitis resolu-
„ bilibus, singulari tunica investitis, com-
„ positæ videbantur. Cor, renes, partes-
„ ve aliæ variae maculas exhibebant in tuni-

„ cis se manifestantes, subnigras, linea al-
 „ bicante circumscriptas „. Unde præci-
 pua hic relata mala orta sint, non consta-
 bat; qvia ægra allata jam adeo erat debilis,
 ut vix verbum proferre potuerit: suspica-
 tur tamen auctor, complicationem adfuisse
 labis venereæ, ob multa huic solennia phæ-
 nomena isthoc in cadavere dete&a. Haud
 est dubium, fœdissima ulcera non raro ab
 leucorrhœa syphilitici qvid simul habente
 effici. Sic J. RHODII (f) „ mulier . . .
 „ utero ac intestino recto erosis a fluxu
 „ albo cum lue venerea parte anteriore
 „ feces reddidit, postica lotium „: unde
 mense post obiit. Malignis id genus ulceri-
 bus letalis qvandoqve gangræna superve-
 nit, velut in LAELII a FONTE (g) ma-
 trona, cui e diurna vagis cum dolori-
 bus leucorrhœa, febris demum vesperi
 semper graviorem adsciscente etiam, ulcus
 uteri enatum, ac tandem in gangrænam ab-
 iens, mortem intulit.

d) *Excrecentiæ fungosæ, polyposæ,*
facile exulcerandæ, tantæ sæpe molis, ut

(f) Obs. med. Cent. 2. Obs. 91.

(g) Consult. 119.

vagina omni repleta urethræ qvoqve orificio præcluso lotii excretionem impedian. Videntur eæ nil esse aliud, ut ipse etiam idem suspicatur MORGAGNIUS (*b*), qvam morbosæ vasorum, e qveis fluor albus procedit, productiones, qvales post crebras narium hæmorrhagias, teste N. J. PALUCCI (*i*), narium perinde polypos generare solent. Tumores hi vix unqvam curationem patiuntur, & ablatio eorum aut inutilis est, aut etiam aliquando funesta, id qvod e seqventibus patescet historiis. A. LOEW (*k*) narrat matronæ obesæ indesinentem fere leucorrhœam purulentam fœtidam, at sine dolore, passæ exiguum intra vulvam tumorem apparuisse, qvi uteri orificio adnatus mensibus ob ætatem jam deficientibus quotidie crevit ac magis tumuit, iisdem vero fluentibus, qvi sæpe intempestivo, aliquando immoderato & ad aliquot septimanas continuato fluxu urgebant, iterum detumescebat. Væ So, cathartica, diuretica, decocta lignorum, suffitus, injectiones, fon-

(*b*) l. c. No. 14. 27. Vide præced. b).

(*i*) Ratio facilis atqve tuta narium curandi polypos.

(*k*) Act. nat. cur. Vol. I. app. p. 72.

ticulus, &c. nec leucorrhœam nec tumorem curarunt. Alium id genus casum & J. BURTON (*l*) & MORTIMER (*m*) descripsere, videlicet puerpera a partu commode edito incidit in septennem leucorrhœam, adeo tandem uberem effectam, ut subinde sedenti omnes togas permeans sedile quoque humor madefecerit. Demum post prævium ponderis in utero sensum emersit fungosus tumor, qui ab orificio uteri enatus, celeri incremento vaginam replens distendensque extra ipsa vulvæ labia processit, pressusqueolidam faniem cruentam emisit. Aderat ingens lumborum uterique dolor cum pulsu parvo, crebro vomitu, sudoribus profusis, ac majore in dies debilitate. Ligatura ergo fungo sursum versus tenuiori & in angustum collum desinenti, osculum tamen uteri usque adeo implenti, ut e laeo tantum latere postrorsum exiguum reliquerit interstitium, altissime injecta, datisque remediiis internis, cum intra 2. 3ve

(*l*) LESKE auserl. Abhandl. pract. u. chir. Innhalts aus den philos. Transact. 3. Th. No. 35. p. 112. sqq.

(*m*) VANDERMONDE Journ. de Medec. T. 3.

dies doloribus non imminutis, fœtore autem facto deteriore, qvalis est cancri ulcerati, tumor lividior fieret, ac materia in exitu spissior subsisteret, vagina crebris injectionibus emollientibus addito melle rosaceo pauxilloque TR^æ myrrhæ mundanda erat. Hinc fœtore imminuto ipse etiam polypus post aliquot dies excidit densus, coloris hepatici, qvi discissus præbuit substantiam, qvalis carcrosis in ulceribus reperitur; quamdiu autem utero adhæsit, sensu caruit. Inde ægra vires aliquatenus recuperavit, nihilominus tamen valetudinaria semper, suamque leucorrhœam porro experta, nihil ab hac mendendi methodo profecit. Hac infelior etiam fuit J. G. BOETTICHERI (*n*) femina 53 annorum, cui a 20 & amplius annis leucorrhœam cum febre lenta, anorexia, cardialgia, stomachi post pastum inflatione, ructibus, alvo adstricta, ac vertigine passæ, cum ejusmodi excrementia in vaginæ vestibulo enata, omnem ejus introitum, ut urina stillare vix possit, occupans, albissima, lamellata, fluxum sub augmento sui minuens, lentam vero febrem augens, indolens tamen, ac mutilata post

¶ (n) Act. nat. cur. Vol. 10. Obs. 100.

hæmorrhagiam semper iterum die postero, ut ante, recrescens, cui biennio ante humor fluoris albi fœtidissimus acerrimusqve jam prælusit, ferro improvide dissecta fuisset, letalem causavit hæmorrhagiam.

e) *Dolor uteri, vaginæ, genitaliumve sæpe enormis; qvippe cujus complures præsto sint causæ, nempe acrimonia ipsa varix intensitatis (o), excoriatæ partes sensilissimæ (p), qvas illa porro laceffit, aut plus minus inflamatæ (q), aut gravius ulceratæ, (r), &c. præfertim si vene-
rei qvid simul adfit.* D. PANAROLI (s)
mulier summos inter dolores periit, „ qvæ
„ ex assidua gonorrhœa (venerea) circa
„ uteri regionem atrocissimos cruciatus pa-
„ tiebatur. Mortua secta vomica in uno
„ qvoqve teste inventa fuit „. Qvantos
vero ALBRECHTI (t) matrona dolores ex-
perta fit, vel inde liqvere potest, qvod
optarit ex hæmorrhagia eos semper leniente
obire, qvam illos denuo sentire.

(o) Vide §. 4. No 2. d). (s) Obs. med. Pentec.

(p) Vide præced. a). 1. Obs. 14.

(q) Ibidem b). (t) Vide seqventi g).

(r) Ibidem e).

f) *Urinæ difficultas* aut *suppressio*, cuius perinde non una causa adest, puta fungos polypos orificium urethræ præcludentes (*u*), spasmos ab excoriatione (*x*), tumorem inflammatorium, &c. velut hæc e casibus BLASII (*y*), BOETTICHERI (*z*), ac MURALTII (*a*) satis superqve eluceescunt.

g) *Hæmorrhagiæ uteri a vasorum erosione.* Tragicum hujus rei casum narrat J. P. ALBRECHTUS (*b*): matrona 46 annorum a multis annis leucorrhœam continuam & usqve adeo uberem, ut intra breve diei tempus aliquot cochlearia materiae excerneret, negligens, re tandem in deterius vergente frustra varia tentavit; etenim fluor acrior factus atroces demum per intervalla causavit dolores, quos semper non multo post horrenda dierum aliquot infecuta hæmorrhagia mitigabat, subsistens vero eosdem excitabat, adeo ut ægra ardenter optarit sub illa sine dolore mori, ne istum porro vel momento experiretur amplius. Interea tamen calamitas ejus nonum in mensim duravit immedi-

6

(*u*) Vide præced. d).

(*a*) Vide præced. b).

(*x*) Vide præced. a).

(*b*) Misc. nat. cur. dec. 3.

(*y*) Ibidem c).

ann. 5. obs. 21.

(*z*) Ibidem d).

cabilis; donec oborta iterum hæmorrhagia demum obiit.

h) *Tabes, phthisis.* Cachexiam ab uberiore diuturniore que leucorrhœa invehit, superius (c) dictum fuit, quam eo etiam promptius conscient, si acrimonia simul praedita fuerit. Cum autem cachexia per se tabem, febrem lentam, phthisinque efficere valeant, tum in primis facile haec singula consequentur, ubi acre pro parte resorptum universæ humorum massæ jugiter in dies miscebitur. Sic phthisica evasit RAULINI (d) femina, eodemque malo demum periit STÖRCKII (e) femina, & ex marasmo RAULINI (f) puella, quæ ex matre, uberem leucorrhœam cum ante graviditatem tum sub eadem passa, vitam nacta post scabiem, varos, erysipelata, rheumatismos, aliaque jam inde a nativitate incommoda ante 8um annum incidit in leucorrhœam lactis sero similem, quæ anno 12mo evasit chylofa. Anno 14to nuptui dattæ, breviique prægnanti fluxus processit uberior cum langoribus; feliciter tamen & hoc

(c) Vide præc. A. f).

(d) Vide §. 18. b).

(e) Vide præced. b).

(f) l. c. T. 2. P. 3. S. 2. C. 1. p. 223.

& inseqvente anno peperit: inde vero fluxus factus slavecens, biliosus, & excorians, tamqve copiosus, ut & difficillime celaretur, & ægram exhauriens intra biennium mafrasmo necaret. Proles relictae langvidæ; posterior obiit, prior vero nondum id temporis convaluit. Porro febricula lenta depascetatur ægras SCHENKBECHERI (g), SILVATICI (h), ac WEIKARDI (i): sceleti in modum extenuata fuit DEGNERI (k) virgo.

i) *Exanthemata*, queis resorptum acre, vel ipsa phthisis, vel alia cachexia inducta occasionem facile præbet. Sic E. G. BALDINGER (l) vidit ab irradicata leucorrhœa pessima miliaria enata cum vehementissimis convulsionibus, deliriis, diarrhœa, &c. Ægra tamen usu ptisanæ, eccoproticorum, camphoræ, ac demum Corticis Peruv. post plura prius etiam vesicantia admota, convaluit. Haud secius F. HOFFMANNI (m) „ Ill. matrona 27 annor. constitutionis valde „ teneræ, & temperamenti sanguineo-phle-

(g) Vide §. 55 d).

(l) Von den Krankh. ei-

(h) Vide §. 35. A. d).

ner Armee 3 Th. I. Ab-

(i) Vide §. 58 No 2. d).

schn. 4 Cap. p. 221. sq.

(k) Vide §. 38. f).

(m) I. c. Obs. 4.

„ gmatici, ante 9 circ. annos post puerperium lochiis cessantibus molesto albæ viscidæque materiæ ex genitalibus profluvio cœpit laborare, qvod inter initia, cum parum exinde perceperit incommodi, non adeo multum æstimavit. At vero invaserente hoc malo, cum multa alia accederent symptomata, plures consuluit medicinæ peritos; qvorum quidem ope se levatam paululum vidit, penitus tamen liberari nunquam potuit. Jam brevi ab hinc tempore fluxus tanta sumpsit incrementa, ut non modo copiosior ex genitalibus feratur, sed & mensibus durantibus non cesseat: unde vires valde decrescunt, atqve pedum tanta est imbecillitas, ut vix 20 passus sine ingenti virium defectione progredi ægra possit. His accedit summa cutis sensibilitas; siqvidem sub quavis fere aeris mutatione subito corporitur rheumatismo cum cephalalgia, doloribus odontalgicis, & faciei erysipelate stipato. Haud ita pridem accepto tristi de subita propinqvi morte nuncio vis morbi ita invaluit, ut nec extra lectum esse, nec somnum capere possit. Imo nunc quoque per intervalla, qvod pessimum est, frigus accedit, extremorumque tremor, ac animi deliquium. Consuluit Cl,

Vir, non tam ad leucorrhœam, quam atrophiam cachecticam respiciens, præter justum regimen 1) Elix. visceral. gtt. 80 bis de die cum cibo. 2) ∇^{α} Selteranæ cum $\frac{1}{3}$ lactis asinini fl̄ ij & amplius qvovis mane per mensem. 3) Qvovis triduo sub noctem pilul. balsam. № xj ad leucorrhœam moderandam; externe vero suffitus, & epithema ex aceto fl. famb. cum æqva parte ∇^{α} Reg. Hung. ad ingvina,

§. 36.

3. *Suppressa* præpostere alios morbos creat, præsertim si vetus fuit, si cito cohibita, si ulceratio simul adfuit. Imo rite etiam tractata curataqve in alia qvandoqve mala, eaqve per totam vitam infestantia, genium mutat, cuiusmodi casum in J. STORCHIO (n) videre est. Nolo hic pathologicis momentis, qvippe qvæ in vulgus nota sint, singula illustrare; sed exempla morborum inde oriundorum potius dabo. Sunt nimirum

a) *Dolores* varii, ut *capitis*, qvos MÜNICHII (o) mulier, ac puella TILLIN-

(n) Von den Weiberkrankheiten 8 Band, casu 50 p. 205 sqq.

(o) Vide histor. 6.

GII (p), sensere, molestæ *nuchæ tensiones*, velut in KANOLDI (q) casu, acuti *dorsi cruciatus*, qvos FÜRSTENAU II (r) vetula tulit, aut *lumborum, ossis sacri*, queis NENTERI (s) femina excruciatatur, & denique *arthritici BEHR II* (t) puellam torquentes. RAULINI (u) puellæ 18 annor. cum post 40 dierum febrem putridam convalescenti perturbationes stomachi, colicæ, motus febriles, & insomnia accidissent, mensesque tempore morbi haud reversi in trimestre emanassent, oborta est continua fere leucorrhœa. Vice quadam autem repente dysuriam pati cœpit cum tantis imi abdominis doloribus, ut nec stare nec sedere quiverit, queis mediocris febris comes erat cum cutis calore ac siccitate. Abdominis universi, in primis autem hypogastrii, tensio dolorifica, ne industi quidem attactum ferens, se se ad femora usqve extendebat: urina inter saevissimos cruciatus non nisi guttatim excrenebatur; leucorrhœa autem erat suppressa. Sæpius igitur educto sangvine, fotibusque emollien-

(p) Vide §. 45 No 2. (t) Vide seqv. f).

(q) Vide §. 37. (u) l. c. T. 2. P. 3. S. 2.

(r) Vide §. 66. C. 5. p. 339.

(s) Vide inferius in g).

tibus ventri crebrius admotis, ac dato potui sero lactis, aqua pullorum, emulsione cum pineolis & 4 sem. frigidis, &c. cum nil proficeretur, ægra immissa est in balneum decocti emollientis semel atque iterum interdiu, tertium noctu, posteroque mane quartum: post istud levamen adfuit, mitiores facti dolores, & lotum libere fluxit. Abdomen tunc liberius exploratum dolebat universum, sed mollius jam, quam ante. Sensibilissimum erat hypogastrum, quo manu leniter compresso insignis uteri inflatio ad umbilicalem usque regionem pertinens tangebatur, dolorque tam acer tenebat tubas, ovaria, ac ligamenta, ut non minor in inguinibus, quam utero, sentiretur, qui se se eadem pene vehementia in internam superiorem ac medium femorum partem porrigebat. Symptomata hæc continenter minuebantur, donec tandem plane remediis cessere. Catamenia reverterant; desitque leucorrhœa.

b) *Catarrhus*, quem JENSENII (x) vidua tussiens, & SCHAAERSCHMIDTI (y) femina gravissimum est experta.

(x) Vide §. 37.

(y) Ibidem.

c) *Diabetes*, qvem letali cum even-
 tu supervenisse refert G. BALLONIUS (z)
 feminæ cuiquam, cui „ diutius fœtens pu-
 „ trisqve illa illuvies effluxerat, qvum an-
 „ nos 60 nata foret, usurpato levi qvodam
 „ remedio inopinato suppressa est. Nec diu
 „ impune eam suppressionem tulit. Etenim
 „ diabetes illius loco multo funestior suc-
 „ cessit, manifestus, suis se se signis expri-
 „ mens, 3 aut 4 menses exercuit, & ad
 „ mortem comitatus est. Tota fete die uri-
 „ na plane aqua fluebat, nec natura eam
 „ fistere poterat. Qvum sat bene habita
 „ esset, emacruit continuo, & siti inexple-
 „ bili cruciabatur; lingva arescebat, & eam
 „ pellucidam præ siccitate vidi; fœtidum ex-
 „ spirabat & cadaverosum. Qvæsivi num in
 „ renum regione sensum caloris aliquem ob-
 „ putrem materiam suppressam percepisset?
 „ ... Retulit, caloris loco ita partem illam
 „ perfrigentem percipere se, ac si glacies in-
 „ ibi cogeretur „.

d) *Exanthemata* chronica vel acuta.
 Sic L. G. KLEIN (a), observavit... ex

(z) Consilior. medicinal. L. 1. Conf. 56. Opp. T. 2,
 p. m. 231.

(a) l. c. p. 112.

„ fluore albo benigno represso ... scabiem
 „ universalem humidam pruriginosam „. Et
 F. HOFFMANNI (b) quadragenaria pur-
 puram inde est adepta.

e) *Febres variæ indolis; putridam febrem* observavit WEIKARDUS (c). J. THEVART (d) meminit matronæ leucorrhœam tetri odoris passæ, cum fœcunditate, ita ut concepta femella fluor pergeret, etiam uberior, mare autem concepto aut parcior procederet, aut sisteretur. Ubi autem hic prorsus fere substitisset (an qvia maritus triennium a matrona se abstinuit?), matrona sensim intra aliquot annos emarcuit, omniaqve alimenta fastidiens ab eorum usu fere abstinuit. Tandem 3^{na} febre prehensa est, cuius tertius insultus rigoris vehementia internoqve æstu summo ita illam afflixit, ut postero die obierit, maximopere de dolore ad hypogastrium qvesta. In cadavere pulmo aliquatenus erat inflammatus, hepar exsiccum & malo colore, uterus autem corruptus & quasi gangrenosus, plenus tabofanieqve.

(b) Vide §. 37.

(c) Vide §. 58. No 2. d).

(d) Nota 2 in BALLON. Conf. L. 3. Conf. 96.

f) *Abscessus, ulcera.* Sic referente apud J. SCHENCKIUM (e) J. BAUHINO, uni ex ancillis cœnobii sæpe, idque aliquot annis, pus e mammillis fluebat, quæ olim leucorrhœæ fuit obnoxia. Porro G. H. BEHRII (f), puella annorum 19, temperamento sanguineo-phlegmatici, brevioris staturæ, veneri non parum addicta, per 2 fere annos fluorem album continuo durantem cum insequente excoriatione partium genitalium experta fuit. Hæc incidentibus, resolventibus, evacuantibus, tonicisque remediis optime tractata, veneris vero lusui intermedio tempore semper incumbens, nullum exinde persentiscebatur levamen. De auxilio itaque desperans a... medicastra potiones assumpsit sistentes atque adstringentes, iisque fluorem hunc inveteratum derepente superpressit. Verum enim vero post decursum aliquot septimanarum summis affecta est cruciatibus arthriticis, quos secuti sunt tumores œdematosi partium corporis inferiorum: dolores illi etiam tamdiu persistiterunt, donec abscessus inter femur

(e) Obs. med. L. 2. fol. m. 309.

(f) Act. nat. cur. Vol. 10. Obs. 103.

„ dextrum ipsius rimamqve pudendi ma-
 „ gnam in conspectum venit, qvi remediis
 „ externis legitimo modo tractatus, qvum
 „ magnitudinem ovi anserini æqvaret, tan-
 „ deū ruptus magna copia materiam mu-
 „ cido-acrem summeqve putridam effudit
 „ cum præsenti levamine symptomatum o-
 „ mniūm. Abscessu postremum digestivis
 „ balsamicis ac sarcoticis convenientibus cu-
 „ rato & consolidato, corporeqve ægrotæ
 „ debito modo expurgato, ad sanitatem
 „ per longum jam tempus amissam puella
 „ hæc rediit... Perinde Vratislaviensis ma-
 trona (g) leucorrhœa inveterata aluminoso
 balneo suppressa in ulcus uteri incidit. Haud
 secius BAJONI (b) femina e leucorrhœa
 usu octiduano remedii empyrici suppressa
 incidit in vehementissimam uteri inflamma-
 tionem, qvæ facta in brachio Yæ Se, adhi-
 bitisqve semicupiis, fotibus, enematisqve
 emollientibus & anodynīs, ac diluente po-
 tu, nihilominus in suppurationem abiit.
 Hinc immissis vaporibus relaxantibus, & in-
 jectionibus factis abscessus in cavum uteri ru-

(g) Vide §. 72. C. b).

(b) ROUX Journa. de Medec. &c. T. 32 A. 1770
Juin p. 521.

ptus minimum tibij puris per vaginam effudit. Qvo facto ægra adhibitis idoneis remediis intra 2 menses ex toto convaluit.

g) *Pbthisis.* Qvam enim facile subsistens leucorrhœa thoracem petat, J. D. G O H L I I (i) observatio innuit: „ femina Gallica „ (refert ille) Francofurtana 30 circ. annorum ante plures annos fluore albo lابورانس ... medicinam qvidem nacta est, qva fluxus iste fuit imminutus; in ejus locum vero brevi post secuta est materiæ translatio ad cerebrum & pectus, ut virulentam quasi materiam non saltem naribus excernat, sed & tussi rejiciat „. Qvam vero a facta id genus pravæ materiæ ad pulmones metastasi phthisis cito conseqvatur, aliorum itidem docent historiæ. Sic R A U LINI (k) matrona leucorrhœam 4 annorum, cum dyspepsia serofisqve vomitionibus, perpesta, materia primum alba ac spissa, dein vero tenui, subviridi, tam acri tamqve copiosa procedente, ut neqve sedere præ dolorificis ventris femorumqve tensionibus ac puncturis & ardore vehementi, neqve præ debilitate artuum inferiorum, nisi laboriose,

(i) l. c. No 6. p. 20.

(k) l. c. P. I. S. 2. C. 4. p. 138.

incedere posset, eam demum usu qvarum-dam pilularum sensim sttit; cuius vel ad primam mox imminutionem tussis occpit sat valida, celeriterque crevit, cum sputis a-qvosis primum, dein cruentis; accessit febris lenta, sputa purulenta facta, & ægram consummata demum phthisis confecit. In cada-vore intestina tenuia erant summe inflata & ampliata, crassa vero admodum coarctata, mesenterium glandulis obstructis refertum, sanis ceteris visceribus, sanoque ac secun-dum naturam reperto utero. In thorace universa pleura pulmonibus firmiter adhære-bat: lævo in pulmone versus costam secun-dam binæ glandulæ bronchiales nucem æ-
qvantes apparuere materiam sebi similem continentes, & e pulmone, dum a costis separabatur, effluxit fere cochlear puris fœ-tidi, e cystide uni dictarum glandularum re-spondente provenientis, qvæ insignem for-mabat sinum, se se a lobi superiore parte ad imam usqve extendentem, & facile 4 di-gitos admittentem. Tota hujus pulmonis substantia contracta erat, ulceribusque ac tuberculis scatens, ac sanie fecibus vini simili referta. Inferius extremum diaphragmati firmissime adhærens velut cartilaginosum vi-debatur. Dextri pulmonis lobi in se con-fusi erant, diaphragmati adhærentes, &

scirrhosis purulentisqve tuberculis pleni. Perinde etiam NENTERUS (*l*) feminæ historiam refert, qvæ ob dolorem lumbo-rum & ossis sacri in dies acerbiorum & nul-lis resolventibus, opiatis, acidulis, em-plastris, ungventis, &c. abigendum pluri-bus ab annis ambulare nequiviverat. Urinæ formabant sedimentum album & crassum, atqve e genitalibus profluebat, præsertim in-stantibus finientibusqve catemeniis, muco-fus humor, cuius excretione imminuta do-lores facti vehementiores. Data demum TR^a alcalina ac pilulis BECHERI post ali-qvot menses leucorrhœa uberius procedens dolores ita mitigavit, ut ægra baculi ope ambulare potuerit. At cum doloribus an-no insequente reversis illa longe alia, qvam qvæ tantopere profuerant, opposuif-set remedia, incidit in phthisin letalem. Eundem a perperam suppressa leucorrhœa eventum fortitæ sunt binæ SACHSII (*m*) ac WINCLERI (*n*) matronæ.

(*l*) RAULIN l. c. Tom. 2. P. 3. S. 3. C. 1. p.
556.

(*m*) Vide §. 72. C. b.

(*n*) Ibidem.

§. 37.

4. *Reversa leucorrhœa*, seu sponte seu arte, mala a sui suppressione orta plerumque tollit. Ita in Annalibus Vratisl. (*o*) feminæ e perfrigerato corpore & in sequente terrore leucorrhœa subsistens molestas nuchæ tractiones, obnubilationem capitis, torporem, & inappetentiam causavit; sed ex usu TRæ ♂ ii cum essent. succ. item ♂ nitroso - cinnabarin. reversa leucorrhœa omnia iterum sustulit. J. C. TILLINGII (*p*) puella octennis, vivax, ingeniosa, fana, at pallidula, leucorrhœamqve iisdem cujusque mensis diebus pati solita citra ullam aliam molestiam, cum sub ipso fluxu aquas Carolinas usurparet uberius, leucorrhœam stitit sequente vehementissima cephalalgia cum totius corporis gravitate: at diminuta thermarum dosi, qvæ alvum satis movit, leucorrhœa revertens puellam sanitati reddidit. L. G. KLEIN (*q*) „ non semel vidi fe-

(*o*) Tent. 35. A. 1726. Febr. Cl. 2. art. 1. §. 3. p. 163.

(*p*) Obs. med. sing. circ. verum usum therm. Carol. 20. p. 39.

(*q*) I. c. tit. catarrhus p. 93.

„ brem catarrhalem ex retento represso
„ fluore albo , huncqve eadem denuo ite-
„ rum cum ευΦορίᾳ revocatum „. Imo
haud ita raro accidit, ut leucorrhœa velut
metaetasibus huc illuc sponte factis morbos
variarum partium creet, qvi sponte illa
iterum reversa denuo evanescunt, repullu-
laturi iterum subsistente profluvio, idqve
ita , ut alternis sibi mutuo succedant tempo-
ribus, cuius rei memorabilem historiam re-
fert J. STORCH (r) de matrona 30 anno-
rum cholericо-melancholica, qvæ ubi post
partum puellæ leucorrhœam nacta suisset,
aliquanto post ei pollex pedis velut ab un-
gve introrsum crescente adeo male affici
occepit, ut nonnulli eum adimendum cen-
fuerint. Toto hoc tempore leucorrhœa ab-
fuit; at sanato pollice continuo rediit.
Abhinc vero per plures annos cuin cepha-
lalgia & odontalgia alternavit, donec ma-
trona denuo concepit: tum vero a media
graviditate ad 8um usqve mensem exquisitos
abdominis dolores perpetiebatur; qvos
cum pingves litus non sedarent, lotiones
vino calido litusqve e castoreo cum ∇^a reg.

(r) Von Weiberkrankheiten 3 Band, casu 4. p.
74. fqq.

Hung. lenivere. Tandem feliciter puerum enixa est, puerperio sine ulla ægritudine consecuto. Fusius hunc ipsum casum Author alibi (*s*) perseqvitur, additqve rem hic non prætereundam, nempe priusqvam in pollicem pedis morbosa materia decubuisset, numerosos in capite pediculos fuisse enatos, totoqve illo tempore, qvo hi adfuere, leucorrhœam abfuisse. Post pollicis affectionem molam gestavit, excrevitqve. Inde inseqventi mense catameniorum profluvium est perpetua. Lapso abhinc trimestri & leucorrhœa afflixit, & in vagina uteri abscessus ortus est, cui sanato aliquot mensium tussis ferina successit. Insequenti anno sub continua leucorrhœa ulcus in palato enatum est. Altero vero anno menses decolores cum pure misti prodibant, ut suspicio effet, venerei qvid subeffe (ni cancer potius uteri adfuerit). Et vero superius (*t*) jam meminimus leucorrhœam cum malis catarhalibus, coryza, tussi, &c. haud raro alternare. s. SCHAAARSCHMIDTII (*u*) femina 37 annor. qvotannis vere & autumno

(*s*) Ibidein 8 Band, casu 19 p. 88. sqq.

(*t*) Vide §. 18 e).

(*u*) l. c. 2. Th. No. 50. p. 374. sqq. 395.

sangvini mittendo affveta, & aliquot ab annis leucorrhœam passa, observavit hanc ingruente qvandoqve uberiore coryzæ fluxu parcus procedere, ut primum vero leucorrhœa increaseret, continuo mitescere coryzam & conqviescere: cumqve aliquando neglexisset autumalem V. S. leucorrhœa inde parcior facta demum substitut, abiitqve in gravissimum catarrhum (nempe carebariam insignem, odontalgiam fugacem, anosmiam, anginam, agheustiam, aurium susurrum, tussim vehementem, &c.) cum febre nocturna, & omnium ingestorum vomitu. Qvo rite curato leucorrhœa iterum revertit. Pariter c. JENSENII (*x*) viduæ 35 annorum leucorrhœa plusquam triennis a suscep-
pto pedibus frigore humido subsistens tussim plurimis cum sputis mucosis causavit, & hac per siccas pedum frictiones ac pediluvia, iterataqve cathartica, ac demum tonico-diapnoica intra 12 dies sublata octiduo post revertit. Haud secius RAULINI (*y*) matronæ leucorrhœa flava, perqvam acris, & copiosa, sub catameniorum finem

(*x*) BÜCHWALD prodrom. ad Act. med. Hafn.
contin. p. 160.

(*y*) l. e. T. I. P. I, S. 2. C. 4. p. 141.

a subito terrore suppressa, rediit qvidem post proximam mensium periodum pristina & indole & ubertate; sed a momento, qvo substitit, dolorem dorsi ac thoracis versus cartilaginem xyphoideam accivit, cui se aliquanto post junxit tussicula sicca cum non-nullis sputis cruento tinctis. Remediis tamen debitiss justo cum regimine usurpatiss cum tussis tum dolor cessit; procul dubio ob fluxum vel maxime reversum: qvi ipse etiam tandem cœpit minui, ejusque indoles emendari, cum spe sanitatis pristinæ. Porro apud F. HOFFMANNUM (z) „ 40 annorum norum femina teneroris & sensibilioris texturæ, diæta minus salubri & incauta utens alvo laborabat obstructa, capitis dolore, & præcordiorum tensione, excernit instar albuminis ovi per uterum materiam singulis mensibus, qvæ procedente tempore coloratior & acrior facta est. Medicus præmisso purgante utitur GRAMMANIANA TR^a, qvæ ob huius faccharum & vitriolum & fistebat hunc fluxum. Ab hoc vero tempore ingenti anxietate

(z) Opp. T. 6. Diss. de imprud. medicat. mult. morb. & mort. causa. §. 41. p. m. 304.

„ præcordiorum, langvore, inquietudine,
„ & dolore lumborum premitur: accipit su-
„ doriferum, & inde universum corpus ma-
„ culis rubris perfunditur; hinc anxietas
„ præcordiorum & internus calor ex parte
„ minuitur. Qvando corpus frigore exci-
„ pitur, purpura protinus recedit, & pri-
„ stina symptomata revertuntur. Tandem
„ usu bezoardicorum purpura corpus dese-
„ rit, & fluor albus revertitur „. Qvam
operose tamen interdum leucorrhœa revo-
cetur, & post qvantas non nisi œconomiæ
animalis turbas, documento est J. C. RO-
STII (*a*) mulier 33 annor. habitus ferosi
cholerico - sangvinei, cacochymici, vitæque
ut plurimum sedentariæ, ac sangvini mitten-
do ab aliquot annis affveta; cui leucorrhœa
cum mensibus, nunqvm fere æqvales pe-
riodos tenentibus, a prima jam eorum eru-
ptione alternans, sub dupliq; quoq; gravi-
tate ac lactatione procedebat: illi vero per
 $\frac{3}{4}$ anni semper deficientes, tantummodo his
exactis fluebant. Post tertium partum per
trimestre fere infantem lactanti a vehementi

(a) Annal. Vratisl. Tent. 25. A. 1723 Aug. Cl. 4.
art. 10. p. 206, sqq.

terrore menstrua excretio aliquatenus apparuit; qvod cum post aliquid hebdomades rursus accidisset, postea non amplius. Leucorrhœa interea prorsus substitut. Qvod ægra cum diutius celasset, ac proxime sequuta pathemata pro fugacibus febrilibus motibus, a stomachi vitio oriundis, cuius de ardore, nauseis, vomituritione, ciborum & carnis præsertim fastidio, tensiva cardialgica ad præcordia & dorsum pressione, laxitudine artuum, ac cephalalgia &c. sibi alias infuetis malis, quereretur, habuisset, data tantummodo incidentia, digestiva, & abstergentia spontaneum vomitum cum levamine causarunt, sed non diurno. Idcirco ablactato infante methodus eadem, interpositis eccoproticis, iterata, & subjunctis stomachicis tonicis amaris emendationem in unam alteramve hebdomadem rursum attulit. Reveris autem prioribus malis ad digestiva ac resolventia redditum, & ægra immisso faucibus digito faburram biliofo-mucosam vomuit, cuius longe majorem vim data Ypecacuanha cum sale Absinthii per 6 lenes adhuc vomitus elicuit cum euphoria. Nihilominus octiduo seqventi emicuit febricula rheumatica cum leni interdum rigore alternoque calore, pulsu celeri, frequenti, pleno, urina rutila, subturbida muci-

mucida parumper, recrementa ♀ reo salina formante, oris glutinositate, appetitu parco, fastidio carnium, exigua siti, angore cardialgico - spastico - oppressorio, molestissimo nocturno usqve in diluculum ardore abdominis in regione uteri, & rheumaticis tensivis urentibusqve dorsi lumborum ac præsertim femorum in crura pedesqve usque doloribus: temperantia, nitrofa, antispasmodica, ♂ lia fixa, diaphoretica, temperata alexipharmacæ, infusa diluentia blanda nervina lente efficaciam exerebant, vexantibus tamen vigiliis, inquietudine multa, & sub levissimo somno sudoribus matutinis erumpentibus. Acceffit intoleranda fere stranguria in ischuriam abiens, cui opitulabatur emulſio temperans leniens discutiens diurético - carminans, cum antispasmodicis. Tandem ex urina sub motibus febrilibus pergentibus procedente pallida, subturbida, cum insignibus floccis mucidis detectum est, leucorrhœam substitiffe. Qvapropter data qvotidie vel alternis diebus pilular. bals. laxantium dosi cum interpolatis temperantibus, ac TR^a ♂ ii ♀ sata, nec non Effentia rad. Pimpin. alb. non multo post cœptum horum usum qvodam die flatus ex utero cum sibilo eruperunt, & vesperi maximi conatus dolori-

bus partus similes ad eosdem elidendos aliquoties oborti sunt; noctu vero hypogastrium intumuit, cum continuo vehementius ardore, tubera hic illic formans pugnum magna, at non diuturna. Ægra vel remotis stragulis vel extra lectum levamen se percipere credebat: cumque enemata recusaret, infistebatur priorum remediorum in & extenorum usui; unde omnia emendari visa, nisi quod insolita debilitas cum tremore artuum, præcipue manuum, iis supereffet. Circa 14 hujus medelæ diem initia revertentis leucorrhœæ apparuere, simulque post horriduli frigoris lenisque caloris vicissitudines, & via circa umbilicum tormina, vagosque passim, in primis ad pectus, dolores pungentes, ingruit diarrhœa moderata seroso-mucosa per 48 horas, cum flatibus copiosis, & levamine, dolorumque rheumaticorum in lumbis & artubus mitigatione. Hac durante cum ægra micam panis V imbutam, aromateque conditam stomacho applicuisset, atroces continuo in capitibus vertice dolores oborti sunt, remotoque topico oxyus iterum defierunt. Leucorrhœam jam melius precedentem febricula rheumatica lenta ad 4 hebdomadas nihilominus comitabatur; ac licet balsamicæ pilulæ interdum interpositæ fuere, tamen acerbi spastico-rheumatici arthritodei

dolores denuo artus invaserunt cum validis abdominis turbis, crebris nempe ejus inflationibus globosis conspicuis, qvæ sub copiosis flatuum ex utero anoqve explosionibus evanescabant. Enemata demum admissa egregie profuere. Sopitis his turbis, intereaqve macula lata rosea in thorace, per tibias vero ac femora innumeris ecchymatibus rubicundis multo cum pruritu & ardore obortis dolores rheumatico - arthritici superiores artus, relictis inferioribus, admodum excruciarunt, nec nisi intra 3 hebdomades diligentι sub usu cun. internorum ſum antiſpasmodicorum ac temperantium, &c. & infusi herbæ Arnicae ver. Bohem cum toto, tum externorum (ſcil. ουν nervinor. camphorat. fotum cum facculis nervinis, cerat. de galban. matric. originibus musculorum applicato, &c.) conqvievere; cum qveis concurrit status paralytodes & contabescentia brachiorum ac manuum, adeo ut ægra nec flectere cubitos, nec manibus vel ori admovere vel tenere qvidqvam posset: statusqve hic sopitis etiam doloribus diu superfuit. Qvo autem plus declinarunt dolores, eo etiam uberius cum madores tum spontanei sudores largi media nocte procedebant. Cumqve ægra aliquando toto

corpore ita sudaret, pristinus repente motus brachiis manibusque rediit; verum dum alvum egestura lecto surgens sudores hos interturbaret, paralysis continuo revertit. Sed morbus tamen quotidie minuebatur, urina citrina fuit cum nubecula alba, pulsus moderatus naturalis. Nunc itaque neglecta in 20 hebdomadem scarificatio administrata est, circa mensum periodos datæ pilulæ bals. suoque tempore tusa pedis vena, unde sanguis spissus nigricans serofus post 3ijv eductas sponte fluere desit. Exhibita MR^a e TR^a ♀ acr. Ω C. C. & eff. succin. unde euphoria continenter crevit. Somnus & appetentia adfuit, artibusque superioribus mobilitas, ubi tremor desisset, pedetentim redivit; sed velut ante in femoribus, ita nunc a cubito ad digitos usque effloruere ecchymata. Sudoribus universalibus sensim remittentibus tanto uberius manus sudabant, earumque in metacarpis super tendinibus extrinsecus nodi gangliformes indolentes emersere, punctoriisque interdum dolores trans digitos percipiebantur. Inter haec procedente ubertim leucorrhœa dabatur MR^a ex essentia Pimp. alb. Succin. & scord. ac TR^a ♀ ii ♀fata, infusumque theatum e rad. Chin. Bardan. Vincetox. Sarspar. lign. Saffafr. Gvajac. Sant. citr. cort. Winter. Samb. Ba-

dian. herb. Chamædr. Meliss. Serpill. flor. Til. Anthos, Paralyf. Lavend. Cheir. &c. externe vero contra accedentem inflationem rheumatico - œdematosam manuum frictiones calidæ, fatus siccii, suffitus nervini, &c. continenter per aliquot hebdomades administrabantur, non neglecto pilular. bals. visceral. usu. Ab his catamenia quoque pristinum ad cursum reducta, & ægra prorsus convaluit. Meretur sane casus hic tironum & studium & attentionem; quippe qui & rarius sit, & multiplicis doctrinæ.

§. 38.

5. Solvitur leucorrhœa varie, niempe mutatione corporis insigni, vel crisi conspicua: hinc

a) *Pubertate*, quo tempore & admirandæ in corpore mutationes accidunt, & gravissimi saepe morbi ob has ipsas mutationes conticescunt. „ Nota mihi, ait J. N. „ PECHLINUS (b), est historia Ill. virginis, quæ cum ipso quoque septenario „ experta est fluorem album magno vi-

(b) Obs. phys. med. L. 1. Obs. 34. p. 82.

„ rium dispendio, sed qvæ diurnitate illa
 „ in consuetudinem morbi venisse videba-
 „ tur, adeo & omnia remedia & qvafvis
 „ respuebat molitiones. Nunc ut est 17
 „ annorum, non vicit tantum adolescentiæ
 „ squalorem, sed & valitudine per justas
 „ mentium vices corroborata, staturaqve
 „ & prolixa & quadrata pares suas triun-
 „ phat „.

b) *Conceptu*, seu qvod illo corpus magnopere mutetur, ut ex innumeris historiis medicis facile elucet, seu qvod vasa illa, unde leucorrhœa vera scaturiebat, ovulo sœcundo ad fundum uteri affixo, ejusqve placenta nascente, evadant impervia. SCHEFFERI (c) sane ægrotæ leucorrhœam conceptus stitit.

c) *Ptyalismo*. J. LANZONI (d) mulier „ quadrigenaria . . . diurno albo „ fluore laborabat, . . . a quo post multa „ remedia frustra tentata salivatione magna „ sponte orta protinus liberata est „.

d) *Anacatharsi*. Inter ægras Ill. STÖRCKII (e), „ qvædam fluore albo la-

(c) Vide §. 69.

(d) Misc. nat. cur. dec. 3. ann. 9. obs. 140.

(e) Ann. med. 2. pag. 210. sq.

„ borantes corpore erant extenuatæ, &
 „ tussicula sicca simul vexabantur. Decocta
 „ emollientia, replentia, & M.R. (B. Lap.
 „ 69. aceti vini aa ȝȝ. Syrup. 5 rad. aper.
 „ ȝȝ. ∇æ flor. Samb. Fœnic. aa ȝiiij. Ter.
 „ fol. ȝri ȝȝ. Liq. anod. min. gtt. vj. M.
 „ S. dentur omni trihorio duo cochlearia),
 „ his optime conduixerunt. Hac ratione
 „ & pectori consulebatur, & illud, qvod
 „ in vasis uterinis stagnavit, solutum est,
 „ & benigno fluore evacuatum, neqve inde
 „ vires debilitatæ sunt. Contigit tunc sëpe,
 „ ut tussi sputa glutinosa cum magno leva-
 „ mine prodierint, & fluxus albus sensim
 „ integre desierit. Suppono autem hic
 „ semper fluorem album simplicem, mitem,
 „ nulla acrimonia venerea, &c. mistum „.

e) Sudore vel universali vel topico.

Sic L. G. KLEIN (f) „ novit fluorem
 „ album chronicum per sudores nocturnos
 „ fœtidos largissimos in femina obesa per-
 „ fecte curatum „. Et J. J. SCHLIERBA-
 „ CHII (g) „ femina 30 annor. sangvineo-
 „ melancholica tempore graviditatis fluore
 „ albo affligitur; qvi tamen postea, cum

(f) l. c. tit. fluor albus p. 112.

(g) Act. nat. cur. Vol. 8. Obs. 38. p. 100.

„ sudor pedum fœtidus accederet, prorsus
 „ conqviescit, & evanescit. Interim hic
 „ sudor per aliquod tempus toleratus mole-
 „ stiam tautam creabat, ut ejus suppressi-
 „ onem a Medico efflagitaret; qvi vero
 „ eandem sub variis persuationibus in ex-
 „ perientia fundatis renuebat. Qvare mu-
 „ lier incommodi hujus pertæsa admodum-
 „ qve impatiens tandem ad cohiben-
 „ dam illam excretionem ex muliercu-
 „ larum consiliis pedum plantis supponit
 „ folia alni, indeqve voti sui compos red-
 „ ditur. Ast dicto citius disparentem pe-
 „ dum sudorem dein fluor albus excipit
 „ rursus. Unde iterum Medicum adit, ac
 „ fluoris albi iublationem postulat: qvi etiam
 „ interne adhibitis alexipharmacis & suc-
 „ cinatis, interpositisqve laxantibus, cum
 „ externa frictione mediante excutia in
 „ pedum plantis, feliciter ceffabat, exfur-
 „ gente iterum fœtido pedum sudore, . . .
 „ omnem sub continuo suo successu prioris
 „ affectus recursum plenarie postmodum
 „ intercipiente „.

f) *Emesi*. Meminit DEGNERUS (b) virginis 48 annorum, qvæ ante octennium

(b) Annal. Vratisl. Tent. 28. A. 1724 April. Cl.
4. art. 12. §. 2. p. 429.


in Anglia leucorrhœam tam uberem ac diuturnam est adepta, ut sceleti in modum fuerit emaciata. Cumqve morbo immediabili a Medicis declarato ad lares paternos reversura mare conscendisset, in creberrimos vomitus, qvos longior ob adversos ventos navigatio diuturniores etiam reddiderat, incidit, sed eo cum fructu, ut cum obitura in navi crederetur; ubi terram attigit, leucorrhœa se liberatam observaverit, pedetentimqve pristinam recuperarit sanitatem.

g) *Diarrhœa*. Narrat P. FORESTUS (*i*) mulierem e leucorrhœa II annorum neglecta cachecticam facie pallidissima cadaverosa, in hydropem incidisse; qvi cum a copioso cerevisiæ Gedanensis potu oborta alvo admodum fluxa subsedisset, pariter leucorrhœa conqviescente, mulier sui incuria post 2. 3ve menses in hancce iterum, ac paucos post annos letalem in hydropem est relapsa. Porro P. ROMMELII (*k*) matrona juvenis, gracilis, rite semper menstruans, ac ter partu jam levata, semper mox a conceptu uberi leu-

(*i*) l. c. Obs. 19.

(*k*) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 5. Obs. 149.

corrhœa, alioquin sibi nunquam conservata, prehendi solebat, quam exacto mense solvebat superveniens diarrhœa periodica quovis mense statis temporibus reverti ad ultimum usque gestationis diem solita, cum sat insignibus terminibus, per 7. 8ve dies durans & usque adeo copiosa, ut a 14 ad 25 effusiones quotidie causaret; innoxia tamen, partu ter jam vivaci consecuto, imo dum prima in graviditate remediis idoneis minuebatur, dyspnœam aliaque symptomata causans, sibi postea fuerit relinqua.





HISTORIAE
LEUCORRHOEAE
P A R S II.

DE MEDENDI METHODO
LEUCORRHOEAE.

C A P U T II.
SUMMA CURATIONIS CAPITA.

§. 39.

Si ullo uspiam in morbo ad tria illa pervulgata curationis capita *Indicans*, *Indicationes*, *Indicata*, animus non perfundorie est advertendus, in leucorrhœa sane id præ pri-

mis observare necessum est; in qua nempe vel minima horum pars prætervisa non medendi modo perturbationem, sed ipsis quoque ægrotis haud exiguum discrimen quandoque, nec facile reparandum detrimentum, adferre consuevit. Idcirco non sine summa clinici judicij acie cura omnis tria illa in capita est intendenda, ut iis rite cognitis justa medendi methodus ineatur.

§. 40.

I. INDICANS itaque est ipsa *leucorrhœa* vera rite coguita (*a*), in qua curate dispiendum, recensne an inveterata? Continua an intermittens? Simplex an complicata (*b*) sit? Nihil enim horum, priusquam medicinam facias, prætereundum est. Cognito ita Indicante, enascitur

II. INDICATIO *leucorrhœam* fistendi cito, tuto, jucundeque. Hunc autem scopum attingere alioquin haud est integrum, nisi

I. *Cacochymia* (ad quam omnium primo in curatione respiciendum) tollatur, seu illa universum jam invasit corpus, seu

(*a*) Vide §§. 19. sqq. 23 sqq.

(*b*) Vide §. 2. I. No 2. sqq.

topica adhuc est in utero , ventriculo : id
qvod obtinetur

a) *Colluvie eliminata* ; etenim „ non
„ possumus , inqviunt Vratislavenses Me-
„ dici (c) , non illis subscribere Practicis ,
„ qvi experientia edocti asseverant , nullum
„ medicamentum prodesse in hoc fluxu ,
„ nisi corpus probe fuerit expurgatum „

b) *Digestione emendata* , a qva sola
læsa haud raro leucorrhœam nasci dictum
est (d).

2. *Affluxus humorum ad uterum immi-*
natur , eorum

a) *Copiam minuendo* ; deinde vero

b) *Fluxum aliorum avertendo* , &

c) *Causam tollendo* , qvæ eos ad ute-
rum uberioris alliciebat , ac fluxum produxerat.

3. *Symptomata (e) morbi mitigentur.*

4. *Efectus (f) tollantur.*

5. *Recidiva præcaveatur ,*

a) *Vitatis causis procatarcticis.*

b) *Sublata uteri , corporisqve la-*
xitate , &c.

(c) Hist. Morb. Vratisl. A. 1700. p. m. 168.

(d) Vide §. 12. 53.

(e) Vide §. 5.

(f) Vide §. 35.

III. INDICATA vero, ope qvorum cuncta hactenus allata obtineri possint, per sequentia capita experientiæ ductu enumera-buntur.

C A P U T III.

E M E T I C A.

§. 41.

E M E T I C A aduersus leucorrhœam per-qvam esse utilia vel inde colligitur, qvod illam emesis sponte oborta in D E G N E R I (g) puella, desperatam licet, ex integro sustulerit: neqve etiam ars naturam imitata successu hactenus caruit; emetica enim exhibita scopo faburram primarum viarum abolen-di, digestionem vitiatam emendandi, humorumqve ab utero avertendi impetum, &c. egregie prodeesse observantur, præsertim si iteratis vicibus, monente M. E T T M Ü L L E R O (b), præbeantur, v. g. qvavis hebdomade, vel bis minimum qvolibet mense, sva-foribus B. S I L V A T I C O (i) & R. a F O N-

(g) Vide §. 38. f).

(b) Opp. T. 2. P. 1. p. 591.

(i) l. c. Cent. 4. № 23.

SECA (k). In primis autem hic ab experientia laudem tulere

§. 42.

1. *Ypecacuanha*, mitissimum omnium emeticum, de qua R. MEAD (l) „ vomitum igitur, (ait) plerumque primo ciere oportet, *vino* præsertim *ypecacoanhæ* „. Et J. P. ALBRECHTUS (m) „ haud ita pri- dem (inqvit) in pertinaci fluore albo, quo femina quædam nullam ex aliis medicamentis persentiscens opem diu enervata erat, tres ejusdem (*Ypecac.*) doses me svafore exhibitas optime profuisse testari possum „.

2. *Afari* radix, quam hic specifice convenire M. ETTMÜLLERUS (n) notat, forte quod potenter simul humores lento, præsentente cachexia vel indigestione, incidat ac fundat. Mitius etiam pulvere rad. *Afari* est *electuarium diafarum* FERNELII (o) a 3ij

(k) ll. cc.

(l) Monit. & præc. med. C. 19. S. 3. p. m. 139.

(m) Misc. nat. cur. dec. 3. ann. 9. obs. 9 sub fine m.

(n) I. c.

(o) Meth. med. L. 7. C. de purgantib. p. m. 135.

ad ſe jure pulli, vino, mulfa, vel ∇^a hordei exhibitum, qvod remedium, teste Autore „, omnis generis humores... vomitio-
„ ne dicit, non continuato sed ex inter-
„ vallis facto impetu, feni atqve prægnan-
„ ti tutum ac facile „. De eodem etiam
R. a FONSECA (p) „, placidum... est vo-
„ mitorium (ait), fine ullo labore per supe-
„ riora educit humores poſt 3 vel 4 ho-
„ ras „: & „, qvod vel in iis, qui maxime
„ a vomitu alieni, non infelici ſucceffuſ-
„ pius ſum expertus „, inquit B. SILVA-
TICUS (q). Paratur hunc in modum:

Rx. Syr. Menthæ

— Violar. aa 3vij. Coqv. in
mellis craffitiem; ſub finem subducto igne
infperge

Rad. Peponis arefactæ

Sem. Raphani &

— Urticæ maceratorum in ∇^a
roſarum, arefactor. & tritor. aa. 3j.

Rad. Afari contritæ & cretæ 3ij
Cinnamom.

Sem. Fœnic. aa 3ij. Confice in
elect. liqv.

(p) l. c. T. 1 Conf. 21.

(q) l. c.

3. *Vitrum & ii ceratum* etiam impense ab nonnullis hic fuit commendatum , qvo solo GEOFFROI (r) leucorrhœam in virgine 18 annor. sustulit ; monet tamen usum ejus in uteriniis evacuationibus curandis constantem esse debere per 15 vel 20 dies , additis etiam cautelis , ut a minima dosi initium fiat , neqve robustis ultra 5 grana pro prima dosi præbeatur , postmodo vero sensim ad gr. 18. 20 ascendatur , dosi tamen haud prius aucta , qvam a priore conspicuus seqvatur effectus , ne alioquin hypercatharsis oriatur : porro ut omnia acida vegetabilia (emeticam remedii vim ad perniciem usqve augentia) sub ejus usu vitentur.

C A P U T III.

C A T H A R T I C A.

§. 43.

CATHARTICA perinde tantum ad leucorrhœæ faciunt curationem , dum primas vias a saburra vindicando digestionem læsam emendant , humoresqve ab utero aver-

r) Philos. Trans. Vol. 47 p. 273. lqq.

tendo fluorem album imminuunt, ut absqve
iis absoluta mali pertinacioris medela ne spe-
rari qvidem possit, miraculoqe sit, potuisse
scribere E T T M Ü L L E R U M (s) : „ purgan-
„ tia ... circumspete & rarissime usurpan-
„ da sunt, qvia parum vel nihil juvant,
„ qvin potius fluorem album magis augent;
„ auctore enim PLATERO observatum fuit,
„ qvod purgantibus fluxus talis interdum
„ fuerit excitatus, qvæ alias eundem nun-
„ qvam passæ fuerunt „. Si tamen uspiam
opus iis foret, draftica svadet, ut bryo-
niam, jalappam, colocynthidem, hellebo-
rum. Verum enim vero tantum abest, ut
noxia magis qvam utilia sint cathartica, &
draftica mitioribus præstare videantur, ut
multo potius utrumqve secus obtineat: ne-
qve hic PLATERI opus est suffragio, ubi
aperte natura & experientia tot seculorum
contrarium tuetur. Sane oborto sponte
alvi fluxu leucorrhœam desiisse alibi (t) vi-
dimus; & qvanto cum fructu alvus hocce in
morbo arte moveatur, haud pauci ostendunt
casus. Sic J. G. ERNESTI (u) novit femi-

(s) l. c.

(t) Vide §. 38. g).

(u) l. c. Tert. 30 A. 1724 Octob. Cl. 2. art. 3.

§. 4 p. 385. sq.

nam plethoricam 30 annorum viro septuagenario nuptam, mensesque & regulares & justo etiam quandoque ubiores habentem, & simul leucorrhœæ ita obnoxiam, ut eam a fine unius periodi menstruæ fere ad alterius usque recursum cum alvo segni patetur, quæ cum nullis effet remediis expugnabilis, solis catharticis multum identidem imminuebatur. Imo vero cum apud A. E. BÜCHNERUM (x) pueræ leucorrhœæ remedia tum multa tum varia, præter sola cathartica neglecta, opponens morbum usque adeo exasperasset, ut acrimonia vicinas partes erodente vix incedere posset, sumpto tandem infuso uterino laxante prorsus ac sine recidiva convaluit. Unde non utilitas modo, verum necessitas quoque catharticorum hocce in morbo dandorum abunde elucescit; & canonis instar habendum est, *leucorrhœæ curationem a catharticis emeticisque ordinendam esse*. Hoc autem fundamento jacto queritur porro, *quoties & qualia* potissimum cathartica præbere oporteat?

(x) *Miscell. phys. med. math. A.* 1730 Mart. Cl. 2
art. 3. p. 931. sq.

§. 44.

Qvoties alvum ducere neceſſum fit, ſi ad indicationes paulisper reſpexeris, illico ſuccurret. Cum enim catharticorum effica- citas non modo ea fit, ut ſaburram prima- rum viarum educant, digestionemqve ita e- mendent (ad qvod una alterave alvi ductio principio morbi instituta ſufficeret utiqve), verum id præ primis utilitatis habeant, ut humorum fluxum ab utero ad intestina aver- tendo ubertatem leucorrhœæ minuant, ſic- que locum ſimul ac tempus remediis laxa uteri vafa roborantibus exhibendis procu- rent, cumque ad id longiore temporis mo- ra opus fit, haud obſcure colligitur, ca- thartica in curatione leucorrhœæ crebrius eſſe præbenda, ſi ſucceffus curationis ferio intenditur. Multum ſane iteratæ cathartes P O T E R I I (y) matronæ profuere. G. P. N E N T E R I (z) mulieri qvintum in mensem gravidæ cum a febre epidemica liberatæ ſu- perveniſſet leucorrhœa variij coloris ac tam copioſa, ut ſæpius per diem induſia mutare cogeretur, metuſqve eſſet, ne fluor ad

(y) Vide histor. 4.

(z) R A U L I N l. c. T. 2. P. 3. S. 2. C. 10 p. 512.

partum usqve cum periculo persisteret , il-
lum nil nisi 3 vel 4 doses pilularum s TAH-
LII (a) per intervalla datæ sustulere . Per-
inde s. JACOZII apud L. RIVERIUM (b)
,, mulier Costensis quadragenaria laborabat
,, a 7 mensibus fluxu muliebri seroso , quem
,, curavit intra 5 septimanas , exhibendo
,, singulis 8 diebus gr. viij resinæ Jalappæ ...
,, Dein recidivæ occasio sublata est usu se-
,, qventis opiatæ

R. Conf. rosar. antiqu. 3ij

— absinth. Pontici 3j

♂ elect. triasantali &

————— aromatici rosati aa 3j

Coral. rubr. ppt. 3f.

Theriacæ veteris 3ij. cum

Syr. de ros. sicc. F. opiate , de

,, qva sumebat ad magnitudinem avellanæ

,, singulis diebus hora somni per longum

,, tempus ,,. Haud secius ægræ G A L E N I (c)

3^{to} quoque die alvus ducebatur. Imo ve-

ro non modo ex intervallis alvum ciere , sed

continentem etiam diarrhoeam lenem indu-
cere , est operæ pretium , id quod M Ü N N I-

(a) Vide §. 5. No 10.

(b) Observ. communic. 8va.

(c) Vide histor. 1.

CHII (*d*) mulier est experta , & L. RIVERII (*e*) „ mulier quadragenaria diurno „ fluore albo laborans post multa remedia „ frustra tentata ptisana laxante per men- „ sem integrum singulis diebus usurpata pro- „ tinus liberata est. Hujus autem ptisanæ „ compositio talis fuit:

R. Sennæ mundatæ 3j

Sem. Coriandri ppt.

Liqvir. rafæ aa 3jſ

▽^a fontis , in qva Tamariud.

3ijj & ligni Lentisci 3j bul- „ lierint , cyathum j. Infundantur frigide „ per noctem , & colaturam capiat mane „ duabus horis ante pastum „. Similem quoqve casum narrat RAULIN (*f*): matro- næ 22 annor. a partu difficiili , lochiis par- cius justo procedentibus , totum hypoga- strium tensum admodum dolebat cum febre insigni. Ter secta vena , fotus , & emulsa nitrofa dolores minuebant; corpusqve uteri tactui enormi magnitudine occurrebat: sed fotibus emulsisqve continuatis , & alvo ope ▽^a Cassiæ , cuius ad pintam ♀ri emit. gr. j.

(*d*) Vide histor. 6.

(*e*) Obs. med. Cent. 3. Obs. 81.

(*f*) I. c. T. 2 P. 3. S. 1. C. 6 p. 105 sqq.

identidem adjiciebatur, continenter libera servata, omnia sensim symptomata evanere, solo qvodam fluore albo superstite, qvi nihilominus etiam ptisanæ e rad. graminis, boragine, & cichor. silv. cum nitro, crebroqve ∇ Cassiæ cum sero lactis paratae, ac Q_f ro emetico, ut prius, acuatæ, usui cefit. Unde satis colligitur, qvantæ ad leucorrhœæ curationem efficaciæ sint cathartica aut iterata aut continuata.

§. 45.

Qualia porro cathartica in usum vocare oporteat, vel ex eo qværere supervacaneum non est, qvod, ut ante dictum, ET T M Ü L L E R U S draſtica mitioribus prætulerit; sed cum Cl. hic Auctor multum circa ea sit hallucinatus, alii multo potius audiendi erunt, qvorum e numero sane F. H O F F M A N N U S (g) veteranus Practicus, cum primo omnium loco cathartica danda pronunciaſſet, continuo subdit: „qvod ta-
„men non per remedia valde commoven-
„tia ac purgantia, sed potius per benigna
„& mitiora, qvæ repetita dosi data per

(g) l. c. curat. §. 3.

„ epicrasin operantur , debet præstari „.
 Præstantissima autem semper ea fuisse sunt
 observata , qvæ simul aliquid in se virtutis
 roborantis vel adstringentis recondunt , &
 non revellunt modo , evacuantqve , sed to-
 num etiam amissum vasis conciliant . Hujus
 autem prosapiæ sunt :

1. *Rheum* , qvod plerique hic ceteris
 omnibus anteponunt . Sic R. MEAD (b)
 „ purgantia (inqvit) brevibus intervallis
 „ data convenient , in primis rhabarbarum ,
 „ qvod vel per se , adjectis qvibusdam aro-
 „ maticis , additoqve interdum , ubi res
 „ postulat , & rii sexies sublimati aliquanto ,
 „ vel qvod nomine TRÆ rhabarbari vinosæ
 „ prostat , freqventer assumi poterit „ : ne-
 que id immerito ; qvandoqvidem teste F.
 HOFFMANNO (i) „ ex omnibus ... laxan-
 „ tibus in hoc morbo proficuis certe emi-
 „ nent rhabarbarina , eo qvod præter la-
 „ xantem etiam blande balsamicam & ama-
 „ ricantem recondunt virtutem , qvæ aci-
 „ dum vitiosum corrigit , partesqve simul
 „ dejectas egregie roboret . At vero ne se-
 „ ligatur rhabarbarum leve & cariosum , sed ,

(b) l. c.

(i) l. c.

„ qvod optimum est, solidum, sincere (ait)
 „ moneo „ „ RÜCKERI (*k*) profecto vetula
 solo rheo suam ad leucorrhœam utebatur.
 Varia autem ei coindicata, de qvibus in con-
 seqventibus capitibus agetur, jungi possunt,
 in primis vero tonica, at non sine circum-
 spectione ac judicio, leniora nempe ac par-
 ciora sub initium & vigente adhuc morbo,
 eaqve roborantia nervina tantum, & qvæ
 lentorem humorum frangunt; postmodo ve-
 ro, ubi corpus abunde vacuatum evasit si-
 mul purius, efficaciora etiam, ita ut sub fi-
 nem adstringentia ipsa rheo utilissime copu-
 lentur. Et dum L. RIVERIUS (*l*) monet
 „ purgantibus qvædam adstringentia & robo-
 „ rantia esse permiscenda, ne humores com-
 „ moti versus uterum magis præcipitentur „
 id non aliter, qvam ut diximus, est acci-
 piendum. Concinnas admodum isthunc in
 finem formulas tironibus F. HOFFMANN-
 NUS (*m*) suppeditat, e rheo aliisque coin-
 dicatis, tonicis præsertim, combina-
 tas, v. g.

Pulvis : Rx. Rhei optimi 3 fl

Terr. fol. 匁 gr. xij. M. D.
pro dosi.

(*k*) Vide §. 6.

(*l*) Prax. med. L. 15, C. 4.

(*m*) 1. c.

Infusum: Rx. Rhei optimi 3vj
 Rad. Aristol. rot.
 —— Zedoariæ
 —— Pimpinellæ
 Cort. ♂ aa 3ij.
 Sem. Anisi stell.
 —— Dauci
 Sal. ♀ri aa 3j. M. F. Species
 pro vini mensura j.

Pilulæ: Rx. Extr. Rhabarb.

— Aloes rosatæ
 Gumm. Galb.
 — Sandar.
 — Hederæ
 Myrrh. elect.
 Extr. Aristol. rot.
 Succini aa 3j.
 Balf. Peruv. q. f. F. e 3j pil.

No xx. Ubi vero sub finem adstringentia indicantur, optime vel myrobalana vel terebinthina vel martalia rheo adjiciuntur. Sic Ill. s T Ö R C K (n) principio morbi MR^{am} incidentem, diureticam, præbebat: „qvan-
 „ doqve autem (inqvit) integre fisti (fluxus)
 „ hac MR^a non potuit, licet multum fue-
 „ rit imminutus, tunc autem $\ddot{\sigma}$ is No 63

(R. Rhei elect. ʒij

Mirobal. citr. ʒj

°° still. Cumin. gtt. j. M. F. ȝ

,, pro unica dosi) aliquoties alterno die da-
,, tus morbo finem imposuit,.. Apud L.
RIVERIUM (o),, Religiosa... correpta est
,, fluore albo admodum copioso & molesto,
,, a qvo præpostere curata a chirurgo, qvi
,, vehementia purgantia ei exhibuerat, affe-
,, ctus ad seqventem hyemem productus est,
,, nec tunc temporis cessavit, sed tantum
,, imminutus est, & ægra pallida & deco-
,, lor permanxit. Vere autem inseqvente
,, affectus paulatim in deterius vergebatur
,, usqve ad æstatis initium, qvo tempore
,, inappetentia, & febricula laborabat, qvi-
,, bus interdum tussis accedebat, ut metus
,, effet, ne in tabem incideret. Ei primum
,, præscripsit leve catharticum ex senna &
,, rhabarbaro, postea phlebotomiam, ac
,, conseqventer ptisanam laxantem per 4
,, dies: postea balneum tepidum... per bi-
,, duum seqvens. A balneo correpta est
,, alvi fluxu, a qvo bene habere videbatur
,, primis diebus, postea tamen ab eo vires
,, infirmiores evadebant, febris interdum

(o) Obs. med. Cent. I. Obs. 46.

„ aderat, & ventriculus inappetentia labo-
 „ rabat. Jussit, ut per 5 vel 6 dies sume-
 „ ret mane rhab. pulv. 3j cum syrupo de
 „ Absinthio Pontico ad boli formam reda-
 „ ctum hora una ante prandium. Prima
 „ die alvus multum & freqventer dejecit,
 „ 2da alvi fluxus omnino cohibitus, & reli-
 „ qvis ventriculus valde confirmatus, fe-
 „ bricula disparuit, melius colorata in dies
 „ apparebat; sed inappetentia perseverabat.
 „ Jussit, ut rhabarbari usum continuaret ad-
 „ huc per 12 dies, sed non amplius cum
 „ syrupo, sed cum terebinth. 3j in bolum
 „ redactum, ad fluorem uteri melius com-
 „ pescendum. Et sic ab omnibus prædictis
 „ affectibus liberata est, „ Luculentum quo-
 que hujuscemodi casum J. P. BURGGRAT-
 VIUS (*p*) memoriae prodidit in hæc verba:
 „ mulier 37^{um} ætatis suæ annum agens,
 „ procera, gracilis, melancholico-choleri-
 „ ci temperamenti, plurima tædia diu per-
 „ peffa, aliquot liberorum mater, pluribus
 „ abhinc retro annis diuturnis & atrocibus
 „ capitis doloribus vexata, sed thermarum
 „ Wisbadensium externo & interno usu ab
 „ iisdem liberata, ineunte vere A. 1735 il-

„ lis ipsis denuo & vehementer tentata , sub
„ Augusti mensis finem ad idem sibi exper-
„ tum remedium confugiens , ac circa Se-
„ ptembris medium a thermis redux sub
„ ipsum in domum suam ingressum men-
„ strua , justo tamen termino , prodire sen-
„ tiebat , qvibus cessantibus pituita succede-
„ bat , hujusqve excretio ita successive au-
„ gebatur , ut circa finem Septembris præ-
„ debilitate decumbere cogeretur , & mihi
„ accersito exponeret , tantum materiæ pi-
„ tuitosæ viridescentis , admodum spume-
„ scentis fœtentisqve , ac genitalia eroden-
„ tis ex iis effluere , ut non solum ob de-
„ bilitatem exinde ortam erigere se nequeat ,
„ sed & propterea in situ erecto corpus fer-
„ vare sibi haud liceat ; qvoniam tunc præ-
„ cipitis torrentis instar illa pituita prolabe-
„ retur . Totum proinde abdomen ulceris
„ instar sibi dolere , cruciatusqve in nates
„ & femora usqve extendi , unde sibi proxi-
„ me , nisi efficaci remedio succurratur ,
„ moriendum esse censeret . Pulsus erat de-
„ bilis & utcunqve celer , sitiebat multum ,
„ cibi vero aut nihil aut parcissimum adpe-
„ tebat . Ego ex hisce circumstantiis caco-
„ chymiam pituitoso - atrabiliariam usu ther-
„ marum interno in primis motam , sed
„ haud emotam , qvin ad uterus potius de-

„ rivatam, colligens... remedium digerens,
„ abstergens, demulcens, atqve simul leni-
„ ter stringens... Pulv. rhabarbari leniter
„ tosti & seminis cardui Mariæ cum there-
„ binthina in pilulas redigendum, harumqve
„ Ʒj m. & v. sumendum, superbibendo in-
„ fusum saturatum ex Galeopsidis foliis &
„ floribus paratum præscribebam. Levari
„ inde se sentiebat; unde 4^{to} abhinc die
„ aliqualis revulsionis gratia propter imma-
„ nes abdominis ulcerosos qvasi dolores ve-
„ nam in cubito incidi & sanguinis Ʒvj cir-
„ citer extrahi curavi. Extractus sangvis
„ vix refixerat, cum levi crusta inflamma-
„ toria tectus appareret: cruciatus abdomi-
„ nis femorumqve multum exinde remitte-
„ bant; fluor vero pituitosæ, spumosæ, fœ-
„ tidæ, viridescentis acrisqve materiæ con-
„ tinuabat non tamen adeo pleno amplius
„ rivo. Ægra usum pilularum ultra octidu-
„ um adhuc continuabat, nunc ter de die
„ Ʒj earum sumendo. Excernebat tum &
„ per alvum copiosam pituitam; cumqve ni-
„ hilominus vires qvodammodo redire inci-
„ perent, jam paulo validius digerere, e.
„ vacuare, & partes affectas roborare stu-
„ debam. Propterea rhabarbari optimi pulv.
„ & Succinum alb. ppt. anatica qvantitate
„ itidem cum terebinthina in pilulas redigi,

„ & ter de die ad 3j & ultra ad 3s assumi
„ curabam : tumqve tam per genitalia qvam
„ per anum pluribus diebus ingens nigri ,
„ spissi , feculenti , atrabiliarii , & abomina-
„ bili fœtore molesti sangvinis copia , sed
„ cum ægræ euphoria & notabili levamine ,
„ prodibat , ita ut eadem profiteretur , su-
„ periorem abdominis partem a ventriculo
„ ad umbilicum usqve jam prorsus sanam se
„ sentire. Manifestum inde mihi fiebat ,
„ multum sangvinis crassi , terrestris , fecu-
„ lenti , a Veteribus non adeo male pro
„ atrabiliario sive melancholico venditati in
„ hoc corpore collectum , & usu thermarum
„ Wisbadensium intrinseco in vasa cœliaca ,
„ meseraica , & hypogastrica per rationes
„ qvalitatis hujus sangvinis & situs horum
„ vasorum derivatum fuisse , atqve ibidem
„ molestissime hæsisse , nunc vero resolu-
„ tum & eliminatum esse. Per duarum
„ propterea septimanarum decursum harum
„ pilularum usui inhærebam , & in dies me-
„ lius se habere ægra lætabatur , qvantitas
„ qvoqve dictorum excretorum successive
„ minuebatur. Tandem cum diuturnum ista-
„ rum pilularum usum aversaretur , liqvoris
„ Terr. fol. ♀ri duplum cum elixirii aperiti-
„ vi CLA U D E R I simplō remixtum ad gtt.
„ 60 & ultra bis de die sumere jubebam

„ tamquam abstergivum, antisepticum, &
 „ leniter evacuans pharmacum, superbiben-
 „ do simul supra memoratum infusum. Redi-
 „ erunt interea legitime menstrua; hisce
 „ vero cessantibus fluor ille pituitosus non-
 „ nihil recrudescebat, quo tamen non ob-
 „ stante ægra jam multo vegetior conservata
 „ sua munia iterum obibat. Cum vero post-
 „ modum solito plus ciborum appeteret, &
 „ ingereret, ac tumorem mollissimum, gra-
 „ cilem, farciminis instar longum, totum
 „ abdomen per hypochondria ambientem,
 „ cum aliquaque ipsius abdominis intumescen-
 „ tia, sentiret, ad ulterius expedienda pa-
 „ riter & roboranda vasa & viscera abdo-
 „ minalia TRæ vitrioli ♂tis ♀satæ simplum
 „ & TRæ Rhabarbari ac syrupi Artemisiæ
 „ ana duplum præscribebam, ut m. & v.
 „ cochl. j. fumeretur; cujus usu primo sta-
 „ tim die manifesto, aliisque præsentibus
 „ id coram observantibus, abdomen subsi-
 „ dere, & ægra tandem continuato ejus
 „ usu cum sanitate in gratiam perfecere
 „ redire cœpit, ..

2. ▽x soteriæ catharticæ simulque leni-
 ter ♂les, cuiusmodi est aqua thermarum Ca-
 rolinarum, cui teste D. BECHERO (q) fer-

t (q) Abhandl. von Carlsbade.

rum inest, & cuius legitimus potus leucorrhœam sæpenq; mero profligavit. Sic J. C. TILLINGII (r) „ puella optima, anno „ rum 14, vivida fatis, ingeniiq; præco- „ cis, patiebatur excretionem albicantem, „ menstrua periodo recurrentem, cum nau- „ sea, cardialgia, & vomitu freqventi; „ qvibus tamen symptomatibus commissi circa „ diætam errores sæpius ansam dabant. In- „ terim Carolinarum usus repetitus sanissi- „ mam reddebat ægram animo & corpore „ præstantissimam „. Perinde refert SCHEI- „ DEMANTEL (s) feminæ, cui per qvam „ parce menstruanti ante & post catamenia mu- „ cus albus profluebat, ab usu Brückenvieu- „ sis aquæ optimum fuisse allatum auxilium.

(r) l. c.

(s) Kurze Nachricht von dem Nutzen und Ge- brauch der im Fulda zu Brückenvau und Wer- narz gelegenen Mineralbrunnen p. 114.

C A P U T IV.
D I U R E T I C A.

§. 46.

DIURETICA quoque ad leucorrhœæ curationem persæpe egregie faciunt, dum acre dilutum evacuant, & humorum fluxum ab utero ad vesicam urinariam avertunt, quem eorum effectum ipse jam GALENUS (*t*), illiusque sectatores (*u*) ab experientia commendarunt. Hinc etiam Vratislavienses Medici (*x*) de recta huic morbo medendi ratione agentes „ nec abhorruimus „ (ajunt) a diureticis, memores illius „ SWALVIANI axiomatis: *uterus albo* „ *fluore fætens diuresi mirifice mundificatur.* „ Eo autem fere scopo dedimus succinata, „ ut & terebinthinata; nec laude sua de- „ fraudanda sunt decocta pituitam & serum „ per urinas evacuantia, quæ SYLVIO in „ crebriori usu fuerunt „ Duplicis autem generis diuretica hic locum habent, nempe

(*t*) Vide histor. 1.

(*u*) FOREST. l. c. Schol. ad Obs. 21.

(*x*) Hist. morb. Vratisl. A. 1700 p. m. 168.

§. 47.

I. *Abstergentia incidentia*, initio maxime morbi, qvamdiu uterus est fôrdidus, ulcerato similis, & vasa ejus humore lento viscido turgent; tunc enim hujusmodi remedia lentum incidendo, vasa stimulando humores ab utero ad vesicam traducendo, ad ulteriorem curationem viam sternunt. Sunt autem illa præprimis salia vel media vel alkalina in debito vehiculo exhibita. Hunc in usum familiaris erat STÖRCKIO (y) sequens MR^a:

Rx. Lap. 69

Acet. vini aa. ʒii

Syr. 5 rad. aper. ʒj.

▽z fl. Sambuc.

Fœniculi aa ʒiiij

Terræ fol. ♀ ʒii

Liq. anod. min. gtt. vj. M. D.

omni trihorio cochl. ij. „ Sub initium (in-
 „ qvit Auctor) fluor inde augebatur, & ma-
 „ jor materiei albæ glutinosæ copia effluxit;
 „ posthac vero materies longe tenuior &
 „ parciор prodiit, & sola hac MR^a ali-
 „ qvamdiu continuata fluor qvandoqve pe-

„ nitus sistebatur „. Præprimis vero hic $\nabla \alpha$ foteriæ sale medio vel alcalino imbutæ conducunt , qvæ affatim haustæ sæpenumero contumacissimas leucorrhœas percurarunt. Sic J. STORCHII (z) mulier 30 annis major , & leucorrhœam aliquot annos uberem passa , ab anno menses etiam nimios cum grumis sanguinis prodeuntibus qverebatur , queis iterum imminutis illa evasit copiosior , cum anorexia , abdominis artuumqve inferiorum doloribus , ac tanta debilitate , ut ægra vix incedere posset. A variis usurpatis levata , at non percurata , Selteranum tandem ad fontem concedens maximo inde cum fructu revertit.

§. 48.

2. *Roborantia*, qvæ evacuando ac revellendo ab utero hujus vasis simul amissum tonum pedetentim restituunt ; cujusmodi sunt

a) *Daucus*, siqvidem s. PAULLI (a)
„ norit muliebri experimento , qvandam folius Dauci herbæ ... decocto , in quo 3j

(z) Obs. clinic. ann. 8. April. Cl. 2. p. 435.

(a) Quadrip. botan. Cl. 3. nt. Filipendula p. 332.

„ pulv. rad. Filipendulae sibi ipsi propinarat,
 „ a profluvio albo muliebri paucis interce-
 „ dentibus diebus viudicatam , qvæ incassum
 „ aliquot ampullas electuariorum in eum fi-
 „ nem præparatorum fastidiose absumpserat „

b) *Juniperi* grana. „ Soror hospitis mei,
 „ inquit H. REUSNERUS (b), . . . fluxu
 „ albo jam aliquot annis conflictata hac ra-
 „ tione convaluit: accipiebat cineres far-
 „ mentorum vitium, & aquæ injiciens pe-
 „ des fomentabat vesperi immediate ante-
 „ quam cubitum iret, primoqve die deglu-
 „ tiebat grana Juniperi iij. altero v. tertio
 „ vij. semenqve præterea urticæ adfu-
 „ mebat „ .

c) *Dictamni* albi radix. Apud Ill. A. de
 STÖRCK (c) „ femina 27 annor. fluore al-
 „ bo jam multum inveterato laboravit, &
 „ converebatur de magna & dolenti tensio-
 „ ne in toto hypogastrio , menstrua habuit
 „ pauca & admodum irregularia. Sumpfit
 „ mane gr. xx pulv. rad. dictamni albi , &
 „ totidem vesperi. Mox fluor albus auge-
 „ batur, & copiosum urinæ stillicidium or-

(b) In G. H. WELSCHII syloge curat. & obs.
 Cent. 5. Obs. 103.

(c) Libell. de flammula Jovis Cap. 2. cas. 9.
 p. 47. sq.

„ tum est cum molesto tenesmo. Post ali-
 „ qvot dies cessavit tenesmus, mansit au-
 „ tem copiosus fluor albus, & materies fie-
 „ bat acrior, & erosit pudendorum labia;
 „ ardor inde ortus mitigabatur lacte & aqua
 „ tepida, qvibus partes affectæ sèpius ablu-
 „ tæ sunt. Continuatum fuit idem reme-
 „ dium, & sensim cessavit fluor albus, &
 „ ægra in hypogastrio nullam amplius mo-
 „ lestiam percepit; menes autem in melio-
 „ rem ordinem redigi non potuerunt,,.

d) *Balsama* denique nativa, qvæ non modo insigni virtute diuretica, sed roborante etiam & adstringente gaudent adeo, ut eorum in usu prudentia sit opus haud vulgari, nec sine compluribus cautelis illa præbere oporteat; nempe 1^{mo} corpus ante probe sit purgatum, 2^{do} a parca dosi eorum usus inchoandus. 3^{tio} catharticis tutissime copulantur, &c. Hoc tamen præ aliis habent singulare, qvod cum simul vulneraria sint & antiseptica, ad præsentem uteri exulcerationem (d) sanandam, putresque humores corrigendos, hic apprime serviant. Quid balsama hæc (in primis terebinthina) rheo aliisve catharticis unita efficacitatem adversus leu-

(d) Vide §. 35. B. c).

corrhœam exferant, superius (*e*) jam vidi-
 mus: nunc etiam, qvid sola possint, per ob-
 servata docemur. v. RIEDLINI (*f*), ma-
 „ trona . . . 38 annor. ante bimestre fere ca-
 „ tarrho ad nares tam vehementi correpta
 „ fuit, ut sero continuo ex iisdem destil-
 „ lante emunctoriis excipiendo omne fere
 „ tempus terere opus habuerit adeo qvidem,
 „ ut noctu obdormire vix potuerit, dum
 „ nempe decumbenti serum tanto cum im-
 „ petu in pectus ruit, ut nisi sedulo sibi
 „ consuluissest, vix suffocationis periculum
 „ avertere potuisset. Sicuti vero jam olim
 „ mastiches grana haud absqve fructu iu-
 „ hoc malo deglutierat, ita & nunc votis
 „ ejusdem sic satisfecere, ut vix bis terve
 „ iisdem in usum ductis omnis catarrhus ad
 „ has qvidem partes cessaverit; verum enim
 „ vero immediate eidem successit fluor al-
 „ bus, qvi non solum partes genitales in-
 „ undavit, sed & accredine sua sic læsit, ut
 „ ob dolorem subseqventem consilio medico
 „ opus habuerit, qvod cum... petisset,
 „ ipsametqve priori catarrho adhuc instan-
 „ te pilulas Francof. sumpsisset, cetera...

(*e*) Vide §. 45. No 1.

(*f*) Curar. medic. millenar. No 404. p. 241.

„ optime valentem alio purgante opus non
 „ habere judicans, *ous* *Therebinthinae* usum
 „ ipsi commendavit, qvem eo lubentius, ut
 „ ut palato minus gratum, in usum duxit,
 „ qvia & olim jam profuisse meminerat, nec
 „ frustra; vix enim per triduum continuato
 „ ejusdem usu ita hic qvoqve fluxus inhibi-
 „ tus fuit, ut alio medicamento non ha-
 „ buerit opus ... Omnino vero laudem in
 „ hoc malo meretur memoratus *ous*, qvem
 „ qvippe, nisi altiores subsint causæ, raro
 „ hactenus se frustra commendasse meminit,,
 Cl. Auctor. Ejusdem efficaciæ est *balsamus Peruvianus*, qvem idem hic Auctor (g) „ in
 „ albo mulierum fluore raro frustra ... in
 „ usum ductum meminit,. Idem etiam præ-
 stat *Opobalsamum*, qvod ab ipso eodem
 Practico (h) „ præcipue in fluore albo ma-
 gno cum fructu aliquoties exhibitum fuit,
 „ ita ut brevi non semel malum sat diutur-
 „ num post diligentem ejusdem usum ceffa-
 „ rit. Exhibeo autem (ait ille) ejusdem m.
 „ & v. 7 vel 8 guttas cum vino malvatico,
 „ cum qvo facilius, qvam ullo alio vehicu-
 „ lo, sumitur,. Nec minoris est energiæ

(g) Lin. med. ann. I, August. 31 p. 267.

(h) Ibidem Junli 15 p. 172.

balsamus Copaiæ, qvi proinde cum vilioris
sit præ Opobalsamo pretii, huic magno ægro-
rum commodo surrogari potest. De hoc
ita v. RIEDLINUS (i): „ mulier (inqvit)
„ ... 38 annor. cum jam sæpius grida
„ semper tum præsertim temporis a fluore
„ albo non parum molestiæ pateretur, in
„ hoc qvidem malo egregium levamen per-
„ cepit, qvando aliquoties Opobalsamum,
„ qvod sub veri nomine venditur, sumpsit;
„ qvod tamen qvia hac ipsa de causa in non
„ exiguo pretio divenditur, nimis pretio-
„ sum ipsi videbatur: unde me, ut reme-
„ dium, qvod cum hoc viribus qvidem re-
„ spondeat, at paucioribus nummis compa-
„ rari possit, rogavit; & ego Ω um Therese-
„ binthinæ commendavi, qvem idem plane
„ præstittisse, aliquoties tum hæc testata fuit,
„ tum aliæ plures notarunt. Accidit vero
„ forte fortuna, qvod dono accepit Ω um
„ tales ex Tirolensi Comitatu allatum,
„ qvem cum nuper denuo grida priori
„ malo non parum vexaretur, aliquoties
„ in usum duxit. Licet autem denuo etiam
„ scopum suum obtinuerit, qvod nempe
„ fluor albus plane inhibitus fuit; successit

(i) Curar. medic. millenar. No 572. p. 354.

„ tamen malum hoc ipso magis molestum,
 „ dum nempe vix 3^{to} mense gravida tan-
 „ tum non continuo ad urinam excernen-
 „ dam stimulata fuit, & ejusdem etiam ma-
 „ jorem ac alias qvantitatem excrevit: unde
 „ jam omnis hic Ω us eidem suspectus esse
 „ cœpit, & redeunte fluore albo an non
 „ aliud substitui possit balsamum minoris
 „ pretii? me interrogavit, commodeqve
 „ mihi in mentem venit balsamum, qvod
 „ de Copaiba nominaut, ... unde hoc ei-
 „ dem præscripsi, nec spe mea vel minimum
 „ falsus fui; sicut enim idem omnino, qvod
 „ olim Opobalsamum, præstitit, ita urinam
 „ illud nimium non movisse ... gaudens
 „ retulit ...

C A P U T V.

D I A P H O R E T I C A.

§. 49.

DIAPHORETICA porro *utrum, qualia,*
quando ad leucorrhœam profligandam faciant,
dispiciendum venit. Ac primum qvidem de
 utilitate illorum nihil est, qvod nos ambi-
 guos teneat; nam *imo* massam humorum a
 superflua aqua vindicant, eam per cutis po-

ros exigendo, 2^{do} motum humorum ab ute-
ro ad peripheriam corporis avertendo leu-
corrhœam imminuunt; 3^{to} sunt etiam dia-
phoretica, qvæ sanguinem ab acrimonia de-
purant, ulcera siccant, tonum laxis vasis re-
staurant, &c. Proinde cum omnia hæc in
curatione leucorrhœæ non raro indicentur,
satis liqvet, diaphoretica non utilia modo,
sed necessaria etiam sæpenumero esse; do-
cuitqve rerum usus, contumacissimas ad alia
qvæqve remedia leucorrhœas solis demum
cessisse diaphoreticis. *Qvalia* autem præ pri-
mis in usum vocare oporteat, eadem nos
magistra experientia jam dudum edocuit;
enim vero ex omni diaphoreticorum pen-
nulla propemodum sunt, qvæ omnibus pau-
lo ante memoratis indicationibus ita facere
fatis possent, ac decocta, infusa, spiritusve ra-
dicum, corticum, & lignorū Americano-
rum, ut est ebenum, gvajacum, saffafras,
farsaparilla, &c. qvippe qvæ in syphilitico
etiam malo operæ pretium faciant, velut in
SCHAARSCHMIDTII (k) ægra videre est.
Qvando vero ad exhibitionem transeundum?
Tum videlicet, ubi vasa prius depleta, ma-
teriaqve morbi variis viis magna pro parte e

(k) Vide §. 33.

corpore educta, residuumq; ejus subactum
& attenuatum, omnisq; jam abest metus,
ne turgens cacochymicus humor, commotus,
minimisq; impactus vasis majora producat
mala, qvemadmodum ex præmaturo id ge-
nus diaphoreticorum corporibus admodum
impuris exhibitorum usu accidisse est obser-
vatum. Hinc recte N. A. FRAMBESARI-
US (*l*) de leucorrhœa agens „ ad reliquias
„ (ait) per sudorem discutiendas & corpus œ-
„ dematosum siccandum nihil præstantius est
„ decocto ligni sancti per aliquot dies mane
„ hausto „ In eandem fere sententiam loquitur
F. HOFFMANNUS (*m*) „ qvandocun-
„ qve (inqviens) feminæ scorbuticæ, imo
„ venereæ, vel qvæ crebrius purpuram ru-
„ bram patiuntur, hac fluxione perniciofa
„ corripiuntur, abstinentia omnino est a
„ calidioribus purgantibus & balneis; sed
„ mitissime sunt primis temporibus tractandæ
„ diaphoreticis fixioribus, & ejusmodi me-
„ dicamentis, qvæ corruptioni lymphæ ma-
„ xime obsistunt. Ego igitur tali in casu
„ cum fructu adhibui pulverem nostrum be-
„ zoardicum cum uno altero de sulphuris
„ & ii nostri grano maritatum, atq; simul

(*l*) Canon. & cons. med. cons. 2.

(*m*) I. c. cautel. §. 8.

„ decoctum præscripsi , qvod folet in lue
 „ venerea ex lignis & radicibus sanguinem
 „ depurantibus , addito ♂¹⁰ crudo , compa-
 „ rari. Et si corpus per mensem & ultra
 „ ita fuerit præparatum , interna pariter ac
 „ externa cum meliori fructu pro sanatione
 „ possunt adhiberi,,. Omnibus haetenus de
 usu diaphoreticorum , in primis vero e li-
 gnis , corticibus , radicibusqve Americanis
 paratorum , dictis bina luculenta exempla
 fidem conciliabunt. H. C. WINTER (n) nar-
 rat feminam ad 26 annos natam ad leucor-
 rhœam simplicem diu varia necquidquam
 usurpasse , fluxumqve multo potius acrem
 evasisse dolentemqve ; postea vero quam per
 14 dies decoctum ligni sancti cum sarsaparil-
 la , fassafras , herbis antiscorb. & passulis ,
 nec non ♂ iata cum interpositis pilulis cathar-
 ticis ♀ libus , aliquamdiu sumplisset , prorsus
 convaluisse. ZACUTUS (o) quoque feminæ
 meminit , leucorrhœam cum immani demum
 cephalæa ex intervallis vexante , abdominis-
 que ac faciei inflatione , passæ , quæ variis
 evacuantibus frustra oppugnata lentam acci-

(n) Annal. Vratisl. Tent. 32 A, 1725 Maji Cl. 2.
 art. 3. §. 3. p. 490. sq.

(o) Prax. admir. L. 2. ObL. 89,

vit febrem cum macie. At viribus victu roborantiumque usu erectis, lenique diuresi præmissa, exhibitum ebeni decoctum feminam pristinæ reddidit valetudini, recidivamque præcavit victus exsiccans, potus decocti rad. chinæ, remedia roborantia, & fonticulus in crure excitatus. Multum quoque remedia hæc diaphoretica cum puellæ NESTERI (*p*) tum GASSERI (*q*) matronæ profuisse censenda sunt.

C A P U T VI.

S I A L A G O G A.

§. 50.

SIALAGOGA, ac præsertim ♀lia, utrum unquam adversus leucorrhœam in subsidium vocare oporteat, haud abs re quæri potest; nam cum LANZONI mulier (*r*) ptyalismo a diuturna leucorrhœa fuerit liberata, neque absonum cuiquam visum fit, salutares naturæ conatus arte imitari, forte

(*p*) Vide §. 61. a).

(*q*) Vide §. 62. a).

(*r*) Vide §. 38. c).

non sine successu periculum rei fieri possit, mirumque est, a nemine, quod sciam, factum hactenus fuisse, posteaquam in omnibus pene aliis contumacibus morbis ♀ ii vires experiri jam libuit. Huc & illud accedit, quod ipsa etiam analogia ad id invitet; nam quemadmodum ceterae per alvum, lotium, sudoremque vacuationes, quod humorum vim ab uteri vasibus avertant, ad leucorrhœam percurandam plurimum faciunt, idque eo etiam efficacius, quo ad remotiora ab utero loca humores traducuntur: ita sane ♀ li ptyalismo inducto humores ab utero ad salivales glandulas deductum iri spes non inanis est; præsertim cum leucorrhœa sit vacatio lymphatica, serosa, mucosa, & saepe etiam catarrhalis prosapiæ, quod utrumque materiæ hujus (nisi jam purulenti quid simul subsit) ad vasa salivalia traducendæ facilitatem pollicetur. Sed tentamina haec iis relinquo, quibus crebrius pertinaces leucorrhœæ occurunt tractandæ. Ubi autem fluor albus venereum simul praefere fert labem, ibi ♀ ii utilitatem nemo profecto hactenus prætervidit. Non est hic L. HEISTERI (s) de leucorrhœa ptyalismo ♀ li

(s) Medic. chir. u. anat. Wanknehm, 2, Band. No. 143.

persanata reticendus casus, qvæ si venerea fuit, posterius dicta confirmat; sin minus, qvod longe est veri similius (nam etsi glandem viri in coitu ob acrimoniam læserit, nihilominus nec gonorrhœam nec aliud syphiliticum symptoma concrivisse memoratur), tunc maximo est argumento, leucorrhœas etiam non venereas ♀ li salivatione percussari posse. Nimirum nobilis matrona 26 annor. leucorrhœam aliquot ab annis patiebatur usqve adeo acrem & dolorificam cum continuo spinæ dorsi dolore, ut & ipsa inde excoriaretur, & viri glandem in coitu rubore cum pustulis, velut ex ambustione, afficeret. Experiebatur etiam sèpius & colicos dolores & aliquot dierum diarrhœam ad 18 dejectiones quotidie causantem: unde vires admodum dejici sentiebat, & sterilis evasit. Variorum propterea cum medicorum tum chirurgorum operam, at frustra, experta, demum ex Auctoris consilio 9^{na} Januar. 1735 seqventibus uti cœpit:

1) Rx. Extr. panchym. C R O L L.

♀ dulc. rit. ppt. aa. gr. jv.

Resin. Jalapp. opt. trit. gr. ij.

Effent. lign. q. f. F. pil. gr. j.

D. pro dosi.

2) Rx. Sulph. ⊖ ♀ ult. præcip.

♀ dulc. aa. ʒf

Extr.

Extr. lign. Saffafr. ʒj

Effent. bals. Copaiv. q. s. F. pilulæ No. 30. Consperg. cinnab. Sumat qvotidie ante somnum No. j.

3) Rx. Raf. lign. Guajac. ʒf

— — Saffafr.

Rad. Sarsapar.

— Chinæ aa ʒj. Conc. gr. modo D. pro infuso bis qvotidie ad 4 vascula hauriendo.

4) Rx. Eff. Succin. ʒf

TRæ g ii ♀ lat. ʒij. M. S. gtt.

35 semper cum potu theato No. 3. Diæta qvoqve idonea est imperata. Tandem 20 Januar. injectiones in uterus fieri cœptæ, nempe:

Rx. ∇æ Calc. vivæ fl̄ j.

♀ dulc. ʒj. M.

Ab hoc remedio 1^{ma} mox die levamen sensit; dolores inde mitigati, & loca excoriata ulcerataqve ad sanationem venere, postea qvam præscripta ∇æ qvantitas bis absumpta est. Et ultimis tribus pilulis (No. 2) die 30 Januar. assumptis ptyalismus uberius processit, genis faucibusqve tumentibus. His ita pro re nata ad finem usqve Februarii procuratis saliva jam spissa jam limpida leniter fluebat, multo simul per uterus jam acri jam blando muco, at citra ullum malum

symptoma, prodeunte, donec 14^{ta} Maji curatione absoluta ægra sana domum reverfa est.

C A P U T VII.

I N V I S C A N T I A.

§. 51.

INVISANTIA etiam nescio a qvo primum in curatione leucorrhœæ tentari cœpta, nec pœnitendo successu. Sic A M A TUS (*t*), *album ovi* aqva rosacea concus-, „ sum (*ait*), jejuno stomacho ebibitum, „ non solum ad album fluorem facere, sed „ gonorrhœam sanare, satis sumus experti, „ ex qvo albo fluore socrus PETRUSII „ Bergomatis annos nata 50 sanata est: „ veluti mulier Veneta, qvæ ad hortorum „ portam habitabat; sed hæc mastichis pa- „ rum in albo ovi ponebat. Plures vero „ alias ex *semine cydoneorum* in jure de- „ glutito sanatas observavimus,. Forte hæc remedia, si primis in viis acrimonia

(*t*) Curat. medic. Cent. 4. cur. 12.

qvædam digestionem turbat adeo, ut hæc potius, qvam illa, leucorrhœam causet, ad stimulum ejus enervandum, sicutqve digestionem restituendam, qva reparata morbus definere consuevit (*u*), plurimum conferunt. Forte etiam tenui aquosoqve sangvini plasticitatem conciliando aliquid præstant.

C A P U T VIII.

R O B O R A N T I A.

§. 52.

ROBORANTIA denique tam sunt ad curandam leucorrhœam necessaria, ut sine eorum adminiculo morbus, citra recidivæ saltet metum, raro unquam plane percurari queat. Nam cum leucorrhœa anastomosi vasorum justo laxiorum (*x*) debeatur, nisi laxitas hæc tollatur, pristinusqve vasis redditur tonus, leucorrhœa aut nullis cedet aliud agentibus remediis, aut certe, ubi aliquamdiu substiterit, ex facili postliminio

(*u*) Vide §. 53.

(*x*) Vide §. 19.

revertetur. Cumqve laxitas vasorum uteri aut a ventriculi atonia digestionem vitiant, aut a totius corporis imbecillitate (velut in laxis & cachecticis), aut a propriis sibi causis (v. g. partu laborioso vel hæmorrhagia, &c. prægressis) ortum ducat, facile patet, qvot titulis necessaria sint, & qvem potissimum ex illorum classe delectum dato in casu facere oporteat. Et cum primo qvo-qve tempore laxitas dicta sit abolenda, illud qvoqve suapte conseqvitur, roborantibus remediis omni morbi tempore locum esse, ita tamen, ut per initia vacuantibus jungantur, sub finem vero sola præbeantur; atqve sic accipiens est L. RIVERIUS (y) roborantium usum ad morbi finem rejiciens. His rite a tirone intellectis roborantia suas in classes, qvas ipsa morbi varia adjuncta exposcunt, sunt dispescenda; hasqve potissimum constituunt roborantia

§. 53.

1. *Stomachica*, qvæ digestionem a ventriculi & intestinorum atonia imminutam aut depravatam pristinæ integritati restituunt.

Quantum intersit scopum hunc in leucorrhœæ curatione attingere, docent trinæ RAULINI observationes, nempe (z) matrona ad 28 annos habens dyspepsiam a 7 annis cum anorexia, stomachi sensibilitate ac dolore, postmodo vero etiam omnium alimentorum vomitu, passa jam inde fere, ex quo ventriculus male habere cœpit, leucorrhœam quoque nacta est; quibus malis ita exhausta fuit, ut ad extremam maciem summamque devenerit debilitatem. Omnibus artis præsidiis incassum tentatis demum Auctoris opera sanata est. Paulo post sopitum vomitum prout digestio restauratur, iisdem etiam gradibus cum leucorrhœatum cetera symptomata conqviescebant adeo, ut ægra tandem pristinum corporis habitum animique vigorem plena cum sanitate recuperarit. Alia (a) perinde matrona 36 annor. cardialgiæ cum digestione turbata, entissima, ac sæpe admodum difficiili, obnoxia tantam simul crepituum vim ano elidebat, ut totis se se matutinis temporibus sæpe in conclavi ab omni confortio abstraham tenere debuerit, ob illorum expulsio-

(z) I. c. T. 1. P. 2. S. 1. C. 10. p. 358.

(a) Ibidem p. 359.

nem. Huic flatulentiae non cessanti anno post digestionem vitiata se junxit triennis leucorrhœa, post pastum semper, ac vel maxime a lactis, quo sœpe è consuetudine abutebatur, usu uberior fluens, cuius color cum flavus alias effet, a pastu chylosus cernebatur. Symptomata eam sanguantia erant stomachi tensiones, debilitas artuum, inquietus, insomnia, naufragia, digestio laboriosa, &c. Verum revertente post data remedia appetitu, emendataque digestione, leucorrhœa desit, & ægra plane convaluit. Hujusce mater (*b*) cum sanissima sexto ac vicefimo ætatis anno nupsisset, feliciterque peperisset, aliquanto post ei vitiata digestio causavit leucorrhœam, hæc vero pessimos consequentes abortus; sed ventriculo emendato leucorrhœa conqvievit, ac matrona feliciter iterum peperit. Inde quotiescumque dyspepsia oborta est, leucorrhœam post se traxit, quæ digestione reparata denuo cessabat. Hinc recte F. HOFFMANNUS, ut superius (*c*) memoratum, inter causas leucorrhœæ pertinacis prætervisam a Medicis in curatione ejusdem dige-

(*b*) Ibidem. p. 360.

(*c*) Vide §. 54.

ftionem vitiatam simul refert. Atqve ex his fatis & efficacia & necessitas roborantium stomachicorum elucet. Qvænam autem ad stomachicorum classem referantur, adeo trionibus qvoqve notum est, ut nihil magis. Sunt nihilominus & horum aliquva, qvæ ceteris ifthic palmam præripiunt, v. g.

a) *Mentha*. F. HOFFMANNUS (d)
 „ vidit sola aqva menthæ spirituosa, de-
 „ centi usu, & purgantibus præmissis, in-
 „ veteratas gonorrhœas fluoremqve album
 „ feliciter sublata „.

b) *Nux moschata*. H. REUSNERI (e)
 „ mulier, qvæ integro biennio fluxu albo
 „ laboraverat, accepit nucem moschatam,
 „ ejusqve affatæ & divisæ partem $\frac{1}{2}$ mane,
 „ alteram $\frac{1}{2}$ vesperi adsumpsit, sicqve con-
 „ tinuando sanata est. Hoc ipso remedio
 „ utebatur qvoqve TH. ERASTUS in si-
 „ stendis mensibus nimiis & fluore albo,
 „ ceu singulare experimento „.

c) *Rosmarinus* M. ETTMÜLLE-
 RO (f) teste „ pariter in fluore albo mu-

(d) De præstant. remed. domest. §. 16. Opp. T,
 s. p. 368.

(e) l. c. Obs. 101.

(f) Colleg. pharm. in SCHROEDER. Opp. T. 1,
 p. 524.

„ lierum egregium specificum est, cuius
 „ decoctum ceu expertum commendatur a
 „ LINDANO,, (g).

d) *Serpillum.* „ Qvantam præ aliis vir-
 „ tutem lento in muco resolvendo fibrisqve
 „ roborandis possideat serpillum , evincit
 „ sæpenumero observatum a me , inquit H.
 „ F. DELIUS (h), auxilium in leucorrhœa,
 „ dum qvovis mane potus theati in modum
 „ usurpatur „,

e) *Qvassiae* ligni decoctum omnibus sto-
 machicis roborantibus longe antecellit , ut
 plurima hactenus variorum observata do-
 cuerunt. Radicem qvoqve ejusdem SCHRA-
 DERUS (i) aduersus leucorrhœam com-
 mendat.

§. 54.

2. *Uterina*, qvæ specifica sua qvadam
 vi in uteri præsertim vasa agere videntur;
 cuiusmodi sunt multa aromata. Sic „ simi-
 „ lem uteri coryzam largiter profuentem
 „ in puella 7^{um} modo annum ingressa , præ-

(g) Colleg. super HARTMANNUM.

(h) Fränk. Samml. 6 Band 35 St. 8 art. p. 451. sq.

(i) Berlin. Samml. 1 Band. 2 St. 3 art. p. 164.

„ misso eccoprotico , aromaticis adhibitis
 „ feliciter sustulit „ G. DETHARDINGI-
 US (k). Interea vero sunt & alia , nullum
 manifestum aroma prodentia , qvæ efficacissi-
 me tonum laxis uteri vasis conciliant. Ex
 omnibus autem uterinis roborantibus duo hic
 vel maxime præcellunt , nempe

a) *Uva ursi.* Nescio qvam planta hæc
 peculiarem habeat vim suam in viscera cavo
 pelveos contenta exferendi. In malis ve-
 sicæ mitigandis tollendisqve abunde nota
 est: sed nec in uterus minus potest, „ In-
 „ signem ejus effectum in femina 46 annor-
 „ leucorrhœa laborante , egomet , ait J. A.
 „ MURRAY (l), expertus sum. Etenim
 „ per 6 annos , qvibus vidua vixit , natu-
 „ ralis excretio nimis copiosa , & qvod se-
 „ cessit , vel obscure rubrum crassumqve,
 „ vel albidum seu viride fœtensqve fuit.
 „ Jam ultra hebdomadem eodem vitio affe-
 „cta tantum sanguinis profuderat , ut ad
 „ canthari mensuram jacturam æstimaret ,
 „ ceteris memoratis incommodis denique se-
 „ sociantibus. Unde dispendium magnum
 „ virium & crebra animi deliqvia passa est.

(k) Misç. nat. cur. Cent. I. append. p. 193.

(l) Comment. de arbuto uva ursi Sect. 3. §. 15. p. 59.

„ Habitus corporis evasit cacochymicus, ap-
 „ petitus cibi deletus, somnus turbulentus,
 „ & tremoribus interruptus. Pilulis purgan-
 „ tibus semel præmissis, 6 doses pulveris uvæ
 „ ursi 3 dimidiæ illi exhibui, qvarum 2 de die
 „ sumeret. Mirari dein oportuit, qvod
 „ adeo cito & tam parva pulveris cōpia ju-
 „ varetur. Nam paulo post cessasse fluxum
 „ cibiqvē cupiditatem rediisse narravit. Co-
 „ lor faciei sanus & subrubellus simul rediit.
 „ Hoc igitur auxilio contenta tum purgan-
 „ tis remedii tum uvæ ursi usum, qvem sva-
 „ feram, continuare recusavit „

b) *Basilicum silvestre*. Hanc plantam in
 Cayenna ubertim provenientem, & ab Ocy-
 mo basilico nostro non nisi, qvod odoris sit
 expers, discrepantem B A J O N (m) specifica
 leucorrhœam sanandi vi præditam tuetur;
 qvam in rem seqventia adducit observata.
 Principio A. 1768 (n) semina ad 24 annos
 habens, a bimestri vidua, leucorrhœam vi-
 rideſcentis coloris, consistentia puris, at ci-
 tra ullum pravum odorem, jam inde a nu-
 ptiis per 4 annos, occasione catameniorum
 ex illo eodem tempore semper subsistentium,

(m) ROUX Journ. de Medec. &c. T. 32. A. 1770.
Juin p. 519. sqq.

(n) Ibidem g. 523. sqq.

adeo uberem patiebatur, ut indusia s̄epissime mutare coacta fuerit. Frustra huic malo bolis adstringentibus longissimo tempore obviam itum, imo ipsi quoque menses periodis consuetis triduum fere instar exiguae transudationis cruentæ apparere hucusque soliti ab illorum usu fere substiterant. Cumque prægressa mariti valetudinarii mors labis venereæ uxori communicatae suspicionem injecisset, idcirco huic ægrotæ post consuetā remedia idonea præmissa administratæ sunt frictiones ♀ les, at ob debilitatem teneritudinemque, leves tantum ac magnis ex intervallis ad evitandum ptyalismum, intercalatis quoque catharticis. Sesquitercio mense hæc methodus adhibita morbum nullatenus mutavit. Eapropter imperato regimine convenienti diutissime data diluentia leniterque aperientia, his tonica, ac demum adstringentia suffecta, nihilo plus profecere; neque melior successus fuit tonicorum ac leniter adstringentium utero injectorum. Unde ægra remediorum pertæsa eorum ulteriorem usum recusavit: donec Centurionis DUCHASSY, cui popularium Cayennæ euphoristorum perqvam gnaro de eximia basilici silvestris in Cayenna crescentis ad leucorrhœam abigendam efficacitate plurimum constabat, consilio adducta usurpato aliquamdiu

succo basilici dicti expresso ad miraculum convaluit, mensibus quoque pristinum ad ordinem reversis. Lapso abhinc bimestri nupsit denuo, concepit, feliciterque peperit. Hoc viso BAJON quoque plantam experiri cœpit in matrona 34 annorum leucorrhœam decennem e laborioso partu nacta, qva occupante nec menses amplius habuit, nec concepit. Fluxus erat continuus & adeo copiosus, ut cachecticum causarit statum cum summa ad hydropem dispositione. Post varia incaſsum tentata remedia, Auctor, praemissis balneis, semicupiis, catharticis, diuturnoqve diluentium cum lenibus aperitivis usu, præbuit mane qvoqve jejunæ succi expressi basilici silvestris circ. 3j, ac reliquo diei tempore imperavit infusi foliorum siccorum ejusdem plantæ potum: qvorum ab usu leucorrhœa sensim remittens intra mensē citra ullam vel molestiam vel functionum lesionem penitus desit, pauloqve inde post menses quoque aliquatenus rediere, ad qvorum pristinum statum revocandum ulterior infusi dicti usus injunctus est. Vires sat cito recuperatae cum pristino corporis vigore, ita ut ægra principio anni 1769 optimè valuerit. Per idem tempus binis aliis feminis nigritis idem remedium Auctor eodem cum successu exhibuit; prior ad 40

annos habens leucorrhœam diurnam cum ligamentorum uteri relaxatione patiebatur, altera 32 annorum eandem a suppressis lochiis est adepta: ambæ, ex qvo leucorrhœa ingruit, & steriles factæ, & catameniis privatæ sunt. Præmissis itaque generalibus remediis, præbuit Auctor per mensem qvovis mane succidiati 3ij, a qvo posterior ægra intra mensem plane convaluit, prior vero non nisi per 14 adhuc dies continuato remedio; menses tamen neutri illarum sunt reversi.

§. 55.

3. *Vulneraria, antiseptica*, qvæ putredini humorum resistunt, ulcerationes uteri genitaliumqve sanant, ichorem saniemqve corrigunt, ac solidis tonum amissum restituendo corpus roborant, & a recidiva præservant. Huc in primis pertinent

a) *Cicuta*, qvæ glandulosos infarctus tollit, ulcera abstergit, pus emendat, sanguinem depurat, urinas movet, dolores mitigat, languentesqve fibras leniter excitat. Plantæ hujus usu leucorrhœam sèpius fuisse profligatam complura testantur observata. Sic Ill. STÖRCKII^(o), femina 48 annorum a

(o) Libell. 2, de Cicuta cap. 2. cas. 14. p. 107.

„ 15 circ. annis fluorem album habuit, &
„ qvamvis remedia ab optimis artis ma-
„ gistris præscripta longissimo tempore af-
„ sumperit, malum tamen aut mansit in eo-
„ dem statu, aut in pejus mutatum fuit.
„ Dum vidit idem esse, sive adhiberet me-
„ dicamenta, sive ea negligeret (imo ex
„ usu medicamentorum subinde debilitata est,
„ & pejus habuit), mutavit consilium, &
„ morbum soli naturæ commisit. Per 11 an-
„ nos fuit sine remedio, dein vero fluxus
„ menstruus retentus fuit, qvi antehac &
„ debito tempore & sufficienti copia sem-
„ per comparuit. Orti tunc sunt acutissimi
„ in utero dolores, & simul advertebatur
„ continuus ardor, materies effluens antea
„ benigna, lenta, mucosa, nunc tenuis fuit
„ & viridescens, & fœtuit. Multorum me-
„ dicorum opem tunc ægra imploravit, ad-
„ ivit chirurgos, consuluit vetulas; ast me-
„ dicamenta potius molestiæ qvam levamini
„ fuerunt. Misera sensim in pessimum sta-
„ tum redacta fuit. Dolores & ardores ad-
„ erant continui, & hi versus vesperas
„ aucti sunt. Præter ichorem putridissimum
„ effluxit subinde sanguis fœtidus, dissolu-
„ tus, & prodierunt frusta fibrosa corrupta
„ subnigra. Vagina uteri & vulva sensim
„ exulceratæ & exesæ sunt, & ægra ema-

„ ciata vix se erectam potuit sustinere. His
„ in miseriis eam ad nosocomium suscep-
„ mus (inqvit Ill. Observator). Rogavi Do-
„ minum H A F F N E R , ut partes genitales,
„ quantum possibile esset, digitis & oculis
„ lustraret. Invenit tunc vulvam exesam,
„ vaginam exulceratam, & os uteri erat fat-
„ durum, dolens, & fortiori pressione prodi-
„ it sanies. Consului, ut bis quotidie in-
„ jectiones in vaginam fierent ex leni infu-
„ so cicutæ cum paucō melle rosarum &
„ sexta parte lactis: præterea copiosum de-
„ coctum involvens demulcens, emolliens
„ mistum cum $\frac{1}{3}$ lactis recentis datum est.
„ Spatio 6 dierum fœtor multum emendatus
„ fuit, & ægra videbatur aliquantulum re-
„ fici. Dedi tunc præter decoctum demul-
„ cens extractum cicutæ, & injectiones in
„ vaginam fuerunt continuatæ. Omnia sym-
„ ptomata sensim in melius mutata sunt;
„ ichoris loco tandem effluxit mucus sub-
„ purulentus, dein nil amplius comparuit:
„ & spatio 11 septimanarum femina integrum
„ sanitatem recuperavit. Ultra 3*ss* extracti
„ cicutæ non opus fuit dare per diem; quo-
„ niam hæc dosis sufficienter omni sympto-
„ mati ivit obviam. Ab injectionibus tunc
„ cessatum est, dum incipiebat materies
„ benigna comparere; abluta tamen ali-

„ qvoties per diem sunt pudenda, ne &
 „ illud benignum intra plicas stagnans a-
 „ crimoniā contraheret „. Perinde (p)
 „ femina 38 annorum jam ultra 10 annos
 „ fluore albo laboravit, ex ano qvo-
 „ qve prodiit gluten tenax fœtidum, ibi-
 „ qve sentiebatur durities vere scirrhosa,
 „ qvæ per vices tantos dolores excita-
 „ vit, ut ægra per plures dies debue-
 „ rit lecto inhærere, nec potuerit dormi-
 „ re, qvamvis opiata affumpserit. Mate-
 „ ries effluens sensim acrior fuit reddita,
 „ & arroxit partes vicinas & linteamina,
 „ qvibus recipiebatur, inde friabilia fiebant.
 „ Remedia qvæqve tentata incassum erant;
 „ ægra facta est tristis, melancholica, &
 „ cœpit contabescere. Dum me accessit,
 „ præscripsi illico cicutæ extractum, qvo
 „ solo remedio 4 mensium spatio sanata
 „ fuit. Vires nunc bonas habet, appetit,
 „ dormit; durities circa annum evanuit,
 „ nec amplius ibi mucus prodiit, nec ullus
 „ percipitur dolor, alvus qvotidie sponte
 „ solvitur, qvæ alias erat pertinaciter clau-
 „ sa, & non nisi purgante aut enemate

(p) Idein libell. de colchic. autumn. rad. append.
p. 82. sqq.

„ poterat moveri. Debito tempore nunc
 „ sanguis menstruus fluit, & fluxus albus si-
 „ let penitus,, Idecirco (q) „, matronæ nobilio-
 „ res hanc herbam juscule incoquunt, idque
 „ dein colatum saepius per diem bibunt ...
 „ Formosa quædam matrona acerrimo flu-
 „ ore albo a longo tempore vexabatur,
 „ duritiem ingentem in ventre habuit, &
 „ uteri vagina erat scirrhosis tuberculis ita
 „ obsita, ut citra summum dolorem vix
 „ tenuis cannula potuerit introduci; ete-
 „ nim ex minimo attacku hi scirrhi vehe-
 „ menter dolebant. Usa est simili juscu-
 „ lo, & bis terve per diem fiebant lenes
 „ ex infuso cicutæ injectiones in uteri va-
 „ ginam. Hoc modo dolores brevi miti-
 „ gati sunt, fluxit ex utero materies longe
 „ purior, nequaquam foetens. Tandem tu-
 „ mores scirrhique disparuerunt, fluxus inte-
 „ gre siluit, & ex solo similis jusculi usu hæc
 „ matrona bene se habet,. Haud secius
 J. POLZERI (r) „, femina 40 aliquot anno-
 „ rum a longo tempore variis symptomati-
 „ bus hystericas, & fluore albo uterino

(q) Ibidem p. 76.

(r) STÖRCK libell. quo contin. experim. Cap. 8.
p. 196.

„ cum tumore scirrhoſo circa ovarium ſi-
 „ niſtrum pugni viriliſ instar vexata eſt.
 „ Adhibito ḡe de extracto aconiti cum fa-
 „ charo, & infuso cicutæ, cui addebatur
 „ $\frac{1}{4}$ lactis, & appoſito emplastro de cicuta,
 „ poſt 6 ſeptimanas integerrime curata eſt .,.
 Ita & KRAPFII (s) „ femina jam a multis
 „ annis fluore albo acri & pudendorum
 „ labia erodente laboravit. Os uteri a
 „ minimo attac̄tu vehementer doluit; &
 „ obſervabatur tumor magnus durus, qvi
 „ totum ſpatium inter offa pubis & uteri
 „ collum replevit. Excepto per genitalia
 „ vapore cicutæ ope cannulæ in vaginam
 „ immiffæ ter de die per $\frac{1}{4}$ horæ, & ci-
 „ cutæ ſucco vel extracto per 4 menses
 „ affumpto hæc femina integre curata ab
 „ hoc malo eſt, & diſparuit tumor ,,.
 Pariter J. QVARIN (t) „ femina (inqvit)
 „ 42 ann. ab ultimo ante ſexennium puer-
 „ perio fluore laboravit uterino. Materies
 „ acris erat, rodens, vicinas partes exco-
 „ rians, pefſime fœtens. Varia aptiſſima
 „ a prudentiſſimis in arte viriſ, ſed fruſtra,
 „ adhibuit remedia. Pilulis ac abſterſione

(s) Ibidem p. 243. sq.

(t) Ten aīn. de cicuta cap. 2. cas. 13. p. 34.

„ partium cum decocto cicutæ, infuso agrimonie, spatio 19 septimanarum integre curata est. Quatuor solum vicibus eam senna purgavi „. Neque minus his memoria dignus est F. C. STOELLERI (u) casus: puella duodeviginti annos nata mendica, eufarca, ab infantia tineam achorosam passa, ex quo tempus catameniorum fluxui solenne attigit, isthoc nullatenus apparente, periodicas tineaæ vicissitudinis eum in modum experiebatur, ut semper a nova ad plenam lunam totum caput, quousque capillatum esse debuisset, crusta humente crassa velut mitra obduceretur, quæ versus ultimam lunæ quadram usque adeo sensim decedebat, ut sub novilunium caput tinea prorsus vacaret, sed simul calvissimum, crudæ carni cuticula tenera obductæ simile, coloreque cancrum exutis nuper chelis contum æmulans. Huic igitur ægræ, præmissa catharsi, data 3j pilularum extracti cicutæ ad pondus gr. ij. paratarum, ut primum m. & v. No. j. & de triduo in triduum una semper pilula plus, caperet. Datus præterea sacculus herba cicutæ plenus, ex qua prius

(u) Beobacht. u. Erfahr. aus der innern u. äußern Heilkunst, § Beobachtung p. 139. sqq.

succus pro extracto expressus, ipsaque dein lente siccata fuit (cui majorem, quam cum succo siccatae, vim pro usu externo ineisse Auctor expertus est), pro cucuphis aliquot conficiendis, & identidem in aqua fervida exprimendis, ac abluto prius ∇^a hac saepius capite diu noctuque gestandis. Unde puella sensim ita convaluit, ut mox curationis initio tinea solito tempore enata sit levior, multis capitis locis intactis relatis, ac solito quoque maturius decesserit. Disparuit omnis capitis rubor, cutis evasit secundum naturam, densi succrevere capilli, ac demum etiam catamenia justis comparuerunt periodis. Duodecim inde post annis rediit puella, referens, catamenia sibi ab aliquot retro mensibus tum primum emanasse, & ex illo tempore leucorrhœam se pati cum exanthemate urente uidoque in una mammarum, ulceribusque in uno pede undique tumente, duro, ac rubente, exedentibus. Cum ceteroquin sanissimum praese ferret habitum, datum 7° quoque die catharticum cum ♀ io dulci, ac post alteram ejus dosin porrectæ ♂ris cicuta Viennensis 3 vj, sumeret quotidie m. & v. ad cuspidem cultri. Pedi cataplasma GOULARDIANUM admotum. Nondum menis absit, cum & pes plane sanus esset, & siccata-

tum pectus, & menses pristinum ad ordinem reversi. Horum casuum agmen claudat insignis alius STÖRCKII (x) casus, nimirum „ femina 52 annor. a longo tempore dolore continuo rodente in utero, „ vexabatur; fluore simul albo laboravit, „ qui sensim adeo malignus factus est, ut „ materies effluens non tantum partes genitalia corroserit, sed & ipsa linteamina quibus excipiebatur, brevi reddiderit frumenta: foetor praeterea tantus fuit, ut & maritus eam fugerit, & omnes feminæ, quibus alias familiariter utebatur, evitarent ejus consortium. Postquam plurimam bonorum suorum partem frustra in sui curationem consumpsit, meum tandem auxilium quæsivit. Iussi, ut serum lactis biberet, & ablueret partes circa pudenda leni infuso cicutæ & lacte, addito paucō melle rosarum. Qvoniam autem conqverebatur, noctes esse maxime inquietas ob enormes in utero ardores prescripsi ℥em ex ʒʒ lap. 69 & ex gr. j opii, ut quotidie cubitum itura similem ℥em sumeret. Somnus inde longior & tranquillior factus est, & augebatur

(x) Libell. 2. de cicuta cap. 2. cas. 15. p. 111. sqq.

„ appetitus, imo & vires maiores videban-
 „ tur, & mens alacrior; ceteroqvin autem
 „ nil mutatum fuit. Exhibui tunc præter
 „ serum lactis extractum cicutæ, & vesper-
 „ tinos ḫes continuavi. Spatio 14 dierum
 „ dolores adeo mitigati erant, ut parego-
 „ rico vespertino opus non amplius fuerit;
 „ materies utero prodiens non amplius ita
 „ fœtuit, nec adeo acris fuit: urina autem
 „ retinebatur. Abstinui tunc per aliquot
 „ dies ab extracto cicutæ, & dedi MR^{am}
 „ seqventem:

Rx. Lap. 69 ȝj

Vini Austriac. montan. ℥ j.

„ M. S. ægra qvater per diem cochl. j.
 „ Hæc MR^a egregios effectus præsttit;
 „ etenim urina prodiit liberrime, & ex-
 „ utero propellebatur multa materies acris
 „ ichorosa cum magno ægræ levamine: in-
 „ terim tamen dolores iterum aucti sunt.
 „ Hinc dein ad usum cicutæ denuo erat
 „ transeundum. Dedi qvotidie gr. xx ex-
 „ tracti cicutæ, & copiosum decoctum ra-
 „ dicis althææ vel serum lactis. Dolores
 „ hinc mitigabantur, & vires auctæ sunt,
 „ atqve prodiit materies mucosa, raro fœ-
 „ tida. Nihilominus post 3 circ. septima-
 „ nas circa urinæ vias iterum tenesmi
 „ observabantur. Unde extracti cicutæ

„ loco iterum dedi M^Ram priorem ex
 „ vino & caucrorum lapidibus. Et hæc
 „ magnum denuo levamen attulit. Hac
 „ ratione cogebat sæpius cicutæ usum in-
 „ terrumpere, & fere omni 14^{to} die de-
 „ di M^Ram, qva absunta extractum cicutæ
 „ iterum continuavi. Effectum est inde,
 „ ut miserrima hæc ægra spatio 6 mensium
 „ integre fuerit sanata; & jam a 9 mensi-
 „ bus optimam sanitatem habet . . . Nar-
 „ ravit, qvod ab omnibus ob fœtorem ex
 „ utero prodeuntem contempta fuerit,
 „ qvod proprius maritus, propriæ proles
 „ eam qvæsi peste affectam fugerint; qvod
 „ tabe fere consumpta nil nisi offa & pel-
 „ lem gesserit; qvod abhoruerit a cibis, &
 „ sudore nocturno fere diffluxerit: nunc
 „ autem dedit videnda torosa brachia &
 „ suras optime repletas & firmas, dixitqve,
 „ qvod jam marito plurimum complaceret,
 „ Alios qvoqve præter hos de cicutæ effica-
 „ cia casus suis postmodo videbimus locis
 (y).

b) *Balsama* nativa, cum & vulnera-
 ria & summe antiseptica, simulqve tonica,

(y) Vide inferius in c) & histor. 10.

sint, huc perinde referri oportere liqvet.
Sed de his jam superius (z) verba fecimus.

c) *Gummi-resinæ* quoque hujus sunt loci, ut mastiche, thus, &c. præsertim ubi vera simul purulentia præsto est. Ill. STÖRCK (a) ejusmodi „ feminas habuit, „ qvibus verum pus ex utero effluxit (b), „ & aderant signa abscessuum in utero la- „ tentium : febrem si magnam & continuam „ simul habuerunt, tunc eam decoctis emol- „ lientibus & emulsis refrigerantibus antea „ diminuere & mitigare tentavit; dein ex- „ hibuit pilulas

(Rx.) Sarcocollaæ

Mastich.

Oliban. aa 3j.

Mucil. gum. tragac. q. s. F. pil.
„ gr. iij. S. D. omni trihor. tres pilulæ),
„ & qvalibet vice desuper hauriendas dedit
„ 3vj infusi agrimonie. Pro potu ordina-
„ rio datum est serum lactis vel lac tripla
„ aquæ copia dilutum. Hac ratione fere
„ omnes restitutæ sunt „. s. BLANCKAR-

(z) Vide. §. 48. d).

(a) Ann. med. 2. p. 213.

(b) Vide historiam 10.

TUS (c) mulierem ab leucorrhœa ex terrore nata, sœpeque ubertim procedente, seqventi ḫe liberavit:

R. Mastiches

Thuris aa ȝȝ. M. F. ḫ. S. bis de die, qvatum digitale plenum capit. Multum autem in leucorrhœa curanda olibano soli defert M. I. MARX (d), qvippe qvod „ experientia nobis (ait) compertum est... „ ad profluvia muliebria ab acrioribus... „ succis, & lympha præcipue acri & falsa „ nimis, orta, in fluore dicto albo præ- „ primis, multum conducere: plures jam „ feminas hocce thure a malo hoc curavi. „ Singulare de hujus usu proficuo adducam „ exemplum. Mulier 50 circ. annor. qvæ „ postqvam firmam satis habuerit valetudinem, etiam postremo tempore, in quo „ menstrua ob ætatem non amplius fluxerunt (fluere autem desierunt aliquot annos ante), incidebat in immane sanguinis profluvium ex utero, quo sedato „ circa uteri regionem motibus spasmodicis, cruciatibus, doloribus acerrimis, „ qui modo hanc modo illam regionis par-

(c) Collectan. medico - phys. Cent. 6. Obs. 87

(d) Obs. medic. P. I. p. 121. sqq.

„ tem terebrabant ac divellebant, correpta
„ est. Ipsam qvoqve vesicam rectumqve
„ intestinum in hujusmodi calamitate impli-
„ cari contendebant dysuriæ fictiæ te-
„ nesmi molestiæ plenissimi. Qvibus per-
„ sistentibus malis fluxit semper ab utero
„ humor qvidam nunc albus nunc flavus
„ raro viridis, interdum tenuis ad instar
„ lymphæ, interdum lentus instar muci,
„ nulla autem unqvm faniei aut puris
„ qvalitate præditus. In hoc vero tem-
„ pore horum affectuum mulier sæpe ex-
„ stitit immunis a febre Clyste-
„ res simplices ex lacte, nec non ex aqva
„ hordeata cum saccharo, interdum etiam,
„ ad mitigandos dolores uteri, ex toto
„ oleo commendavi. Dein experientia
„ edoctus præscripsi thuris usum, cuius
„ drachmæ dimidium saccharo tritum aqva
„ cinnamomi tenui in formam potionis red-
„ actum, addita TR^a corticis Peruviani,
„ qvam potionem mane & cubitum petens
„ sumpsit ægra, cum decocto sarsaparillæ
„ & radicis chinæ. Regio uteri spongiis
„ madentibus calida decoctione papaverum
„ & florum chamomillæ fovebatur. Ali-
„ menta erant ex pane bis cocto, hordeo
„ perlato, avena mundata, oryza, fago,
„ ovis forbilibus, juribus carnis vitulinæ

„ & pullorum , gelatinæ C. C. &c. Frænabuntur hisce humorum agitatio ac tumultus , fistebatur dolor , nec rediit hæmorrhagia , fluxus uterinus sensim cessabat , vires refocillabantur. Pro universali autem reparatione corporis usum lactis præscripsi , redigebaturque ægra ad suam laudabilem temperiem „. P O T E R I I (e) qvoqve matronæ gummi-resinarum usus plurimum fuit salutaris. Huc etiam referri debet decoctum nucis pineæ cum ligni visci quercenti portione potui datum ; namqve „ mirabile , inquit D. P A N A R O L U S (f) , remedium est , huic morbo egregium , sicuti nos pluries observavimus „.

d) *Cortex Peruvianus* , unus omnium instar ; siqvidem summe roborat , spasmis medetur , febrem lentam tollit , putredini resistit , pus pravum corrigit , &c. sicqve aut solus ad leucorrhœam curandam sufficit , aut aliis indicatis remediis additus omnem in curatione paginam absolvit. Sane H. F. D E L I U S (g) „ in contumaci leucorrhœa post varia conservata remedia eximios effe-

(e) Vide histor. 4.

(f) Obs. med. Pentecost. 2. Obs. 48.

(g) l. c. 32 St. 4 Art. No 4. p. 138.

„ etus vidit, si ejus pulv. aliis uterinis de-
 „ purantibus, qvæ absqve illo cassa erant,
 „ admistus in potus theati forma usurpaba-
 „ tur. Cœlibes & maritatæ, si iis sapor
 „ tolerabilis erat, bene se inde sensere,
 „ partes prius laxæ robur sunt adeptæ, ca-
 „ tamenia rite fluxere, & luridus faciei co-
 „ lor in meliorem est conversus . . . Confirmat hæc seqvens STÖRCKII (b) observa-
 „ tio: „ femina 30 aliquot annor. jam ultra
 „ binos annos fluore albo laboravit, mate-
 „ ries erat acris, fœtida, lenta, qvando-
 „ que fusca penitus, sensit simul ægra ini-
 „ uteri orificio freqventes dolores lancinan-
 „ tes, & ardorem continuum; totum cor-
 „ pus erat debile & flaccidum. Cum citra-
 „ ullum levamen optima affumpsisset reme-
 „ dia, præscripsi cicutæ extractum. Hoc
 „ affumpsit per 6 septimanas, & abierunt
 „ omnes dolores, prodiens materies nomi-
 „ amplius fœtuit, nec acris erat, & fiebat
 „ albi coloris, tenuis admodum & pauca.
 „ Cum autem corpus totum debile videre-
 „ tur, & hic fluxus adhuc a vasorum flac-
 „ ciditate penderet, dedi seqventes pilulas : :

(b) Libell. qvo contin. experim. Cap. 3. cas. 23..
p. 46. lqq.

R. Extracti Cicutæ

Corticis Peruv. aa. 3ij. M. F.
 „ pil. gr. iij. S. sumat qvater per diem tres
 „ pilulas, & bibat desuper vasculum infusi
 „ Rutæ. His sine interruptione per 3 septi-
 „ manas adhibitis corpus totum factum est
 „ vegetum, desit uteri fluxus albus, &
 „ comparuerunt menstrua pulchri coloris &
 „ debita copia. Jussi adhuc per mensem ma-
 „ ne sumeret 4 pilulas, & 4 vesperi. Hac
 „ ratione convaluit ,,. Ubi vero leucor-
 rhœa soli vasorum uteri laxitati ortum de-
 bet, solo sepe cortice Peruvianó profligatur,
 ut I. G. SCHENKBECHER (*i*) in femina
 mediæ ætatis expertus est, qvæ catamenia
 ordinate qvidem, sed a natura semper uber-
 rima, simulqve 3^{ia} qvaqve septimana fluen-
 tia, habens, leucorrhœam etiam ultra tri-
 ennium, spissam, lentam, e flavo jam vi-
 ridem, mordacemqve, & ut ut continuam,
 tamen 4 aut 5 diebus tam ante qvam post
 mensium fluxum uberiorius procedentem, ten-
 sivo mordaciqve cum dolore uteri, lumbo-
 rum, & ingvinum, pruritu in pudendis, e-
 maciatione, ac febre lenta continuo crescen-

(i) Bericht von den heilsamen Wirkungen der
 kinkina p. 100. sqq.

te, vesperiqve cum vehementi cephalalgia, insigni calore ac siti, &c. plus affligente, tolerans, mense Novembr. 1767 repente in hæmorrhagiam uteri incidit; qva percurata menses, ut ante, revertebantur. Curatio ad leucorrhœam dirigi cœpta: nempe facta brachii Vx Se, datoqve bis eccoprotico e rheo, senna, & manna, exhibitum decoctum ex æquis partibus farsapar. & rad. chinæ cum pulvere nitri tabulati in f. q. ∇x paratum, colatum, clarumqve, interdiu frigide, mane vero calide post deglutitas 5 pilulas seqgentes, poculi mensura hauriendum:

R. M. P. de succin. CRATON. ʒf

Extr. panchym. CROLLII

Myrrhæ

Off. sepiæ ppt.

ꝝ dulc. aa ʒj

Effent. Succin. q. f. F. pil. gr. ij.

Binis his remediis toto Decembri usâ est. Dein A. 1768 a 1^a Januar. ad usqve 22am Febr. bis adhuc vena brachii tusa, terque eccoproticum prius dictum iteratum, ac prioribus pilulis seqventes suffectæ

R. Extr. panchym. CROLL.

Terebinth. Venet. aa. ʒj.

Resin. Oleæ Capensis

Gumm. Elemi

Granor. Mastich.

♀ dulc. aa. 3*fl*

Eff. Succin. q. s. F. pilul. gr. ij.

Porro Rx. Rad. Althææ 3*ij*

— Chinæ

— Sarsapar. aa. 3*fl*

— Saponar.

— Liqvirit. rasæ aa. 3*j*

— Bardan.

Lign. Saffafr. aa. 3*fl*.

Anisi stell. 3*ij*. M. Concif. D.

ut semper inde cochl. ij. coqv. in ∇^a fl ij,
& colatura qviete clarificata D. U. instar prioris decocti. Nutriebatur autem pane similagineo probe pisto, hordeo perlato, cremore avenæ, oryza, fago, ovis sorbillibus, pomis affatis, carne pullorum, vitulina, ac bubula, saepius tamen affa qvam elixa: interdum etiam vasculum choccoladæ aqvosæ conceffum; vetito prorsus potu caffee, theato, ac id genus infusorum. Sangvine his remediis aliquatenus emendato, ut leucorrhœæ materia jam albior iterum proflueret, a 23^a Febr. per inseqventes dies, qvæ sanguinem a residua materia purulenta depurarent, data; leucorrhœa vero solius corticis Peruviani usu, qvi omnem qvoqve dolorem sensim sopiverat, est sublata, fluxu in dies & magis albescente, & parciori effe α to, conqviescente febre lenta, reversoqve

vividiori faciei colore , & carnosiore habitu. Absumpfit ægra ad 25^{am} usqve Maji corticis Peruv. Itē iij cum ȝjȝ & ȝij qva in pulvere qva in electuariis. Initio qvotidie sumpfit pulveris ȝj. & dosi in singulas hebdomades aucta postremo qvotidie sumpfit partitum ȝvj, nunquam amplius. Primis 14 diebus dabatur in pulvere cum pauxillo nitri ac rheo, reliquo tempore sine ullo accessorio, usqve ad 3 circ. postremas hebdomades, ubi pulverum jam pertæsæ præbebatur electuarium ex pulvere cum syrupo vel capillor. veneris vel rosar. rubrarum. In alimentis sub usu corticis haud magna mutatio facta: ut primum per anni tempus licuit, præter cibos ante memoratos, usus herbarum recentium, ut lactucæ, spinachiæ, acetosæ, chærefolii, rad. petrosel. &c. imperatus; cœpit pauxillo vi ni rubri uti; sole aprico vel ambulabat vel rheda vehebatur solito freqventius. Alvus, ubi necessum erat, vel enemate vel sumptis mannæ ȝij. sollicitabatur. Denique ad præcavendam recidivam ob laxiorem natura ute rum (mensium justo crebriorum & uberiorum causam) die 28^a Maji consilium ægræ datum, ut aliquamdiu adhuc dosi minore corticem sumere pergeret, qvovis anno semel bisve mitteret sangvinem, & omnia sangvinem rarefacientia studiose vitaret. Qvo factum

factum est; ut cum aliquamdiu adhuc singulis hebdomadis corticis Peruv. 3ij. jv. sumeret, quotidie in melius profecerit.

C A P U T IX.

A D S T R I N G E N T I A.

§. 56.

A D S T R I N G E N T I A postremo supersunt pertractanda; qvod eo etiam enucleatus fieri oportet, cum sint, qvi illa ab leucorrhœæ curatione penitus abesse velint: qvos inter F. H O F F M A N N N U S (k) „ in fluore albo (inqvit) sive simplici sive virulento, „ vel etiam in mensibus decoloribus, ad stringentibus tam internis quam externis „ nihil perniciosius est; siqvidem inde materia serosa in utero ejusque vasis retenta in maffam sœpius valde tenacem concrevit, qva non modo excretio hæc impeditur, sed ingens quoque & ad tactum durus tumor in regione pubis non raro subnascitur, qvi, nisi cito succurratur, nunquam fere non gravia accersit accidentia.

(k) Med. rat. system, l. 8. cautel. §. 1.

„ Vidimus enim exinde lentes febres cum
„ atrophia, phthisin, purpuracea exanthe-
„ mata, tumores tympaniticos, & eroden-
„ tes in faucibus defluxiones uvulam & a-
„ mygdalas pessime affientes, nec non ute-
„ ri scirrhos, apostemata, & exulcerationes
„ pene infanabiles,. Credimus hæc omnia
viro experientissimo, at non ita, ut axio-
matum instar ac citra ullam exceptionem
amplectenda censeamus; qvandoqvidem &
aliorum clarissimorum in arte virorum anno-
sam experientiam aliquid esse arbitramur,
qvi non modo non obfuisse adstringentia,
sed usqve adeo simul necessaria fuisse obser-
varunt, ut cum ceteris qvibusvis remediis
leucorrhœa non cesserit, solis adstringenti-
bus aut imminui cum levamine, aut plane
etiam expugnari se se pateretur. Haud ta-
men est ambiguum, tanta in iis præbeundis,
exteriusve applicandis circumspectione opus
esse, ut nisi inevitabilis illorum præsto sit
indicatio, nullatenus adhibere eadem opor-
teat, præsertim vero per principia morbi,
qvo tempore omnia alia agenda, qvam ad-
stringendum. Qvapropter

§. 57.

*Indicantur binis tantummodo in casibus,
nec unquam alias, videlicet dum adest*

1) *Laxitas vasorum vel in toto vel in
utero tantum, superstes post omnia quæque
hactenus memorata remedia exhibita, ne
ipsis quidem roborantibus abolenda, i. e.
in fine morbi, quem solā jam tantummodo
vasorum laxitas superstes fovet.* Dictum e-
nim fuit (*l*), leucorrhœam anastomosi vaso-
rum uteri aut vaginæ deberi; neque obscu-
rum est, anastomosin hanc binis posse cau-
sis tribui, ita ut vel humorum affluentium
ad vasa illa ubertas motusque quantitas tan-
ta sit, quæ sufficiat extremis vasorum dicto-
rum osculis præter naturam diducendis la-
xandisque, vel vero ea sit horum vasorum a
quibuscumque aliis causis inducta atonia, quæ
efficit, ne extrema illa ipsorum oscula eo-
usque se se contrahere valeant, ut nihil præ-
ter arteriosum quemdam halitum ac rorem
transmittant aliud, vel denique ambæ illæ
causæ simul adsint: unde manifesto colligi-
tur, in omnibus his tribus casibus curationem
principio morbi ad humores in dictis illis va-

(*l*) Vide §. 19. sqq.

sis contentos vel maxime dirigendam esse; ac in primo qvidem casu minuendam esse humorum vasa illa distendentium cum copiam tum & motus quantitatem, ut ita vasa se se, ablato solo obstaculo, ad pristinam suam diametrum contrahere queant. Isthoc proinde in casu vacuantibus cum lenissime vasa stimulantibus tantum, nullatenus vero adstringentibus, opus esse abunde liquet; secus enim humor vacuandus, praesertim si pravae est indolis, retentus deteriora causaret mala. Unde recte L. RIVERIUS (*m*), adstringentia, inquit, „nunquam sunt adhibenda, donec antecedens materia probe „evacuata & derivata sit; alioqui humores „illi retenti ad partes nobiliores ruunt, & „graviora symptomata excitant, „ut jam superius (*n*) vidimus. Sed neque in altero etiam casu, et si sola vasorum laxitas morbum creet, adstringentia curationis initium exposcit; nam praeterquam quod laxiora justo vasa uberiorem, quam par est, humorum copiam, a qua anastomosis eo facilius procuratur, in se recipient, haud aliter etiam ad pristinam se se diametrum contrahere vale-

(*m*) l. c.

(*n*) Vide §. 36.

bunt, qvam si humores iisdem contenti ad minorem naturali & copiam & impetum redigantur: idcirco in altero qvoqve hocce casu non adstringentia sed vacuantia curationem ordiri debent; & siqvid præter vacuationes hic instituendum est aliud, ad laxitatem nimirum vasorum simul respiciendo, illud ad roborantium tantum exhibendorum usum pertineat, oportet. Tertius deniqve casus cum e binis prioribus conflatus sit, perinde adstringentia a principiis curationis prorsus excludit. Hincqve fit, ut leucorrhœa sèpenumero sine ullis adstringentibus auspicio curetur, iis vero præmature exhibitis vel contumacior evadat, vel male suppressa longe deteriora post se mala trahat. Verum ubi per principia morbi humorum vis & copia, pro eo ac par erat, imminuta fuit, indoles aliena emendata, omniaqve alia curationis obstacula undiqve sublata, leucorrhœa tamen ob solam vasorum atoniam nullis roborantibus nervinis, utpote qvorum virtus minor sit, qvam atoniæ vasorum gradus exposcat, abolendam perstat; tum vero adstringentia, nervinis valentiora, in usum vocanda sunt, eaqve vel sola vel roborantibus juncta, non neglectis tamen per intervalla vacuationibus.

2) *Inanitio* nimia bonorum simul humorum, functiones, præsertim animales lædens, vitæque periculum intentans, nisi fluxus oxyus aut suspendatur ad tempus, aut certe, pro eo ac par est, minuatur. Urgens enim est indicatio vitalis, cui tum cito satisfaciunt adstringentia, a quævis hocce in casu ne initio qvidem ægritudinis, ne dum habituali in malo, est abstinentia, aut quidquam pertimescendum; quandoqvidem palliativo tantum scopo administrantur. Indicationem hanc non cerebri speculationis-que commentum, sed experientiæ fœtum esse, docent observata v. RIEDLINI (o):

„ est autem (narrat ille) quædam propin-
 „ quæ mihi cognatione conjuncta, jam fer-
 „ me quadragenaria; quæ per plusculos
 „ annos fluore albo laborat, qui non solum
 „ interdum tantam adipiscitur acredinem,
 „ ut & partes genitales excoriet, verum
 „ aliquoties jam, quando diutius præsertim
 „ institit, caput tantum debilitavit, ut non
 „ solum de memoriæ defectu, verum & de
 „ visus tanta imminutione conquessta fuerit,
 „ ut interdum oculis vel proprius admota
 „ vix distingvere a se invicem potuerit.

(o) Lin. med. ann. 6. Octobr. 14 p. 1161. sqq.

„ Haec ipsam autem non tam confortantia
„ qvævis, & vel laudatissima cephalica ju-
„ verunt, qvam qvando remediis idoneis
„ nimius hic fluxus inhibitus fuit. Et de
„ iisdem fere malis conqueritur præcipui cu-
„ jusdam mercatoris uxor juvencula, cete-
„ ra sana; hæc enim fluore hoc correpta
„ non solum subinde vertigine vexatur, ve-
„ rum &, dum attentius subiecta adspicit,
„ visum interdum aliquamdiu sic amittit,
„ ut, nisi post aliquod temporis spatium,
„ eadem dijudicare non possit. Laudat hæc
„ qvidem opobalsami usum; at qvia tanta
„ diligentia, qvanta opus est, illud in usum
„ non ducit, malum identidem reddit, ipsam-
„ que, ut sui majorem gerat curam, qvæsi
„ hortatur. In primis autem hoc referenda
„ est matrona qvædam nobilissima, tenuior-
„ ris constitutionis, aliquot liberorum ma-
„ ter; hæc enim, ut ut tributum lunare fere
„ semper, qvando non gerit utero, in ni-
„ mia solvat qvantitate, inde tamen se vel
„ minimum mali nunquam percipere, qvin
„ melius se habere aliquoties jam serio co-
„ ram me testata fuit; at a semper imme-
„ diate succedente fluore albo tantum ipsi
„ debilitatur caput, ut tantum non perpe-
„ tuis catarrhis divexetur, qui dentium ma-
„ xime sensilem partem præsertim occupan-

„ tes in iisdem subinde tantos excitant do-
 „ lores, ut & a gravioribus sibi metuat ma-
 „ lis, oculosque in primis & haec subinde
 „ caligantes notans ab apoplexia se non in-
 „ anem fovere metum aliquoties credit. Et
 „ illi vero ea, quae fluxum hunc retardant,
 „ medicamenta praे aliis hactenus conduxe-
 „ runt, . Haec RIEDLINUS. Ita etiam
 RAULINI (*p*) robustæ feminæ leucorrhœa
 post quatridui febrem invalescens ad ex-
 haustionem usq; causavit primum tensiones
 stomachi, lassitudinem artuum, tolerabilem-
 que cephalalgiam, quae demum in cardial-
 giam, debilitatem, sævissimosque capitis do-
 lores adoleverunt, leucorrhœa usq; adeo
 incremente, ut ad eam moderandam præter
 diluentia & cathartica etiam lenibus adstrin-
 gentibus cum paregoricis opus fuerit, a
 quæis demum remisit cum levamine, spem-
 que ulterioris sanationis præbuit. Ceterum
 fluxus erat sensibiliter chylosus, bihoriisque
 a pastu tam copiose procedebat, ut ægra
 erecto in situ conclavis pavimentum confur-
 caverit; postea minuebatur insigniter usq;
 ad novam refectionem.

§. 58.

Delectus qvoqve remediorum adstringentium non est prætermittendus; qvandoqvidem eorum nonnulla aliis qvoqve indicacionibus eodem tempore implendis inserviunt. Aptissime vero hoc facientia remedia adstringentia binas in classes dirimi possunt, ad qvas pertinent

I. *Exsiccantia terrestria* absorbentia, qvæ duplicitis hic utilitatis esse videntur, dum nimirum non acrimoniam modo humorum ad se alliciendo tollunt, sed aquofam etiam humorum partem, qvæ acres illas moleculas vehiculi instar complectitur, solidisqve interjecta tonum eorum imminuit, potenter imbibunt, ac per urinas evehunt. Hujusmodi sunt vel maxime

a) *Lapides cancrorum*, qveis in leucorrhœæ curatione feliciter nuper Lugduni Batavorum celeber Practicus uti cœpit, præbendo eos qvotidie ad 3ij. Ibiqve præcipue operæ pretium facere sunt visi, ubi materia tam erat acris, ut partes, qvas tetigit, arroserit (q). Cui rei STÖRCKIANA (r)

(q) Medic. Commentar. von Edinburgh i Th. 3 St.

3. Abschn. p. 362.

(r) Vide §§. 47 & 55. a).

qvoqve observata congruunt. Sed medicamenti hujus virtus ad leucorrhœam curandam jam dudum ante G. W. W E D E L I O (s) nota fuit: „ curavimus (ait ille) „ aliquando fluorem hunc solo magisterio „ oculor. 69 cum oleo anisi, item elixir „ uterini aliquibus dosibus „.

b) *Corallia*, qvorum in curanda leucorrhœa usus jam satis antiquus est, non futurus utiqve, nisi profuissent; maximeqve illorum TR^a & Syrupus commendantur. Ita C. KOELICHEN (t) sexennem puerlam a leucorrhœa, post alvum infuso rhei per epicrasin motam, data per aliquot dies TR^a Coralliorum liberavit. Perinde J. LANZONI (u) ægra usu ejusdem TR^a ac pulveris Terræ Sigill. ab eodem malo convaluit. Refert idem viduam 33 annor. ab leucorrhœa cum pallore, cephalalgia, palpitationibus cordis, & hypochondriorum tremore, syrapi corall. QVERCETANI (x) usu fuisse vindicatum. Cujus syrapi efficaciam

(s) Amœnit. mater. med. L. 2. S. 2. C. 12. No. 6. p. 416.

(t) Act. med. Hafniens. Vol. 1. Obs. 83.

(u) Misc. nat. cur. dec. 3. ann. 1. Obs. 39.

(x) Dispens. Viennens. fol. 292.

etiam novennis puella PAULLINI (y) est experta.

c) ∇^a *Calcis* & ∇^a *Bristolensis*, „ qvæ revera est aqua calcis naturalis „ teste R. MEAD (z), & in curanda leucorrhœa perqvam efficax. Ita mulier apud T. THOMPSONUM (a) ex abortu cum hæmorrhagia non admodum exhausta in bimestre incidit leucorrhœam citra universi corporis cachexiam: ad quam sanandam, sub facili nutrimento, concessa potui paucum vino rubro & ∇^a Pyrmontana, quotidiana vectio curru imperata, cortexque Peruvianus exhibitus. Ab his spatio 5. 6. hebdomadum sensim fluxus minuebatur, ac tandem a Bristolensis aquæ usu plane desit.

2. *Austeria medicamenta ac proprie stypatica*, velut est

a) *Suber ustum* „, quod ad 3j proprium fuit experimentum HELIDA EI Paduani „, teste M. ET TMÜLLERO (b).

(y) Vide §. 6.

(z) Expos. mechan. venenor. Tent. I. p. m. 40.

(a) Samml. auserl. Abhandl. zum Gebrauch der præct. Aerzte 3. B, 1 St. p. 13, sq.

(b) I. c. p. 952.

b) *Qvercus folia*. „ Ego , inquit „ H. MERCURIALIS (c), cum decocto „ fol. qvercus ʒjv vel ʒvj cum ʒj coaguli „ leporini per 8 vel 10 dies usurpato inve- „ teratos fluxus curavi „ .

c) *Terra Catechu*. „ Ante omnia , „ inquit J. DOLAEUS (d), convenit „ TR^a Catechu cum V^s Q^fato parata , & „ per 9 dies continuata , qva sola plures „ restituimus. Potest in larga exhiberi „ dosi „ .

d) *Vitrioli acidum*, qvod simul diureticum , & antisepticum est. „ Nullum , „ ait R. a FONSECA (e), præstantius re- „ medium pro roboratione interna inveniri „ poterit eo , qvod sic conficitur :

R. ∇^a rosar. t̄b jv.

Ω vitriol. gtt. xij. ad xv. M.
„ ita ut aqva reddatur acidula , ac vix ta-
„ lis sentiatur ad gustum. Deinde sumito
„ tres pugillos rosarum rubrarum siccaturum ,
„ & ponantur in ∇^a vitriolata in vase vi-
„ treo , deinde baculo agitetur aqva ; post-
„ ea permaneat sic aqva per duos dies ,

(c) De morb. mulier. L. 4. C. 6.

(d) Encycl. med. L. 5. C. 4. §. 24. p. 506.

(e) I. c. Tom. I. Consult. 21. p. m. 152. sq.

„ in quo spatio (mirum dictu) aqua acquirit
 „ colorem saporem & odorem rosarum: de-
 „ inde extrahe ipsum liqvorem tinctum, &
 „ cum saccharo rosaceo & julapio rosarum
 „ fiat syrpus, de quo sumat singulo quo-
 „ que mane 3j. Medicamentum est præ-
 „ stantissimum corroborans, parum adstrin-
 „ gens „. Eodem nuper acido exhibito
 leucorrhœam M. A. WEIKARD (f) bis
 fugavit, primum (g) in matrona jam ca-
 chectica, macra, hecticamque simul febrem
 perpetiente, cui leucorrhœa post hysteriti-
 dem suppressa febrem putridam epidemicam
 15 dierum accivit. Huic præter evacuantia
 opponebatur ▽^a acido minerali mista cum
 syrupo potui data, eo cum effectu, ut &
 putrida & hecrica febris & leucorrhœa des-
 erint. Postrema qvidem aliquot post men-
 ses rediit, sed humor jam albus, parcior,
 minusque acer profluebat. Alia (h) ma-
 trona eundem fluxum uberem cum perpe-
 tuo sanguinis ex utero stillicidio ac febricu-
 la hecrica passa, ubi diu °° vitriol. in ▽^a
 cum syrupo bibisset, addito interdum elixir

(f) Obs. medic. p. 108. sqq.

(g) Ibidem casu 1.

(h) Ibidem casu 2.

vitriol. MYNSICHTI, ita sensim convaluit, ut etiam gravida facta feliciter pepere rit. Stillicidio sanguinis sub hac graviditate, uti & sub priore, quam abortus exceptit, accidenti HALLERI elixir acidum opitulatum est.

e) *Martialia* demum omnium pene efficacissima. Nam cum teste R. MEAD (*i*) hocce in morbo,, laxiores corporis fibril,, læ adstringentia desiderant, ea in primis „ qvibus ferrum inest „ optime Auctor convenire existimat. Eximie utique STACKII (*k*) duci profuere. Maxime vero idoneæ hosce in usus sunt $\nabla\alpha\ \delta\ les$, ut *Lauchstadienses*, *Freyenwaldenses* (*l*), *Landeccenses* (*m*), &c. De *Piperinis* ANHORNIUS coram J. REYDT (*n*) sancte affirmavit, nullum se aut certius aut securius adversus leucorrhœam nosse remedium eorumdem potu ac balneo, multasqve ab se nobiles ægras harum aquarum usu e morbo dicto plane fuisse percuratas, qvæ frustra

(*i*) l. c.

(*k*) Vide histor. 5.

(*l*) HOFFMANN l. c. cautel. §. 3.

(*m*) Histor. morbor. Vratisl. A. 1669. p. m. 59.

(*n*) Hydrophylacii 1. Th. 12. Cap. p. 263.

prius efficacissima qvæqve remedia sunt expertæ. Non sine fructu sane Comes ab ETTINGEN iisdem est usq; (o). Rublenses qvoqve idem præstant, qvarum in & extero usq; A. F. BERTRAMI (p) juvenis matrona non modo a vetusta leucorrhœa est liberata, sed ob eandem sterilis conceptionis qvoqve signa jam præ se tulit. Porro „ in affectu hoc rebelli, inquit J. DO- „ LAEUS (q), ex singulari dispositione „ lymphæ, qvando hæc corrupta & acris „ reddita fuerit, & glandulas partium ge- „ nitalium corruperit, ut non amplius re- „ tinere possint, convenienter præ aliis ther- „ mæ Embenses, a qvibus plures feminas „ albo fluore rebelli laborantes curatas vi- „ di „. Brückenvienses etiam non sunt incelebres. Apud M. F. ALIX (r) „ fe- „ mina 30 annorum fluore albo per 4 jam „ annos post insignem animi mœrorem „ afficta aquas Brückenvienses in & ex-

(o) Ibidem p. 184.

(p) Unterricht von dem Gebrauche u. Würkungen des Ruhler Stahlwassers p. 60. Obs. 8.

(q) Encycl. med. L. 5. C. 4. §. 24. p. m. 505.

(r) Obs. chirurg. fascic. 4 contin. obs. de salut. effect. aquar. miner. Brückenvau, Obs. 14. p.

„ terne adhibebat tam felici successu, ut
 „ penitus a malo suo liberaretur, & men-
 „ ses legitimos experiretur, qvales durante
 „ fluore albo nunquam ipsi successerant „.
 Sæpenumero etiam hæ aqvæ curationem
 accelerant, dum aliorum remediorum usui
 subjunguntur. Sic J. C. RUEFFII (s) ma-
 trona admodum formosa, prope quadrag-
 naria, sangvinea, obesula, vivax, ac in vene-
 rem prona, qvater olim partu levata, dein
 septennium a viro relicta, a triennio leucor-
 rhœam ex intervallis jam plus jam minus
 molestam patiebatur cum symptomatibus hy-
 stericis, notabiliqve in dextra uteri parte.
 (qva se olim fœtus gestasse meminit) dolore,
 qvi sub fluxu mensium (pene 14^{to} qvovis
 die, at sine dolore, nec nimia copia, re-
 vertentium) insigniter minuebatur, iis vero
 finitis denuo invalescebat, nec non obscurò
 qvodam loci dolentis tumore. Post usum
 pilularum saponaceo - gummosarum, semi-
 cupiorum, & frictionem abdominis qvolibet
 mane institutam, e consilio A. HAENII
 sumebat ter qvotidie No. 3 pilulas e se-
 quentibus:

(s) Consult. medic. p. 148, sq. 155.

R. Sangvin. dracon.

Terebinth. coctæ aa ȝij

— liqvidæ q. f. F. pil.

gr. jv. qveis sæpius vesperi jungendum sva-debatur paregoricum e syr. diacod. cum mucilag. sem. cyd. ▽^a ros. extracta. Ab his pilulis aliquamdiu cum regimine usurpatis demum aqvis Spadanis ægra ex integro convaluit.

C A P U T X.

C O M P O S I T A.

§. 59.

C O M P O S I T A *remedia* ad leucorrhœam ea voco, qvæ e pluribus hactenus enarratis simplicibus conflata & exhibita pluribus eodem tempore indicationibus faciunt satis. Medicamenta hæc magnis passim ornantur œncomiis, præsertim ab suis inventoribus; neqve inficiandum est, ea sæpenumero operæ fecisse pretium: idcirco nec prætereunda hic esse censui, ut qvæ ad absolutam leucorrhœæ historiam pertineant. Commendatissima vero sunt fere isthæc:

§. 60.

1. *Cremor semin. lactucæ cum ▽ a ♂ li.*
 Etenim,, cremore lacteo semenis lactucæ ▽ a
 „ chalybeata præparato plurimas albo fluore
 „ laborantes cum ♂ eboris subtilissimo mi-
 „ sto percuravit J. MEYNOLDUS Medicus
 „ Venetus,, referente G. H. VELSCHIO (t).
 De hoc ipso remedio T. BARTHOLINUS (u)
 „ inter rara experimenta (ait) & sèpenu-
 „ mero feliciter probata adversus albas
 „ mulierum fluxiones hoc accepi in Italia:
 „ cremorem nempe semenis lactucæ prius
 „ macerati in ▽ a extictionis chalybis,
 „ addito pulv. eboris in tenuissimum polli-
 „ nem redacti „, + F. C. PAULLINI (x)
 „ duas feminas, alteram 38, alteram 57
 „ annorum a fœdo hoc fluore cremore se-
 „ minis lactucæ, prius in ▽ a extinct. chă-
 „ lyb. macerat. addito pulvere nuc. mosch.
 „ præmesso purgante, omni ex voto cura-
 „ vit „, (y).

(t) Mise. nat. cur. dec. 1. ann. 4. app. p. 47.
 micrōin. cent. 2. No. 95.

(u) Act. med. Hafniens. Vol. 5. Obs. 36.

(x) De nuc. mosch. S. 2. P. 3. membr. 7. C. 7.
 §. 4. p. 666.

(y) Confer. §§. 51 & 58. No. 2. e),

§. 61.

2. *Essentiæ*, TR^æ variæ e prius allatis conflatæ, cujusmodi sunt, qvas constituunt
a) TR^a *Corallor. cum οu Lignorum.*

J. M. NESTERUS (z) „ puella nobilis o-
„ ctennis (inquit), habitus corporis gra-
„ cilioris, corripiebatur per 3 menses flu-
„ ore muliebri . . . ex nimio atqve con-
„ tinuo facchari usu, qvo a pueritia affve-
„ ta erat, & somno, cui indulxit haetenus
„ contraēto, cum pallore faciei & labiorum,
„ cephalalgia gravi, respiratione anhelosa,
„ palpitatione cordis, lassitudine gravativa,
„ appetitu penitus prostrato, ac metu, ne
„ malum hoc in cachexiam aut atrophiam
„ degeneret . . . Ordinavi varia, qvæ alias
„ cum felici successe in hoc affectu adhiberi
„ sciebam, in primis ad humores crudos
„ præparandos, obſtructiones referandas,
„ ac intemperiem corrigendam. Optima
„ tandem obſervata diæta præscripsi vinum
„ medicatum, ac postea TR^{am} Corall. cum
„ οu lignorum præparatam aliquoties ex-

(z) Misc. nat. sur. dec. 1. ann. 8. obſ. 25.

p. 46.

„ hibui, & ægram . . . optimæ sanitati re-
„ stitui „ (a).

b) *Essentia bals.* Peruviani cum TR^a ♂
ZWOELFFERI. „ In fluore albo, ait F.
„ HOFFMANNUS (b), præmissis per epi-
„ crasin agentibus laxativis, ex melissa,
„ abrotano, corticibus lignorum, essentia
„ balsami Peruviani cum TR^a ♂ ZWOELF-
„ FERI mixta in rebelli hoc & molestissimo
„ feminarum affectu, non omissis quoqve
„ externis cum eodem balsamo suffumiga-
„ tionibus in uterus receptis, egregium
„ levamen aliquoties attulit „ (c).

c) *Essentia Pimpinelle alb.* cum TR^a
♀ri usitatissimum ad leucorrhœam remedi-
um (d) J. STORCHIO, apud quem (e)
puella tenera 11 annor. 24^{ta} Januar. cum
ante & post meridiem expallescens vomuis-
set, at sine febre, data TR^a rhei 3j binis
dosibus cum levamine. At cum nihilomi-

(a) Confer §§. 49. & 58. No. 1. b).

(b) Diss. de balsam. Peruv. §. 27. Opp. suppl. I.
P. 2. p. 740.

(c) Confer §. 48 d) & §. 58 No. 2. e).

(d) Confer §. 53. 47.

(e) Obs. clinie. ann. 8. Januar. Cl. 2 No. 5. p.
331. (Confer etiam von Weilkerkrankh. 2.
Band casum 113. p. 419.)

nus ægrotare pergeret, 18^{va} Febr. detectus apud eam est fluor albus, cui opposita MR^a ex essent. Pimpin. Lignor. cum TR^x ♂ ii aa 3j. S. m. & v. gtt. xij. Postero die æstuanti data MR^a refrigerans. Die 20^a bene habuit. Febr. 27^a referunt leucorrhœam aliquot diebus & vehementem & excoriantem adfuisse. Idcirco præscripta seqventia:

R. MP. BECHERI

— purgant. aa 3*fl*

♀ dulc. gr. jv. M. D. pro 4
dosib. vesperi.

R. Effent. Pimpin. 3ij.

TR^x ♂ ii *fl* sat. 3j. M. S. ad
gtt. xv.

Ab his demum ex integro convalescit. Porro (*f*) mulier 26 annor. leucorrhœæ interdum obnoxia cum eam domesticis remediis repressisset, 27^a Decembr. tempore catameniorum tormentosam diarrhœam nacta est, qva per TR^x rhei 3j bifariam sumptam sedata, mensibusqve absolutis, 31^a in febrem pleuriticam, sibi non insuetam, incidit, cui rursus pulv. antisp. pect. ac litu depulse 1^a Januar. successit odontalgia,

(*f*) Ibid. Decembr. Cl. 2. p. 652.

dataqve MR^a refrigerante, postero die in hypochondriis (ubi nempe litus ante adhibitus fuit) effloruere miliaria, ægra magis ægrotante; sed simul erupit denuo fluor albus. Continuatis Pulv. & MR^a die 4^a Januar. mulier melius habuit; vehementes tamen adhuc dolores spinam dorfi tenuere. Datus pulv. antispi. sal amar. c. magnes. alba. Die 15^a e mariti infectione patuit leucorrhœam esse venereum. Data ergo effent. Pimpinell. cum. TR^a ♀ri bono effectu. At qvi hæc, si malum erat venereum, poterant profuisse? Forte penis mariti excoriationem tantum est perpetrus (g).

§. 62.

3. *Potus varie confecti, qvalia sunt*

a) *Apozemata LOSSII & GASSERI.*

Sic apud Medicos Vratislavienses (b)
 „ ceteris parum proficientibus ab inveterata
 „ to malo liberata fuit matrona apozemate
 „ LOSSII (i):

(g) Vide §. 30.

(b) Hist. morb. Vratisl. A. 1700. p. 369.

(i) Obs. med. L. 4. C. 8. p. 344.

- Rx. Raf. lign. Lentiscin. ʒvj
 ——— Rosmarin. ʒij
 Succin. fl. crass. contus. ʒvj.
 Rafur. Stanni ℥ j.
 ——— Ebor. ʒj. macer. in
 △æ font. ℥ viij per 24 h.
 dein adde
 Rad. Eryng. ʒij.
 Uvar. passar. ʒij. Coqv.

Perinde A. GASSERI (k) mulier „, fluore
 „, uteri laborabat . . . adeo pertinaci, ut
 „, nulli remediorum generi cederet, sed
 „, continue molestus effet, ut in submeju-
 „, lis urinæ stillicidium. Purgationibus
 „, igitur saepius jam iteratis, aliisqve diver-
 „, sæ formæ tergentibus, & adstringentibus
 „, adhibitis, potu tandem decocti conva-
 „, luit:

- Rx. Lign. Gvajaci ʒij.
 Cort. ejusd. ʒjs
 Glycyrrh. ʒj. Coqv. ad me-
 diet. in
 △æ ℥ jvs, dein adde
 Sem. Portul.
 — Sumach aa ʒij.

(k) Apud G. H. VELSCH syll. cur. & obs. med.
 Obs. 86.

Rad. Tormentill. ʒf

Glandium cum calicib. No. vj.

Consolid. Saracen. p. j. Coq.

„ denuo probe cooperta ad reman. ℥ ij.

„ Colat. adde ad singulas ʒjv

Syr. Cydonior. ʒj. M. D. fudo-
„ re excitato. Æstate etiam ad acidulas
„ missa potu earumdem melius habuit „.
Ex consideratis horum apozematum simpli-
cibus facile apparebit, ad quasnam indica-
tiones eodem tempore inserviant.

b) *Vina medicata STÖRCKII, FO-*
R E S T I. Ab STÖRCKIO (*l*), si ad pur-
gans alibi (*m*) memoratum leucorrhœa
non conqvievit, & ægræ debilitabantur,
„ tunc optato cum successu datum est vi-
„ num

R. Limat. ♂ non rubig.

Cort. Cinnamom.

— Winteran.

— Peruv. aa ʒf M. F. ♀
cui affunde

Vini generos. Austriac. ℥ ij.

„ Relinqve in leni digestione per 24 h. dein

„ colaturam per inclinationem exhibe. M.

(*l*) Ann. med. 2. p. 211.

(*m*) Vide §. 45. No. 1.

„ S. detur ter de die cochlear j. sensim
 „ augendo dosin. Solo hoc vino reliquiæ
 „ fluoris albi penitus sublatæ sunt, &
 „ ægris rediit robur, color, & integra sa-
 nitas „ (n). De FORESTI autem vino
 alibi (o) dicetur.

§. 63.

4. *Pilulæ variorum Auctorum*, ut sunt

a) L. B. LENTINI (p) ex rheo,
 alumine, cortice Peruviano (q), qvas ipse
 in leucorrhœa continua non acri summæ effi-
 caciæ est expertus.

b) BECHERI *polychrestæ* (r), vel
 E. C. STAHLII, de qvibus ita ipse (s):
 „ si a qvoqvam (ait) medicamento usqvam
 „ effatu dignum in hacce affectione effectum
 „ observavi, certe ab usitatis mihi pilulis
 „ eumqve usqve adeo sub sensus cadentem,
 „ ut primum leucorrhœam adaugentes post-

(n) Confer §. 55. d), & §. 58. No. 2. e).

(o) Vide histor. 3.

(p) I. c. No. 23. p. 157.

(q) Confer §. 45. No. 1. §. 58. No. 2. e).

§. 56.

(r) Disp. Viennens. fol. 146.

(s) Colleg. cat. magn. cat. 68. p. 679.

„ modo rite continenter sumptæ eandem
 „ sensim imminuant, ac demum plane
 „ compescant „. Formula earum est se-
 qvens (t):

R. Extr. C. B. & Fumar.

Gumm. ammon. in Acet. Scillit.
 solut. aa ʒj.

Myrrhæ optim.

Aloes succotr. aa ʒj.

G. Hederæ ʒs ad ʒij.

Croc. pulverisat. gr. xv. M. F.

pil. D. quotid. gr. xv pro dosi (u).

§. 64.

5. Pulveres, iu primis

a) I. DOLAEI (x): „ nos (inquit
 „ ille) levi remedio & plerumque unico
 „ solemus curare hoc malum, & nisi aliud
 „ quid adsit, quod hujus morbi curatio-
 „ nem impedire possit, auderemus fere cer-
 „ tam polliceri curationem. Exhibemus
 „ autem sequentem pulverem, & quidem rei-
 „ teratis vicibus (y):

(t) Ibidem cas. 19. p. 233.

(u) Confer §. 43. 53. 55. c).

(x) Encycl. med. L. 5. C. 4. §. 24. p. 505. sq.

(y) Confer §. 58. No. 1. 2 d) e).

Rx. Testar. ovor. calcinat. ʒf
 Vitriol. ♂ a gr. vj. ad x . . .
 potest adjungi
 Camphoræ gr. iij.
 Laud. opiat. gr. j.
 Sacch. hni gr. v. M.

(Postremum tamen consultius omittetur.)

b) J. H. LANGII (z); qvi „ est
 „ (ait) albi fluoris præter venereum atro-
 „ cissima species, qvam menstrui fluxus
 „ subitanea suppressio gignit. In eo curatu
 „ difficillimo interdum malo optimo cum suc-
 „ ceffu camphoram succino albo præparato ♂
 „ nitro combinatam ordinavi: qva medela
 „ menses in suos tramites inducti fuerunt,
 „ & protinus ceffavit morbus elegantiori
 „ sexui adeo detestandus „.

c) F. C. PAULLINI, cuius confe-
 ctio est (a):

Rx. Herb. Adianth. magu. ʒf
 Succin. alb.
 Corall. alb. aa ʒij. M. F. Pulv.
 tenuis, cuius usu cum decocto fol. Rosma-
 rini (b) tres matronas a leucorrhœa libe-

(z) Miscell. verit. medic. p. 77.

(a) l. c.

(b) Confer §. 53 c) & §. 58 No. 1. b).

ravit P. L. EBEN (*c*). Plura huc facientia composita remedia a variis passim Auctori- bus commendata collegit J. ASTRUC (*d*).

C A P U T XI.

R E M E D I A E X T E R N A.

§. 65.

Externa qvoqve præsidia in facienda leucorrhœæ medicina neutiqvam sunt omitten- da, ut qvæ hujusmodi sint, qvæ vel cor- pus ægrum ad remediorum internorum usum aptent, vel horum ipsorum actionem pro- moveant, vel symptomata morbi egregie mitigent; imo sæpen numero ejus sunt ener- giæ, ut omnem sola absolvant curationem; qvandoqvidem haud raro ipsi loco affecto applicari possunt. Horum ergo in censum vel maxime referuntur

§. 66.

I. SANGVINIS MISSIO, qvæ pluri- bus titulis hic opitulatur. Nam proximam

(*c*) Obs. posthum. a J. FRANCO edit. Obs. 19.

(*d*) l. c. §. 7. p. m. 134.

leucorrhœæ causam sœpe tollit, dum copiam sanguinis minuendo vasis uteri potentiam confert ad minorem se se diametrum contrahendi (e): qvo facto oscula arteriarum arctius contracta nil amplius transmittent. Qvod tunc in primis valet, ubi vasorum uteri adeat infarctus a mensibus suppressis (f), aut qvacunqve solenni alias vacuatione sanguinis vel neglecta vel intercepta (g), aut præsente unde unde plethora. Cujus rei luculentum exemplum præbet RAULIN (h): puellam admodum sanguineam ante triennium scorbutici totius corporis dolores cum laffitudine ceterisqve scorbuti periculosissimi symptomatis invaserunt; catamenia minuebantur, ac plane defecere, postqvam ægra velut marasmo emarcuit. Curatione longa ac diffcili, anni tamen spatio peracta, menses sensim rediere, sed nec typo nec ubertate pristina; qvam ob causam puella lumborum dolores, gravitatem capit, aliaqve hic solennia incommoda perpetiebatur, qvæ ultra semestre aliud ex alio

(e) Vide §. 19.

(f) Vide. §. 16.

(g) Vide §. 18. g).

(h) I. e. T. 2. P. 3. §. 2. C. 5. p. 336.

fibi succedebant: comparuit diarrhœa serosa, sed versus octavum diem sponte cessanti mox successit copiosa leucorrhœa; hanc Væ So brachii minuit, posteroqve die iterata citra malam seqvelam prorsus abegit. Interea consveto circiter tempore catamenia rediere, qveis absolutis 8^{vo} post die diarrhœa illa prior est reversa; cui perinde Væ Se sublatæ leucorrhœa in præsenti non successit, sed ocliduo post 3^{am} catameniorum periodum copiosa iterum ingruit, qvam rursus Væ So compescuit; neqve ex hoc tempore illam secuta est porro diarrhœa. Ceteroquin vero qvoties catamenia solita fluxere ubertate, illis nec leucorrhœa nec diarrhœa successit; parcus vero fluentes menses semper aut alvi fluxus aut fluor albus excepit, sibiqve successerunt, nisi id matura Væ Se præcaveretur, magisqve semper puellam leucorrhœa qvam diarrhœa afflixit, fatigavit, ac debilitavit. Sic F. HOFFMANNUS (*i*) „, sèpius observavit a menstruo flu- „ xu per 2. 3^{ve} menses non ex graviditate, „ sed aliis causis, retento ingentem sanguini- „ nis profusionem obortam fuisse, qvam „ postea fluor albus excepit. Qvare ad

(i) l. c. §. 4.

„ utrumqve malum præcavendum Vx So,
„ expensis prius omnibus circumstantiis,
„ administrata est utilissima „. Qva ipsa in
pede instituta , datisqve idoneis remediis,
femina E R N E S T I (k) ab leucorrhœa men-
sium imminutionem conseqvente est liberata.
Sic etiam J. H. F Ü R S T E N A U I I (l) „, vetu-
„ la... septuagenaria ... Vx Sni & scarifi-
„ cationi adsveta, utraqve vero ob ætatem
„ ingravescentem hactenus neglecta , fluxu
„ uterino fere perpetuo , eoqve copioso,
„ varii coloris, striis sanguineis distincto &
„ fœtido correpta . . . addita . . . circum-
„ stantia , qvod fluxu isto tantisper retardato
„ ægra mox exqvisis dorsi doloribus expo-
„ sita fit, nausea ceteroqvin, ciborum fasti-
„ dio, lassitudine totius corporis , & similibus
„ symptomatibus perpetuo afflcta (erat). Con-
„ gruis remediis, purgantibus, roboranti-
„ bus , tonicis , mundificantibus , ex or-
„ dine exhibitis, ægra & redeuntem cibo-
„ rum appétitum , & vires alacriores , &
„ fluorem nunc revera album & homoge-
„ neum adefse fatetur , & continuato debi-
„ torum usu auxiliorum , ipsaqve scarifi-

(k) Vide §. 16.

(l) Act. nat. cur. Vol. 9. Obs. 96. p. 375.

„ catione postliminio reassumpta pristinum
 „ vigorem . . . propediem exspectat „.
 Neque vero solæ hæ sunt hujus vacuationis
 utilitates ; valet quippe etiam, indicataque
 est admodum, ad dolores (*m*) a vasorum
 humoribus turgentium distentione, eique
 saepe comite inflammatione ortos sponien-
 dos, id quod ex græ BURGGRAVII (*n*) ac
 STÖCKII (*o*) testantur. Contra vero
 sanguinis missio, monente L. RIVERIO (*p*),
 vetusto in morbo locum vix habet, ubi si-
 gna exhaustionis & cachexiae in hydrope in
 tendentis praesto sunt. Unde etiam medici
 Vratislavienses (*q*) hoc de morbo agentes
 „ V. S. (inqviunt) vix celebravimus, etiamsi
 „ eam vehementer laudet SYLVIUS; quia
 „ fere medicam opem implorant nostrates
 „ viribus jam dejectis, & tabe corporis immi-
 „ nente, aut praesente cachexia hydropis
 „ matre „.

(*m*) Vide §. 5. No 1.

(*n*) Vide §. 45 No 1.

(*o*) Vide histor. 10.

(*p*) l. c.

(*q*) Hist. morb. Vratisl. A. 1700, p. m. 168.

§. 67.

2. FRICTIONES *ficcæ*, primum molliores, dein asperiores ad vasa laxa roboranda, infarctusque dissipandos, qvas sua in ægra GALENUS (*r*) cum fructu instituit, præsertim in laxis corporibus, sunt admodum proficuae. Ut &

§. 68.

3. LITUS seu frictiones cum fluidis factæ. „ Decantatum est, inquit M. ETT- „ MÜLLERUS (*s*), hoc unguentum eupo- „ riston ex sclarea, de quo CORBEIUS (*t*): „ mulier (ait) quædam liberavit multas fe- „ minas ab albo fluxu

R. Sclaream contritam, in

Butyro finito putrefieri: tunc co- „ que parum & serva. Hoc unguento mu- „ lieris ventrem ab umbilico ad pubem „ usque inunxit, immittendo simul parum in „ vulvam; & comedat quoque herbam „ ipsam, .

(*r*) Vide histor. I.

(*s*) I. c. p. 952.

(*t*) Gynæcior. L. I. C. 3.

§. 69.

4. FOTUS qvoqve interdum ad locum ipsum applicare licet, eo videlicet in casu tantum, ubi uteri simul adest prolapsus (*u*); pro cuius varia affectione vari etiam fotus locum habeant, oportet, nempe abstergentes, mundantes, humorem, si acer est, diluentes & enervantes, dolorem pacantes, excoriata loca vel ulcera præsentia munda ta persanantes, amissum utero tonum reddentes, &c. at in postremo hoc non sine circumspectione est versandum (*x*). Quantæ autem efficaciæ id genus fotus memorato in casu sint, docet insignis observatio H. A. SCHAEFFERI apud J. F. HENCKELIUM (*y*), nempe sacri Præconis uxor 30 annis major, sana nubens, primo partu puerperioqve rite defuncta in leucorrhœam incidit admodum molestam, præcipue si menses ordinate non procederent; qvæ si qvando diutius persistabat, sensit, maxime sub labore ponderum qvæ elevatione, qvidpiam e. vulva egredi,

(*u*) Vide §. 35. A, b).

(*x*) Confer §§. 55. 56.

(*y*) Neue medic. u. chir. Anmerkungen I Samml.
No 19. p. 118. sqq.

at sola iterum capta in lecto qviete evanescere. Sesqvianno post alterum gravida optime rursus valuit, nec prolapsu, nec leucorrhœa, nisi novissimo ante partum tempore, reversa. Puellam enixa est sanam. Inde prioribus qvidem obnoxia fieri malis cœpit; at marito e phthisi decumbente plus quietis noctæ ambo iterum sensim ita remisere, ut demum optime se haberet. Marito elato fratri ejusdem nupsit. Sed sterilis facta, leucorrhœæ post aliquot a nuptiis menses recidivam est perpetua, a qva causato iterum sœpe prolapsu semper qviete in lecto medebatur. Tandem leucorrhœa evasit excorians, sub qva cum mulier denuo arcas aliaqve ponderosa levaret, prolapsum rursus nocta est, at multo quam alias majorem, nec amplius lecti qviete curabilem, qvi reliquo postea lecto & plus increscens & dolentior factus, ægramqve incedere non sinens, ipsam ad opem remediaqve, hactenus usurpata nunquam, qværenda compulit. Uterus totus extra vaginam prolapsus reperiebatur, tumore caput infantis trimestris æquans, fordidis plenus undique ulceribus cum labiis admodum callosis, & effluxu fœtidi puris ex uteri orificio, ut carcinoma esse videtur. Idcirco primis 8 diebus ulcera 12^{ma} qvavis hora linimento balsamico

(R. Bals. de Styrac. ʒij

— Copai. ʒj

Liqvam. Myrrh. ʒiij

Vitelli. ovor. № ij. M. applicetur calide) deligata , superimposito fotu, omni hora repetendo , ex aromaticis amaris subadstringentibus & adstringentibus herbis radicib. corticib. in vino rubro & aceto, parato , tam calido , qvantum ægra ferre potuit , lataqve fascia literam T referente omnia communita. Diæta severa cum regimine imperata. Inde non dum 8 diebus lapsis ulcera mundabantur, imminutoqve ab adhibitis diligenter fotibus uteri tumore & inflammatione mulier ita sensim convaluit, ut pristinam ad molem uterus redactus , repositusqve, ac pessario firmatus haud amplius prociderit. Leucorrhœa toto curationis tempore durans, & qvotidie inter diligandum aliquatenus observata , peculiaribus remediis haud egebat ; namqve consanato repositoqve utero mox desit , mensesqve rite processere. Curationis succeſſum adjuvit factum postmodo divertium , ut ita plus qquietis ægra corpori genitalibusqve præſtare qviverit. Interna remedia nulla alia præter pilulas balsamicas bis per hebdomadem data , & in fine præscriptum elixir roborans

R. Elix. visceral. H O F F M. ʒj.

Effent. Aurantior.

— Castorei aa. ʒij.

T R æ ♂ c. succ. pom. ʒs. M. S.
ter qvaterve per diem gtt. 60 ex ∇ a. Ubi
autem uteris non elapsis id genus fatus ap-
plicari neqveunt, ibi vicariam iis operam
eadem cum utilitate præstant fatus pubi ad-
moti, vel vero

§. 70.

5. S U F F I T U S in cavum uteri idoneis
instrumentis immissi. „ Neqve nihil, inquit
„ R. M E A D (z), ad sanationem confert va-
„ ginam subinde suffumigare, superinjecto
„ nimirum prunis pulvere ex thure, masti-
„ che, succino, & cinnabari ♂ ii ita com-
„ mistis, ut singulorum æqvalis sit portio „
Multum iis etiam confidit F. H O F F M A N-
N U S (a) dicens : „ in inveterato fluore albo
„ siqvid adhuc cura finita de fluido ex ge-
„ nitalibus exstillat, præter jam dicta exter-
„ na & interna suffitus ex olibano, tacama-
„ haca, mastiche, & succino merentur lau-

(z) l. c. p. m. 140.

(a) l. c. §. 7.

„ dari, qvæ viæ ad uterum tendenti com-
 „ modo instrumento sunt applicanda: qvo-
 „ dammodo enim relaxatas glandulas ro-
 „ borant, . Confirmat id seqventi casu (b):
 „ femina 20 annos nata, constitutionis qvoad
 „ corpus teneroris, qvoad animum valde
 „ sensibilis, cibis dulcibus, fructibusqve
 „ horæis, & lacticiniis nimium indulgens,
 „ vitamqve amans sedentariam, a primis
 „ adolescentiæ annis perpetuo fere viscidi
 „ muci per nares stillicidio laboravit. In
 „ conjugio primum gravida partu functa est
 „ admodum laborioso, idqve propter paulo
 „ vehementiorem secundinarum extractio-
 „ nem, & inde obortum dolorem valde
 „ acutum. Neqve dein lochiorum fluxus,
 „ ut debuit, successit, sed omnino fere substi-
 „ tit: unde in febrem incidit optima mulier
 „ valde acutam; a qva tamen brevi post
 „ convaluit. Retinuit vero ab infelici hoc
 „ puerperio magnam uteri atoniam, & per-
 „ petuum fere seri albicantis & putridi ex
 „ finu ejus profluvium, qvod post mensium
 „ effluxum semper infestat gravius. His
 „ accedunt adhuc aliæ rectæ valetudinis læ-
 „ siones; nam a frigore admisso vel flatu-

(b) Ibidem Observ. 5.

„ lento cibo assumpto aut a levi qvadam
„ animi commotione dolore lumborum affi-
„ citur valde gravativo ; macilenta in dies
„ magis redditur ; & vesperi inferiores pe-
„ dum partes tumidæ conspicuntur. Dura-
„ runt singula hæc mala per integros 6 men-
„ ses : qvare ne his pejora adhuc eveniant...
„ consilium dedi , ut per 3 continuos dies
„ pilularum mearum balsamicarum № 15
„ circa decubitum , postero die vero mane
„ dosis pulveris falino · nitrofi sumatur , id-
„ qve aliquoties , interpositis semper ali-
„ qvot diebus , repetatur. Pro potu præ-
„ scripsi decoctum mastichinum cum pauxil-
„ lo cinnamomi acuatum & inter cibos cum
„ vino remixtum. Ad uterum roborandum
„ exterius commendavi suffumigia ex sanda-
„ raca , mastiche , benzoe , & cinnabari
„ vulgari confecta ; saepiusqve ingvinali re-
„ gioni imponendos svasi sacculos herbis
„ nervinis repletos & ex vino rubro co-
„ ctos : interne vero eodem fine balsamum
„ nostrum vitæ cum TR^a ♀ri æqvali portio-
„ ne remixtum cum infuso theiformi mane
„ exhibere jussi. Qvæ methodus , subjun-
„ ctio simul accuratiori vitæ regimine , opem
„ attulit exoptatissimam „ . Perinde J. P.

LOTICHIUS (*c*) matronam juvenem, præscripta pro aliquot diebus tragæa (R. ḫ h. potentill. capill. vener. aa. ȝij. f. plantag. maj. corall. alb. aa. ȝſ. nucif. garyoph. aa. ȝij. effent. citri ȝj. facch. ros. tab. man. chr. perlat. aa. ȝſ.) ex ∇^a plantag. & vino q. f. sumenda, imperatoqve, ut m. & v. foliis salviæ super prunas injectis suffitum locis naturalibus intra vestes exciperet, intra octo dies ab leucorrhœa totos ferme dies molestante, sterilitatemqve causante, liberavit. Haud secius J. A. a GHEM A (*d*) sterili feminæ, ob menses ab inito matrimonio anomalos & leucorrhœam, consuluit, ut Θ* & ciner. clavellatos æqvis partibus in ∇^a solutos prunis injiceret, fumumqve exciperet. Qvo aliquamdiu factitato, post 13 annorum sterilitatem vix anno lapsō gemellos concepit. Multum qvoqve hæc suffumigia profuerunt ægrotæ NIZETI (*e*).

§. 71.

6. INJECTIONES uterinæ vel elutiones amplioris etiam sunt usus, qvarum ope

(c) Obs. med. L. 5. C. 1. Obs. 12. p. 452.

(d) Obs. med. decad. 1. obs. 6.

(e) Vide §. seq.

qvæcunque a morbi principio ad finem usque
indicantur, ipsi affecto loco possunt applica-
ri. Præcipuus autem earum usus est ad acri-
moniam profluentis materiæ obtundendam,
dolorem ardoremque sopiaendum, erosa ex-
coriata ulceratave sananda, pus pravum
corrigendum, infecta, siqva adsunt, necan-
da, amissumque uteri tonum restaurandum,
ac fluxum pertinacem fistendum. Hinc pro
varietate horum adjunctorum variæ perinde
injectiones locum sibi depositunt. „ In ge-
„ nere vero, inquit F. H O F F M A N N U S (f),
„ illud notandum arbitror, qvod tales inje-
„ ctiones non simul ac semel & magna
„ quantitate, sed crebrius & in refracta por-
„ tione, ad unciam scil. j. vel ij. adhiberi
„ debeant. Vitanda autem sunt omnia sal-
„ fa, acria, nimis pinguis & lubricantia, „
Ubi itaqve dolorificæ genitalium vaginæ ute-
riqve erosioni ope earumdem prospiciendum
est, lac aqua dilutum optimo cum effectu in-
jicitur. Sic s T Ö R C K I I (g) in ægris „ ul-
„ terior partium corrosio facilime evitaba-
„ tur, dum saepius per diem materies acris
„ & in plicis stagnans anatica parte lactis
„ recentis & ∇^x rosarum abluta fuit, &

(f) l. c. cautel. §. 2.

(g) Ann. med. 2. p. 212.

„ dum plagæ arroſæ excoriatæ post ablutionem unguento inunctæ sunt

R. Ungv. nutrit. 3 iii

— popul. 3jſ. M.

Si qvid autem venerei hocce in malo est admistum, utiliter, exemplo HEISTERI (*b*), liqvor ex ∇^{α} Calcis vivæ ſb. j cum ♀ dulc. Īj immittetur. Si vero infecta nescio qvæ uteri in cavo nidulentur, blandis anthelmin- tics necanda erunt. Sic narrat TH. COCK- SON (*i*), matronam 27 annorum, semper ante sanam, a trimestri ea affligi cœpisse fœ- ditate, ut 3. 4ve ante catameniorum fluxum diebus lumborum dolorem solito acriorem sentiret cum profluvio materiæ viridescentis pessimeq; fœtentis ex utero, donec san- gvis erupisset. Ab hujus autem leucorrhœæ principio ad finem usq; ipforum mensium copiosos simul excernebat vermiculos vivos, exiguos, junioribus ranis caudatis non ab- similes, qvippe qveis pro ratione caudæ minimæ grande fuerit caput, & qvi inter digitos contriti fœtorem materiæ ex utero ante menses profluentis spargebant. Ab hoc

(*b*) Vide §. 50

(*i*) Medic. Commentar. von Edinburgh 3 Th. 1 St.
2 Abschn. No 4 p. 88. sq.

malo tandem facta decocti e flor. chamom. & absinthio cum oleo olivarum bis in dies per 3 hebdomas injectione mulier citra recidivam convaluit. Si denique ulceratio ute-ri adfuerit, velut diuturnitate morbi haud raro accedit, injectiones hæ sunt admodum necessariæ, a quævis F. H O F F M A N N U S (*k*) „ vidit... in fluore albo inveterato, qui „ difficulter alias sanabilis est, nec non in „ abscessibus & exulcerationibus peculiarem „ plane effectum,. Conveniunt autem hic vulneraria cum leniter adstringentibus; et- enim teste R. M E A D (*l*) „ externa... mi- „ nime adhibere oportet, quæ nimia vi „ peccantem humorem reprimunt, ac repel- „ lunt; illa tantum sunt ex usu, quæ mem- „ branæ hujus ulcuscula detergent simul & „ sanant. Ipse eventu sæpe felicissimo fe- „ minam laborantem, aut ∇^{am} aluminosam „ Bateanam, aut ∇^{am} vitriolicam camphora- „ tam, adjecto alterutri mellis Ægyptiaci „ aliquantulo, per syringem hujusmodi usi- „ bus aptam parva quantitate, at repetitis „ vicibus, infundere jussit,. Sæpenumero etiam injectiones idoneæ suffituum efficaciam

(*k*) l. c.(*l*) l. c.

magnopere promovent, curationemqve accelerant, cuius rei exemplum perqvam luctulentum literis mandavit Cl. NIZET de VARENNES (*m*), videlicet matronæ ultra biennium leucorrhœam debilitantem negligenti tandem intolerandi dolores punctionis in utero oborti sunt cum signis uteri ulcerati. Consilium petenti imperabantur, sub usu solorum tantum juscudorum per aliquot dies, suffitus e pulveris benzoës, storacis calam. olibani, resin. juniperi, mastichis, myrrhæ, asæ fœtidæ, aloes, succini aa. 3j, & simul concisis rosmar. salv. absinth. calaminth. thymi, serpilli, matricar. chamom. marrub. n. ocymi, rosar. rubr. gran. junip. aa. 3f. saepius per diem (*n*) ope machinæ ad id confectæ (*o*) administrandi. Post 14 dies decrescentibus doloribus cum ægra longe melius valeret, ad accelerandam curationem commendatae simul injectiones vulnerariæ & adstringentes, qvæ una cum suffitibus malum intra breve tempus sustulere. Matrona inde enixa est filium hucusqve sanum.

(*m*) Neuste Heilkunde aus dem Franzöf. der Herren
BÜCHOZ u. MARQVET C. 8. §. 2. p. 158. sq.

(*n*) Ibidem §. 1. p. 153.

(*o*) Ibidem p. 150. sqq.

§. 72.

7. BALNEA, *semicupiaqve* supersunt, qvæ perinde naturam remediorum interne indicatorum habere debent, iisdemqve, ut ista, cum cautelis sunt administranda. Unde suapte liqvet, balneis calidis ∇^{α} simplicis in leucorrhœæ curatione vix unqvam, nisi illa a vasorum rigiditate forsan ortum trahe-ret, locum esse posse; eo qvod majorem uteri vasis atoniam inducant, & queis GALENI (*p*) ægra non impune usa est. Horum itaqve loco multo magis indicantur

A. *Diaphoretica* balnea debito tempore in usum vocanda, cujusmodi sunt vapo-raria. Etenim teste F. HOFFMANNO (*q*) „ balnea sicca sive *laconica*, si a superfluo „ & excrementitio humido corpus prius „ probe liberatum fuerit, in feminis phle- „ gmaticis usum omnino habent laudatissi- „ mum, dum externo calore sudorem eli- „ ciendo partibus, ob excretam nimiam hu- „ miditatem relaxatis, pristinum tonum ex „ voto restituunt,. Idem etiam præstant

B. *Thermæ sulphureæ*, qvæ simul abstergent, discutiunt, ac valide exsiccant.

(*p*) Vide histor. I.

(*q*) l. e. §. 5.

Eapropter „ balnea Badensia & Rodanensis „ qvandoqve mira præstant, inquit STÖRCKIUS (r), ubi remedia interna non sufficiunt.

C. *Roborantia, adstringentia*, sub finem morbi, post omnia alia remedia rite præmissa, fluxum nihilominus pergentem, ob vasorum uteri atoniam, sola sæpe fistunt; recidivam morbi præcavent; mensesqve in ordinem redigunt. Qvorum usum v. RIEDLINUS (s) interdum ita esse observavit necessarium, ut sine illo incassum balsama, martem, aliaqve interna præbuerit. Cujusmodi in primis sunt

a) *Herbacea e plantis aromaticis confecta*, qvorum efficaciæ multum tribuit F. HOFFMANNUS (t), qvam seqventi in casu est expertus: „ femina 30 & aliquot „ annorum, macilenta, post abortum 3^{ta} „ vice paßum per annum & ultra fluore albo „ correpta fuit satis molesto, mensibus „ inordinate & interdum largiter profluens tibus. Ordinavi pilulas . . . balsamicas „ circa tempus decubitus per triduum de-

(r) l. c. p. 213.

(s) Lin. med. ann. I. Junii 7. p. 164.

(t) l. c. Observ. 3.

„ vorandas, desuper bibendo postero die
„ mane vinum laxativum uterinum ad 3
„ circ. uncias. Iisdem diebus immittendam
„ duxi ægram balneo aquæ dulcis cum her-
„ bis roborantibus, sacculo inclusis, de-
„ coctæ, temporeqve infessus sacculum hunc
„ ingvinali regioni imponendum. Interje-
„ cto trium dierum intervallo pristinam cu-
„ ram per totidem dies repetendam svasi,
„ idqve rursus 3^{ta} vice, hac tantum cau-
„ tela, ut sub qvavis cura novæ herbæ
„ pro balneo sumantur. Deniqve uterum
„ thure, mastiche, & succino incensis
„ commendavi suffumigandum, rectamqve
„ vitæ rationem per longum adhuc tempus
„ continuandam injunxi. Qva methodo,
„ qvum non modo per alvum, sed per ute-
„ rum qvoqve ingens humorum sentina
„ fuerit expurgata, optima hæc femina,
„ sicut plures aliæ pertinaci & molestissimo
„ hoc affectu laborantes, pristinam recupe-
„ ravit sanitatem . . . Eodem cum sucessu
id genus balnea sua in ægra expertus est
MÜNNICH (u).

(u) Vide histor. 6.

b) *Mineralia plumbata, ferrata, aluminosa, &c.* RAULINI (*x*) matronæ 40 annor. temperamenti biliosi, a variis animi motibus diuturnis haud parum emaciatae functiones turbatæ leucorrhœam accivere; a qva usurpatis per mensem legitimo sub regimine balneis plumbatis (les bains Plombières) liberata est. Alia (*y*) quoque matrona melancholici temperamenti solo perinde harum thermarum potu in secessuque per 2 æstates usurpatis a bienni leucorrhœa convaluit. Omnium tamen cautissime cum balneis aluminosis est mercandum, ut qvæ non satis circumspecte adhibita plus noxæ qvam emolumenti adferre visa sint. Sic „ nota nobis, ajunt Vratislavenses (*z*), „ est egregiæ spectatæqve formæ mulier, „ qvæ cum nihil intentatum reliquisset, ut „ a fluore albo, qvo per multos annos „ laborarat, liberaretur; tandem virtutem „ balnei aluminosi experiri statuit: unde „ suppressus qvidem fluxus est, sed infauste „ admodum; successit enim ulcus circa ori- „ ficum uteri molestissimum, qvod ægerri-

(*x*) l. c. T. 2. P. 3. S. 2. C. 3. p. 300.

(*y*) Ibidem C. 5. p. 342.

(*z*) Hist. morb. Vratisl. A. 1700. p. 169. sq.

„ me admisit medelam. Hac vero post
 „ longi temporis patientiam obtenta secutæ
 „ sunt hæmorrhoides cum fuminis tormini-
 „ bus conjunctæ, non sine suspicione exul-
 „ cerationis intestini recti, qvæ circa singu-
 „ las lunæ phæses cum sedibus freqventibus
 „ non sine exquisitissimis doloribus totius
 „ abdominis, turbas dant maximas, ac
 „ ægram in tabem conjiciunt, ex qvibus
 „ malis hactenus nulla arte potuit eluctari,..
 Tristior hocce etiam est casus G. C. W I N-
 CLERI (a), cuius Ill. „ persona . . .
 „ 25 annorum, constitutionis calidæ & sic-
 „ çæ, dum virgo adhuc esset, sæpius & fin-
 „ gulis, dum haberentur, diebus comedere
 „ re solebat fructus 4 melonum integros,
 „ superbibens aqvam fontanam frigidam,
 „ & balnea in aqva frigida nocturno tem-
 „ pore instituit . . . Unde post matrimo-
 „ nium contractum, mutato aere & vita
 „ cœlibe, abscessus sub axilla dextra prod-
 „ uit, qvi apertus, mundicatus, & sana-
 „ tus est. Postmodum scabie sicca laborare
 „ cœpit, adjuncto fluore . . . albo. Cum
 „ itaque horum malorum pertæsa, & simul

(a) Misc. nat. cur. dec. 1. ann. 6. obs. 103 p.
141. sq.

„ prolis habendæ amore arderet
 „ curæ medicastræ nefandæ se concredidit,
 „ qvæ adhibitis balneis adstringentibus e
 „ vitriol. alumin. &c. repulit humores pec-
 „ cantes per fluxum album & scabiem ex-
 „ cretos, qvi regurgitantes ad superiora
 „ 3^{to} statim die scrophulas in collo ab
 „ utroqve latere magnas, parvis subseqven-
 „ tibus, produxerunt. Hinc tussis valida
 „ oborta, materia sc. acri & craffa ad pulmones
 „ delata, qvi illa infarcti tandem putredine
 „ affecti & exulcerati; unde febris putrida
 „ cum hectica accessit, viresqve magis ma-
 „ gisqve dejicit. Expectorationes erant
 „ purulentæ cum sanguine mistæ, ita ut
 „ consummata inde phthisis, qvidqvad de
 „ . . . medicamentis . . . adhibitum, se-
 „ queretur, cui propter nimium potum
 „ (propter calorem p. n.) etiam hydrops
 „ conjungebatur, & tandem mors placida
 „ seqvebatur, cum per sesquiannum cum
 „ hisce malis conflictata esset. Ubi & hoc
 „ notandum duxi, qvod HIPPOCRAT-
 „ E S (b) dicat: *qvibuscunqve tabidis e*
 „ *capite una capilli defluunt, ii diarrhœa*
 „ *superveniente moriuntur.* Hæc vero per-

„ sona Ill. præsenti capillorum defluvio sæ-
 „ pius vexabatur diarrhœa, & qvidem sa-
 „ tis enormi, dejiciens semper serum mul-
 „ ta bile tinctum, ita ut prima vice terro-
 „ rem omnibus incuteret, & mors propter
 „ vires debilitatas exspectaretur. Sed ex-
 „ hibitis remediis confortantibus . . . &
 „ hac & aliis vicibus ab ea evasit, ita ut
 „ recuperatis viribus eam ipsi emolumento
 „ fuisse animadvertere licuerit „ &c. Eun-
 dem casum etiam descripsit 4 annis ante
 P. J. SACHS (c). Ex his ergo patet,
 qvam prompte ab his balneis etiam contu-
 max, ne dum recens, subsistat fluxus,
 & qvid e præmature suppresso malorum
 pullulare queat.

c) *Frigida* in aqua vel simplici vel marina, ubi nimia vasorum laxitas morbum pene incurabilem fovet, sunt tantæ efficaciaz, ut J. FLOYER (d) memoriaz prodiderit, in BAYNESII tentaminibus raro vel nunquam fecellisse. Et R. WHYTT (e)

(c) Misc. nat. cur. dec. 1. ann. 2. schol. ad obs.
26. p. 49.

(d) Psychrolusiaz p. m. 221.

(e) Sämmtl. zur pract. Arzn. gehör. Schriften p.
m. §28.

„ vidit leucorrhœam post omnia qvæque
 „ remedia incassum data solo fere balnei
 „ marini usu fuisse curatam „, Hæc de
 balneorum varietate. Injectionum loco bal-
 nea usurpari posse, nemo, opinor, ambi-
 get; etenim fluida cum ad libellam se com-
 ponant, fieri necesse est, ut corpore in
 aqvas umbilico tenus immerso illæ ad uteri
 usqve fundum per vaginam perveniant:
 qvod ut eo etiam eveniat certius (si forte
 vel genitalium vel orificii uteri arctiora ob-
 starent claustra), non abs re svasor est B.
 SILVATICUS (*f*), ut indito vaginæ cy-
 lindro perforato expeditior aqvis balnei in
 uterus via præstetur.

§. 73.

8. FONTICULI, *setacea* qve et si ad mor-
 bosam materiam ex uno loco in alium avo-
 candam longe sint efficacissima, ea qve Vra-
 tislavienses (*g*) isthic etiam commendent,
 admodum tamen raro & medentibus in
 mentem veniunt, & ab ægrotis admittuntur,

(*f*) 1. c. Cent. 3. No. 21. p. 216, Cent. 4. No.
 9. p. 302.

(*g*) Hist. morb. Vratislav. 1. c.

qvæ maximam partem delicatulæ sunt, ac tormenta id genus chirurgiæ maximopere exhorrescunt, qvæsi vero plus in hisce crudelitatis ac doloris, qvam in leucorrhœa molestiæ fœditatisqve reperiretur. In primis vero præclare hæc præsidia profunt in illo leucorrhœæ genere, qvod rheumaticam aut catarrhalem indolem sapit; qvam in rem illustrem observationem suppeditat F. HILDANUS (*b*), nempe matronæ ad 30 annos habenti, robustæ, continuam cephalæam crebrasqve ophthalmias expertæ demum in dextri oculi cantho fistula lacrimalis est oborta; ad qvam fere biennium jam durantem persanandam cum post catharsin aliaqve universalia, nec non quotidianum collyrii usum, nuchæ setaceum fuisset inditum, cephalæa non multo post, ac fistula lacrimalis intra 4 menses, prorsus sublatæ sunt, nec ophthalmia amplius revertit. Setaceum in triennium gestavit, donec sponte sua (ut interdum fit) consanatum fuisset ulcus. „ Laboraverat autem (qvod annotatione dignum est) matrona illa per annos nos aliquot fluxu muliebri aut menstruis

, (*b*) Obs. & eur. med. chir. Cent. 4. Obs. 19.
exempl. I.

„ albis: qvamobrem nunqvm utero gesta-
 „ verat; adhibito vero setaceo paulatim
 „ remisit fluxus, ac paulo post concepit
 „ ac filiam peperit, qvæ etiam nunc cum
 „ aliis liberis, qvos deinceps progenuit,
 „ vivit, ac optime valet „. Perinde ad
 præcavendam leucorrhœæ recidivam Z A C U-
 T U S (*i*) in crure suæ ægrotæ fonticulum
 excitari jussit. Pulchre his etiam congruit
 observatio STORCHII (*k*).

§. 74.

9. AMULETA, *transplantationes*, &
 qvibus per ignorantiam credula suis in mi-
 fériis humana industria speciosum vel sym-
 pathiæ vel antipathiæ nomen indidit, per-
 inde in fœdo hoc juxta ac pertinaci sæpe
 ad rationalia præsidia morbo pertentata sunt.
 Sic P. GRÜLINGIUS (*l*), colonus Hon-
 „ steinenfis . . . mihi (ait) narravit, qvod
 „ costa sua eodem malo ultra annum la-
 „ borasset, & multos Medicos consuluif-
 „ set, sed omnia fuissent irrita. Tandem

(*i*) Vide §. 49.

(*k*) Vide histor. 13.

(*l*) Obs. & cur. medic. Cent. 3. Obs. 23.

„ vetula qvædam svadet, ut sumeret lin-
 „ teum, & exciperet fluorem uterinum,
 „ eundemqve suspenderet in fumarium.
 „ Qvo facto fluxus muliebris fluere desiit,
 „ & sic hæc mulier ab omnibus symptomati-
 „ bus liberata est,. Successus id genus
 curationum, ut alias ostenderam (*m*), non
 tam ab ipsa medendi methodo remediisqve
 nihil rationis habentibus, qvam ab animi
 motibus occasione curationis obortis, to-
 tumqve sistema nervosum magnopere mu-
 tantibus, est repetendus.

C A P U T XII.

D I A E T E T I C V M R E G I M E N T U M

§. 75.

I. ALIMENTA, si ullo uspiam in
 morbo, in leucorrhœa profecto vel maxime
 religiosum exposcunt delectum, adeo ut
 isto solo aut præterviso aut neglecto mor-
 bus sæpenumero nulla alia arte sit expugna-
 bilis. Duo autem præ primis hic erunt præ-

(*m*) Hist. febr. interim. Vol. I. P. 2. §. 136.

stanta, ac primum qvidem, ut alimenta sint causæ morbi, tum vero ipsi etiam morbo, opposita, vimq;e possideant medicamentosam. Utriusque plana est ratio. Nam cum leucorrhœa haud raro ab indigestione, cui ipsa plerumq;e ingestæ occasionem præbent, oriatur (*n*), aut certe foveatur; evidens est, si iisdem porro utaris alimentis, foturam te cum causam morbi tum ipsum quoq;e morbum: contraria igitur hic agenda erunt, affumendaq;e alimenta spectata & indole & copia facile digerenda. Medicatam vero simul habebunt indolem, si alvi urinæq;e excretionem facilitent, si perspirationem promoteant, si acrimoniam enervent, si putredini resistant, roburq;e solidis adaugeant, ac digestionem emendent, &c. Summi in arte viri acerrimo semper oculo ad diætam respexere, ut ex eorum passim hocce in libello allatis observationibus videre est, idq;e usq;e adeo, ut a curato etiam morbo diu adhuc exquisitam diætam tenendam imperarint, qvos inter in primis F. HOFFMANNUS (*o*) rem suis ægris studiose inculcabat; neq;e id imme-

(*n*) Vide §§. 12. 53.

(*o*) Vide §. 35. B. 1). §. 72. C. a).

rito: nam E. G. STAHLIO (*p*) „ nota
 „ sunt exempla, puellas interdum fatis diu
 „ a fluxu albo (curato) mansisse immunes;
 „ ut primum vero lac sumpfere, continuo
 „ recidivam fuisse passas „. Ideo vetat ille
 lacticinia, pingvia, flatulenta, &c. Quan-
 tum vero hic vel soli alimentari diætæ rite
 observatæ tribuendum sit, docet RAU-
 LINI (*q*) casus, nempe matrona robusta
 ac sana, vita ab infantia ad nuptias usque
 in cœnobio exacta, primis matrimonii an-
 nis (20 annos nata) repente contrariam
 priori vivendi rationem occpit, potui
 Theæ, Caffe, Chocollatæ, vini, spirituoso-
 rumque, saltui, vigiliis, &c. indulgens.
 Unde somnos inquietos, alvi constipatio-
 nem, ardorem urinæ, æstum internum, pu-
 stulas in facie totoque corpore, & acerri-
 mam leucorrhœam sibi accersivit. His ma-
 lis oppositæ Væ Ses, balnea, & ordinatum
 vivendi regimen. Alimenta blanda & hu-
 mecantia, ptisana cum avena & lactuca
 parata, potus aquæ hordeatæ, tenuis li-
 monatæ, &c. ususque lactis primum asinini
 dein caprilli, imperatus; alvus libera fer-

(*p*) l. c. Cas. 69 resol. p. 675.

(*q*) l. c. T. 2. P. 3. S. 2. C. 1. p. 232.

vata, & sub finem cathartica ex intervallis exhibita. Qvibus effectum est, ut symptomatibus omnibus pedetentim disparentibus leucorrhœa qvoqve defierit. Inde matrona observata porro legitima vivendi ratione concepit, ac ter ex ordine robustam enixa sobolem sana in posterum vixit.

§. 76.

2. VENERIS *usus* moderatus vel nullus, saltem pro aliquo tempore. Namqve superius (r) exemplis docuimus, neonuptas haud raro ab immoderato veneris usu in leucorrhœam incidere, licet nunquam antehac illam expertæ sint, ibidemqve etiam E R I E D L I N O vidimus, fœditatem hanc sola infrequentia concubitus pene fuisse abolitam: unde patet quantum ad curationem hujus mali conferat relictus (saltem aliquamdiu) veneris usus. Idcirco etiam Ill. praticus Italus R. F O N S E C A (s) pro matrona Veneta leucorrhœam paciente consultus, inter cetera diætetica præcepta,, abs,, tineat (inqvit) a coitu toto prægnati-

(r) Vide §. 14.

(s) l. c. Tom. 2. Consult. 52. p. m. 287. sq.

„ onis tempore . . . post partum etiam
 „ abstineat per 2 menses a congressu viri,
 „ ut curari possit . . . Verum quidem est,
 aliquando leucorrhœas admissa viro fuisse
 sanatas, cuiusmodi exemplum refertur in
 Annalibus Vratislaviensium (*t*) de femina,
 quæ post congressum cum viro, tametsi im-
 prægnata non fuerit, ab leucorrhœa nihilo
 minus ex integro liberata; perinde J. N.
 PECHLINUS (*u*), narravit mihi (ait)
 „ femina fidei probatissimæ sibi, cum virgo
 „ esset, menstruis cum luna euntibus fluo-
 „ rem plerumque successisse album, frustu-
 „ lis crassioribus & instar albuminis ovi
 „ cocti comitatum, neque ante desisse
 „ hoc vitium (si ita vocandum est, quod
 „ sine ulla valetudinis labore corpus succu-
 „ lentum occupabat), quam cum viro con-
 „ sverceret; tum enim suppresso illo fluxu
 „ menstrua sola ordine profluxisse. Illa ta-
 „ men ipsa, cum aliquando rei novitatem
 „ stuperet, ex grumulis, qui naturam atque
 „ interfemineum inquinare solebant, unum
 „ manibus oculisque exploravit, reperitque

(*t*) Tent. 31. A. 1725. Januar. Cl. 2. art. 2.
p. 25. sq.

(*u*) Obs. phys. med. L. I. Obs. 21. p. 49. sq.

„ materiam albo ovi cocto plane similem;
 „ cumqve curiositate ducta digitum ori ad-
 „ movisset, tam perdite acrem, ut qvovis
 „ lixivio certare posset, infectumqve os fri-
 „ gida diluere neceſſe haberet,. Sed id ge-
 nus leucorrhœæ plerumqve ab ipſa dome-
 ſtico ſolidorum humorumqve citra ullam fere
 cauſam externali dispositione proficiuntur,
 qvam interdum facta inſignis aliqva corpo-
 ris mutatio aut ſyſtematis nervosi commotio
 abolere conſuevit, qvo facto etiam ipſe flu-
 xus conqviſcit. Id ipſum jam E. G. STAHLIUS (x), vir acer omino ac penetrantis
 judicii, animadvertit, dicens: „ illud ſem-
 „ per certum eſſe ab experientia comperi,
 „ nihil in leucorrhœæ, qvacunqve me-
 „ dendī methodo tentatæ, curatione dura-
 „ bile obtineri, niſi ipſa vivendi ratio etiam
 „ pro re nata vel per matrimonium & im-
 „ prægnationem, vel libidinum fugam pror-
 „ fus fuerit mutata, aut niſi malum fit
 „ vel recens vel ſyphiliticæ labis haud ex-
 „ pers; poſtremum enim leucorrhœæ genus
 „ præ aliis benignæ indolis faciliorem ad-
 „ mittit curationem , .

(x) l. c. p. 680.

§. 77.

3. AERIS *soliqve mutatio.* Qvantum hæc ad maxime rebelles morbos abigendos faciat, neminem nisi medicæ historiæ prorsus ignarum, præterire existimo. In leucorrhœa qvoqve pertinaci profuisse est observata. Sic duæ juvenes feminæ Gallæ, narrante RAULINO (y), paucis post ab adventu suo Viennam Austriæ diebus correptæ sunt leucorrhœa rebelli, nec nisi reditu in patriam curabili. Nihil autem Cl. Virum moror, leucorrhœam hanc suarum gentilium aquis Austriæ, natura sua hujus morbi genifi (ut vult ipse) faventibus tribuentem. Magnopere qvoqve profuit RAULINI (z) puellæ urbani aeris cum rusticano commutatio.

§. 78.

4. MOTUS *muscularis.* Leucorrhœa enim teste P. FORESTO (a) vel maxime „ his... accidit, qvæ prava vivendi ratione

(y) I. c. T. I. P. I. S. 3. C. 4. p. 179.

(z) Vide histor. II.

(a) I. c. schol. ad Obs. 20.

„ utuntur , luxuosa qvidem , sed minime
 „ exercitata: unde & nunquam visæ agre-
 „ stes mulieres id (profluvium) pati , sed
 „ urbanæ , & inter eas , qvæ sunt magis
 „ muliebri habitu , & qvæ sedentariam vi-
 „ tam perpetuo degunt „. Neqve id mi-
 rum , qvandoqvidem otio corpus laxitatem
 solidorum contrahit , a qva fluor albus or-
 tum dicit (b). Hinc „ , siqvidem ignavia
 „ corpus hebetat , labor firmat „ , notante
 A. C. CELSO (c) , satis liqvet , qvantum in
 qvotidiano corporis exercitio præsidii insit
 ad leucorrhœam cum prævertendam tum cu-
 randam ; qvod usqve adeo verum est , ut ni-
 hil sæpe proficiatur hocce in morbo profligando
 remediis , si salubris corporis motus
 negligitur. Sic R A U L I N I (d) puellæ 10 an-
 nor. candidissima facie , corpore ultra æta-
 tem elatiore , palati fornix & gingivæ ad-
 modum pallebant , cum pulsu sangvinem mi-
 nus compactum solidorumqve laxitatem indi-
 cante , & leucorrhœa serosa ab aliquo tem-
 pore molesta fuit. Nutriebatur hactenus
 jusculis , lacte , columbis , similibusqve. Ea-

(b) Vide §. 19.

(c) De medicina L. 1. C. 1.

(d) l. c. T. 2. P. 3. S. 2. C. 1. p. 238.

propter inchoante medico curationem horum alimentorum in locum dabantur sicciora & minus humectantia, nimirum panis mediæ fortis, legumina, farinacea, ova forbia; potui concessa tenuis ex aurantiis aqua faccharata. Qvovis mane præbebatur juscum e cancris, cichoreo silvestri, scolopendria, ac pimpinella paratum, cui infusum erat nasturtium aquaticum, chærefolium, ac pauxillum rhei, non tam cathartico quam tonico potius scopo, cujus dosis 7^{mo} vel 8^{vo} qvovis die augebatur ad alvum bis terve quotidie movendam. Sed cum corporis defet motus, puellæ rus concedendum erat in monasterium, ubi exercendi corporis defet occasio. Ibi continuatis in binos fere menses sub motu musculari remediis, & corpore quotidie mane ope setonis perficto, leucorrhœa sensim remittens demum cessavit, & puella continuato solerter corporis exercitio, observatoqve debito vitæ regimine robustius temperamentum est consecuta.

§. 79.

5. PATHEMATA *animi* in leucorrhœæ curatione haud postremas sibi vindicant curas; qvandoqvidem sibi relicta felici remedium successui magnopere officiunt, dum

fœdum illud profluvium efficaciter fovent, idque multiplici ratione, pro varietate videlicet ipsorum. Neque hujus rei aut ambigua aut obscura est ratio; quæ enim leucorrhœam proritare possunt, eandem & fovere præsentem utique valent. Oriri vero leucorrhœam ab animi motibus jam ante (*e*) vidimus: quidni ergo ortam fovere quoque valeant? Imo vero ita sæpe fovent, ut curationem illa durantibus iis prorsus respuat. Meminit RAULIN (*f*) feminæ, quæ vehementi ac diurna animi afflictione ob amissam fortunam secundam in eadem incidit mala, quæ puella superius (*g*) memorata perpetua est; quæ cum iisdem oppugnarentur etiam remediis; mitiora quidem evasere, at non prorsus desierunt, quod causa illorum semper præsto fuerit: idcirco ægram perpetuo langvor tenebat.

§. 80.

6. VESTITUS denique ratio non est prætereunda. Magnopere etenim interest in curatione leucorrhœæ perspirationem uberius

(*e*) Vide §. 11.

(*f*) I. c. T. 2. P. 3. S. 2. C. 5. p. 341.

(*g*) Vide §. 36.

&

& æqvabiliter procedere; in vulgus autem notum est, vestimenta ad perspirationem vel promovendam, si calori conciliando foven- doqve sunt idonea, vel reprimendam, si le- viora ac rarioris texturæ sint, qvam pluri- mum facere: proinde tali qvoqve feminas leucorrhœæ obnoxias tueri corpus amictu oportebit, qvi promovendæ & æqvabiliter fovendæ perspirationi fit qvam maxime idoneus, eo præfertim tempore, qvo diapho- retica in curatione vel præbentur, vel in- dicantur. Nihil vero tantam in muniendis adversus frigus artubus exigit curam, qvam ipsi pedes, qvos a madore in primis frigido tueri necessum est; ii qvippe concepto frigo- re non modo perspirationem celerrime in- terturbant, ac sufflaminant, verum catame- niorum qvoqve fluxum haud raro fistunt. Qvorum alterutrum si eveniat, leucorrhœam ex facili post se trahit (*b*), præsentem vero jam fovet, atqve ad omnia præsidia contu- macem reddit. Qvapropter non umbras se- cantur, qvi in leucorrhœæ curatione pedum a frigore defendendorum rationem esse ha- bendam serio inculcant.

(*b*) Vide §. 18. a) g).

A P P E N D I X.

Quid morbus sit, qvibusve potissimum
remediis cedat, vetulis juxta ac em-
pyricis est longe notissimum: at, qvibus ille
profectus e causis, eruere, atqve remediorum
non copiam modo ac delectum pro in-
dole ipsius morbi & varietate causarum sua
in potestate habere, verum & singulorum
dandorum tempora, mutuumqve eorum in-
ter se ordinem ac nexus rite pernosse, ne-
qve ab justa aberrare dosi, qvidve, ubi alia
simul adjuncta inciderint, his ipsis remediis
aut adjiciendum aut detrahendum sit, provi-
dere, id enim vero e Medici est dignitate.
Omnia qvidem hæc singillatim præfente in
libello abunde (opinor) a me sunt præstata;
verum cum multa illa, ac varia, nec
omnem in casum idonea sint, haud raro
ambigere tironem faciunt, qvid primum,
qvid paulo serius arripiendum, qvidve ad
extremam curationis metam removendum
sit. Id imperitum vulgus *ex praxi condisci*
oportere existimat, qvafsi dicas per discrimi-
na mortesqve aliorum. Ego vero, si qvid
video, nihil tironem his difficultatibus cer-
tius expedit, qvam exempla e probatissimis

deprompta Auctōribus, atqve ob oculos posita; qvippe qvæ discentem fidi instar moderatoris lecto ægri adstantis (qvid enim reapse est scriptis mandata observatio v. g. HIPPOCRATIS de morbo Larissæ virginis, qvam si ipsum cōūm spectares medicinam virginis eidem facientem?) in dubiis erudire valeat. Multæ profecto ex id genus historiis clinicis in lectorem novellum utilitates dimanant; namqve exhibendorum remediorum ordinem ac tempora docent; varias variorum in eadem ægritudine curanda methodos produnt; & qvid in abstrusioribus complicatisve casibus agendum sit, præmonstrant; &c. Hunc itaqve in finem, qvo libellus hic tironibus reddatur utilior, 13 leucorrhœæ historias adjicere est visum, in qveis illos passim ad varios libelli locos suum in commodum relegendos, ubi operæ pretium esse credidi, interpolatis signis admoneo.

HISTORIA II.

G A L E N I (i).

Primo eam loco referre visum est; quod ab hac vera leucorrhœæ rite curandæ epocha initium ceperit. Ad hanc GALENI historiam omnes pene ævi posterioris Medici in leucorrhœæ cura respexere.

BOETHI uxor, cum in muliebrem fluxum, qvem vocant, incidisset, celebres medicos verita . . . obstetricibus consuetis optimis sane omnium, qvæcunqve in Urbe forent, primum utebatur. Vir ejus, ut ipsam nihil inde levari vidit, præcipuos qvosqve medicos convocat, & eos, qvid opus sit factu, considerare jubet. Postqvam in eam sententiam ab omnibus itum est, ut ea remedia adhiberentur, qvæ ab HIPPOCRATE & aliis post HIPPOCR. optimis qvibusqve descripta fuissent, voluit BOETHUS, semper interessem mulieribus, qvoties aliquid ægrotanti ministrarent uxori, probaremque singulas medicamentorum materias, qvarum intentio summatim erat, non

(i) De præcognit. ad POSTHUM. Cap. 8.

uterum modo sed universum corpus etiam
siccare: ungventa insuper admoverem, qvæ
muliebres locos supprimerent; morem BOE-
THO gerebam. Sed, ita faciendo, cum de-
terior reddi morbus in dies videretur, jure
mecum & reliqui dubitare cœperunt; &
qvamvis omnes reqvireremus ad alium fa-
nandi modum transire, melius tamen qvic-
qvam aut ratione inventum, aut experien-
tia repertum non occurrebat, qvam id, qvod
optimi qviqve medici paulo ante consense-
rant. Interea vero tumor in ventre, qvalis
in prægnantibus suboriri consuevit, appa-
ruit: qvamobrem ex ministrantibus mulieri-
bus nonnullæ revera prægnantem esse ægro-
tantem credidere; non tamen medicorum
aliquis id verum esse arbitratus est: nam mu-
liebris fluxus indicia, qvæ singulis diebus
excernebantur, earum opinioni refragaban-
tur. Cum igitur ægropa mulier ab ancilla,
qvam fidam habebat, & alia sibi fieri per-
mitteret, qvæ in prægnantibus fieri solent,
& singulis diebus lavaretur, contigit, ut in
prima thermarum cella vehementissimis dolo-
ribus correpta, qvales parientibus advenire
solent, humoris aqueiusqve adeo multum ex-
cerneret, ut animo defectam e thermis ipsam
extulerint. Inclamatibus ergo & vociferanti-
bus ancillis, verum neqve pedes neqve manus

neque os ventriculi, qvod usitato nomine sto-
machus appellatur, fricantibus, ipse, qui
casu ante fores balnei constiteram, audito
clamore intro me proripui, conspiciensque
frigentem manu nardino unguento admota
stomachum laborantis ex eo confricui, an-
cillasque jussi . . . unam pedes calefacere,
aliam manus fovere, reliqvas odorandum
aliqvid naribus supponere. Tunc itaque ce-
leriter ipsam recuperavimus. Subsidente ve-
ro ob inanitionem ventre summopere lætata
est obstetrix, non tam quia (ut opinabatur)
prægnans non fuisset, quam ut summisso
ventre Medicis, qui sibi non crediderant,
aperte contradiceret; eo quod vere intu-
misse ventrem percepisset. Dubitantibus
itaque singulis, quid factu opus esset (nam
ad priorem intentionem mulierem sanare sa-
tis fidebant, nec ad aliud curationis genus
transire audebant) noctu mihi de ea re cogi-
tanti tale quiddam novum occurrit. Nam
quando, ut dixi, mulier animo defecit, . . .
ipse arrepto nardi unguento præcordia con-
fricui, recordatus sum, me tantam mollitu-
dinem illic reperisse, ut cum animadvertissem
postea me violentius a principio præcordia
fricasse, timens, ne carnem lividam redde-
rem, a violenta confictione defliterim; par-
tes enim omnes circa præcordia, si quis exa-

cte comparare velit, lacti qvod coagulatur, non dum tamen in caseum obduruit, similes fuerant. Prorsus itaqve mihi visum est, infistendum nimiæ humiditati exsiccandæ morbi, qvi aqvosus esset; ex cogitandumqve talem sanandi modum, qvo non solum humiditatem siccaremus, verum etiam ita calefaceremus, ut æstatis præsertim tempore ægrotantis corpus non liqvesceret, qvod frigidæ & humidæ temperaturæ supra modum erat: hujus tamen contrarium tunc faciebamus, cum ipsam in harena maris calida decumbere præcipieremus. In aliud qvoqve erroris genus, qvi plerisqve in morbis occurrit, tum nos etiam incidere collegi; labuntur enim sæpe Medici, dum id qvidem, qvod redundat, evacuant: ne autem illi simile aliud gignatur, non prohibent. Atqve ideo mecum decrevi, ut universa victus ratio ad duo inclinaret, potus paucitatem, & totius corporis frictionem, qvam non expice & resina subseqveretur inunctio, sed ex melle solo, multum qvidem cocto, tantum tamen refrigerato, ut hac in re fontanæ aqvæ similis æstivo tempore foret. At qvemadmodum per cutem humorem redundantem evocare melius esse cognovì, sic medicaminibus urinam crientibus eundem per vesicam educere deliberavi, dandamqve ope-

ram censui, ut per alvum etiam detrahatur. His animo præsumptis . . . medicamento aqveum humorem per alvum educeisse primo usus sum (*k*); post aquam, in qua asarum & apium fermentaverant, bibendam exhibui (*l*). Cum itaque duobus primis diebus his remediis adhibitis uterus minus fluere cœpisset, 3^{to} die rufus haud multum medicaminis illius exhibui, quod per alvum trahebat ea, quæ in uterum reperabant; cum non solum per urinam, sed per alvum etiam humorem derivare vellem (*m*). Ab eo die postea quotidie & melle eam perunxi, & corpus confricui mollissimo primum, tūm asperrimo sindone (*n*): montanarum insuper avium carnes & pisces saxatiles comedendos obtuli. Cum igitur diebus 15 hisce remediis usus essem, nullum prorsus morbi vestigium apparuit.

(*k*) Confer §. 43.

(*l*) Confer §. 46.

(*m*) Confer §. 44.

(*n*) Confer §. 67.

H I S T O R I A II.

P. F O R E S T I (o).

*Sequitur Auditor in ea ex integro pene
AETII (p) methodum in leucorrhœa
ipſi rubra dicta, qvæ nempe sanguinem
ſimul ob plethoram admixtum habet,
curanda.*

Uxori meæ carissimæ post mensium natu-
rale purgationem contigit aliquando, ut
fluorem muliebrem, modo tendentem ad
naturam sanguinis, modo ad bilem, expe-
rireetur; & qvia ſæpe facies rubore inficie-
batur, & venæ turgidæ effent, sanguinem
bis aut faltem ſemel in vere detraximus,
& egregie juvabat (q) . . . Purgavimus
deinde eandem cum decocto myrobal. citrin.
& ḡe rhabarb. adjecto syrup. roſ. ex infuſ.
roſ. rubrarum apertarum (r). Et qvia in
lumbis ſæpe dolebat, loca renum freqven-

(o) Obs. & cur. med. Lib. 28. Obs. 21.

(p) Terrabil. 4. Serm. 4. Cap. 64.

(q) Vide §. 66.

(r) Confer. §. 43.

ter inungi jussimus *unguent.* *ros.* sed non ante purgationem totius corporis . . . Ideo bilem purgavimus cum medicamentis ad billem facientibus, aliquo modo adstringentibus (*s*), ut est *rhab.* *myrobal.* *succus ros.* & *earum syrup.* & quæ bilis acrimoniam frangunt. Dedi etiam aliquando pilulas ex *rhab.* & *myrob.* freqventer maceratas in succo *ros.* nam pilulis magis delectabatur; conficiebam autem hoc modo (*t*):

R. *Rhab.* *elect.* freqventiss. irrorati succo *ros.* 3ij.

Myrob. citrin.

Chebul. Indarum infusar. in succo *ros.* aa 3j.

Mastiches 3j.

Spicæ 3l. cum

Syrup. *ros.* laxat. de quibus sumebat semel in hebdomada in lecti exitu duas vel 3 vel 4 ad summum (*u*). Postea, cum modice distillaret, succida lana vino & rosaceo madente fovi mus, summitatesque superiores (nempe brachia) vinculis deli-

(*s*) Confer §. 45.

(*t*) Confer §. 45. No. 1.

(*u*) Confer §. 44.

gavimus. . . . Sed & leviter urinam provocantia & simul bilem contemporantia propinavimus, ut hoc vel simile decoctum (*x*):

- Rx. Rad. Cichorii cum toto
— Endiv.
Summitat. Lupul.
—— Borag.
—— Fumar. aa M. j.
Lactucæ M. f.
Iujubar.
Sebesten recent. aa No, vij.
Capill. Vener
Polytrichi aa pug. j.
Sem. Anisi 3ij.
Sem. 4 frig. major. aa 3j β .
Flor. ros. rubr. pug. j.
Sem. papav. alb. 3j F. deco-
ctio pro f β j. Coletur, & facch. dulcore-
tur, & arom. spec. trium sant. 3j β M. De-
inde bibat vinum rubrum stypticum Galli-
cum (*y*); & recte habebat. Deinde qvo-
que ex hac MR^a vel simili ad magis restrin-
gendum:
- Rx. Conserv. ros. antiqu. 3j β
Diacydon. fine spec. 3 β
Conserv. fl. Cichorii 3j.

(*x*) Confer §. 46.

(*y*) Confer §. 56. sqq.

ꝝ trium sanc.

Corall. rub. usti & loti aa
ꝝjſſ cum

Syr. Cotoneor. F. MR^a.

Utero etiam abluto decocto hordei & len-
tium cum pauco saccharo, postea etiam ad-
jectis ros. fuccis, adhibito insuper in fine
fotu magis adstringente, tandem recte ha-
buit, optimo viatu utens. Maxime juva-
bat in fine collutio adstringens (z), mo-
derate refrigerans, qvale illud est ab A E-
TIO (a) commendatum: *succus plantagi-
nis, polygoni stratiotæ, cydoniorum, & me-
spilorum.*

HISTORIA III.

E J U S D E M (b)

*Exhibit curatam leucorrhœam arcano reme-
dio BENEDE. FAVENTINI, aliaque
notatu non indigna, præsertim solen-
nem Audiori medendi methodum.*

Matrona admodum biliosa . . . menstrua
alba patiebatur, qvæ colore flavo etiam

(z) Confer §. 71.

(a) l. c.

(b) l. c. Obs. 22.

linteolum inficiebant (*c*). Primo igitur materiam communem aggravantem hoc medicamento leniente eduxi (*d*):

R. Cassiæ recens extractæ ʒj
Pulp. Tamarind. ʒjſ
Myrobal. citr. subtiliss. pulveri-
fat. ʒj.

Saccharo asperso F. bolus. Ce-
pit in diluculo. Deinde hunc syrum 5
diebus continuis propinavimus:

R. Syr. de succo acetosæ ʒjſ
— ex ros. siccis
— myrtini
Mellis ros. colati aa ʒſ
▽æ plantag.
— acetos.
— endiv. aa ʒij. M. pro 2 do-
sibus.... Deinde illam ita purgavimus (*e*):

R. Diacatholici ʒvj.
Elect. de succo ros. ʒjſ
Rhab. electi (sine spica) ʒij
Myrob. citrin. ʒſ. cum ʒiij
Decocti commun. flor. & fru-
ctuum, addendo

(*c*) Confer §. 4. I. No, 2, a).

(*d*) Confer §. 43.

(*e*) Confer §. 44, sq.

Syr. ex infus. ros. pallid. ʒ. M.
F. potio. Deinde ablata jam causa antece-
dente, syrupis adhuc semel reiteratis, & sum-
ptis pilulis in præcedente Observatione dictis,
injectoqve cremore hordei cum succo planta-
ginis & mucilag. cotoneorum, nam ex acri-
monia bilis sentiebat ardorem in collo ute-
ri (*f*), & exhibita emulsione sem. 4 frigid.
major. & pap. propinavi & illud, qvod erat
secretum Præceptoris mei, qvo multas cura-
vit mulieres, præcepi nimirum, ut jejuna
hunc prius bolum per 6 horas ad minus ante
cibum sumeret; deinde potum per 15 dies:

Rx. Album. ovi recent. & non coct.
No. ij.

Thur. masculi

Boli Armen.

Terræ Sigill. aa ʒ. Pulverisentur
pulverifanda & M. ac patienti exhibeatur (*g*).

Rx. Vini rubr. stiptici exstinct. cha-
lyb. pluries in eo ʒjv.

Gummi Arab.

— Tragac. aa ʒ. M. & F.
potus (*b*), detur in diluculo. Hæc . . .
egregie sæpe juvabant.

(*f*) Confer §. 71.

(*g*) Confer §. 51. 55. c). §. 58. No. 2.

(*b*) Confer §. 51. 58. No. 2; e).

H I S T O R I A IV.

P. P O T E R I I (i).

Exhibit simplicissimam leucorrhææ medendi methodum, quæ tironibus pro modulo inserviet, præsertim cum pulchro se remediorum commendet selectu.

Perill. D. HELENA de FASANINIS annos 50 nata, uterinis doloribus nonnullis mensibus assidue conflictabatur cum inappetentia, cordis palmo, syncope, & aliis. Hujus doloris causa proxima erat fluor albus uterinus, acrimonia membranas, nervos uteri, & circumjacentes partes vellicans . . . Fluxionis materia subcitrina & male olens & purulenta erat: hinc ulcus vel in corpore uteri vel ejus cervice. Scopi curatorii erant, fluxionem fistere, dolorem sedare, ulceræ mundificare & exsiccare. Ad quæ peragenda totum corpus prius repurgare decrevimus; quo facto partes læsas robo-

(i) Insign. curat. & singul. observ. Cent. 2. cap. 7. apud. F. HOFFMANN. Opp. suppl. I. P. 1. p. m. 116. sq.

rare, & reliqua explere. Ad corpus repurgandum seqventi potionē usi sumus:

Rx. Agaric. trochisc. 3ijvſ infund. in
△æ Artemis. f. q. In colat. dissolve

Elect. diaphœnic. 3 v.

Data fuit mane, ut moris est, ex qua multoties purgata fuit. Seqventibus diebus pro syrupis præparantibus capiebat bis in die decoctum artemisiæ, matricariæ, melissæ, absinthii Pont. calendulæ, betonicæ, & pimpinellæ, ad 3vj pro dosi. Iterum purgata fuit seqventi potu (k):

Rx. Rad. bryoniæ siccæ 3ijvſ infund. in
f. q. decocti præscripti,
in colat. dissolve

Elect. de succo ros. sol.

— diaphœnici aa 3ijvſ. Data fuit hæc potio mane, ex qua similiter probe purgata fuit. Postmodum ut penitus fluxio summoveretur, capiebat sequentes pilulas mane:

Rx. Gummi ammoniaci

— opopanacis

Myrrhæ

Masticæ aa 3j

(k) Confer. §§. 44. 45. No 1.

Agarici trochisc. 3ijv
Scainmoneæ spagyr. more pptæ
3ij.

Croci ♂ reverberati 3iij.

Macis

Succini essentiæ aa 3ij

Lap. hæmatitis 3js cum

Syr. de Artemisia F. massa (l).

Capiebat 3ij in tres pilulas singulis diebus,
3 horis ante prandium. Atque his dolores
illi atroces & contumaces una cum fluore
illo pravo in totum sublati fuerunt, & ab-
hinc qvinquennio sanitate felicissima po-
titur.

H I S T O R I A V.

J. H. STARCKII (m)

*De inveterato fluore albo tribus tantum
remediis intra 14 dies feliciter curato.*

Ducis N. N. conjux, postqvam singulis
annis parere desisteret, incidit in continu-

(l) Confer §. 55. c). §. 58 No. 2. e).

(m) Misc. nat. cur. dec. 3. ann. 9 & 10. obs. 168.

um fluorem album adeo molestum, ut partes in effluendo vicinas corroderet. Variis usurpatiis remediis, cum molestiam hanc ulterius ferre non poffet, me implorat tandem . . . Igitur . . . præscripsi seqventem ſēm :

R. Specif. ceph. d. M. 3j

○ fulm. rite ppt. gr. iiiij. M. S.

♂ catharticus pro dosi, qvem in jufculo calido . . . affumpſit, & vel decies inde per alvum dejecit cum aliquati virium jaſtura. Hinc die (postero) eam ab omni medicamentorum uſu liberam reliqui; interim tamen eadem die duo seqventia remedia ut in pharmacopœa debite præparentur, ſollicitus fui :

R. Limat. chalyb. finiss. 3f. D. ad chartam in duodecuplo divifum. S. ♂ ſangv. temperans, cuius qvovis mane No. j. fumatur. Porro

R. Therebinth. Venet. q. f.

Myrrh. elect.

Croci Austr.

♂ Castor. elect. aa 3f

Camphoræ

♀ri Vitriolat.

Ocul. 69 crud. in alcohol redactor.

Corall. rubr. ppt. aa 3ijf. M.

F. l. a. pil. No. 9 ex 3j. inaur. S. ſingula-

res pilulæ, qvarum a meridie ac vesperi No. 9 sumendæ cum syrupo viol. qvo delectabatur, ad nauseam pilularum, qvam habebat, evitandam. Die 3 incepit præscriptis remediis uti, & ut accuratam diætam observaret, evitando præprimis omnia acida, falsa, & acria, svasi; in qvibus omnibus mihi . . . obtemperavit. Hinc . . . elapsis 8 diebus fluor iste albus in minori copia effluere incepit, ita ut die 10^{mo} curationis plane desisteret. Interim me auctore continuavit usum præscriptorum medicamentorum usqve ad (15^{am} curationis) diem, qva ab hoc morbo molesto & curatu difficulti . . . feliciter curata fuit . . . Vivit adhuc sana & vegeta in hunc usqve diem, qvo hæc scribo, qvasi nunquam hoc molesto morbo afflita fuisset.



HISTORIA VI.

J. A. MÜNNICHI (n)

Sistit pertinacem admodum leucorrhœam cum symptomatum coborte, nec nisi varia ac diuturna remediorum administratione superabilem.

Matrona duo de triginta annorum, temperamenti sanguineo-phlegmatici, non multo post partum difficilem, sub qvo non admodum provide ab obstetricie tractata est, incidit in leucorrhœam (o) benignam. Principio parcior, dein qvotidie uberior humor albicans mucosus e muliebribus continententer prodibat; menses defecerunt; accessit pruritus ac dolor genitalium in dies major; facies expalluit, abiit appetitus, viresqve haud parum decrevere. Ægra evasit segnis, continuoqve mœsta, præsertim qvod e fœcunda facta sit sterilis. Qvod si fluxus aliquando sublisteret, oriebantur phlogoses, cephalal-

(n) Apud A. E. BÜCHNER. miscell. phys. med. math. A. 1730. Febr. Cl. 4. art. 5. p. 889. sqq.

(o) Confer. §. 17.

gia, palpitatio cordis, & anxia spiratio (p). Inter varia tentata in cassum dum consilio Medici demum emmenagogis uteretur, incidit in nimium mensium profluvium cum summa vi- rium jactura; qvod sponte iterum in mensium suppressionem cum universorum symptomatum priorum incremento ac duratione lon- giore mutabatur. Tandem consultus Auctor hunc in modum curationem adornavit:

1) Væ So in pede, scopo plethoræ mi- niuendæ & sanguinis ad ima derivandi, in- stituta (q). Inde

2) Salia media incidentia quotidie hora 2da pomeridiana in pulv. data, &

3) Balsamicæ pilulæ ad menten STAHLI compositæ No 15 qvolibet vespere ex- hibitæ, desuperque

4) Vinum medicatum postero manœ hau- riendum datum:

Rx. Rad. Rhab. 3jſ

— Zedoar.

— Aristoloch. rot.

— Ari aa. 3ij.

— Pimpin. alb. 3iiij

Herb. Melissæ M. ij

(p) Confer §. 36.

(q) Confer §. 66.

Herb. Artemis.

— Serpill.

— Origan. aa. M. j.

Fol. S. S. S. ȝj

Cort. Aurant.

— Citri aa. ȝij. M. F. Species infundendæ in Vini mensuris ij more solito, sumatqve continuis ȝ diebus mane qvovis q. s. ad alvum ter qvaterve movendam. Præterea

5) Balneum uterinum administrabatur, e seqventibus speciebus confectum:

R. Rad. Valerian.

Petrofel. aa. ȝij

Summit. Juniperi ȝj

Herb. Matricar.

— Melissæ

— Serpilli

— Fumar. aa. M. j.

— Majoran. M. s.

Flor. Chamom. Rom. ȝij

— Lavend. ȝvj. M. F. saccu-

lus inde, totum valens hypogastrium tege-re, qvi in lebetem ▽æ fervidæ per $\frac{1}{2}$ h. indatur, & ægrotæ postmodo hanc in aquam qvotidie hora 4^{ta} a meridie per triduum im-missæ hypogastrio calide applicetur; unde rursum in lectum egressæ probe sudandum erat. Atqve hæc methodus triduo semper

tenebatur, 4^{to} autem die præter vespertinas pilulas nihil præbebatur medicamentorum, sed jura vinosa aliique refocillantes cibi concedebantur. Continuata sic medendi ratio fuit, qvoad post egressum e balneo nihil materiæ mucosæ aqvis innatare amplius est observatum, qvæ principio admodum copiosa præsto erat. Cum vero post 4 circiter hebdomades ita exactas imminuta qvidem, at non dum ex integro sublata, fuisset ægritudo, elapsis 14 diebus curatio omnis eodem ordine denuo est resumpta, sub cuius finem semper

6) Essentia balsamica s T A H L I I (r) aliquamdiu usurpanda data. Post bis resumptam hancce curationem intra 8 hebdomades leucorrhœa cum omnibus symptomatis desit, menses ordinati reversi, & matrona haud ita multo post imprægnata elapsa anno sanum enixa est puellum.

(r) Fundam. chemiæ T. 2. p. 178.



HISTORIA VII.

H. P. JUCHII (s)

*Continet exactissimum prototypum tironibus
perquam utile, ex quo, qua ratione in me-
dicina leucorrhœæ facienda ordinate iis
procedendum sit, liquido intelligitur.*

Virgo duo de vigesimum ætatis suæ agens
annum, phlegmatico potissimum corporis ha-
bitu (t), nimium decocto ex fabis Coffee,
otio (u), & in primis mœrori silentioqve
(x) indulgens, illo primum mali genere agi-
tari cœpit, quod virginibus & mulieribus,
quæ vitam sine diæta sine motu vivunt, na-
turæqve necessitatibus detrahunt, sæpe plu-
rimum evenire solet, mensum nimirum sup-
pressione. Atqve cum ex horum defectu
nullum sanitatis suæ, ut ipsi videbatur, pa-
teretur detrimentum, nisi quod circa tem-
pus menstruum eluctantes sanguinis motus,

(s) Diff. sistens virginem fluore albo benig. laboran-
tem. (4to Erford. 1730. Resp. C. F. BOCKS-
HAMMER.) §§. 2. 18. sqq.

(t) Confer §. 7.

(u) Confer §. 78.

(x) Confer §. 11.

horrorem etiam universum corporis habitum invadentem ægrius ferret, eorum integritatem fusqve deqve habuit. At enim 4^{ta} ab iis suppressis periodo tam tetris acerbisqve lumborum & uteri correpta doloribus, ut die nocteqve nullam qvietis partem caperet, atqve genibus subinde nixa vix locum situm-qve corporis convenientem inveniret, qvo conceptam illam ab animo doloris molestiam abstegeret. Jungebatur deambulando spirandi difficultas summa. A sumptis alimentis fructum sensit corpus nullum, sed velut tabe confectum molle laxum segneqve efficiebatur. Vi ergo symptomatum in dies ingravescente sanitati suæ consultura ab aniculis, qvæ lateri ejusdem hærebant, expetit auxilium, qvi muliercularum senatulus morbi fomitem in stomacho latere autumans ejusmodi ægrotæ præbet potionem, qva penè ad interitum eandem dedisset; parum enim absuit, qvin disrumperetur media, cum ejus vi lien, pulmones, jecur, & cor atqve omnia intestina seditione facta conarentur foras erumpere. Accessit vero anus alia, qvæ catameniorum vitium morbi causam tulisse sentiens unice menses restituendos clamitat; atqve huic fini vini Mosellani cum fabina crocoqve multo & pane mellito decocti aliquot mensuras ægræ propinat, qvod

illa avide haurit, eo qvidem tempore, qvod inter duas purgationes menstruas intercedere solet, & sanitatis mox recuperandæ spem concipit. Parum tamen etiam vinum non apto tempore datum tulit præsidii; potius passio illi fiebat amplior; symptomata acrius vehementiusqve commovebantur, & die ex die ducta mirum sæviebant in modum, donec naturæ cooperantis beneficio sarcina corpori infesta multis tandem sub tormentibus exitum moliri cœperit. Factum enim est, ut 5^{to} valetudinis suæ mense, eoque, quo alias stillabant catamenia, termino citrinus primo, maximam tamen sangvinis purpurei partem continens, postea subalbidus per genitalia prodiret humor (y), qvi in principio paucus, suffecto autem tractu temporis robore omnibus fere diebus manabat copiofior, ita tamen, ut ea periodo, qva fluere alias solebant menses, eadem nunc reverterentur, parci qvidem, perqve 2 durarent dies, iterumqve ab eorum cessatione dicta superius erumperet illuvies. Urina ex cruditatibus toto corpore conceptis turbida naturali defluebat itinere, & ceu squammis mixta pondere mox petebat fundum. In his

(y) Confer §. 18. g).

itaqve suis, qvas jam per 3 menses pertulit, molestiis, & qvod totum corpus sordibus squallere miserum esse perpenderet, coloris- que bonitas corrumperetur, serio de artis praesidiis, qvæ morbus reqvirebat, cogitat ... Ad profligandum itaqve hunc affectum animo intento & defixo respeximus, atqve dedimus operam, ut humores noxios toto corpore conceptos per vias convenientes educeremus. Cui qvidem negotio confiendo, & qvod solennem sanguinis excretionem suppressam morbi causam attulisse deprehendebamus, de eo pertusa in pede vena subtrahendo meditabamur; ast vires attenuatae, pulsus saepe plurimum langvidus, sanguis item intra canales parcus, monebant, ut ne huic praesidio generoso locum daremus. Qvapropter neglecta Væ Se ... initibus primum evacuantibus pilulis... STAHLI^(z) fomitem morbi aggrediebamur, qvarum matutino tempore pro dosi 3j dedimus; sequentibus autem diebus ad sanguinis imundiciem corrigendam ex usu nobis erat hæc MR^a:

R. Eff. Rorismarin.

— Succini

TRæ ♂ ii ♀ satæ aa. 3j.

(z) Confer §§. 45. 63. b).

Cujus MR^a singulis diebus m. & v. 40 gtt. vice una præbuimus. Qvarto vero qvovis die dictarum pilularum usum iterum commendabamus (*a*). Potus soliti loco hausit ægrota decoctum ex raf. ligni lentisc. safffr. passul. min. bacc. laur. junip. sem. coriand. (*b*). His per 20 circiter dies adhibitis, licet in principio ab usu harum pilularum fluxionem augeri, eandem tamen sensim multum minui, observavimus. At exacto mensium curriculo sanguis nunc iterum ea copia, qvantam corporis conditio ferebat, despumari, qvem vero rursus fluor albus excipiebat, ita qvidem, ut cum antea tenax & viscidus per genitalia erumperet humor, jam destillaret tenuis, parcus. Qvare ubi magna ex parte corpus a colluvie serosa purgatum animadvertebamus, in eo studium porro collocabamus nostrum, ut non intermisso pilularum, nunc 6to qvovis die exhibitarum, usu (*c*), partibus internis antiquum rubor conciliaremus, non omisis iis, qvæ ad humoris serosi reliquias ab utero revelandas atqve ad corporis ambitum diverten-

(*a*) Confer §. 44.

(*b*) Confer §. 84. 49.

(*c*) Confer §. 57 № 1.

das facere videbantur. Qvotidie proinde binis de die vicibus hanc propinavimus
MR^{am} (*d*):

R. Eff. cort. Aurant.

— millefol.

— pimp. alb. aa. 3j.

— TR^x vitriol. ♂ LUDOV. 3fl.

D. 30 gtt. pro dosi. Selegimus pariter radices, herbas, &c. corroborantes, atqve infuso theiformi sequentes dedimus (*e*):

R. Rad. Zedoar.

— Bardan. aa. 3fl

Herb. Rorismar;

— Abrotani

— Salviæ

— Melissæ

— Menth. crisp. aa. M. ij.

— Galeops. fl. alb.

Flor. Chamom. Rom. aa. p. iij.

Sem. Fœnic. 3ij. M. concis.

contus. S. species forma theata usurpandæ. Hac medendi via ægrota nostra ad pristinam perducta sanitatem; neqve externis aliis remediorum opus erat formis... Color faciei... sub hac... passione corruptus jam

(*d*) Confer §. 53 & 58 No 2. e).

(*e*) Confer §. 53 No 1.

iterum micare vividus, sanguis pariter menstruus nulla amplius sequente turpi colluvie via stato tempore progrediebatur regia. Postremo cum magnum curationis recte confiendae momentum in dicta positum esse rationis suffragio omnes ex omni memoria affirment Medici, eandem agrotae etiam nostrae curatius paulo servandam commendavimus. Aerem proinde, quem, dum agra nostra morbo implicita teneretur, cœli tempestas concitavit frigidum, a corpore arcendum svasimus; hujus enim vi totum corporis habitum gravius affici, cœca corporis spiracula constipari, rejectisque intus, qui exspirare debebant, humoribus ... fluorem album magis firmari docuimus. Atque interdictis alimentis frixis, pinguis, fumo induratis, adstringentibus etiam & acidis, a quibus si non excitari, foveri tamen & augeri fluxionem albam SYLVIUS (*f*) notat, ac iis, quæ a stomacho nec facile vinci, neque distribui, aut excludi queunt, cibos, qui a tenero ventriculi amplexu prehendi, liquari, ac robur viscerum erigere poterant (*g*), v. c. carnes pullorum cum nuc,

(*f*) Prax. med. L. 3. C. 4.

(*g*) Confer §. 75.

moschata, vituli cum major. conditas, magis tamen veru infixas, ad ignem versatas, capere jussimus. Potus erat decoctum (superius) traditum, non tamen nimius ille, sed modicus, qvandoqve vinum, cui rosmarinus vires medicinales (*b*) communicaverat, rubrum. Somno & vigiliis, ut modum in iis tenendo satisfaceret, hortati sumus. Excretiones naturales v. g. urinæ, sudoris, in statu etiam morbi sæpe plurimum vigebant; alvo autem semel saltim hoc in morbo impeditæ compressæqve necesse fuit conciliare libertatem. Aggregatæ enim tum in intestinorum tubo feces, & qvi in illum corrivantur varii generis humores, in primis pituitosi, aere impuro & crassiori elevato, excitabant flatus varietate & impetu ludentes, sonos etiam interdum affectantes, & intesta na distendendo doloris efficiebant sensum. Qvam qvidem alvi adstrictionem continuato pilularum usui tribuendam vix putamus... sed magis neglecto corporis motui, cui tamen admonita sensim affuefieri cœpit (*i*). Demum injuncto etiam decenti affectuum regimine (*k*), ... qvem in medendo optavimus, affecuti sumus terminum.

(*b*) Confer. 53 e).

(*i*) Confer §. 78.

(*k*) Confer §. 79.

HISTORIA VIII.

L. HEISTERI (1)

Exhibens contumacem puellæ impuberis leucorrhœam, methodumque Auctori ad curandum bunc morbum usitatam.

Galli filiolæ septenni leucorrhœa laboranti 1733 die 6^{ta} Julii rogatus præscripsit :

R. Herb. millefol. c. flor. M. j.

Raf. lign. Sassafr. ʒj. M. conc. gr. modo D. sig. Species theata forma bis quotidie ad vascula ʒ bibendæ.

R. Effent. lignor. ʒj

— Cascar. ʒj. M. D. gtt. xv. pro dosi cum infuso priore.

R. Pil. balsam. STAHL. ʒj. D. alterno vespere No. 7 sumendæ. Alternis quoque diebus imperatum balneum cum rosmarini, salviæ, millefolii aa M. j. paratum. Sed leucorrhœa, appetente licet, probeque dormiente ægra & hilari, nihilominus pergebat, ut ante. Idcirco 18^{va} Novembris priorum in locum data:

(1) Medic. chir. u. anat. Wahrnehm. 2. Band.
No. 128.

R. Herb.

R. Herb. virg. aur. M. j.

Rad. torment. ʒf.

Raf. lign. sassafr. ʒj.

Flor. rosmarin. p. ij. M. conc.

gr. modo D. Species pro infuso prioris ad modum usurpando.

R. TRæ ♂ ii ♀ sat. ʒj

Eff. succin. ʒij. M. S. gtt. 20

bis de die cum infuso præcedenti.


R. Off. Sep. ppt. ʒvj.

Succin. ppt. ʒf.

Croc. ♂ aperit. s T A H L. ʒj.

Ol. still. caryoph. gtt. ij. M. F.

ꝝ qvovis vespere ad cultri cuspidem ante somnum sumendus. Pilulæ qvoqve s T A H L II qvalibet hebdomade interpolandæ, tota-qve hæc curatio in mensem continuanda injuncta. Sicqve mali emendatio est consecuta.



HISTORIA IX.

E J U S D E M (m).

*In qua specimen leucorrhœæ cum ulcere
uteri curatæ habetur.*

A. 1728 die 28 Aug. mulieri 40 annor.
leucorrhœam cum ulcere uteri passæ seqven-
tia præscripsit:

R. Rad. eryng. ʒj.

Herb. anthos M. j.

Flor. lavend.

— cheiri aa p. iij.

Caff. caryophyll. 3iij. M. conc.
cr. modo D. Species bis de die forma theati
infusi bibendæ.

R. Nitri regener.

ꝝ Vitriolat. aa 3ii.

Sal. Absinth.

Cinnab. ʒ ii aa 3j.

Extr. Caſtor. gr. vj

Ol. ſtill. Caryoph. gtt. vj. M. F.

ꝝ ante ſomnum ad cultri cuspides ij capi-
endus.

R. Extr. Aristol. rot. 3j.

Aloes depur.

Myrrh. rubr. aa 3j.

Extr. helleb. nigr.

— gentian. aa 3*fl*

Opobals. liquid. q. f. F. pil. gr.
j. consperg. pulvere liqvirit. S. No. 15 ante
somnum.

R. Ungv. diapomphol. 3vj.

♀ vivi 3ij. Subige in mortar.
vitreo. Adhibetur externe m. & v. Ab
his paulo post melius habuit; sed curæ ac-
celerationem roganti die 14^{ta} Septembr.
præscriptum porro

R. Cinnab. vulgar.

♂ crud. aa 3*fl*

Mastich.

Myrrhæ

Succini

Olibani aa 3j. M. contus. gr.
modo D. pro suffitu, ut m. & v. inde ali-
qid prunis injiciat, fumumqve infessus mo-
do ad genitalia & hypogastrium admittat.
Porro consilium datum, ut m. & v. unguen-
tum ♀ le vulgare pisi magnitudine cuilibet
tarso calide infricet. Die 30 Novembr. e
lapsu vulnus penes malleolum pedis dextri
ortum multum aquosi humoris plorabat, si-
mulqve leucorrhœa aliquatenus revertit a-

cris & mordens: eapropter omnia remedia ordine pristino resumpta sunt, a qveis plane convaluit.

HISTORIA X.

ANT. L. B. DE STÖRCK (n)

Casum prorsus singularem sistens leucorrhææ diuturnæ, suppressæ primum, dein in reversione acerrimæ, tum alterum quoque suppressæ, tandem purulentæ factæ, cum varia tam ipsius quam symptomatum curatione.

Femina 42 annorum, sanissima alias, 7 abhinc annis (causam ignorat) cœpit fluore albo continuo laborare; & ab eo tempore nil sangvinis menstrui amplius comparuit. Materies ex utero prodiens sub initium lenta, mucosa, subalbida fuit; in hypogastrio autem advertebatur tensio, & dolor pectorius vagus. Præterea urina subinde tenesmo retenta aut difficilis reddita est. Usu balneorum & variorum remediorum spatio 9

(n) Libell. 2 de cicuta Cap. 2. cas. 13.

mensium hic fluxus suppressus fuit. Verum mansit in hypogastrio tensio & dolor punctarius, & saepius observatus est urinæ tenuismus, & (o) vagi calores freqventer caput turbarunt, supervenerunt leves leipo-thymiae, & fere quotidie versus vesperas spinam dorfi horror perrepit. His symptomatibus solo decocto althææ medebatur ægra. Per integrum fere quinqvennium malum fuit satis mite, ægra habuit vires, & poterat suos labores peragere. Dein autem erodentes orti sunt dolores, hypogastrium tensum ex minimo attactu valde doluit, & demum retenta est urina & alvus. Enematibus emollientissimis, & similibus fomentis tandem cœpit urina prodire acris turbida, & alvus dura nigra globosa. Levamen inde habuit ægra, recuperavit iterum suas vires, & potuit extra lectum esse. Extero attactu deprehendebatur in medio hypogastrio tumor durus, in quo continuus percipiebatur dolor ardens, erodens, pungens. Atque ideo hæc femina balneo emollientissimo quotidie per binas horas insedit, & 8^{va} die, quo hoc balneo utebatur, prodiit ichor subfuscus, acer, fœtidus, & dolo-

(o) Confer. §. 36.

res ardoresqve inde levabantur. Simili balneo adhuc per 14 dies usq; est, & multo melius inde se habuit; etenim hypogastrum sat rudem attackum sine dolore tulit, & ægra potuit ambulare absq; molestia. Verum fluxus ichoris acerrimi semper factus est copiosior, & erosa est uteri vagina & vulva (p). Hinc remedia externa internaque applicata fuerunt. Per aliquot dies ægra subinde sibi levata videbatur, & fluxus fuit admodum mitis: dein autem aucti sunt iterum dolores, supervenit febris, retenta est urina. Hinc enematibus & fomentis urinæ viæ iterum debebant liberari; & inde ichoris fluxus copiosior fuit. Sensim ægra debilitata est, cœpit vespertino tempore horripilationes conqueri, dein calores, & noctu copiose sudavit (q). Tentata quæcunque nil juverunt; imo dolores semper siebant magis vivaces, pertinaciores, & materies magis fœtuit, & fuit acerrima. A medicis relicta demum ad nosocomium venit tota emaciata, cachectica. Tentavi omnia remedia, quæ in similibus casibus profuisse alias vidi; præterea decoctis demulcentibus & diæta molli

(p) Confer. §. 35. B. a).

(q) Confer. §. 35. B. h).

conabar involvere acrimoniam. Vires vi-debantur paulisper augeri, & mens fieri alacrior; verum febris vespertina & sudor nocturnus continuarunt: neqve imminutæ sunt dolores, neqve fluxus mitior redditus. Hinc qvum adverti, me remediis usitatis actum agere, transivi ad usum cicutæ (r), dedi autem simul decoctum saturatum radicis althææ, & leni infuso cicutæ, qvod lacte factum est, curabam sæpius per diem vulvam & uteri vaginam elui (s). Intra paucos dies magna fiebat mutatio, remiserunt dolores, febris vespertina erat mitior, somnus magis tranquillus, sudor minus copiosus, neqve materies utero effluens adeo fœtuit. Decimo octavo die jam dedi nycthemeri spatio 24 grana de extracto cicutæ. Symptomata omnia fere qvotidie in melius mutata sunt; dolores tamen subinde adeo vivi fuerunt, ut opio debuerint sopiri. Trigesimo die dolores erant enormes urentes; accessit febris, sitis, & multum imminutæ sunt vires. Removi illico extractum cicutæ, non tamen propterea cicutam damnavi. Venam ægræ se-

(r) Confer §. 55. a).

(s) Confer §. 71.

cui (*t*), & solum decoctum emollientissimum cum nitro & melle exhibui. Externe applicabatur cataplasma emolliens. Dum hæc febris accessit, filuit omnis fluxus uteri, urina reddebatur difficilior, non tamen penitus retenta est. Sangvis e vena missus fuit spissus, phlogisticus. Mala hæc symptomata absqve omni fere remissione in 4^{um} diem durarunt, ægra sæpius sensit horrores; 4^{to} die debilis admodum fuit ægra, pulsus sæpius intermisit, observabantur freqventes caloris colorisqve in facie mutationes. Demum versus vesperas, prægresso magno horrore & sudore frigido & levi animi defectu mucus prodiit ex utero, mistus striis sangvineis, & advertebatur magnus fœtor. Hinc omnes gangrænam letalem aedesse clamitarunt. Verum post $\frac{1}{2}$ horam prodiit multum pus, & ægra se levatam sensit, & nox fuit quieta, & bono somno dein reficiebatur. Altero mane eam inveni alacrem, & pulsum habuit naturalem; puris fluxus mediocris continuavit. Solum iterum radicis althææ decoctum tunc sine nitro exhibui, verum junxi simul pilulas ex olibano, maftiche, sarcocolla, & mucilagine

(*t*) Confer §. 66.

gummi tragacanthæ confectas (u). Dolores circa uteri regionem pauci fuerunt, neque ulla amplius durities tactu observata fuit. His solis medicamentis & diæta molli spatio 12 dierum puris fluxus integre curatus fuit, & auctæ sunt vires. Qvum tamen cessante puris fluxu per vices adhuc ichoris stillicidium animadvertebatur, & ægra subinde dolores pungentes vagos in utero conqvesta est, pilulas balsamicas seposui, & earum loco dedi extractum cicutæ: cuius efficacia dein intra 3 septimanas ægra integre sanata fuit. Etenim fuit torosa, robusta, agilis, nil conqverebatur, uteri omnis fluxus siluit, urina prodiit sine molestia, appetitus fuit bonus, somnus tranquillus reficiens.

(u) Confer §. 55. e).

HISTORIA XI.

RAULINI (x)

Leucorrhœæ bæreditariæ, qvam causæ procatarcticæ magnopere fovebant in impubere puella, mutata penitus vivendi ratione curatæ casum sistens.

Puella octennis, e matre leucorrhœam continuam ac debilitantem tam ante graviditatem qvam in eadem passa in lucem edita, ultra semestre fluorem album habens extenuabatur, stomachique jam tensiones persentiscebatur. Cum vero lacte semper, jusculis, pullis & columbis vesceretur, atque a cunis jam vinum pitissaffet, ac vix bimulæ alternis diebus concessa fuissent caffee, thea, chocollata, nec unquam e domo vel horto prodiere sineretur: haud alioquin, qvam tota vivendi ratione mutata, morbus videbatur curabilis. Idcirco aeris, aquæ, ac diætæ salubrioris causa (y) ruri habitatio loco edito, cuius per subjectam planitiem rivi majores fluebant, conducta

(x) l. c. T. 2. P. 3. S. 2. C. 1. p. 233. sqq.

(y) Confer §. 77.

illi fuit, dataqve moderatrix ruralis magis qvam urbanæ diætæ guara. Alimenta non alia concessa, qvam panis & ruri consuetu jura, legumina, ac fructus; potui vero data aqva recens e petris versus meridiem sca turiens. Imperatus simul serena siccaqve tempestate corporis motus eum ad modum, ut nunquam, nisi post $\frac{1}{2}$ h. deambulationem ad jentandum admitteretur, nec prandium caperet, nisi post laffitudinem a deambu lando, qvod idem a prandio quoqve fa ctum (z). Porro mane qvovis egressæ lecto præbebantur aliquot guttæ balsami Peruviani (a) cum infuso corticum amaro rum ex aurantiis (b); omniqve octiduo pulveris Rhei grana aliquot in prandio ad primum jusculti cochlear admiscebantur to ties, donec alvus mota est (c). Identidem vero seponebantur medicamenta, ne iis natura afficeret. Exacto sic anno redierunt vires, perspiratio ad lenem usqve sudorem, nunquam antehac obortum, inva lescens promovebatur præbito mane, bihorio

(z) Confer §. 78.

(a) Confer §. 48. d).

(b) Confer §. 53.

(c) Confer §. 44 45 No. 1.

antequam surgeret, balsamo Peruv. hausto-qve desuper infuso calido e veronica mare & cortic. aurant. (*d*), leucorrhœaqve pedentim remittens sub finem biennalis hujus regiminis ex toto desiit. Aliqvanto post puella in cœnobium translata, ubi ordinata, minus tamen jam severa, vivendi ratione observata sanissima mansit, ac debito tempore catamenia quoqve rite nacta est.

HISTORIA XII.

E J U S D E M (*e*).

Insolitum prorsus leucorrhœæ ab anevrysmate carotidis exortæ exemplum suppeditans, quo personato leucorrhœa quoqve conqvievit.

Matrona 30 annorum a $\frac{3}{4}$ anni haud exiguum læva in carotide externa gerebat anevrysma cum pulsatione, ceterisqve solennibus anevrysmati symptomatibus. Aderrat insuper totius colli intumescientia cum

(*d*) Confer §. 49.

(*e*) I. c. T. 1. P. 2. S. 1. C. 9. p. 335.

dolore tensivo instar pedis anserini per totam omoplatam usqve adeo cruciante, ut caput neqve gyrare neqve affectum in latus movere sine acerbo dolore posset. Junctus his etiam langvor aliquis fuit, ac somnus inquietus & interruptus, turbata ventriculi functio, & leucorrhœa cum continuo uteri dolore, aliisqve incommodis nullas ægrotæ inducias concedentibus. (f) Post omnia usitata artis præsidia a Cel. cum medicis tum chirurgis per 18 menses necquidquam tentata, Auctor tandem (g) secta crebrius vena, injuncta tenui diæta, cum moderato corporis motu, adhibitis balneis tepidis, siccisqve totius corporis frictionibus institutis, ac datis potui diluentibus, leniter aperitivis, aquis soteriis & libus, anevrysmati totique collo admovit cataplasmata cum semper vivo & aliquot solani foliis, sub cinere coctis, parata. Qvorum post bimestrem fere administrationem anevryisma evanuit, omniaque symptomata disparuere, ægra per 6 inde annos illibata sanitate gaudente.

(f) Ibid. T. 2. P. 3. S. 2. C. 6. p. 372.

(g) Ibidem p. 370. sq.

HISTORIA XIII.

J. STORCHII (b)

De leucorrhœa gentilitia cum rheumate capitatis alternas tenente, ac demum utroque hoc malo Auctoris methodo percurato.

Rustica mulier 32 annorum, procera, cholerico-phlegmatica, laboris continui impatiens, ac septennium sterilis (i), A. 1723 die 12^{ma} Junii pro continua quinque jam hebdomadum leucorrhœa opem rogabat, causam ejus ignorans, nisi quod memoria tenebat, binas suas natu majores sorores eadem laborasse (k), quorum altera multas nihilo minus proles nacta (l), altera vero sterilis fuerat. Praescripsi igitur:

R. Eff. lign. saffr.

— rosmarini

— succini

TRæ ♂ii tartaris. aa. 3j. M. D.

(b) Von Weiber-Krankheiten 8 Band easf. 71
p. 274 sqq.

(i) Confer §. 35. A. d).

(k) Confer §. 8.

(l) Confer §. 35. A. d).

S. sumat m. & v. ad gtt. xxx. simulqve data
pulveris purgantis gr. xxv pro dosi. Die
29^{na}, cum hucusqve nil profecisset in me-
lius, ordinavi

R. Extr. panchym. C R O L L. 3*β*

— rhabarb.

Resin. jalapp.

♀ ii dulc. aa. gr. v. M. cum

Eff. lign. saffafr. F. pil. № xij.
pro dosi.

R. Pulv. corall. alb. 3ij

— off. s̄epiæ 3j. M. div. in
ix dos. vespertinas. Porro

R. Effent. rosmarin.

TRæ ♀_{ri} aa. 3ij. M. S. gtt. xxx
mane. Sed his qvoqve in cassum datis, 24^{ta}
Julii imperavi primam denuo MR^{am}, ac
præterea præbui

R. Rad. bardan. 3j

Herb. beton. M. ij

— marrub. alb. M. j.

Ligu. saffafr. 3*β*. M. D. pro thea-
to potu. Ab his leucorrhœa ita intermitte-
bat, ut non nisi ante & post catamenia flue-
ret, semperqve 14 diebus intermediis abef-
set. Sed cum etiam sic sterilitas mansisset,
ægræ ulteriorem qvoqve opem poscenti A.
1724 die 15^{ta} Aprilis imperata phlebotomia
in pede, datumqve

Rx. Effent. millefol.

— lign. saffaf. aa. 3ij

— succin. 3j. M.D. m. & v.gtt. 30.

Rx. Pulv. purgant. gr. xxjv

♀ ii dulc. gr. jv. M. D. 3^{to} post
V. S. die pro dosi. Inde leucorrhœa uberior
primum facta postmodo remisit: idcirco ite-
rata die 29^{na} MR^a, & simul datus pulv. co-
rall. cum nitro, non sine egregio levamine.
Die 20^{ma} Maji præscriptum est

Rx. Eff. rosmarin. 3j.

— millefol. 3ij

— lign. saff.

— bals. Peruv. aa. 3j. M. S. m.
gtt. 30 vesperi autem pulveres postremos;
itereturqve catharticum diei 15 Aprilis. Tan-
dem 14^{ta} Junii datum:

Rx. TR^a ♂ ii 3*fl*

Eff. lign. 3ij. M.

Rx. Corall. alb. 3*fl*

Off. sep. 3j

♂ ii ♂ lis cacheat. 3*fl*. M. div. in
9 doses. Die 2^{da} Septembr. narravit ægra,
se antehac rheumate capitis cum narium ob-
structione laborasse; & qvamdiu leucorrhœ-
am patiebatur, ab rheumate se immunem
fuisse: ubi vero æstate præcedente leucor-
rhœa iterum substitit, rheuma capitis esse
reversum. Cum hactenus tempestas admo-
dum

dum esset calida, occidente ejusdem mutatione rufus me illi medicinam facturum sum pollicitus. Die 12^{ma} Sept. dysenteriam tunc epidemicam experiri cœpit, qvam tamen potiuncula ex TR^a rhei & elect. diacord. FRACAST. brevi sopivit. Die 23^{tiā} phlebotomiam fvasi; posteaqve præbui pil. purg. c. & dulci, & TR^a g. ii. Die 11^{ma} Oct. ordinavi potum theatum pro sangvine depurando cum rad. Bardan. Sarsap. lign. sanct. & Saffafr. in TR^a g. ii. mistum, consuluique, ut veteris illius rheumatis causa aliquoties vesicantia furis aliud ex alio applicaret. Ab his tam bene habuit, ut A. 1725 puellam pepererit, enutriveritqve; licet deinceps nullæ aliæ proles succeferint. Inde usqve in A. 1728 sana vixit; hujuscce autem Junio mense ac Martio inseqventi dolorem in lœva regione lumbari nocta est, qvem primum oleo chamom. cum camphora, alterum vero emplastro miracul. c. camph. leniqve potu theato oppugnaverat; ab leucorrhœa autem immunis vixit.



I N D E X I.

A U C T O R U M.

A.

Annales Vratislav. 33. 42.

49. 138. 143. 152. 162
189. 283.

Acta Berolinensia (vid.
Gohlius)

Astruc 54. 70. 71. 72. 74.

Acta Hafniensia 234. 242.

76. 79. 82. 83. 86. 252.

Acta Lipsiensia 56.

Acta natur. cur. 120. 122.

B.

133. 151. 172. 255.

Baglius 81.

Acta nov. nat. cur. 22.

Bajon 134. 202.

Acta Parisina 9.

Baldinger 126.

Aetius 7. 13. 97. 297.

Ballonius 57. 84. 131.

300.

Bartholinus 242.

Albrecht 124. 159.

Bauhinus 133.

Alix 239.

Becher 176. 249.

Amatus 194.

Behr 133

INDEX I. AUCTORUM.

Bertram 239.
 Blanckart 216. sq.
 Blasius 115.
 Bockshammer 312.
 Boehmer 98.
 Bœrhaave 73.
 Bötticher 122.
 Bonetus 111.
 Büchner 52. 163. 308.
 Buchotz 98.
 Büchwald 141.
 Burggrav 172.
 Burton 121.

C.

Castro 34.
 Celsus 286.
 Cockson 266.
 Commentar. von Edinb.
 66. 233. 266.
 Commerc. Norimb. 35.
 108.
 Corbeius 257.

D.

Degner 152.
 elius 200. 219.
 etharding 201.
 isipensat, Viennens. 234.
 249.
 olaus 29. 79. 236. 239.
 250.

E.

enius 252.
 llhard 62.

Erastus 199.
 Ernesti 49. 162.
 Ettmüller 158. sq. 162.
 199. 235. 257.

F.

Faventinus Bened. 300.
 Fernelius 30. 159.
 Foesius 27.
 Floyer 275.
 Fonseca 55. 104. 158. sqq.
 236. 282.
 a Fonte Læl. 57. 119.
 Forestus 7. 97. 101. 153.
 178. 285. 297. 300.
 Frambesarius 188.
 Francus 252.
 Fürstenau 255.

G.

Gahrlied 31.
 Galenus 7. 57. 292.
 Gasser 247.
 Gehema 264.
 Geofroi 159.
 Gohlius 41. 51. 135.
 Graaf 8.
 Grülingius 278.
 Gulbrand 36.

H.

Hagendorf 39.
 Harder 15. 17.
 Hartmannus 200.
 Heilkunde neuße 268.

INDEX I.

- | | |
|---|--|
| Heister 191. 320. 322. | L. |
| Helidæus 235. | |
| Henckel 258. | Lange 251. |
| Hentrich 43. 103. 106. | Lanzonus 150. 234. |
| Heucher 8. | Lentin 54. 249. |
| Hildanus 277. | Leske 121. |
| Hill 66. | Lindanus 200. |
| Hippocrates 27. 29. 104.
274. | Loew 120. |
| Historia morbor. Vratisl.
42. 157. 178. 238. 246.
256. 272. 276. | Lossius 246. |
| Hœchstetter 30. 34. | Lotichius 264. |
| Hoffmannus (Frid.) 6. 10.
14. 29. 33. 37. 41. 48.
49. 96. 126. 142. 167.
168. 169. 188. 199.
225. 238. 244. 254.
261. 262. 265. 267.
269. 270. 303. | M. |
| Hoffmannus (Maur.) 19. | Marx 217. |
| Jacob 165. | Mauriceau 21. |
| Jensen 141. | Mead 5. 159. 168. 233.
238. 261. 267. |
| Juchius 312. | Mercurialis 236. |
| K. | Meynoldus 242. |
| Kaltschmied 43. | Misc. natur. cur. 15. 11.
31. 105. 107. 124. 155.
153. 159. 201. 233.
242. 243. 273. 277.
305. |
| Klein 76. 131. 138. 151. | Montanus 34. |
| Kœlichen 234. | Morgagnius 6. 9. 30. 37.
61. 62. 64. 110. 1200. |
| Krapf. 210. | Mortimer 121. |
| | Münnich 308. |
| | Muralto 105. 107. 111. |
| | Murray 201. |
| Nenter 137. 162. | N. |
| Nester 243. | |

A U C T O R U M.

Neuhold 108.

Nizet 268.

O.

Ovelgün 22.

P.

Palluci 120.

Panarolus 123. 219.

Paulli 180.

Paullini 30. 242. 251.

Pechlinus 31. 149. 283.

Pinæus 63.

Pitcarnius 5. 87.

Platerus 162.

Polzer 209.

Pomme 79.

Poterius 303.

Q

Qvarin 210.

Quercetanus 234.

R.

Raulin 4. 9. 36. 38. 42.

54. 55. 101. sq. 125.

129. 135. 137. 141.

164. 166. 197. sq. 232.

253. 272. 281. 285.

286. 288. 330. 332.

Reusner 181. 199.

Reydt 238. sq.

Rhodius 119.

Riedlinus 43. 46. 82. 103.

104. 105. 230. 270.

Riverius 13. 165. sq. 169.

171. 196. 228. 256.

Rommelius 153.

Rost 143.

Roux 134. 202.

Rücker 35. 51.

Rueff 240.

S.

Sachs 275.

Samml. Berlin. 200.

- - - Fränk. 200. 219.

- - - Leipzig. 55. 235.

Sauvages 8.

Schaarschmidt 56. 65. 76.
89. 140.

Schæffer 258.

Scheidemantel 177.

Schenck 133.

Schenkbecher 221.

Schliefbach 151.

Schraderus 200.

Schurigius 32.

Silvaticus 3. 11. 12. 14.

15. 29. 43. 46. 53. 97.

101. sq. 105. 158. 160.

276.

Sperling 8.

Stahlius 27. 249. sq. 281.

284. 311.

Starck 305.

Stoeller 211.

Y 3

INDEX I. AUCTORUM.

- | | |
|--|---|
| <p>Störck 57. 99. 113. 150.
170. 179. 181. 205.
208. 209. 213. 216.
220. 248. 265. 270.
324.</p> <p>Storch 18. 33. 44. 45.
50. 52. 85. 86. 87. 103.
128. 139. sq. 180. 244.
245. 334.</p> <p>Swalve 178.</p> <p>Swieten 73. 75.</p> <p>Sylvius 41. 256. 318.</p> | <p>V.</p> <p>Vandermonde 121.
Varfavienses Observ. 60.
Velsch 181. 242. 247.</p> <p>W.</p> <p>Wachter 98.
Wedelius (G. W.) 174.
234.
- - - - (J. A.) 62.
Weikard 45. 237.
Weitz 32.
Whytt 275.
Wincler 273.
Winter 189.</p> |
| <p>T.</p> | <p>Z.</p> |
| <p>Terraneus 30. 31.</p> <p>Thevart 132.</p> <p>Thompson 55. 235.</p> <p>Tillingius 138. 177.</p> <p>Timæus 19.</p> <p>Transact. Philos. 161.</p> | <p>Zacutus 189.</p> |



I N D E X II.

R E R U M.

A.

Aabortus leucorrhœæ
causa 51. 68. &
effectus quoque 99.

Abscessus a leucorrhœa
suppressa 133.

Abstergentia diuretica in-
terduin conducunt in
leucorrhœa 179.

Acidum vitrioli efficax ad
leucorrhœam 236.

Acrimonia fluoris albi 15.
sq. nascitur ex ejus
diuturnitate 109. effi-
citque varia mala 110.
sqq.

Aeris mutatio utilis in
leucorrhœæ cura 285.
330.

Adstringentia leucorrhœam
curant 225. sqq. qvan-
do danda? 227. qvalia
optima? 233. exsiccantia
ibid. austera 235.

Aetas qvæ maxime leu-
corröhœæ obnoxia? 29.

sqq. etiam tenera ibid.
Affectus animi leucor-
rhœam causant 39. cu-
ram impediunt 287.

Alba menstrua qvid? (v.
leucorrhœam).

Album ovi cum aqua ro-
farum sumptum sustulit
leucorrhœam 194.

Albus fluor (v. leucor-
rhœa).

Alimenta in leucorrhœæ
cura qvalia danda? 279.

Aluminosa balnea in leu-
corröhœæ cura circum-
spekte adhibenda 272.

Alvus qvalis in leucor-
rhœa? 26. fluxa sol-
vit leucorrhœam 153.

Amor lascivus leucorrhœæ
causa 40.

Amplitudo vulvæ ab über-
tate leucorrhœæ 97.

INDEX II.

- A.**
 Amuleta contra leucorrhœam 27.
 Anacatharsis leucorrhœam solvit 150.
 Anatome e leucorrhœa defunctarum quid doceat? 63.
 Aneuryisma carotidis externæ causavit leucorrhœam 332. sqq.
 Animus dejectus morosus in leucorrhœam patientibus 27.
 Antimonii vitrum cerasum efficax ad leucorrhœam 161.
 Antiseptica quando in leucorrhœa danda? 205.
 Antivenerea nec sola nec omnem leucorrhœam curant 87. sq.
 Anxietas in leucorrhœa 26.
 Apozema ad leucorrhœam efficax 246. sq.
 Aqvæ soteriae curant leucorrhœam 176. sq. martiales 238. sqq. & calcis vivæ 235. & Bristoliensis ibid.
 Asari laus in leucorrhœa 159. sq.
 Ascarides cum leucorrhœa prodeunt 18. sqq.
- B.**
 Balneorum in leucorrhœa cura efficacia, præfertim
- diaphoreticorum 269.
 roborantium 270. thermarum 272. frigidorum 275.
 Balsamorum nativorum in leucorrhœæ cura virtus 182. 215.
 Basilicum filvestre specifice curat leucorrhœam in Cajenna 202.
 Belgis leucorrhœa crebra est 41.
 Benigna leucorrhœa quid? 7.
 Berolini leucorrhœa crebra est 41.
 Bristoliensis aqvæ vis ad leucorrhœam curandam 235.
 Brückenviensis fontis efficacia contra eandem 239.
- C.**
- Cachexia cum leucorrhœa 6. ejus causa 37. effetus 108. sq.
 Calcis aqva efficax ad leucorrhœam 235.
 Cancrorum oculi curant leucorrhœam 233.
 Catamenia (v. menses).
 Catarrhus suppressus leucorrhœam creat 55. 334. & vice versa 130. 141.
 Catechu virtus ad leucorrhœam 236.

R E R U M.

- Cathartica leucorrhœam curant 161. sqq. vel iterata vel continuata ibid. mitiora tantum danda 167. sqq.
- Causæ leucorrhœæ proegumentæ 29. sqq. procatarcticæ 39. sqq. proxima 61. sqq.
- Cephalalgia a leucorrhœa suppressa 138.
- Chlorosis cum leucorrhœa, hujusque causa 6. 37.
- Cicuta leucorrhœam curat 205.
- Coitus causat leucorrhœam venereum 79. in ea que dolorem creat, non item in vera leucorrhœa 79. & virum inficit 79.
- Color leucorrhœæ 11. sqq. unde albus? 61. sq.
- Complicata leucorrhœa quid? 6.
- Composita remedia ad leucorrhœam 241. sq.
- Conceptus leucorrhœam tollit 150.
- Consistentia varia leucorrhœæ 14.
- Contenta ejusdem 18. sqq.
- Continua leucorrhœa 3.
- Copaivæ balsami laus in leucorrhœa 185.
- Copia leucorrhœæ 17. distinguente leucorrhœam veram a gonorrhœa venerea? 75.
- Corallia curant leucorrhœam 234. 243.
- Corpora qvæ prona in leucorrhœam? 35.
- Cortex Peruvianus efficax in leucorrhœæ cura 219. sqq.
- Coryza (v. leucorrhœa), ejus fluxus suppressus leucorrhœam causat 55. sq. 141.
- Cydoniorum semen utile in leucorrhœa 194.
- D.
- Dauci laus in leucorrhœa 180.
- Debilitas virium cum leucorrhœa 26.
- Diabetes a leucorrhœa suppressa 131.
- Diæticum regimen in leucorrhœa 279.
- Diagnosis varia leucorrhœæ 69. sqq. præsertim verræ a gonorrhœa venerea 71. sqq. qvæ est admodum difficilis 89. sqq.
- Diaphoretica leucorrhœam curant 186. sqq. 269.
- Diarrhœa solvit leucorrhœam 153.
- Diasari Fernelii laus in leucorrhœa 159. sq.
- Dictamni albi radix leucorrhœam curat 181.

I N D E X II.

Diuretica curant leucorrhœam 178. sqq.

Diuturnitas leucorrhœæ varia 94. sqq.

Dolores leucorrhœæ comites 26. ex ejus acri monia etiam oriuntur 123. sq.

Dyspepsia cum leucorrhœa 26.

Dyspnoea cum leucorrhœa ibid.

E.

Ebeni decoctum efficax in leucorrhœa 190.

Effectus varii leucorrhœæ 96. sqq. præsertim suppressæ 128. sqq.

Embrosensis aquæ laus in leucorrhœa 239.

Emeticorum virtus in leucorrhœa curanda 158. sqq. quæ hic optima? 159. sqq.

Emmenagogæ leucorrhœam creant 41.

Essentiæ variæ efficaces ad leucorrhœam 244.

Exanthemata a leucorrhœa acri 126. sq. vel suppressione ejusdem 131.

Excoriationes genitalium a leucorrhœa 110.

Excrecentiæ ibidem ab eadem 119.

Exsiccantia adstringentia curant leucorrhœam 233.

Externa remedia ad leucorrhœam varia 252.

F.

Febris cum leucorrhœa 26. vel ab eadem suppressa 132. 138. sq.

Ferri virtus in leucorrhœæ cura 238. 272.

Fluor albus (v. leucorrhœa), ejus phænomena 10. sqq.

Folia quercus curant leucorrhœam 236.

Fonticuli tollunt leucorrhœam 276.

Fotus utiles ad leucorrhœam 258.

Freyenwaldensis fons leucorrhœam curat 238.

Frictiones utiles in leucorrhœa 257.

Frigida balnea sanant leucorrhœam 257.

Frigus huncidum leucorrhœæ causa 41. sq.

Fumi utero immitendi in leucorrhœæ cura 261. sqq.

Functiones quæ lassæ in leucorrhœa? 25. sqq.

Fungi uteri, vaginæ a leucorrhœa 119.

G.

Gangræna a leucorrhœa 110.

R E R U M.

- | | |
|---|---|
| Genitalia (v. excoriatio, fungi). | Infantum leucorrhœa 30.
sqq. |
| Glandularum tumores subfidentes causant leucorrhœam 57. | Inflammatio a leucorrhœa 110. |
| Gonorrhœa ab leucorrhœa vera qvi dignoscenda? 71. sqq. benigna qvid? 7. | Ingesta leucorrhœæ causa 40. |
| Gravidarum leucorrhœa 8. 46. | Injectiones uterinæ ad leucorrhœam 264. sqq. |
| Gummi - resinæ prosunt in leucorrhœa 216. | Inspectio pudendorum ad diagnosin leucorrhœæ requisita 76. sqq. |

H.

- | | |
|--|--|
| Habitus corporis in leucorrhœa qualis? 26. | Juniperi grana laudantur in leucorrhœa 181. |
| Hæmorrhagia uteri leucorrhœæ causa 51. vel ejusdem effectus 124. | Juvantia & nocentia an leucorrhœæ indolem determinent? 25. sqq. |
| Hæmorrhoides cœcæ leucorrhœæ causa 59. sq. | |
| Hæreditaria leucorrhœa 36. 330. | L. |
| Historiæ selectæ leucorrhœæ 292. sqq. | Lactis usus leucorrhœam revocat 281. metastasis leucorrhœæ causa 53. |
| Histerica passio comes leucorrhœæ 6. | Lactucæ sem. tremor curat leucorrhœam 242. |

I.

- | | |
|---|--|
| Impuberum leucorrhœam tollit pubertas 149. | Lassitudo cum leucorrhœa 26. |
| Inanitio nimia a leucorrhœa poscit adstringentia 230. | Lauchstadiensis aquæ laus in leucorrhœa 238. |
| Indicationes in leucorrhœæ cura 156. sq. | Laxitas vasorum uteri pertinax poscit adstringentia 227. |

- | | |
|--|---|
| | Infantum leucorrhœa 30.
sqq. |
| | Inflammatio a leucorrhœa 110. |
| | Ingesta leucorrhœæ causa 40. |
| | Injectiones uterinæ ad leucorrhœam 264. sqq. |
| | Inspectio pudendorum ad diagnosin leucorrhœæ requisita 76. sqq. |
| | Intermittens leucorrhœa 3. |
| | Inveterata leucorrhœa 2. |
| | Inviscantia utilia ad leucorrhœam 194. |
| | Juniperi grana laudantur in leucorrhœa 181. |
| | Juvantia & nocentia an leucorrhœæ indolem determinent? 25. sqq. |

L.

- | | |
|--|--|
| | Lactis usus leucorrhœam revocat 281. metastasis leucorrhœæ causa 53. |
| | Lactucæ sem. tremor curat leucorrhœam 242. |
| | Landeccensis aquæ laus in leucorrhœa 238. |
| | Lascivia leucorrhœam accelerat 40. 42. sqq. |
| | Lassitudo cum leucorrhœa 26. |
| | Lauchstadiensis aquæ laus in leucorrhœa 238. |
| | Laxitas vasorum uteri pertinax poscit adstringentia 227. |

INDEX II.

- Leucorrhœa qvid? 1. ejus nomina varia 2.
 57. genera 2. sqq. tempora affigendi 5. 10.
 phænomena 10. sqq. qualitates 11. sqq. ubertas 17. contenta 18. sqq. ubi endemia? 41. mensium vicaria 51. e quibus vasis scaturiat. 2. 61. sqq. cum menstruis fluens 66. sqq. an tunc venerea? 81. sqq. cessat deficientibus menstruis 68. ejus causæ 29. sqq. symptomata 9. sqq. diagnosis varia 69. sqq. prognosis 94. sqq. curatio 155. sqq. historiæ selectæ 292. sqq.
 Ligni sancti laus in leucorrhœa 188. sq. & Americanorum lignorum 187.
 Litus ad leucorrhœam utiles 257.
- M.**
- Maligna leucorrhœa 8.
 Martialium vis in leucorrhœæ cura 238.
 Matrimonium leucorrhœam causat 43.
 Melancholia in leucorrhœa 27.
 Menses albi (v. leucorrhœa), in leucorrhœa
- qva ratione procedant 26. eandem varie causant 47. ejusdem sunt vicarii 51. cessantibus iis cessat leucorrhœa 68.
 Menthæ aqua spirituosa efficax ad leucorrhœam 199.
 Mercurialis ptyalisinus curat leucorrhœam venereum, forte & veram 190. sqq.
 Metastases leucorrhœæ causa 53. leucorrhœæ suppressæ variornim malorum causa 128. sqq.
 Mæror leucorrhœæ causa 40.
 Molæ leucorrhœam creant 51.
 Morbi uteri leucorrhœam inducunt 39.
 Moschata (v. nux)
 Motus corporis in leucorrhœæ cura necessarius 285.
 Muliebre profluviuim (v. leucorrhœa).
- N.**
- Neonuptarum leucorrhœa 43.
 Notha leucorrhœa qvid? 6. qvotuplex? 7. sq.
 Nux moschata esa curat leucorrhœam 199.

R E R U M.

O.

- Obesæ leucorrhææ magis obnoxiae 35.
Oculorum cava elevata in leucorrhæa 27. livores 28.
Odor leucorrhææ 15.
Olibano curata leucorrhæa 217.
Opobalsamo sanata leucorrhæa 184.
Otium vitandum in leucorrhææ cura 286. sqq.
Ovi album curat leucorrhæam 194.

P.

- Palpitatio cordis cum leucorrhæa 26.
Partus leucorrhææ causa 51.
Pathemata animi (v. affetus).
Pediculi in capite enati leucorrhæam fistunt 140.
Pedum calor in leucorrhææ cura necessarius 289. sudor reversus leucorrhæam fugat 151.
Periodica leucorrhæa 5.
Perspiratio in leucorrhææ cura promovenda 288. sq.
Peruvianus balsamus in leucorrhæa efficax 184. ejusdem essentia 244.

Peruvianus cortex (v. cortex).

Phænomena leucorrhææ varia 10. sqq.

Phlegmaticæ sunt plus proclives in leucorrhæam. 35.

Phthisis a leucorrhæa 125. præsertim suppressa 135.

Pilulæ variæ ad leucorrhæam efficaces 249.

Pimpinellæ albæ laus in leucorrhæa 244.

Piperinæ aquæ leucorrhæam sanant 238.

Polypi (v. excrementiæ, fungi).

Procatarcticæ causæ leucorrhææ 39. sqq.

Proegumenæ ejusdem 29. sqq.

Prognosis ejusdem 94. sqq.

Proxima causa ejusdem 61. sqq.

Ptyalismus spontaneus leucorrhæam solvit 150. mercurialis perinde 190. sqq.

Pubertas leucorrhæam impuberum tollit 149.

Pudendorum (v. excoriatio).

Pulveres varii ad leucorrhæam 250.

Purgantia (v. cathartica).

Purpura a suppressa leucorrhæa 132. 142. sq.

INDEX II.

- Purulenta leucorrhœa 322.
324.
- Q.
- Qualitates leucorrhœæ variæ 11. sqq. 73. sq.
Quassia laus in leucorrhœa 200.
Quercus foliorum virtus in leucorrhœa 236.
- R.
- Ratiocinium de leucorrhœæ scaturigine 65.
Recens leucorrhœa 2.
Regimen diæticum in leucorrhœa 279.
Remedia ad leucorrhœam 158. sqq.
Reversa leucorrhœa morbos a sui suppressione ortos tollit 138. sqq.
Rhei ad leucorrhœam efficacia 168. junctis præfertim tonicis 169.
Roborantia diuretica indicata 180. sqq. & nervina 195. sqq. balnea 270.
Rosmarini virtus in leucorrhœa 199.
Ruhlenis aquæ laus in leucorrhœa 239.
- S.
- Sacchari abusus leucorrhœæ causa 41.
- Salivatio (v. ptyalismus).
Sangvinis vacuatio solennis suppressa leucorrhœam causat 59. missio quando indicata? 252. sqq. ubi vetetur? 256.
Scabies a suppressa leucorrhœa 132.
Scarificatio neglecta leucorrhœæ causa 59.
Semen cydoniorum in leucorrhœa utile 194.
Sensuum turbatio a leucorrhœa 107.
Serpilli virtus in leucorrhœa 200.
Setaceorum laus in leucorrhœa 276.
Sialagoga profunt in leucorrhœa 190. sqq.
Simplex leucorrhœa 6.
Soli mutatio utilis ad leucorrhœam curandam 285.
Solutio variis modis leucorrhœæ 149.
Soteria (v. aquæ).
Spadanæ aquæ laus in leucorrhœa 241.
Spongia vaginalis indita leucorrhœam creat 45.
Sputa suppressa leucorrhœæ causa 55. oborta solvunt leucorrhœam 150.
Sterilitas leucorrhœæ effetus 104. sq. non tamen semper 106. sq.

R E R U M

Stomachica remedia condu-
cunt ad leucorrhœæ cu-
ram 196. sqq.

Suberis usci laus in leucor-
rhœa 235.

Sudor pedum repressus leu-
corrœæ causâ 53. re-
versus eandem fugat
151.

Suffitius ad leucorrhœam
curandam 261.

Suppressæ leucorrhœæ se-
quelæ 128. sqq. qvas
reversa leucorrhœa tol-
lit 138. sqq.

Sympтомата leucorrhœæ 9.
sqq. 72.

Syrupus corall. curat leu-
corrœam 234.

T.

Tabes a leucorrhœa 125.

Tempora leucorrhœæ re-
verti solitæ 10.

Tensio hypochondriorum
vel hypogastrii comes
leucorrhœæ 26.

Terebinthinæ spiritus fistit
leucorrhœam 184.

Terræ catechu vis ia leu-
corrœa curanda 236.

Terror leucorrhœæ causa
39.

Tincturæ corall. laus in leu-
corrœa 234. 243.

Transplantatio leucorrhœæ
278.

Tumores artuum in leucor-
rhœa 26. sq. uteri vagi-
næ a leucorrhœa 119. sq.
glandularum (v. has).

Tussis a leucorrhœa sup-
pressa 141. sq.

Typus leucorrhœæ num
diagnosin absolvat? 81.

U.

Vacuationes solennes sup-
pressæ leucorrhœam
causant 53. sqq.

Vagina an veræ etiam
leucorrhœæ sedes? 62.
ejus irritatio leu-
corrœæ causa 45. prola-
psus ejusdem effectus 97.
Leucorrhœa e vagina
cum cataemeniis ex utero
eodem tempore fluenti-
bus 66. sqq.

Vasa qvæ leucorrhœam
gignant? 2. 61.

Ubertas leucorrhœæ 17.
75. quid efficiat? 97.

Venus nimia leucorrhœæ
causa 42. sqq. in cura-
tione vitanda, 282.

Vera leucorrhœa quid &
qvotuplex? 2. sqq.

Vermiculi cum leu-
corrœa excreti 18. sqq.

Vesicantium virtus ad leu-
corrœam abigendam ca-
tarthalem 337.

INDEX II. RERUM.

- Vestitus** ratio in leucor-
 rhœæ cura 288.
Vetus leucorrhœa 2.
Victus humidus leucor-
 rhœæ causa 41. qvalis
 in cura tenendus? 279.
 fqq.
Viduas leucorrhœa dese-
 rit 44. sq.
Vina medicata ad leucor-
 rhœam 248.
Vir admissus leucorrhœam
 abegit 283.
Vitrioli acidum in leucor-
 rhœa proficuum 236.
Vitri antimon. cerati laus
 in leucorrhœa 161.
Ulcera genitalium in leu-
 corrœa 6. varia item
 ab eadem suppressa 133.
Vomitui cessanti succedens
 leucorrhœa 55.
Urina qvalis in leucor-
 rhœa? 26. sq. ejus dif-
 ficultas vel suppressio a
 leucorrhœa 124.
Uteri morbi leucorrhœæ
 causa 39. prolapsus ab
 eadem 97. fungi, polypi
 ab eadem 119. fqq.
Uterina leucorrhœa 2. re-
 media ad leucorrhœam
 qvalia? 200.
Uterus an. sedes leucor-
 rhœæ? 2. 61. fqq.
Uva ursi sanat leucor-
 rhœam 201.
Vulneraria danda in leu-
 corrœa purulenta 205.
Vulvæ amplitudinem causat
 leucorrhœæ ubertas 97.
Y.
Ypecacuanhæ laus in leu-
 corrœa 159.



B U D Æ
 TYPIS CATHARINÆ LANDERER.

