

Ce soir tu risques de coucher avec Léo qui a couché avec alexandre et Hervé qui ont couché avec Pat qui a couché avec Hypolite ... / Ministère de la Santé et des Sports ; INPES, Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé.

Contributors

France. Ministère de la Santé et des Sports
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (France)

Publication/Creation

[2012?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/emt3689e>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Ce soir tu risques de
coucher avec

léo qui a
couché avec alexandre

et he rvé qui ont couché

avec pat qui a couché

avec hypolite et ted qui

ont couché avec C harles

qui a couché avec pierre

et thomas qui a couché

avec alexandre

et ted qui ont couché

avec alexandre

et ted qui ont couché

avec alexandre

Les personnes séropositives au VIH sont particulièrement exposées à la contamination par le VHC lors de pratiques hard ou SM, de pénétrations anales multiples (irritations, lésions) quand ces relations ne sont pas protégées.

(source InVS)

Signes possibles : fatigue, fièvre, nausées, diarrhée, jaunisse. Ces signes ne sont pas systématiques. Ils peuvent apparaître entre 2 et 8 semaines après la contamination, puis disparaître.

Dépistage : simple prise de sang.

Traitement : un traitement existe mais les effets secondaires des deux infections et de leurs traitements respectifs limitent la palette de médicaments utilisables.

Risques et complications : la co-infection VHC et VIH est source de complications dans la prise en charge : elle réduit l'efficacité des différentes combinaisons thérapeutiques.

Pour vous protéger, faites-vous régulièrement dépister et utilisez un nouveau préservatif ou un gant et un lubrifiant à base d'eau ou de silicone à chaque pénétration et avec tous vos partenaires.

Faites le test. Protégez-vous.

Plus d'informations sur les IST sur
www.havefun.fr

3112-09599-PC



Sida Info Service
0 800 840 800
(appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sida-info-service.org

