Sedonil : en las neurosis, sindromes de angustia, irritabilidad, insomnio / Instituto Sanitas Sociedad Peruana.

Contributors

Instituto Sanitas Sociedad Peruana

Publication/Creation

[1950]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/x9b9evsn

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org La eficacia de los bromuros como sedante ha sido confirmada por la experiencia de muchos años. La dificultad consistía en hacerlos tolerables a los pacientes que los necesitaban por tiempo prolongado, lo cual ha sido obtenido por la actual técnica.

De positiva acción sedante en todas las edades

EN LAS NEUROSIS, SINDROMES DE ANGUSTIA, IRRITABILIDAD, INSOMNIO.

Sedonil



EDONIL presenta la siguiente fórmula:

Bromuro de sodio	40	grs.
Cloruro de sodio	3.7	
Extracto (. crategus	3	
Extracto (, passiflora	3	"
Excipiente aromático		
c. s p.	100	CC.

Debido a sus componentes al agregar SEDONIL a agua hirviendo se obtiene un caldo de sabor a carne y legumbres, que disminuye el desagradable sabor de los bromuros. En esta forma los pacientes aceptan la terapéutica por tiempo prolongado, no disminuyendo el apetito ni provocando reacciones ante el medicamento.

Sedonil presenta las siguientes ventajas:

- Dosificación exacta de bromuro de sodio, que permite condicionarlo a los reguerimientos del paciente.
- Acción sinérgica ejercida por los extractos fluídos de crategus y passiflora, que contribuye a intensificar el efecto sedante del bromuro.
- Es un producto de amplias indicaciones, en especial los trastornos neurósicos, y los pequeños síntomas de éstos, como estados de angustia, irritabilidad, insomnio, etc.

SedoniL se emplea a la dosis de 1/2 a 1 medida, 2 a 3 veces al día según las necesidades del caso. Diluído en agua caliente, caldo o sopa, se obtiene una bebida de agradable sabor a carne y legumbres, que puede tomarse como sopa o como condimento junto a otros alimentos.

FRASCO DE 120 CC.