Liranol: clorhidrato de promacina "Wyeth" para tratamiento de alcoholicos, psicopatas y narcomanos agitados / Laboratorios Wyeth Interamericanos Inc.

Contributors

Laboratorios Wyeth Interamericanos Inc.

Publication/Creation

[1956]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/jb5tf6yf

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

Lirano1

Clorhidrato de promacina "Wyeth"

PARA TRATAMIENTO DE ALCOHOLICOS, PSICOPATAS Y NARCOMANOS AGITADOS

FORMULA:

Clorhidrato de promacina. Clorhidrato de gamma-dimetilamino-n-propil fenotiacina.

INDICACIONES:

Alcoholismo agudo.— Psicopatías con agitación psicomotriz.— Narcomanías con agitación aguda.

VIAS DE ADMINISTRACION:

Actúa en forma rápida por vía endovenosa, produciendo hipnosis a los 5 o 10 minutos, pero de la cual los pacientes pueden despertar para interrogárseles y atender sus necesidades corporales.

Se emplea también por vía intramuscular u oral.

CONTRAINDICACIONES:

Estados comatosos por sustancias farmacológicas que deprimen el sistema nervioso; arterioesclerosis cerebral, cardiopatía coronaria e hipotensión arterial.

PRESENTACION:

Tabletas de Liranol de 25, 50 y 100 mgr. Inyectables de Liranol de 50 mgr. por c.c.

Laboratorios Wyeth Interamericanos Inc.