

**Liranol : clorhidrato de promacina "Wyeth" para tratamientos de  
alcohólicos, picopatas y narcomanos agitados / Laboratorios Wyeth  
Interamericanos Inc.**

**Contributors**

Laboratorios Wyeth Interamericanos Inc.

**Publication/Creation**

[1957]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works;brvj24wg>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

# LIRANOL

Clorhidrato de promacina

“Wyeth”

PARA TRATAMIENTOS DE ALCOHOLICOS, PICOPATAS Y  
NARCOMANOS AGITADOS

#### FORMULA

Clorhidrato de promacina.

Clorhidrato de gamma-dimetilamino-n-propil fenotiacina.

#### INDICACIONES

Alcoholismo agudo.— Psicopatias con agitación psicomotriz.—  
Narcomanías con agitación aguda.— Pre-anestesia - vómitos post-  
anestésicos, náuseas de las gestantes, potencialización de los  
analgésicos.

#### VIAS DE ADMINISTRACION

Actúa en forma rápida por vía endovenosa, produciendo  
hipnosis a los 5 o 10 minutos pero de la cual los pacientes  
pueden despertar para interrogárseles y atender sus necesidades  
corporales.

Se emplea también por vía intramuscular u oral.

#### CONTRAINDICACIONES

Estados comatosos por sustancias farmacológicas que deprimen el sistema nervioso; arteriocleriosis cerebral, cardiopatía coronaria e hipotensión arterial.

#### PRESENTACION

Tabletas de Liranol de 25, 50 y 100 mgr.

Inyectables de Liranol de 50 mgr. por cc.

---

Laboratorios Wyeth Interamericanos Inc.