

**Arsenoterapia Acetylarsan : lo que es oportuno saber del: Acetylarsan /
Specia Productos Farmacéticos ; distribuidores para el Perú: Life.**

Contributors

R.P. Specia (Firm)
Laboratorios "Life"

Publication/Creation

[1951]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/vmbny67u>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



ARSENOTERAPIA

ACETYLARSAN

Lo que es oportuno saber del:

ACETYLARSAN

(4-oxi-3-acetilaminofenil-1-arsinato de dietilamina)

PROPIEDADES:

Preparado arsenical pentavalente químicamente puro, dotado de propiedades espirilicidas enérgicas y bien toleradas por el organismo.

INDICACIONES:

- 1) Sífilis en todos su períodos
Tratamiento de tanteo
Tratamiento ambulatorio o disimulado
Asociación con penicilina o con sales de bismuto
Sífilis visceral y nerviosa
Sífilis ocular
Heredo-Sífilis.
- 2) Espiroquetosis-ictero-hemorrágica-fiebre recurrente-pian-sodoku-bronquitis sangrante de Castellani.
- 3) Amibiasis.

PRESENTACION:

Acetylarsan adultos:

Ampollas de 3 cc. de solución acuosa al 23,6%
(cajas de 10 ampollas)
1 cm. 0, g 05 de arsénico.

Acetylarsan infantil:

Ampollas de 2 cm. de solución acuosa al 9,4%.
(cajas de 10 ampollas)
1 cm. 0, g 02 de arsénico.

POSOLOGIA Y MODO DE EMPLEO:

Inyecciones sub-cutáneas o intramusculares.

Adultos:

Serie de 16 inyecciones bi-hebdomadarias de 3 cc. (1ª. y 2ª. inyección: 1 y 2 cc.) con intervalo de un mes antes de iniciar la nueva serie.

Niños:

Calcular la posología sobre la base de 1 cg. 5 de producto activo por kilo de peso y a dosis progresivas (cuando el paciente pesa menos de 15 kilos utilizar Acetylarsan Infantil).

Peso del Niño	Primera Inyección	Interv.	Segunda Inyección	Interv.	Tercera Inyección	Interv.	Producto que debe utilizarse
3 - 4 kgs.	0 cc. 2	3 a 4 días	0 cc. 3	3 a 4 días	0 cc. 5	Inyecciones Semanales	Acetylarsan infantil
5 - 6 „	0 cc. 3		0 cc. 5		0 cc. 7		
7 - 8 „	0 cc. 4		0 cc. 7		1 cc.		
9 - 10 „	0 cc. 5		1 cc.		1 cc. 5		
11 - 12 „	0 cc. 6		1 cc. 2		1 cc. 7		
13 - 15 „	0 cc. 7	1 cc. 5	2 cc.	Inyecciones Semanales	Acetylarsan adultos		
15 - 18 „	0 cc. 3	3 a 4 días	0 cc. 6			3 a 4 días	1 cc.
19 - 22 „	0 cc. 4		0 cc. 8				1 cc. 2
23 - 26 „	0 cc. 5		1 cc.				1 cc. 5
27 - 30 „	0 cc. 6		1 cc. 2				2 cc.

CONTRAINDICACIONES:

Insuficiencia renal, Hipertensión arterial, Lesiones del fondo del ojo de origen no sifilítico, Insuficiencia hepática.

DISTRIBUIDORES PARA EL PERU:



Avenida Wilson 1550 — Lima — Apartado 3118