

**Arsenoterapia oral Stovarsol : lo que es oportuno saber del: Stovarsol /
Specia Productos Farmacéticos ; distribuidores para el Perú: Life.**

Contributors

R.P. Specia (Firm)
Laboratorios "Life"

Publication/Creation

[1950]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/dcznu74w>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



ARSENOTERAPIA ORAL

STOVAR SOL

Lo que es oportuno saber del:

STOVAR SOL

(ácido-4 oxi-3 acetilamino-fenil-1 arsinico)

PROPIEDADES:

Arsenical pentavalente, administrable por vía oral y dotado de una débil toxicidad no obstante su cantidad elevada en arsénico: 27,2%.

PRESENTACION:

Comprimidos de 0,25 (Fco. de 15 comprimidos)

Comprimidos de 0,05 (Fco. de 70 comprimidos)

Comprimidos de 0,01 (Fco. de 50 comprimidos)

INDICACIONES Y POSOLOGIA:

AMIBIASIS:

Adultos: 2-4 comprimidos de 0,25 al día, durante 7 a 10 días. Después de un período de descanso de 7 a 10 días, repetir el tratamiento.

Niños: 0,05 por cada año de edad, 4 días a la semana durante tres semanas.

LAMBLIASIS; ESPIRILOSIS INTESTINAL:

Posología igual a la utilizada en el tratamiento de la Amibiasis.

ENTERO-COLITIS CRIPTOGENETICAS, DIARREAS TOXI-INFECIOSAS:

2 comprimidos de 0,25 g por día por un período de 7 a 10 días. Repetir el tratamiento después de un descanso de 6 días.

COLITIS DESINTERIFORMES DE LA PRIMERA INFANCIA:

6 comprimidos de 0,1 g al día en tres veces, 4 días seguidos en la semana durante un mes.

DIARREA DE LOS TUBERCULOSOS:

1-3 comprimidos de 0,25 g al día, durante algunos días.

PIAN:

Tratamiento progresivo y regresivo:

- 1er. día 2 comprimidos de 0,25 g
- 2º. día 3 comprimidos de 0,25 g
- 4º. día 4 comprimidos de 0,25 g
- 6º. día 3 comprimidos de 0,25 g
- 8º. día 2 comprimidos de 0,25 g

Luego un comprimido cada 3 días, la semana siguiente, o sea una dosis total, de 4 g. para un tratamiento.

TIFUS RECURRENTE:

Dosis oral única de 1,5 g en el adulto y de 0,8 g por año de edad en el niño.

ASOCIACIONES FUSO-ESPIRILARES:

Angina de Vincent, ciertas estomatitis, úlcera fagedénica, bronquitis sangrante de Castellani, (bronquitis fétida) 1 a 4 comprimidos de 0,25 g en 24 horas.

INDICACIONES VARIAS:

Piorrea alveolo-dental, líquen plano.

CONTRAINDICACIONES:

Insuficiencia hepática o renal, lesiones del fondo del ojo.

DISTRIBUIDORES PARA EL PERU:



Avenida Wilson 1550 — Lima — Apartado 3118