

**Tropiezos ... : Proteja al paciente... estimulando formación de leucocitos... /  
The Armour Laboratories.**

**Contributors**

Armour Laboratories

**Publication/Creation**

[1947]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/ffqhu6g9>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome  
collection**

Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

# TROPIEZOS



Los trastornos del equilibrio constituyen uno de los signos característicos de las complicaciones neurales en la anemia perniciosa. Se manifiestan por cierta inseguridad al caminar, con tendencias al tropiezo o a la caída. Estos síntomas pueden constituir el primer indicio de anemia, o pueden aparecer mas tarde en el transcurso de la enfermedad. De cualquier modo, la mayoría de las autoridades médicas están de acuerdo en que un adecuado y efectivo tratamiento es esencial para prevenir el progreso de las manifestaciones neurológicas. Si la anemia no se trata adecuadamente, las complicaciones neurales pueden hacerse progresivas, incapacitando al paciente.

Por estas razones es imperativo que la preparación hepática que Ud. prescriba o administre sea terapéuticamente efectiva y de indiscutible potencia. Debe recordarse que no es la substancia hepática en si sino los principios hematopoyéticos y factores secundarios contenidos en el hígado los que estimulan la formación de la sangre.

En la preparación de los Extractos de Hígado Armour, se toman toda clase de precauciones para preservar los constituyentes activos del hígado fresco. Los Laboratorios Armour tienen a su alcance el mayor abastecimiento del mundo de materias primas de origen animal. Se emplean solamente hígados de ganado joven, saludable, en pleno periodo de crecimiento.

Los científicos y técnicos de Armour son expertos en escoger, analizar y procesar los productos de origen animal. Sus equipos son los mejores disponibles. Cada lote de producto terminado, se ensaya sobre pacientes de anemia perniciosa en recaída, para así comprobar su potencia hematopoyética de acuerdo con los requisitos de la Comisión Consultiva sobre preparaciones Antianémicas de la Farmacopea de los Estados Unidos.

*Tenga confianza en la preparación que Ud. prescriba o administre—Especifique "ARMOUR"*

## Preparaciones de Hígado Armour

### Extracto de Hígado Parenteral (Crudo)

1 y 4 Unidades Inyectables F. E. U. por cc. en frasquitos de 10 cc. Una preparación que conserva los factores hematopoyéticos menores y el contenido vitamínico original del hígado.

### Extracto de Hígado Parenteral (Refinado)

15 Unidades Inyectables F. E. U. por cc. en frasquitos de 1, 5 y 10 cc. Un producto altamente purificado y concentrado para la administración de dosis masivas.

### Solución de Extracto de Hígado (Oral)

Cada 45 cc. (tres cucharadas) representan 1 Unidad Oral F. E. U.—Una preparación asimilable, terapéuticamente activa, para aquellos casos en que se prefiere la vía oral.

**THE ARMOUR LABORATORIES**

• CHICAGO 9, ILLINOIS

*Centro principal de productos medicinales de origen animal*



**Proteja al Paciente . . .  
ESTIMULANDO LA  
FORMACIÓN DE  
LEUCOCITOS**



*F. Netter  
M.D.*

Mieloblasto



Mielocito



Metamielocito



Lobocito



La destrucción de los Leucocitos es uno de los efectos dañinos que pueden resultar ocasionalmente del tratamiento quimioterápico con sulfamidados o arsénicos. Clínicamente las primeras señales son el mal color y el decaimiento e inquietud del paciente.

La Médula Osea Amarilla Concentrada Armour es de gran valor en este tipo de granulocitopenia, así como también en la angina agranulocítica. Dentro de las 48 horas después de haberse comenzado este tratamiento se nota cierta mejoría en el paciente, seguido de un aumento progresivo de granulocitos.

En casos muy severos la Médula Osea Amarilla Concentrada Armour puede ser administrada en dosis de una cucharadita cada cuatro horas hasta obtener la mejoría clínica y hematológica deseada. La dosis puede entonces ser reducida. Es innecesario decir que los sulfamidados u otras drogas irritantes deben suprimirse tan pronto como estos efectos nocivos sean notados.

Después de la fase crítica y en los casos menos severos la Médula Osea Amarilla Concentrada Armour en glánules (cápsulas de gelatina selladas) puede ser empleada ventajosamente en dosis 2 a 3 glánules tres veces día.



Frasquitos goteros de 15 cc.  
Cápsulas de gelatina selladas  
(glánules) en cajas de 25,  
50 y 100.

**THE ARMOUR LABORATORIES**

**Chicago 9, Illinois**

*Tenga confianza en la preparación que Ud. prescriba—Especifique "ARMOUR"*