

**Saproxyl ... : Hormantoxone, principio antitóxico del hígado, concentrado y purificado ... / "AMS" Associated Medicinal Specialities, S.A.**

**Contributors**

Associated Medicinal Specialities

**Publication/Creation**

[1946]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/wkqg3yve>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome  
collection**

Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

# SAPROXYL

●

Enteritis agudas, subagudas o crónicas.  
Gastroenteritis — Colitis (colon ascen-  
dente o transverso), — Fermentaciones  
nocivas — Putrefacción intestinal —  
Diarreas — Infecciones intestinales es-  
pecíficas: fiebres tifoideas y paratifo-  
ideas, disenterías, colerinas, etc.

●

“AMS”

Associated Medicinal Specialties, S. A.

APARTADO 1658

HABANA

TELEF. FO-1774

# HORMANTOXONE

Principio Antitóxico del Hígado, Concentrado y Purificado

## *Indicaciones*

- I. **Insuficiencia de la función antitóxica del hígado** (cirrosis, ictericias, hepatismo, litiasis biliar).
- II. **Auto y hetero-intoxicaciones:** (uremia, intoxicaciones alimenticias y microbianas, toximánias, etilismo, psicosis, toxemias gravídicas, vómitos incoercibles del embarazo, pre-eclampsia, intolerancias medicamentosas, intoxicaciones medicamentosas).
- III. **Toxi-infecciones:** (coadyuvante de la seroterapia específica). Psicosis infecciosas, cuidados pre y post-operatorios, colecistitis y pericolecistitis.
- IV. **Anafilaxis-Intolerancias alimenticias:** asma, urticaria, jaqueca, accidentes séricos, estrofulus y fiebre del heno.
- V. **Dermatosis:** eczemas, pruritos, eritemas, edema de Quincke.
- VI. **Oligurias.**
- VII. **Insuficiencias hepáticas de la infancia** (vómitos biliosos, vómitos periódicos, acetonémicas, intoxicaciones alimenticias, hepatitis crónica latente, irritabilidad, "cansancio hepático", intolerancias medicamentosas, intolerancias alimenticias, urticaria, pruritos, prúrigo strophulus, enfermedades infecciosas-es-carlatina, tifoidea, difteria, etc.)

## *Posología*

### **Glóbulos.**

Esta forma es para adultos y también para niños bastante grandes para poder tragarlos. Los niños menores de 15 años tomarán la mitad o tercera parte de la dosis indicada para adultos.

Los glóbulos no contienen azúcar y pueden ser administrados a diabéticos.

**Casos graves y agudos.** 6 a 9 glóbulos diarios, tomados a razón de 2 a 3 glóbulos con un poco de agua antes de cada una de las principales comidas.

**Casos medianos.** 5 a 6 glóbulos diarios, tomados antes de las comidas.

**Insuficiencias crónicas.** 3 a 4 glóbulos diarios antes de las comidas.

## "AMS"

**Associated Medicinal Specialties, S. A.**

APARTADO 1658

HABANA

TELEF. FO-1774