

**Colchiperina antirreumático ... / Brandiere y Cía Lboratorios.**

**Contributors**

Brandiere y Cía

**Publication/Creation**

[1956]

**Persistent URL**


<https://wellcomecollection.org/works/f52d2d49>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



# Colechipirina

HOUDE

antirreumático

a ntiflogístico

a nti-inflamatorio

a nti-álgico

a ntipirético

a tóxico

BRANDIERE y Cía.

Laboratorios

**Composición:**

Vitamina B<sub>1</sub>  
Colchicina  
Ácido acetilsalicílico

**Presentación:**

Grageas con capa entérica (fr x 40)

**Posología**

4 a 6

grageas al día  
durante 10 a 15  
días al mes  
Ninguna contraindicación

La COLCHIPIRINA constituye el tratamiento de fondo de la diátesis reumásica, gracias a su efectividad sobre la sintomatología dolorosa y febril de las manifestaciones inflamatorias y de los brotes evolutivos de las artrosis.

Perfectamente tolerada, la COLCHIPIRINA respeta la integridad del tubo digestivo y sus anexos y no provoca acostumbramiento ni fenómenos de acumulación.



BRANDIERE Y CIA. MIEMBROS DE LA A. L. C.

1956