

**Asadul medicación estimulante y protectora de la célula hepática ... :  
Septiyodina quimoterapia de las infecciones / Laboratorios Aliados de  
America, L.A.D.A.**

**Contributors**

Laboratorios Aliados de America

**Publication/Creation**

[1941]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/bcn9n79z>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome  
collection**

Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

LABORATORIOS ALIADOS DE AMERICA, S. A.

AVENIDA 8a., ENTRE 3 y 4

BUENAVISTA,

(MARIANO)



# ASADUL

Medicación estimulante y protectora de la célula  
Hepática

## FORMULA:

Acido cólico .....	3.50	''
Peptona pura .....	14.29	''
Hexametilentetramina .....	6.00	''
Sulfato de magnesio .....	36.21	''
Sacarosa aromatizada, c. s. p.....	100.00	''

## INDICACIONES:

De acción colagoga y colerética enérgica. Está indicada en la Angiocolitis y Colecistitis Litiasis biliar, constipación por hipocolia, insuficiencia funcional del hígado. Estados anafilácticos (asma, jaqueca, urticaria).

## DOSIS:

Como drenaje: la tapa medida bien llena. Como anti-anafiláctico: una cucharadita rasa  $\frac{3}{4}$  de hora antes de las comidas. En la insuficiencia hepática, colemia familiar, & &, una medida en ayunas, dos o tres veces a la semana.

En frascos de 135 gramos, (c/ su tapa-medida).

**"ANTE TODO NUESTRO PRESTIGIO"**

LABORATORIOS  
ALIADOS  
DE AMERICA

L.A.D.A.

# SEPTIYODINA

Quimioterapia de las infecciones

## FORMULA:

Yodometilformina .....	0.318	grs.
Formina .....	0.050	"
Suero isotónico .....	5	c.c. "

## INDICACIONES:

En todas las infecciones agudas: septicemias; piohemias; bronconeumonía, fiebre tifoidea; fiebre puerperal, pielitis, adenoiditis; salpingitis, & &.

## DOSIS:

Por vía endovenosa, de 5 a 20 c.c. diarios, o sea de 1 a 4 ampolletas.

## PRESENTACION:

Cajas de 5 y 10 amps. de 5 c.c.

*Muestras y folletos a disposición de los Sres. Médicos.*

AVENIDA 8a. ENTRE 3a. Y 4a.

BUENAVISTA-MARIANAC

"ARGUS"