

Noctinal butabarbital sodico Frosst : hipnotico inofensivo de acción rapida y sedativa : intensificador de los analgesicos, sin efectos secundarios / Charles E. Frosst & Co. ; representantes para Cuba: Distribuidora Cubana.

Contributors

Charles E. Frosst & Co.
Distribuidora Cubana

Publication/Creation

[1950]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/qs2ru72d>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

NOCTINAL

BUTABARBITAL SODICO

Frossi

HIPNOTICO INOFENSIVO DE ACCION RAPIDA Y SEDATIVA;
INTENSIFICADOR DE LOS ANALGESICOS, SIN EFECTOS SECUNDARIOS

Sedativo de acción rápida que produce efecto en $\frac{1}{2}$ hora, y dura de 4 a 6 horas. Los pacientes se despiertan despejados y sin efectos secundarios, después de un sueño reparador.

"NOCTINAL" posee además las siguientes ventajas:

"NOCTINAL" no es peligroso; la relación entre su valor terapéutico y tóxico es muy amplia, siendo fácilmente eliminado.

"NOCTINAL", suministrado incluso en exceso de la dosis terapéutica completa, no produce prácticamente ningún efecto sobre el corazón, presión sanguínea, respiración o riñones.

"NOCTINAL" es un producto intermedio entre los barbituratos de corta acción, como el pentobarbital, y los de acción prolongada, como el fenobarbital.

"NOCTINAL" es la droga que deberá elegirse siempre que se desee utilizar un barbiturato como sedativo general.



NOCTINAL

BUTABARBITAL SODICO

Frosst

HIPNOTICO INOFENSIVO DE ACCION RAPIDA Y SEDATIVA;
INTENSIFICADOR DE LOS ANALGESICOS, SIN EFECTOS SECUNDARIOS

INDICACIONES Y DOSIS

“NOCTINAL” EN MEDICINA

Insomnio, Nervosismo, Neurosis Menopáusica, Fatiga Excesiva
y otras Neurosis y Psicosis.

Para el Insomnio: 0,097 Gm. aproximadamente media hora antes de acostarse.

Cuando se requiera un ligero sedativo continuo: De 0,032 a 0,097 Gm. dos o tres veces al día.

En estado de excitación: De 0,097 a 0,195 Gm. dos o tres veces por día.

Niños: De acuerdo con la edad y estado físico.

Los mejores resultados se obtienen, si después de suministrada la dosis de “NOCTINAL”, se toma agua caliente, té o leche.

“NOCTINAL” EN OBSTETRICIA

Vómitos del embarazo: De 0,032 a 0,065 Gm. según se requiera.

NOCTINAL

FORMAS DE PRESENTACION

“NOCTINAL” 0,097 Gm. No. 353 “Frosst”

Frascos de 20 y 40 tabletas.

Charles E. Frosst & Co.
MONTREAL, CANADA

Representantes para Cuba:
DISTRIBUIDORA CUBANA
INDUSTRIA, 508 - TELF. M-8436
LA HABANA