

**Orquisteron-L "Frosst" : suspensión acuosa de testosterona libre / Charles E. Frosst & Co. ; distribuidores para Cuba: Distribuidora Cubana.**

**Contributors**

Charles E. Frosst & Co.  
Distribuidora Cubana

**Publication/Creation**

[1950]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/x3r72r6q>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome  
collection**

Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

# ORQUISTERON-L

"Frosst"

## SUSPENSION ACUOSA DE TESTOSTERONA LIBRE

### DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACION

Para empezar, será conveniente proceder con la administración de una dosis total igual a la de la solución oleosa. Por ejemplo, si se inyectan 25 mg. de Orquisterón en aceite, dos veces por semana, la dosis de **ORQUISTERON-L** debe ser de 50 mg. en una sola dosis semanal. El efecto producido en el paciente determinará el nivel futuro de las dosis. Si el paciente no hubiere usado Orquisterón en solución oleosa, se le indicará una dosis semanal de **ORQUISTERON-L** igual a la suma de las dosis semanales, que se le habrían indicado en el caso de usar la solución oleosa.

El **ORQUISTERON-L** se administra por inyección intramuscular. Si se administra subcutáneamente la inyección es dolorosa, y causa una placa congestiva, cuya induración puede tomar de 15 a 20 días. Se recomienda retraer el émbolo de la jeringa antes de inyectar, para no permitir a los cristales penetrar en la corriente sanguínea.

Algunos pacientes acusan un dolor tardío en el lugar de la inyección, que aparece a las 8 o 10 horas. Este dolor, que nunca es fuerte, desaparece siempre alrededor de las 24 horas, y en vista del menor número de inyecciones que se requiere en cada mes, no debe ser considerado como un obstáculo para el uso de la suspensión.

### FORMAS DE PRESENTACION:

Bulbo x 10 cc. No. 573 con 25 mg. x cc.  
Bulbo x 5 cc. No. 574 con 100 mg. x cc.

Se debe agitar vigorosamente el bulbo antes de retirar el contenido, para asegurar una distribución uniforme de los cristales en la suspensión. La obstrucción de la jeringa durante la inyección, se puede prevenir usando una aguja calibre 21.

Charles E. Frosst & Co.  
MONTREAL CANADA

Representantes para Cuba:  
**DISTRIBUIDORA CUBANA**  
INDUSTRIA, 508 TELF. M-8436  
LA HABANA

# ORQUISTERON-L

"Frosst"

## SUSPENSION ACUOSA DE TESTOSTERONA LIBRE


Una nueva forma de testosterona, para administración por vía intramuscular, se presenta bajo el nombre de **ORQUISTERON-L**. Es una suspensión acuosa de microcristales de testosterona libre. Se puede obtener el mismo fin con este preparado que con Orquisterón - P, (que es una solución oleosa de propionato de testosterona) pero en algunos casos la administración de la substancia microcristalina ofrece ventajas adicionales.

Aunque el efecto hormonal de testosterona, proporcionado por los microcristales, no se consigue en forma tan rápida como cuando se inyecta Orquisterón - P, la duración de su efecto alcanza un período más largo, que puede variar de 4 a 7 días en distintos pacientes. Se forman depósitos de cristales, de donde la absorción procede lentamente, y algunos facultativos administran regularmente **ORQUISTERON-L** a pacientes que requieren un curso prolongado de tratamiento, dado que puede reducirse la frecuencia de las inyecciones.

Rara vez, con el Orquisterón-P, la sensibilidad individual al vehículo que se emplea, puede causar reacciones después de la inyección intramuscular. Estas reacciones pueden producirse con cualquiera de los vehículos comunmente usados —aceite de mani, maíz o sésamo— y aparecen como manifestaciones alérgicas o de irritación local en el lugar de la inyección. La administración de **ORQUISTERON-L** no presenta dichos efectos y puede usarse con éxito en tales pacientes.

Dado que el efecto hormonal producido por el **ORQUISTERON-L** se mantiene, como antes se ha expuesto, durante un período de 4 a 7 días, dependiendo del paciente, no se puede llegar a una conclusión definitiva sobre la dosis de mantenimiento. La observación de los beneficios obtenidos, permitirá calcular para cada paciente la cantidad y frecuencia de las dosis subsiguientes.

En general, el **ORQUISTERON-L** es de utilidad en los casos en que el tratamiento deba ser prolongado, o cuando las soluciones oleosas produzcan efectos desfavorables.



NUESTRO  
ANIVERSARIO  
50

