

**Ostoco gotas : preparado hidrosoluble de multivitaminas con yoduro de sodio / Charles E. Frosst & Co. ; distribuidores para Cuba: Distribuidora Cubana.**

**Contributors**

Charles E. Frosst & Co.  
Distribuidora Cubana

**Publication/Creation**

[1950]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/x4vck63y>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

# OSTOCO

GOTAS

PREPARADO HIDROSOLUBLE DE MULTI-  
VITAMINAS CON YODURO DE SODIO

## FORMULA

INGREDIENTES POR C.C.

Vitamina A . . . . .	8.000 Un. Int.
Vitamina D . . . . .	4.000 Un. Int.
Vitamina B <sub>1</sub> (Cloruro de Tiamina) . . . . .	4 mg.
Vitamina C (Acido Ascórbico) . . . . .	120 mg.
* Niacinamida . . . . .	10 mg.
Yoduro de Sodio . . . . .	0.023 mg.

\* No mencionado en la etiqueta.

## MODO DE EMPLEO

**PARA INFANTES:** De 5 a 10 gotas de OSTOCO (0.25 a 0.5 cc.) contadas con el gotero de precisión y añadidas a un pomo de la dieta diaria, una vez que el mismo se haya refrescado.


**PARA NIÑOS MAYORES:** De 5 a 10 gotas (0.25 a 0.5 cc.) diarias, mezcladas en un vaso de leche, cocoa, etc.

Si fuera necesario, debido a su sabor agradable, las gotas OSTOCO pueden ser administradas directamente dentro de la boca del infante o niño.

En las gotas OSTOCO se presenta la dosis promedio y los requerimientos completos de niños e infantes, de las vitaminas A, D, B<sub>1</sub>, C y Niacinamida, conjuntamente con mínimas cantidades de yodo; éste último para la profilaxis contra las deficiencias de este metaloide.

## PRESENTACION

Frascos de 8 cc., 15 cc. y 30 cc., con gotero de precisión.



NUESTRO **50** ANIVERSARIO



# OSTOCO

## GOTAS

POSEE UNA POTENCIA RACIONAL  
Y ADECUADA

Una dosis de 5 gotas diarias es suficiente para los infantes  
de 3 ó menos años de edad

Vitamina o Mineral	Requerimiento diario de infantes	5 Gotas OSTOCO (1/4 cc.)	24 onzas de leche (promedio ingerido)	Ingestión total diaria 5 gotas OSTOCO y 24 onzas de leche
A . . . . .	1500-2000 U. I.	2000 U. I.	1410 U. I.	3410 U. I.
D . . . . .	400-800 U. I.	1000 U. I.		1000 U. I.
B <sub>1</sub> (Clorhidrato de Tiamina) . . . . .	0.4-0.6 mg.	1 mg.	0.333 mg.	1.333 mg.
B <sub>2</sub> (Riboflavina) . . . . .	0.6-0.9 mg.		1.6 mg.	1.6 mg.
C (Acido Ascór- bico) . . . . .	30-35 mg.	30 mg.	10.5 mg.	40.5 mg.
Niacinamida . . . . .	4-6 mg.	2.5 mg.	7.344 mg.	9.844 mg.
Yodo en forma de Yoduro Sódico . . . . .	0.006 mg.	0.006 mg.		0.006 mg.

Una dosis de 10 gotas diarias es suficiente para niños prematuros,  
para otros casos excepcionales y para niños hasta la edad de 12 años

Vitamina o Mineral	Cantidad diaria requerida para niños de 3 a 12 años	10 Gotas OSTOCO (1/2 cc.)	24 onzas de leche (promedio ingerido)	Ingestión total diaria 10 gotas OSTOCO y 24 onzas de leche
A . . . . .	2500-4500 U. I.	4000 U. I.	1410 U. I.	5410 U. I.
D . . . . .	400-800 U. I.	2000 U. I.		2000 U. I.
B <sub>1</sub> (Clorhidrato de Tiamina) . . . . .	0.8-1.2 mg.	2 mg.	0.333 mg.	2.333 mg.
B <sub>2</sub> (Riboflavina) . . . . .	1.2-1.8 mg.		1.6 mg.	1.6 mg.
C (Acido Ascór- bico) . . . . .	50-75 mg.	60 mg.	10.5 mg.	70.5 mg.
Niacinamida . . . . .	8-12 mg.	5 mg.	7.344 mg.	12.344 mg.
Yodo en forma de Yoduro Sódico . . . . .	0.012 mg.	0.012 mg.		0.012 mg.

Datos tomados de las recomendaciones del Wisconsin Alumnae Research Foundation  
sobre los requerimientos de vitaminas de leche total.

Charles & Frossi & Co.  
MONTREAL CANADA

Representantes para Cuba:  
**DISTRIBUIDORA CUBANA**  
INDUSTRIA, 508 - TEL. M-8436  
LA HABANA