

Ostoco gotas "Frosst" : preparado hidrosoluble de multivitaminas con yoduro de sodio / Charles E. Frosst & Co. ; distribuidores para Cuba: Distribuidora Cubana.

Contributors

Charles E. Frosst & Co.
Distribuidora Cubana

Publication/Creation

[1950]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/jc3gfgqw>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

OSTOCO

GOTAS
"Frosst"

PREPARADO HIDROSOLUBLE DE
MULTI-VITAMINAS CON YODURO DE SODIO

FORMULA

INGREDIENTES POR CC.

Vitamina A	8.000 Un. Int.
Vitamina D	4.000 Un. Int.
Vitamina B ₁ (Clorhidrato de Tiamina)	4 mg.
Vitamina C (Acido Ascórbico)	120 mg.
Niacinamida	10 mg.
Yoduro de Sodio	0.023 mg.

* No mencionado en la etiqueta.

MODO DE EMPLEO

PARA INFANTES: De 5 a 10 gotas de OSTOCO (0.25 a 0.5 cc.) contadas con el gotero de precisión y añadidas a un pomo de la dieta diaria, una vez que el mismo se haya refrescado.


PARA NIÑOS MAYORES: De 5 a 10 gotas (0.25 a 0.5 cc.) diarias, mezcladas en un vaso de leche, cocoa, etc.

Si fuera necesario, debido a su sabor agradable, las gotas OSTOCO pueden ser administradas directamente dentro de la boca del infante o niño.

En las gotas OSTOCO se presenta la dosis promedio y los requerimientos completos de niños e infantes, de las vitaminas A, D, B₁, C y Niacinamida, conjuntamente con mínimas cantidades de yodo; éste último para la profilaxis contra las deficiencias de este metaloide.

PRESENTACION

Frascos de 8 cc. y 30 cc., con gotero de precisión.



OSTOCO

GOTAS

"Frossl"

POSEE UNA POTENCIA RACIONAL Y ADECUADA

Una dosis de 5 gotas diarias es suficiente para los infantes de 3 ó menos años de edad.

Vitamina o Mineral	Requerimiento diario de infantes	5 Gotas OSTOCO (1/4 cc.)	24 onzas de leche (promedio ingerido)	Ingestión total diaria 5 gotas OSTOCO y 24 onzas de leche
A	1500-2000 U.I.	2000 U.I.	1410 U.I.	3410 U.I.
D	400-800 U.I.	1000 U.I.		1000 U.I.
B ₁ (Clorhidrato de Tiamina)	0.4-0.6 mg.	1 mg.	0.333 mg.	1.333 mg.
B ₂ (Riboflavina)	0.6-0.9 mg.		1.6 mg.	1.6 mg.
C (Acido Ascórbico)	30-35 mg.	30 mg.	10.5 mg.	40.5 mg.
Niacinamida	4-6 mg.	2.5 mg.	7.344 mg.	9.844 mg.
Yodo en forma de Yoduro Sódico	0.006 mg.	0.006 mg.		0.006 mg.

Una dosis de 10 gotas diarias es suficiente para niños prematuros, para otros casos excepcionales y para niños hasta la edad de 12 años.

Vitamina o Mineral	Cantidad diaria requerida para niños de 3 a 12 años	10 Gotas OSTOCO (1/2 cc.)	24 onzas de leche (promedio ingerido)	Ingestión total diaria 10 gotas OSTOCO y 24 onzas de leche
A	2500-4500 U.I.	4000 U.I.	1410 U.I.	5410 U.I.
D	400-800 U.I.	2000 U.I.		2000 U.I.
B ₁ (Clorhidrato de Tiamina)	0.8-1.2 mg.	2 mg.	0.333 mg.	2.333 mg.
B ₂ (Riboflavina)	1.2-1.8 mg.		1.6 mg.	1.6 mg.
C (Acido Ascórbico)	50-75 mg.	60 mg.	10.5 mg.	70.5 mg.
Niacinamida	8-12 mg.	5 mg.	7.344 mg.	12.344 mg.
Yodo en forma de Yoduro Sódico	0.012 mg.	0.012 mg.		0.012 mg.

Datos tomados de las recomendaciones del Wisconsin Alumnae Research Foundation sobre los requerimientos de vitaminas de leche total.

Charles E. Frossl & Co.
MONTREAL CANADA

Representantes para Cuba:
DISTRIBUIDORA CUBANA
INDUSTRIA, 509 - TELF. M-8436
LA HABANA