

**Teodiamil (teofilina etilenodiamina) "Frosst" / Charles E. Frosst & Co. ;
distribuidores exclusivos para Cuba: Distribuidora Cubana.**

Contributors

Charles E. Frosst & Co.
Distribuidora Cubana

Publication/Creation

[1948]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/arbzs5g6>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

TEODIAMIL

(Teofilina etilenodiamina)
"Frosst"

Para el tratamiento del Dolor Cardíaco, Angina de pecho, esclerosis coronaria, trombosis coronaria, efectos tardíos de la Aortitis y ataques agudos de asma.

TOXICIDAD

Rara vez produce efectos tóxicos. Sin embargo, una dosis excesiva de "Teodiamil" (al igual que la cafeína y otros derivados de axantina) puede producir en pacientes susceptibles, cefalea, náuseas y albuminuria.

FORMAS DE PRESENTACION

"TEODIAMIL"

No. 411, "Frosst"

Teodiamil 0,19 g.

"TEODIAMIL"

con "NOCTINAL"

No. 412, "Frosst"

Teodiamil 0,19 g.

°Noctinal 0,032 g.

La cubierta entérica de la pastilla previene la irritación gástrica.

°Barbiturado de sodio etil secundario "Frosst".

Se suministra en frascos de 50 y 100 pastillas.

DOSIS

Una pastilla dos o tres veces al día.



Representantes Exclusivos para Cuba:

DISTRIBUIDORA CUBANA

INDUSTRIA 508

TELEF.: M-8436 - A-7684

HABANA, CUBA





TEODIAMIL

(Teofilina etilenodiamina "Frosst")

Para el tratamiento del Dolor Cardíaco, Angina de Pecho, Esclerosis Coronaria, Trombosis Coronaria, efectos tardíos de la Aortitis y ataques agudos de Asma

USOS TERAPEUTICOS

La administración de "Teodiamil" a los pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca produce un gran alivio, ya que dilata las arterias coronarias y aumenta la cantidad de sangre suministrada al músculo cardíaco, contribuyendo a que el límite del esfuerzo necesario se aumente sin intensificación del dolor. La adición de una pequeña dosis de "Noctinal" produce un efecto de gran valor en el paciente inquieto, preocupado y agitado por el esfuerzo, a quien devuelve su tranquilidad alterada. El "Noctinal" es un calmante que obra rápidamente, produce efecto en media hora y cuya acción dura de 4 a 6 horas, sin dejar ninguna sensación de abatimiento. Se ha visto que la combinación de "Teodiamil" con "Noctinal" es especialmente útil en aquellos casos en que es necesario evitar al paciente la administración de un exceso de calmante.

El "Teodiamil" se absorbe rápidamente (una concentración elevada aparece inmediatamente en la sangre) y su efectos persisten durante varias horas. A este respecto posee ciertas ventajas sobre algunos compuestos de acción lenta como el salicilato sódico de teobromina, el salicilato sódico de cafeína, y la teofilina; y, por otra parte, sobre otros compuestos de acción rápida pero transitoria, tales como el nitrito de amilo, la nitroglicerina y el nitrito sódico. Es también un poderoso diurético, aumentando la circulación sanguínea a través de los riñones y actuando directamente como estimulante de la secreción renal.

Charles E Frosst & Co.

MONTREAL

CANADA

Organización canadiense

Manufacturera de productos farmacéuticos, establecida en 1899