

**3 nuevas preparaciones de Glaxo : Premenstril, regulador de la tensión premenstrual : Ammenostril, regulador de la amenorrea : Menostril, regulador del síndrome menopáusico / Glaxo Laboratories Ltd., Greenford, Inglaterra.**

**Contributors**

Glaxo Laboratories

**Publication/Creation**

[1956]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/bh5ygaju>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

3 nuevas preparaciones de Glaxo



**Premenstril**  
M.R. Sol.

*regulador de la Tensión  
Premenstrual*



**Ammenstril**  
M.R. Sol.

*regulador de la Amenorrea*



**Menostril**  
M.R. Sol.

*regulador del Síndrome  
Menopáusico*

## **Premenostril tabletas**

mujeres normales son afectadas consistentemente por la tensión premenstrual cuya sintomatología, inestabilidad emocional, cefalea, náuseas, irritabilidad, se presenta unos diez días antes del inicio de la menstruación para cesar bruscamente con su aparición.

La tensión premenstrual obedece, según algunos investigadores, a un desequilibrio o alteración del coeficiente progesterona/estrógeno con aumento de la actividad estrogénica, que puede ser regulado con la administración de progestógeno.

Las Tabletas de Premenostril resuelven eficaz y convenientemente los trastornos de la tensión premenstrual por su contenido de Etisterona (Progesterona activa por vía bucal) y de vitamina B<sub>12</sub>, a cuya efectiva influencia sobre el bienestar general se añade su acción sobre los síntomas psiconeurológicos que acompañan a este síndrome.

La dosis usual de PREMENOSTRIL es de 1 a 2 Tabletas diarias durante los quince días que anteceden a la fecha probable de la menstruación.

*Cada Tableta contiene: Etisterona 5 mg.; Vitamina B<sub>12</sub> 50 mg.; Frascos de 25 Tabletas*



## **Ammenostril tabletas**

El tratamiento de la amenorrea se reduce hoy a su más simple expresión con AMMENOSTRIL, nueva preparación hormonal oral, cuya administración se limita a solo CINCO días de cada mes.

AMMENOSTRIL Tabletas contiene los principios activos por vía bucal de las hormonas etinil-estradiol y etisterona. Los resultados han evidenciado que esta combinación hormonal no solo restablece el ciclo menstrual (amenorrea secundaria) sino que es capaz de estimular su espontánea aparición (amenorrea primaria).

La dosis de AMMENOSTRIL es de 1 Tableta cuatro veces al día durante los últimos CINCO días del 'ciclo'. Este tratamiento se repetirá cada 28 días por tres o cuatro meses.

*Cada Tableta contiene: Etinil-estradiol 0.01 mg.; Etisterona 10.00 mg.; Frascos de 25 Tabletas*



## **Menostril tabletas**

El más exacto conocimiento del proceso íntimo de la menopausia y la disipación de las muchas supersticiones y concepciones erróneas que la envolvían no ha impedido que gran número de mujeres la anticipen con verdadera aprehensión. Este temor carece de justificación en el momento actual porque MENOSTRIL, nueva preparación hormonal Glaxo, controla efectiva y rápidamente la mayoría de los trastornos físicos y psíquicos que la acompañan.

MENOSTRIL es una asociación de etinil-estradiol y metil-testosterona que controla cabalmente la molesta sintomatología del climaterio femenino. Además, MENOSTRIL participa de la acción sedante de Carbromal y de la benéfica que la vitamina B<sub>12</sub> imparte al bienestar general.

Las 'llamaradas de calor', la disnea, el insomnio, la irritabilidad y las algias reumáticas que aparecen al iniciarse la menopausia, así como la kraurosis vulvar, el prurito vulvar y la vaginitis senil que aparecen más tardíamente, desaparecen o mejoran marcadamente con esta medicación. La dosis usual de MENOSTRIL es de 1 a 2 Tabletas dos o tres veces al día hasta obtener la sedación de los síntomas.

*Cada Tableta contiene: Etinil-estradiol 0.2 mg.; Metil-testosterona 1.0 mg.; Carbromal 50.0 mg.; Vitamina B<sub>12</sub> 10.0 mcg. Frascos de 25 Tabletas*



GLAXO LABORATORIES LTD GREENFORD, ENGLATERRA