Administración por instilación gástrica "gota a gota" contínua de Aldrox / John Wyeth & Brother Incorporated.

Contributors

John Wyeth & Brother

Publication/Creation

[1943]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/bqqjprse

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

Administración por instilación gástrica "Gota a Gota" contínua de ALDROX



Se han obtenido resultados sorprendentes al administrar el ALDROX por el método de instilación gástrica "gota a gota" contínua (Los rayos X de los casos tratados comprueban que se ha obtenido la cicatrización completa en el plazo de 7 a 10 días después de instituirse el tratamiento.)

Ataques de dolor, severos y frecuentes,

pueden indicar la conveniencia de recurrir al método de instilación gástrica contínua con ALDROX. Este tratamiento puede seguirse en la casa del enfermo, lo mismo que en hospitales y clínicas. Así se obtiene el control adecuado e ininterrumpido de los elementos irritantes durante aquellos períodos en que conviene un medicamento contínuo. Los adelantos en la técnica del aparato instilatorio han aumentado grandemente la utilidad de este método.

El método consiste en diluir una parte de ALDROX en tres partes de agua; la dilución es instilada contínuamente en el estómago por medio de una sonda naso-esofágica, a razón de 15 gotas por minuto, día y noche. La sonda debe llegar sólo hasta la parte inferior del esófago. Es importante que la sonda no pase dentro del estómago mismo, para evitar que el quimo obstruya el orificio de salida. No es necesario sacar la sonda para alimentar al sujeto.



EL ALDROX puede obtenerse en frascos de 175 cc.



JOHN WYETH & BROTHER, INC. PHILADELPHIA

Propiedades de ALDROX

EL ALDROX—Gel Coloidal de Hidróxido de Aluminio de Wyeth, es un antiácido adsorbente e inabsorbible que, de acuerdo con el reactivo de Töpfer, es capaz de neutralizar en media hora no menos de doce veces su volumen de ácido clorhídrico (N 10). Al igual que la leche, el ALDROX no "neutraliza" completamente la acidez gástrica, sino que reduce las secreciones gástricas a un pH compatible con la rápida cicatrización y la formación de un revestimiento protector de la úlcera. Facilita la cicatrización de la úlcera sin provocar un estado alcalino artificial en el estómago, evitando de tal forma hipersecreciones reaccionales secundarias, tan frecuentes con las terapias alcalinas. El ALDROX, al contrario de los medicamentos alcalinos, es completamente inofensivo aun en los casos con historial de cólico renal o litiasis.



Dosis Oral

Sugerimos la siguiente dosificación:

Dos cucharaditas de ALDROX en medio vaso de agua, al levantarse, una hora después del desayuno, de cada comida y al acostarse. Entremedio de estas dosis puede recomendarse la toma de ALDROX en pequeños sorbos para controlar síntomas molestos. A los principios del tratamiento, el ALDROX puede ser indicado a intervalos de dos horas, día y noche.

JOHN WYETH & BROTHER, INCORPORATED Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Alta Calidad Desde 1860 PHILADELPHIA, PA., E. U. A.