

**Contributors**

Laboratorios Aliados de America

**Publication/Creation**

[1942]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/szgps8ca>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

# ANTIANEMIL

## COMPOSICION:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Extracto de hígado . . . . .     | 1.00 gms. |
| Extracto de bazo . . . . .       | 2.00 "    |
| Extracto de médula ósea. . . . . | 2.00 "    |

En una ampolla para administrar por

VIA DIGESTIVA.



## INDICACIONES:

Anemia en todas sus formas. Leucemias.

## DOSIS:

En los niños, de 50 gotas a el contenido de media ampolla por día, según la edad. En los adultos de  $\frac{1}{2}$  a 2 ampollas, también por día.

## PRESENTACION:

Caja de 6 ámpulas de 5 c. c. para administración exclusiva por vía bucal.





# TESTIMEDUL

## COMPOSICION:

|                              |           |   |           |
|------------------------------|-----------|---|-----------|
| Espermina.....               | 0.04 grs. | Glicerofosfato de magnesio.....         | 0.02 grs. |
| Extracto de cerebro.....     | 0.25 "    | Nitrato de estricnina.....              | 0.0005 "  |
| " " médula roja.....         | 0.25 "    | Suero fisiológico, c. s. p.....         | 2 c. c.   |
| Glicerofosfato de sodio..... | 0.05 "    | 1 c. c. es igual a 1 gr. de cada una de |           |
| " " potasio.....             | 0.03 "    | las materias frescas.                   |           |

## INDICACIONES:

Astenia, agotamiento nervioso, neurastenia, histerismo, también en la anemia perniciosa como medicación coadyuvante, en las anemias secundarias, clorosis, leucemias, debilidad sexual e impotencia.

## DOSIS:

Una ampolla intramuscular diaria o alterna a juicio médico o alterna por vía endovenosa.

## PRESENTACION:

En cajas de 6 y 12 ampollas de 2 c. c.