

Nueva sal bismútica hidrosoluble : Luebi Lada inyectables, tabletas / LADA, Laboratorios Aliados de América, S.A.

Contributors

Laboratorios Aliados de America

Publication/Creation

[1946]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/c4fqgsem>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Nueva Sal Bismútica

HIDROSOLUBLE

LUEBI

INYECTABLES
TABLETAS

Lada



LUEBI

INYECTABLE
TABLETAS

ALTO INDICE TERAPEUTICO

■ **Completa Absorción.**

■ **Mínima Toxicidad.**

- Fórmulas -

Tableta:

Bismutato de dihidroxipropilo	0.08 Gm.
Citrato de sodio	0.22 Gm.

Inyectable:

Bismutato de dihidroxipropilo	0.08 Gm.
Propilenglicol	0.50 Gm.
Alcohol bencílico	0.01 Gm.
Agua para inyectable, c.b.p.	1 cc.

Cada tableta o cada cc. equivalen a
50 Mg. de Bismuto.

Sífilis en todos sus periodos. Coadyuvante en los tratamientos mixtos a base de Bismuto y un Arsenical.

N

uevo compuesto de BISMUTO PENTAVALENTE, base activa del LUEBI, de absorción segura, amplia distribución y excreción. Por ser relativamente no tóxico, es un excelente medicamento en el tratamiento de la Sífilis.

Bajo su acción desaparecen las lesiones sífilíticas más rápidamente que con otros preparados de BISMUTO, y por las altas concentraciones que alcanza en el cerebro y líquido céfalorraquídeo, es especialmente apropiado para el tratamiento de la neurosífilis.

LUEBI en cualquiera de sus formas farmacéuticas, ha dado brillantes resultados clínicos. En la neurosífilis es insustituible, así como medicamento exclusivo en personas refractarias al Arsénico y al Mercurio.

PRESENTACION:

Frasco-ampula de
10 cc. y frasco de
30 tabletas.

D O S I S :

Tabletas.—Para adultos 1—2 tabletas tres veces al día con el estómago vacío (media hora o una hora antes del alimento).

Inyectable.—Para adultos 1 cc. en inyección intramuscular, dos veces por semana o cada tres días. Debe dejarse transcurrir por lo menos dos días entre una aplicación y otra.

En los niños las dosis están sujetas a la edad y al estado general.