

Bismutoterapia liposoluble : Karl Meinicke Bis Ambard : bismuto inyectable soluble ... / Laboratorios Ambard, Santiago de Cuba.

Contributors

Laboratorios Ambard

Publication/Creation

[1942]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/z9knvw2r>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

**BISMUTOTERAPIA
LIPOSOLUBLE**



KAHN-MEINICKE

BISAMBARD

**LABORATORIOS AMBARD
SANTIAGO DE CUBA**

BISMUTO INYECTABLE SOLUBLE

Bis Ambard

Solución oleosa a base de la **sal bismútica del Trimetil-Ciclopentano-Carboetoxi-Carbonato** asociada a la **Lecitina** a fin de utilizar de ésta última sus propiedades lipotróficas que estimulan la cicatrización de las lesiones luéticas.

Bis Ambard reúne las siguientes condiciones:

Tratamiento sencillo, cómodo e indoloro

Dosificación perfecta-0.045 bi metal por cada medio c. c.

Efecto treponemicida poderoso

Penetra en el líquido raquídeo por su condición aniónica

Permanece largo tiempo en el organismo

No es tóxico

Se elimina muy lentamente

Efectos duraderos

No afecta los riñones

Eliminación principalmente intestinal

Cinco séptimos son eliminados por esta vía

Un séptimo por los riñones

El resto por otros emucorios

No provoca albuminuria ni efectos secundarios

No causa estomatitis ni gingivitis

FORMULA:

Trimetil-ciclopentano-carboetoxi-carbonato de bismuto.....	0.192 grs.
Lecitina de huevo.....	0.050 "
Vehículo alcoholbenciloleoso.....	0.500 c. c.

CADA AMPULA DE MEDIO C. C. EQUIVALE A 0.045 BI METAL

DOSIS:

Adultos: de $\frac{1}{2}$ a 1 c. c. dos o tres veces por semana pudiendo aumentar la dosis hasta 1 $\frac{1}{2}$ c. c. cada vez

Niños: 0.3 c. c. por cada 15 Kilgrs. de peso.

INDICACIONES:

Todos los estados luéticos. De acción muy eficaz en las formas nerviosas por su penetración en el líquido cefalo raquídeo.

En las amigdalitis fusio-espirilar (Vincent) En la frambe-sia o Pian. Mal de Pinto, etc.