

Evite que se desencadere el shock anafiláctico en el organismo de su paciente : Poli-Tiosulfato inyectable y oral, Tiosulfate intramuscular, Polipeptona adultos y niños, Biliseptina / Laboratorios Dr. Laureano Pequeño.

Contributors

Laboratorios Dr. Laureano Pequeño

Publication/Creation

[1942]

Persistent URL


<https://wellcomecollection.org/works/wwwsnfcu>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



según su localización:

NASALES: Estornudos, inflamación de las membranas, generalmente acompañadas de excesiva secreción mucosa clara.

FARINGEA: Picazón, tos espasmódica.

BRONQUIAL: Obstrucción bronquial, con expiración e inspiración fatigosa y frecuentemente acompañadas de espectoración, de esputos claros mucosos.

APARATO RESPIRATORIO: Asma.

OCULARES: Edema de la conjuntiva, picor, inflamación y enrojecimiento de los párpados, excesiva secreción lacrimal.

GASTRO-INTESTINALES: Dolores abdominales, intolerancia digestiva, inapetencia, náuseas, estreñimiento, intoxicaciones alimenticias, diarreas, resultando relativamente frecuentes ciertos tipos de colitis especialmente colitis muco-membranosa o del tipo de colon espástico o colon irritable y la mixo-neurosis intestinal.

VEJIGA: Frecuentemente dolorosas micciones.

HEPATICAS Y VESICULA BILIAR: Pueden presentarse como un verdadero cólico hepático (Síndrome coloido-clásico de Parturier), pasando naturalmente por formas más larvadas a tipo de colecistitis infecciosa o de litiasis biliar.

ARTRITICAS: Dolores en las articulaciones e inflamaciones son muy definidas e interesantes en las manifestaciones alérgicas.

CUTANEAS: Urticarias, edema angioneurótico, eczemas, pruritos, erupciones, eritemas, etc.

PRESION SANGUINEA: Crisis de hipotensión.

NERVIOSAS: Jaquecas, excitabilidad nerviosa, irritabilidad, insomnios, depresión, astenia y neurastenia.

PRESENTACION:

Biliseptina { Granulado, frasco de 6 onzas.
Comprimidos, frasco de 50 comp.

Poli-Tiosulfato { Oral, frasco de 4 onzas.
Inyectable, caja x 10 amp. 2 c.c.

Polipectona para Adultos, Granulado, frasco de 6 onzas.

Polipectona para Adultos, Comprimidos, frasco de 50 comp.

Polipectona para Niños, Granulado, frasco de 6 onzas.

Tiosulfato Intramuscular, caja x 10 amp. 2 c.c.

1942

LABORATORIOS DR. LAUREANO PEQUEÑO

ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS