

Trichuris trichiura (Tricocéfalo dispar) ... : medicación específica: Santokin Kuba líquido en enemas / Laboratorios Kuba ; Kouri-Basnuevo.

Contributors

Laboratorios Kuba
Kouri-Basnuevo

Publication/Creation

[1951]

Persistent URL


<https://wellcomecollection.org/works/wjy6gtf8>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



TRICHURIS TRICHIURA (Tricocéfalo dispar)
Ciclo Evolutivo

Esquema original de los Dres. Kouri-Basnuevo

Los Tricocéfalos macho y hembra (a) y (b) se localizan especialmente en el ciego (m) del hombre (l) su hospedero habitual. La hembra (b) pone huevos (c) que salen al exterior con las heces (h). Pasado algún tiempo de su estancia en el exterior, estos huevos se embrionan (d) y constituyen la forma infestante para el hombre. Cuando éste los ingiere, tomándolos del suelo (i, j), directamente con sus manos, o por intermedio de sus alimentos (k, l), el embrión queda en libertad en el intestino y se hace parásito adulto, macho (a) o hembra (b). Esta, después de la cópula, pone huevos fecundados (c) que salen al exterior con las heces (h) recomenzando de nuevo el ciclo.

(Cortesía de "Lecciones de Parasitología y Medicina Tropical", por los doctores Pedro Kouri y José G. Basnuevo, La Habana, Cúba.)

MEDICACION ESPECIFICA:

SANTOKIN KUBA LIQUIDO EN ENEMAS

SANTOKIN KUBA LIQUIDO EN ENEMAS

FORMULA:

Cada 15 c.c. contiene:

Hexilresorcinol 1 Gm
Glicerina, c. s. p. 15 c.c.

INDICACIONES

Contra la Tricocefalasis y la Oxyuriasis.

PLAN DE ADMINISTRACION:

1o.) PREPARACION PREVIA DEL PACIENTE:

En la víspera del enema medicamentoso, es conveniente que el paciente no ingiera más que alimentos líquidos todo el día. Por la noche al acostarse, se administrará un enema evacuante, y otro por la mañana al levantarse, con agua hervida tibia, con el propósito de limpiar lo mejor posible el colon.

2o.) ENEMA MEDICAMENTOSO:

a) Mezcla del **SANTOKIN LIQUIDO**, en la proporción de un frasco de 15 c.c. por cada 300 c.c. de agua hervida tibia, o de solución acuosa tibia de Acacia (Goma arábica) al 10%.

b) **Dosis: A los Niños:** De 1 a 5 años, 200 a 500 c.c. de la mezcla, en la proporción arriba señalada (un frasco de 15 c.c. de **SANTOKIN LIQUIDO**, por cada 300 c.c. de agua hervida tibia, o de solución acuosa tibia de Acacia (Goma arábica) al 10%.)

A los Adolescentes y Adultos: De acuerdo con la edad, y sobre todo, con la talla, de 600 a 1200 c.c. de la mezcla, siempre en la proporción de un frasco de 15 c.c. de **SANTOKIN LIQUIDO**, por cada 300 c.c. de agua hervida tibia, o de solución acuosa tibia de Acacia (Goma arábica) al 10%.

c) El Enema medicamentoso se administrará en ayunas, dos horas después del último enema evacuante, y deberá retenerse por un tiempo no mayor de 15 minutos, a partir del momento en que comience la instilación rectal del medicamento.

d) Deberá protegerse, con vaselina sólida, las regiones anal, perianal, y vecinas, contra el contacto de la solución del **SANTOKIN LIQUIDO**, a fin de evitar cualquier posible irritación cutánea.

PRESENTACION:

Frascos de 15 y de 30 c.c.

LABORATORIOS KUBA. S.A.

INSTITUTO DE PARASITOLOGIA Y MEDICINA TROPICAL

KOURI-BASNUEVO

QUINTA AVENIDA Y CALLE 78 — MIRAMAR, MARIANAO — HABANA, CUBA