

**Enterobius vermicularis (Oxyuris) ... : medicación específica: por vía oral:
Oxyuricda Kuba tabletas recubiertas y granulado : por vía rectal: Santokin
Kuba líquido en enemas / Laboratorios Kuba.**

Contributors

Laboratorios Kuba

Publication/Creation

[1952]

Persistent URL


<https://wellcomecollection.org/works/ednhaxv8>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



ENTEROBIUS VERMICULARIS (Oxyuris)
Ciclo evolutivo

En este parasitismo existe el fenómeno de auto-infestación (d), debido a que el huevo es embrionado e infestante en el momento mismo de ser puesto por la hembra en las mórgenes del ano y en el medio exterior. (a) Hembra ovífera en las mórgenes del ano, donde pone huevos (c) que contaminan los dedos del hospedero, o llegan, junto con las heces (h), o sin ellas, al suelo (c') contaminando nuestros alimentos (k, l). Si son ingeridos, el embrión intra-ovular queda libre en el intestino donde se desarrolla la forma adulta hembra (a) o macho (b). Después de la cópula los machos (b) se detienen y mueren en el ciego, mientras que las hembras ovíferas (a) descienden a poner a las mórgenes del ano de su hospedero (1) para comenzar de nuevo el ciclo.

(Cortesía de "Lecciones de Parasitología y Medicina Tropical", por los doctores Kourí y Basnuevo. La Habana, Cuba)

MEDICACION ESPECIFICA:

Por vía oral.

OXYURICIDA KUBA

TABLETAS RECUBIERTAS Y GRANULADO

Por vía rectal:

SANTOKIN LIQUIDO EN ENEMAS

OXYURIASIS

Tratamiento por Vía Oral:

OXYURICIDA KUBA

A base de **Violeta de Genciana**

PARA LOS ADULTOS:

Tabletas Recubiertas de 0.03 Gm. (Tipo "Adulto")

Dosis: Tres tabletas al día, durante 16 días.

Presentación: Frascos de 50 tabletas.

PARA LOS NIÑOS:

Tabletas Recubiertas de 0.01 Gm. (Tipo "Infantil")

Dosis: Una tableta al día, por año de edad, durante 20 días.

Presentación: Frascos de 50 tabletas.

Granulado (0.01 Gm. por cucharadita)

El "Oxyuricida Granulado" ha dejado, total y definitivamente, resuelto el problema de administrar Violeta de Genciana a niños muy pequeños, incapaces de tragar las tabletas. Su sabor es agradable y el Carbonato de sodio que ha sido agregado a su fórmula, evita las náuseas y vómitos producidos por la Violeta de Genciana, sin que afecte, en lo más mínimo, su eficacia terapéutica.

Dosis: Una cucharadita al día, por año de edad, durante 20 días.

Presentación: Frascos de 160 Gms.

Tratamiento por Vía Rectal:

SANTOKIN LIQUIDO EN ENEMAS

A base de **Hexilresorcinol**

La administración por vía rectal del **SANTOKIN LIQUIDO**, aplicado en forma de enemas, constituye el más seguro tratamiento de la OXYURIASIS.

Los enemas se preparan en la proporción de 15 cc. de **SANTOKIN LIQUIDO** por cada 300 cc. de agua hervida tibia o de solución acuosa tibia de Acacia (Goma arábica) al 10%.

Dosis: Generalmente, para los enemas medicamentosos, se utilizan 15 cc. de la solución final (15 c.c. de **SANTOKIN LIQUIDO** por cada 300 c.c. del diluyente) por cada libra de peso hasta las 80 lbs. Después de las 80 libras se utilizan de 1,200 c.c. a 1,500 c.c. Antes de administrar el enema medicamentoso, se limpiará bien el colon de materias fecales, administrándose dos enemas evacuantes de agua hervida tibia, uno la noche anterior y otro a la mañana siguiente, dos horas antes del enema medicamentoso, estos dos últimos en ayunas.

Presentación: Frascos de 15 y 30 c.c.

LABORATORIOS KUBA, S. A.

(Instituto de Parasitología y Medicina Tropical Kouri-Basnuevo)

QUINTA AVENIDA Y CALLE 78 — MIRAMAR, MARIANAO — HABANA, CUBA

1952