

Picratol picrato de plata Wyeth : para el tratamiento de la tricomoniosis vaginal / Wyeth International Limited.

Contributors

Wyeth International

Publication/Creation

[1949]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/bawkry9j>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



PICRATOL

PICRATO DE PLATA


Wyeth

Para el tratamiento de la

TRICOMONIOSIS VAGINAL

WYETH INTERNATIONAL LIMITED, NEW YORK, N. Y., U. S. A.

TRICOMONIOSIS VAGINAL



- A. Flagelos
- B. Blefaroplasto
- C. Axostilo
- D. Granulaciones cromáticas
- E. Cuerpo y filamento parabasal
- F. Núcleo
- G. Membrana ondulante

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

Clínicamente se hace diagnóstico de presunción de la Trichomoniosis ante la presencia del típico flujo amarillo pardusco, espumoso y mal oliente; queja de picazón y ardor en los genitales externos, así como aparente inflamación de la mucosa vaginal, mostrando erosión o puntitos rojos semejantes a fresas (frutilla).

Para su confirmación debe efectuarse un examen microscópico de un frotis tomado de la secreción del cuello, el cual se diluye en solución salina normal, suero fisiológico o solución modificada de Ringer.

TECNICA DEL TRATAMIENTO

Lávese y séquese bien la vagina y en caso de existir un tapón de moco cervical, éste deber ser removido mecánicamente. Una mezcla de caolín e hidróxido de aluminio coloidal (Kao-magma) facilita esta operación debido a que coagula el moco y permite su expulsión.

Aplíquese un frasco de 5 Gm. de POLVO DE PICRATOL WYETH al Insuflador y sin el uso de un espéculo, insértese el insuflador hasta que la campana de goma haya cerrado bien la entrada de la vagina; entonces

pulverícese bien todo el contenido del frasco sobre la mucosa vaginal dando atención especial al cuello y fondo de saco, retirando ligeramente el insuflador después de cada tres o cuatro compresiones con el fin de no ejercer una presión excesiva en la vagina. Ordénese a la paciente insertarse todas las noches (durante seis noches subsiguientes a la pulverización) un OVULO de PICRATOL WYETH y entonces volver al consultorio para una segunda y última pulverización, la cual debe ser seguida también de otra serie de seis OVULOS de PICRATOL WYETH.

Al terminar esta segunda serie de óvulos, la paciente debe visitar nuevamente al médico para un examen final. En caso de creerlo necesario, el médico puede efectuar una tercera pulverización acompañada de otra serie de seis óvulos, pero en la mayoría de los casos esta medida no es necesaria, ya que dos pulverizaciones son generalmente suficientes para obtener la curación. En el caso de una reaparición de los síntomas, el médico podrá comprobar que en todos los casos se trata de una reinfección de la paciente.

WYETH INTERNATIONAL LIMITED, NEW YORK, N. Y., U. S. A.