

Nitocol : fricciones - jarabe / Laboratorios MIDY.

Contributors

Laboratorios MIDY

Publication/Creation

[1956]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/tn7tmdvj>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



NITOCOL

fricciones - jarabe



NITOCOL

afecciones de las vías respiratorias

F r i c c i o n e s

Modo de empleo

Nicotinato de guayacilo
Nicolinato de fenilo
Esencia de limón deterpenada
Metoxitímol
Alcanfor
Excipiente no graso penetrante

J a r a b e

Esencia de limón deterpenada
Timol sulfonato de sodium
Benzooato de ammonium
Jarabe de codeína
Tintura de estramonio
Jarabe de hiedra

Indicaciones

Los ésteres nicotínicos, vasodilatadores periféricos penetrantes, confieren al NITOCOL-FRICCIONES su originalidad: una simple unción torácica provoca una fuerte hiperemia cutánea, una descongestión profunda, y permite la penetración transcutánea efectiva de los principios antisépticos y balsámicos del NITOCOL. Ninguna irritación de la piel.

Calma la tos y facilita la expectoración. Débilmente dosificado en codeína (cuya acción se refuerza por el jarabe de hiedra) el NITOCOL JARABE corta la tos sin cortar el apetito.

Propiedades terapéuticas

Traqueítis, bronquitis, catarros.
Todas las indicaciones de la revulsión torácica.

Afecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias: tos, traqueítis, bronquitis, laringitis, etc.


Composición

Aplicar sobre el pecho y la espalda, suavemente, 2 a 3 veces al día, hasta su completa penetración. Si se desea una revulsión energica, cúbrase con una capa de franela.

No mancha - No es grasoso - Olor agradable.

Adultos (y niños mayores de 12 años): 2 a 4 cucharadas cada 24 horas.

Niños: (3 a 12 años): 1 a 4 cucharaditas cada 24 horas.



1956
LABORATORIOS MIDY, S. A.
Clavel 302 - Habana, Cuba.

