Ferrous-Om, hierro estable en altas dosis con vitaminas ... : Calciocolina, sacaronato de calcio y colina al 22% ... / Laboratorios Om.

Contributors

Laboratorios Om

Publication/Creation

[1944?]

Persistent URL


https://wellcomecollection.org/works/y58aw9tk

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org



HIERRO ESTABLE
EN ALTAS DOSIS
CON VITAMINAS

A - B1 - B2 (G) - C - D

Antianémico y reconstituyente general, de especial indicación en las anemias secundarias e hipocrómicas, desnutrición, convalecencias, avitaminosis, catarros frecuentes, inapetencia, embarazo y lactancia.

Cada cucharada de 15 c.c. corresponde a 645 milígramos de Sulfato de hierro, equivalente a 125 milígramos de hierro estable y asimilable.

FORMULA POR 15 C.C.

Hierro estable		125	mgrs.
	A natural		
Vitamina	B1, Cloruro Tiamina	100	U.I.
Vitamina	B2 (G), Riboflavina	200	gam.
Vitamina	C, Acido Ascórbico	500	U.I.
Vitamina	D natural	500	U. I.



POSOLOGIA

ADULTOS: DE DOS A CUATRO CUCHARADAS AL DIA.

NIÑOS: DE DOS A CUATRO CUCHARADITAS.

INFANTES: UNA O DOS CUCHARADITAS DE LAS DE CAFE.

Laboratorios Om

CALCIOCOLINA Sacaronato de Calcio y Colina al 22%

ADULTOS

Inyectable



a asociación del Calcio y la Colina, hace tratade este medicamento un enérgico tratamiento de las enfermedades infecciosas y un poderoso reconstituyente y recalcificante, un poueroso reconstituyente y recatcincante, aumentando la Colesterina en la sangre sin modificar la glucemia.

Desmineralización. Raquitismo. Tuberculosis. Pretuberculosis. Fenómenos de decalcificación. Fretuberculosis. Fenomenos de decalcificación. Accidentes
Espasmofilia. Crecimiento defectuoso. INDICACIONES: séricos y como preventivo del shok anafiláctico. Posee la máxima tolerancia en productos cálcicos.

Adultos: 1 ampolla diaria o alterna, intra-Niños: media o una ampolla de la infantil, POSOLOGIA: venosa o intramuscular. diaria o alterna.

Caja de 8 ampollas de 5 c.c. para adultos. Caja de 8 ampollas de 2 c.c. para niños. PRESENTACION:

HABANA Laboratorios Om CUBA