Gotas Cosedal Infantil: sedante de tos / Laboratorios Vieta-Plasencia, S.A.

Contributors

Laboratorios Vieta-Plasencia

Publication/Creation

[1957?]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/srgxaybq

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).





Gotas

* COSEDAL

Infantif



SEDANTE DE LA TOS



Laboratorios VIETA-PLASENCIA, S. A.



COSEDAL INFANTIL

COSEDAL "INFANTIL" es una nueva presentación de las gotas COSEDAL, cuya fórmula sólo ha sido alterada para sustituir la codeína por narcotina, con el fin de permitir la administración de este eficaz antitusígeno, no narcótico, en los casos en que se objete el uso de la codeína, lo que ocurre con mayor frecuencia en la infancia. De este modo, los señores médicos pueden seleccionar entre 2 presentaciones de COSEDAL, la clásica presentación con codeína y la actual a base de narcotina, ambas de amplio uso en Pediatría.

La Narcotina -C22 H23 NO7- es un derivado isoquinoleinico del opio, que la contiene en la proporción de un 6%. Aunque deriva del opio, no es narcótico, como tampoco lo es la papaverina que pertenece al mismo grupo químico. Como ésta, no origina hábito ni efectos aviesos, pudiendo suprimirse su administración en cualquier momento, aún después de prolongada administración. Aunque es un antitusígeno de acción central, no tiene efectos secundarios sobre el Sistema Nervioso Central, ni modifica la tensión arterial, respiración o peristalsis intestinal. Se le atribuye un discreto efecto broncodilatador, lo cual facilita la expectoración. Su toxicidad es prácticamente nula, aún cuando se prolongue su empleo por largo tiempo. Sus propiedades antitusígenas son comparables con las de la codeína, pero algunos le atribuyen propiedades superiores que las de esta droga. Está indicada siempre que se desee moderar o suprimir el síntoma tos, no importa su etiología.

La Tintura de Beleño, actúa sobre las vías de conducción del estímulo tusígeno; su principio activo es la hiosciamina, pero contiene pequeñas cantidades de escopolamina y atropina. El Acónito actúa selectivamente sobre la tos a punto de partida laríngeo o traqueal, pues una vez absorbido ejerce una acción

anestésica sobre las mucosas, siendo de gran utilidad en la tos de origen nervioso; se emplea la tintura de raíz de acónito, que contiene ½ mg. de alcaloides por centímetro cúbico, principalmente aconitina. La acción adrenérgica de la Efedrina complementa la fórmula de COSEDAL "INFANTIL"; pues la proporción contenida en cada dosis ejerce discreta acción broncolítica, coadyuvando a la expulsión de secreciones, sin que aparezcan manifestaciones secundarias desagradables.

COSEDAL "INFANTIL" se presenta en forma de una agradable suspensión, con sabor de menta, que permite su administración en los niños de paladar más exigente.

FORMULA:

(Cada cc. (30 gotas) contiene:

Narcotina	30	mg.
Tintura de Beleño	0.20	cc.
Tintura de Acónito	0.10	cc.
Bromuro de Efedrina	10	mg.
Excipiente idoneo, c. s.		

INDICACIONES:

Siempre que se desee moderar o suprimir el síntoma tos.

ADMINISTRACION Y DOSIS:

Menores de 6 años: 10 gotas. De 6 a 12 años: 15 a 30 gotas.

Mayores de 12 años: 30 gotas. Estas dosis pueden ser repetidas 2 ó 3 veces en el día, de acuerdo con las necesidades individuales.

PRESENTACION:

Frasco gotero de 12 cc.



LABORATORIOS VIETA-PLASENCIA, S. A.

REINA 310 HABANA
MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE LABORATORIOS CUBANOS

1957