

Dihidropenicilina Vipla / Laboratorios Vieta-Plasencia, S.A.

Contributors

Laboratorios Vieta-Plasencia

Publication/Creation

[1953?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/bu4jyxrw>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Cada frasco contiene:

Sulfato de Dihidroestreptomicina
equivalente a 1 Gm de Estrepto-
micina pura, base, y 500,000 uni-
dades de Penicilina G Potásica
cristalizada



Cada frasco contiene:

Sulfato de Dihidroestreptomicina
equivalente a 1/2 Gm de Estrepto-
micina pura, base, y 500,000 uni-
dades de Penicilina G Potásica
cristalizada.



Cada frasco contiene:

Sulfato de Dihidroestreptomicina
equivalente a 1 Gm de estrepto-
micina pura, base.

Penicilina G Procaína 600,000 U.I.
Penicilina G Potásica 400,000 U.I.



DIHIDROPENICILINA



LABORATORIOS VIETA - PLASENCIA, S. A.
HABANA - CUBA

Doctor: ofrecemos a Ud.

DIHIDROPENICILINA

en tres presentaciones:

¡ Una para cada necesidad de su paciente. . . !

I

"Cuando prefiera la acción de depósito de la penicilina procaínica, que mantenga por 24 horas o más, los efectos intensos pero efímeros de la penicilina cristalizada, prescriba:

R/

DIHIDROPENICILINA "FUERTE"

. . . y obtendrá, además, una suspensión perfecta de los antibióticos, **que no se adhiere a las paredes del frasco,** facilitando su dosificación y evitando el desperdicio de la droga".

II

"Cuando desee penicilina cristalizada, para administración endovenosa*, preparación de nebulizaciones (aerosol) o, simplemente, administración intramuscular a intervalos frecuentes, de 3 a 12 horas, prescriba:

R/

DIHIDROPENICILINA "1 Gm."

O

R/

DIHIDROPENICILINA "1/2 Gm."

. . . de acuerdo con la proporción de penicilina y estreptomicina que requiera, siendo más utilizable la presentación de "1/2 Gm." cuando mayor dosis de penicilina desee administrar diariamente, pues el riesgo de alcanzar dosis tóxicas de estreptomicina se reduce a la mitad."

* Infusión gota a gota.