

Dinesta : via digestiva : Ulcocida / Laboratorios Vieta-Plasencia, S.A.

Contributors

Laboratorios Vieta-Plasencia

Publication/Creation

[1944?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/yghrgtug>

License and attribution


Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DINESTA

VIA DIGESTIVA



ULCO CIDA

DINESTA

(Solución de Monoclorhidrato de Histidina al 4%)

HISTIDINOTERAPIA DE LA ULCERA GASTRO-DUODENAL

- Alivia el dolor.
- Actúa directamente sobre la lesión.
- Favorece la regresión de la misma.

Posología:— Un ampula diariamente de 5 c.c. hasta llegar a 21 inyecciones.

Debe instituirse una segunda cura a las seis semanas o a los tres meses y una tercera al año para evitar recidivas.

Presentación:— Caja x 6 ampulas de 5 c.c.

ULCOCIDA

ANTIACIDO, ANTIESPASMÓDICO, Y SEDANTE
DE LAS MUCOSAS DIGESTIVAS.

Tratamiento adecuado de la hipersecreción que conduce tan amenudo a los estados ulcerosos.

Coadyuvante de la histidinoterapia como tópico de la mucosa, en las úlceras establecidas.

Dosis:— Una cucharadita media hora después de las comidas, desleída en un poco de agua.

Presentación: Frasco de 240 gramos netos.



LABORATORIOS VIETA-PLASENCIA, S. A.
HABANA - CUBA

Miembros de la Asoc. de Laboratorios Cubanos. Inscip. Retiro Médico No. 30.