Contributors

Laboratorios Vieta-Plasencia

Publication/Creation

[1948?]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/rebsaq7p

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org



ANTIACIDO

DURANTE décadas el tratamiento del ulcus gastro-duodenal y de la hiperacidez gástrica por los alcalinos rindió óptimos frutos. Sus inconvenientes (producción de gases, pelígro de alcalosis, etc.) fueron obviados al introducir en la terapéutica de esta grave afección el trisilicato de magnesia, de gran poder adsorbente y neutralizante.

MGNORHL

ADSORBENTE

MAGNOTRISIL (Trisilicato de Magnesia) neutraliza *lentamente* el contenido gástrico *sin alterar* el equilibrio ácidobásico y no inhibe la acción de la pepsina.

MAGNOTRISIL produce, al mezclarse con los jugos digestivos, una magma gelatinosa que protege las mucosas del tubo gastro-intestinal. Su acción antiácida es más duradera que la de los alcalinos corrientes. El contenido gástrico se mantiene por más tiempo junto al punto de neutralidad.

Hace cesar la hemorragia y el dolor y adsorbe las toxinas intestinales.

Evita los gases (flatulencia).

INDICACIONES

Ulcera Gástrica - Hiperacidez Gástrica - Dispepsia - Toxemia Intestinal - Fermentación Destructiva - Envenenamientos.

DOSIS

1 ó 2 tabletas después de los alimentos, sea triturándolas o dejándolas desintegrar en la boca.

> MAGNOTRISIL Frasco de 50 tabletas.



LABORATORIOS VIETA-PLASENCIA, S. A. Reina No. 310 Habana - Cuba

Miembro de la Asoc. de Laboratorios Cubanos. Inscripción Retiro Médico No. 30.