

Siomine : tetrayoduro de metenamina / Pitman-Moore Company ; agentes para la isla de Cuba: Kaufmann y Quintana.

Contributors

Pitman-Moore, Inc.
Kaufmann y Quintana

Publication/Creation

[1941]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/n2v274qy>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

SIOMINE

TETRAYODURO
DE METENAMINA

24.22.22



PITMAN-MOORE COMPANY
INDIANAPOLIS, IND., E. U. A.

SIOMINE

INDICACIONES

ARTERIOESCLEROSIS — ESCLEROSIS CORONARIA — ANGINA PECTORIS — ANEURISMO AORTICO - BOUCIO - BRONQUITIS CRONICA - TOS - ASMA - REUMATISMO ARTICULAR — DERMATOSIS ACTINOMICOSIS — SPOROTRICOSIS — SIFILIS TERCIARIA Y SECUNDARIA TARDIA — TABES DORSALIS — AFECCIONES CEREBRALES NERVIOSAS — ENFERMEDADES DE LOS OJOS, ETC.

POSOLOGIA

En casos no específicos la dosis que se sugiere al médico es de 1 cápsula tomada 2 a 3 veces al día inmediatamente después de las comidas. Se tomará encima un vaso de agua.

En el tratamiento de la sífilis la dosis generalmente suficiente es de 3 a 6 cápsulas diarias tomadas después de las comidas acompañadas de un vaso de agua.

PRESENTACION

Frascos de 20 y 40 cápsulas.

SIOMINE con CINCOFENO, cápsulas.

Este producto combina la acción de la SIOMINE con la acción anti-reumática, analgésica y eliminadora del ácido úrico del cincófeno.

Muy eficaz para el tratamiento de la neuritis, gota y otros estados inflamatorios dolorosos, musculares o articulares.

POSOLOGIA: 1 a 2 cápsulas 3 veces al día. Adviértasele al paciente que tome agua en abundancia para asegurar una buena diuresis.

PRESENTACION: frascos de 20 cápsulas.

SIOMINE con SALICILATO DE SODIO, cápsulas.

Indicado en todos los casos en que conviene administrar una medicación **yodo-salicilada**. Los ingredientes se hallan en proporciones que permiten administrar una dosis eficaz de salicilato sin rebasar la dosis conveniente de SIOMINE.

POSOLOGIA: adulto (para dosis máxima de salicilato) 2 cápsulas 4 veces al día, durante 3 días con descanso de 3 días.

PRESENTACION: Frascos de 40 cápsulas.

Agentes para la Isla de Cuba:

KAUFMANN Y QUINTANA

Apartado 1658 HABANA Teléf. F0-1774.