Dramamine brand of dimenhydrinate : Norblastín : B12 + acido folico, dos factores importantes en la terapéutica de las anemias megaloblásticas / Searle.

Contributors

Searle

Publication/Creation

[1956?]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/heczt5dq

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org "...hemos comprobado que 50 mg. dos veces al día es suficiente para prevenir los efectos del mareo."

-Rust, S.M., and Fosbery, F.W.A.: Prevención del Mareo (Correspondencia), Brit. M.J. 2:98 (Julio) 1949.



BETTHAN ARCHIVE

Se ha comprobado que pequeñas dosis de Dramamine frecuentemente son suficientes para prevenir el marco en el mar, en aviones, en trenes o cualquier otra forma de marco de movimiento.

También el Dramamine es efectivo en el tratamiento de Náuseas del Embarazo, Síndrome de Meniere, Vértigos, Migraña, Náusas Postoperatoria, etc.

El Dramamine se presenta en tabletas de 50 mg. y también en elíxir.





SEARLE

La Investigación al Servicio de la Medicina



B₁₂ + ACIDO FOLICO Dos factores importantes en la terapéutica de las anemias megaloblásticas

Morblastin

- La Vitamina B₁₂ actúa como el factor extrínseco.
- 2.- El Acido Fólico estimula la utilización de la B₁₂.
- Existe una gran sinergia, entre ambos factores.



INVESTIGACIONES CIENTIFICAS AL DIA