

El uso de Aldrox por el metodo de gota a gota / Wyeth International Limited.

Contributors

Wyeth International

Publication/Creation

[1947]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/axgksxgj>

License and attribution


Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

El uso de **ALDROX**

POR EL METODO DE GOTA A GOTA



Se han alcanzado resultados favorables con ALDROX en cientos de casos de úlceras pépticas con el tratamiento intragástrico continuo de gota a gota. Este tratamiento es altamente eficaz en casos de melena y hematemesis, así como en casos de úlceras resistentes. El mismo tratamiento realizado en un hospital durante 10 días, se está popularizando igualmente para tratar úlceras pépticas no complicadas, cuando el paciente tiene medios económicos para los gastos de hospital. El tratamiento de gota a

gota con gel de alúmina proporciona una protección no interrumpida contra la acción corrosiva del jugo gástrico.

En casos de hemorragia gástrica, la instilación continua de este medicamento protege el coágulo que cubre la superficie ulcerada. El Aparato Wyeth para Tratamiento Intragástrico Continuo de Gota a Gota, es sencillo y eficiente y su manejo requiere muy poco tiempo de parte del médico.

Véase a la vuelta la descripción de este aparato.

WYETH INTERNATIONAL LIMITED • NEW YORK

TRATAMIENTO POR GOTA A GOTA CON

ALDROX

GEL DE HIDROXIDO DE ALUMINIO WYETH


DURANTE 10 DIAS.



El tratamiento con ALDROX por el método de gota a gota no se limita únicamente al hospital, sino que puede emplearse también cómodamente en el hogar. Está especialmente indicado en casos graves de hipersecreción y ataques frecuentes de dolor.

Proporciona además una protección segura y constante contra nuevos factores de irritación durante los períodos en que se necesita la administración constante del medicamento.

En este método ALDROX se diluye en tres partes de agua y se instila constantemente en el



estómago por medio de una sonda nasogástrica (sonda Levin o la sonda aplastable latex) a razón de 15 gotas por minuto, día y noche. La sonda debe llegar hasta el extremo inferior del esófago y no es necesario retirarla para limpiarla, a menos que así se desee.

A petición se enviará una circular que describe detalladamente el procedimiento.

Puede recetarse el ALDROX para uso oral al igual que para la instilación continua. Cuando se recete el ALDROX para uso oral, hay que tomarlo con frecuencia y por un largo tiempo para obtener los mejores resultados. La dosis ordinaria es de una o dos cucharaditas, cinco o seis veces al día.

Para comodidad de los casos ambulatorios ofrecemos también las TABLETAS ALDROX. Cada tableta produce el efecto antiácido de dos cucharaditas de ALDROX líquido.

ENVASES

ALDROX se ofrece en frascos de 6 o 12 onzas (líquido) y en cajas de cartón de 30 tabletas.

WYETH INTERNATIONAL LIMITED

NEW YORK, N. Y., E. U. A.

Printed in U. S. A.
WA-1B