

**Ulceroterapia : serie de productos Wyeth para llenar las necesidades individuales en el tratamiento de pacientes con ulcera peptica o gastroduodenal / Wyeth International Limited.**

**Contributors**

Wyeth International

**Publication/Creation**

[1949]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/epjyrhun>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome  
collection**

Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

# ULCEROTERAPIA...

SERIE DE PRODUCTOS WYETH PARA LLENAR LAS NECESIDADES INDIVIDUALES EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ULCERA PEPTICA O GASTRODUODENAL

## ALDROX

(LIQUIDO Y EN TABLETAS)

**INDICACIONES:** Alivia rápidamente el dolor producido por la hiperacidez, ayuda a la rápida cicatrización de la úlcera, elimina los peligros de reacciones ácidas secundarias y no produce alcalosis.

**ADMINISTRACIÓN:** De 1 a 2 cucharaditas cinco o seis veces al día, entre las comidas y al acostarse.

**PRESENTACIÓN:** Frascos de 175 y 350 cc. Para los casos ambulatorios se ofrecen las tabletas ALDROX en cajas de 30 tabletas. Cada tableta produce el efecto antiácido de dos cucharaditas ALDROX en forma líquida.



## PHOSPHALJEL

(FOSFALGEL)

Recomendado especialmente para los casos de úlceras marginales consecutivas a la gastroyunostomía, o úlceras acompañadas de diarrea, o cuando el régimen dietético está pobre en fósforo. Su efecto antiácido es cualitativamente semejante al del ALDROX, pero ligeramente más suave. Frascos de 175 y 350 cc.

## ALDROX con

TRISILICATO de MAGNESIO

Este producto se ha elaborado especialmente para enfermos que padeciendo de úlcera péptica están propensos al estreñimiento. Proporciona las ventajas de ALDROX además de impedir que se produzca estreñimiento. Frascos de 175 y 350 cc.

**PELICULA MEDICA:** Una película en color y hablada en español sobre la Patogenia, Diagnóstico y Tratamiento de la ULCERA PEPTICA GASTRODUODENAL, se proyectará ante grupos de médicos en todos los países de Hispanoamérica. Esta película fue hecha por el Laboratorio de Experimentos Gastroenterológicos del Hospital Mount Sinai de Nueva York, y producida por cortesía de los LABORATORIOS WYETH.

*Wyeth*  
International Limited

NEW YORK, U. S. A.






## Síntomas usuales de la úlcera...

El síntoma clínico usual de la úlcera péptica gastroduodenal es el dolor entre las comidas y dolor fuerte entre la 1 y las 3 de la mañana.

### SITIOS de Dolor en Casos de Úlceras Pépticas Gastroduodenales

Cada punto indica el sitio donde el enfermo siente máximo malestar. Las flechas indican las regiones en las que se proyecta el dolor; los diferentes dibujos indican la relativa frecuencia del cambio del dolor.



**ALDROX**

**ALDROX con**  
*Trisilicato de Magnesio*

**PHOSPHALJEL**  
(Fosfalgel)

Estos preparados proporcionan pronto alivio del dolor en la úlcera péptica gastroduodenal, y junto con reposo, dieta y dominio de las emociones, ofrecen medios reconocidos para el tratamiento de esta enfermedad.