Para infecciones cutaneas : tratamiento sulfamidade ... Alution, de sulfatiazol al 5 por ciento / Wyeth International Limited.

Contributors

Wyeth International

Publication/Creation

[1948]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/nv4kjcv7

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).




Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

PARA INFECCIONES CUTANEAS

Tratamiento Sulfamidado

Después del éxito asombroso obtenido con las sulfonamidas administradas por vía interna, para contrarrestar las infecciones piógenas, fué natural emplear estos agentes quimioterapéuticos en el tratamiento tópico de las infecciones de la piel.

El ALULOTION de Sulfatiazol al 5% ayuda a la utilización eficaz de la quimioterapia en el tratamiento de las enfermedades primarias de la piel, así como para contrarrestar las infecciones secundarias que se desarrollan en las infecciones cutáneas.



El ALULOTION de Sulfatiazol contiene un 5% de sulfatiazol en una base de gel de hidróxido de aluminio y caolín. Es un medio conveniente y efectivo para la aplicación tópica de sulfatiazol en una base exenta de grasa. Estudios sobre la difusión en agar, de preparados de sulfatiazol en diferentes bases, demostraron que las sulfonamidas se desprenden con mayor rapidez en bases que contienen agua.

**ALULOTION de Sulfatiazol al 5% se ofrece en frascos de 60 cc.


ALULOTION

DE SULFATIAZOL AL 5 POR CIENTO

Ventajas del ALULOTION



Distribuye el medicamento eficazmente.





No contiene grasa (Su base es hidromiscible).



Evita que la infección se extienda.

Hay 2 clases de 2 clases de ALULOTION

- 1 Alulotion de Mercurio Amoniacal con Caolín.
- 2 Alulotion de Sulfatiazol al 5%.



La absorción del sulfatiazol, aplicado tópicamente, no es suficiente, en condiciones normales, para producir efectos sistemáticos. Sin embargo, cuando se aplica por largo tiempo a superficies extensas, o cuando hay alergia, puede causar serias reacciones tóxicas. Si esto ocurre, se debe remover inmediatamente toda la loción y además hacerle tomar líquidos al paciente.

1948

Wyeth

INTERNATIONAL LIMITED • NEW YORK, N. Y., U. S. A. Printed in U.S. A.